

Ex Bibliotheca  
majori Coll. Rom.  
Societ. Jesu


72'6 34

72 12  
6 6  
34 25

72  
16  
2  
26







LAZARI  
RIVERII  
PRAXIS MEDICA,  
*CVM*  
THEORIA.



BIBLIOTHECA  
ROMANA  
VITTIORUM

LAZARI  
**RIVERII,**  
 CONSILIARII,  
 ET MEDICI REGII,



*ATQVE*

In Monspelienſi Vniuerſitate Medicinæ Profeſſoris , &  
 Doctorum Monspelienſium Decani.

**PRAXIS MEDICA**  
**CVM THEORIA.**

*EDITIO VLTIMA.*

*Cui accedit, Index rerum ampliffimus.*




**LVGDVNI,**

Sumpt. IOANNIS-ANTONII HUGVETAN,  
 & MARCI-ANTONII RAYAUD.

*M. DC. LX.*

**CVM PRIVILEGIO REGIS.**

7





ILLVSTRISSIMO  
*REVERENDISSIMOQUE DOMINO,*  
D. CLAVDIO  
DE REBE,

ARCHIEPISCOPO ET  
Primate Narbonensi , Præsidi nato  
Generalium Comitiorum Occitaniae ,  
Christianissimi Regis Consiliario , Sa-  
cri Ordinis Sancti Spiritus Commen-  
datario Torquato , &c.

*S A L.*



VLGARIBVS tantum , &  
malè feriatís hominibus  
ascribendum est , quod  
passim iactatur à multis : iniurias

ã 3 ac

## EPISTOLA

acceptas marmori , beneficia vero arenæ inscribi. Ingenuis viris , quia disparem longè fortiti sunt indolem , ita & discrepantes longè sunt mores : Hi nempe marmori beneficium insculpunt , non verò arenæ committunt , ne pestilens obliuio si temporis aura quidquid erat inscriptum obliteret , disperdâtque quod æternitati commensurari desiderant. Scite profectò , sapienterque Seneca , dum acceptorum beneficiorum memoriam apud omnes perennare voluit , consenescere nunquam ; iuvenes scilicet à Veteribus depingi Gratias , æquissimas dandorum , reponendorumque munerum præsidēs audierat , in quibus quò minùs esset ætatis , plus quoque foret memoriæ. Veritatis



# N V N C V P A T O R I A .

tatis huius conscia Monspeliensis  
 Vniuersitas ( A R C H I P R Æ S V L  
 I L L V S T R I S S I M E ) infinitis Mu-  
 nificentiae tuæ obstricta nomini-  
 bus , recentem beneficiorum à te  
 acceptorum memoriam non mar-  
 mori tantum , sed & fastis omnibus  
 insculpere : nec agere tantum gra-  
 tias , sed & referre gestiret ; nisi ex-  
 cellsa tua , & tenuis sua fortuna re-  
 munerandi facultatem adimeret.  
 At quod vnicum superest , ea per-  
 petuò commemorare non desinit ,  
 Hoc pulpita nostra quotidie perso-  
 nant , hoc passim audiunt literati  
 viri , Vniuersitatem hanc singulari  
 tuo præsidio consistere. Cùm enim  
 difficillimis Galliae temporibus Pro-  
 fessorum stipendia minimè proce-  
 derent , & pristinis defecta viribus

## EPISTOLA.

vix in sterilibus pulpitis suis hisce-  
ret eorum vox; indoluisti statim,  
quâ es humanitate, communi non  
eorum tantum, sed & studentium  
omnium damno; ac ne diutiùs  
elanguesceret Doctorum industria,  
paterno affectu, in huiusce pro-  
uinciæ Occitanicæ Comitiiis (quæ  
humeris patriæ salutem gestant)  
decreto sancitum esse voluisti, vt  
apud Regem, sacrumque eus Con-  
sistorium, per ipsos Comitiorum  
legatos, prouentus nostri de mo-  
re deinceps repræsentandi accura-  
rentur. Quinetiam priuatis literis  
aulæ Proceres monuisti, quanto hu-  
ius prouinciæ, & Galliæ totius de-  
trimento, suppressa essent Professo-  
rum stipendia. Cum autem inso-  
lita, quod exhaustum affirmabant,  
ærarij

## NVNCVPATORIA.

ærarij penuria conatus illos irritos  
 fecisset ; tu tandem eo anno , quo  
 legationem Comitiorum suscepisti,  
 ab ærarij Præfectis , aliisque sacri  
 Consistorij Proceribus , autoritate  
 & gratiâ , quâ polles maximâ , ius  
 nobis in stipendia nostra integrum  
 præsens obtinuisti , simulque pri-  
 stinum Academiae splendorem re-  
 stituiisti. Quo nomine quantæ tibi  
 referendæ sint gratiæ , nemo no-  
 strum ignorat. Hoc certè vnusquis-  
 que satagit , vt nullam tanti benefi-  
 cij prædicandi occasionem omittat.  
 Ego pro meo symbolo , hanc satis  
 insignem aripiendam censui , vt il-  
 lius magnitudo longè latèque pro-  
 pagetur. Efficiet foetus iste meus,  
 quem Celsitudini tuæ supplex offero,  
 consecróque lubens, vt tota intelligat

## EPISTOLA

ligat Europa (quam breui peragratu-  
rus est) paternâ tuâ curâ, piâque sol-  
licitudine huius Vniuersitatis de-  
cus omne constituisse. Non ignoro  
pro tanto, ac tam singulari bene-  
ficio, longè maiora atque illustrio-  
ra tibi à me deberi, tuumque no-  
men omnibus à me literis, atque  
ingenij monumentis celebrari oport-  
tere. Verùm neque tu id expectas,  
neque ego, si omnes animi & in-  
genij vires in hac re profundam,  
vllam partem tuarum laudum ac  
meritorum cùm in me, tùm in  
alios mei ordinis, assequi me posse  
confidam. Apud omnes liquidò  
constat, te pro illa animi tui ma-  
gnitudine, non aliam ex benefactis  
quærere vel gloriam, vel fructum,  
præter eam voluptatem, quam be-  
nefa

## N V N C V P A T O R I A .

nefaciendo aliis bonus quisque in seipso experitur. Officiorum vicissitudo eas amicitias continet , quibus inter se eiusdem sortis homines , aut certè non admodum dispares , deuinciuntur. Vobis , quos supra cæterorum conditionem euectos in ipso rerum humanarum fastigio diuina Providentia locauit , illud cum corporibus cœlestibus commune est , quòd vt illa efficientiam quidem declarant in inferiora hæc , verésque in ea exercent suas sed ab iis nihil vicissim accipere possunt : sic vos potestatis vestræ , atque auctoritatis documenta subleuandis inferioribus datis ; ipsi vicissim quicquam ab iis , præter laudem ac prædicationem , testem grati ac memoris animi , percipere non

## EPISTOLA

non potestis. Hoc igitur vnicum nobis superesse videretur, vt tuarum laudum præconio debitum soluere niteremur. Verum cùm te laus omnis inferior sit, non aliter laudari pro dignitate potes, nisi vt omnem tibi laudem imparem esse fateamur. Eâ enim cœli facie ac compositione natus videris, vt omnem omnium in te astrorum contractam felicitatem esse nemo non iudicet, quorum impressionibus absolutissimam corporis & animi præstantiam consequutus es. *Si enim* ( vt de Traiano Imperatore à Plinio iunior dictum ) *proceritas corporis, honor capitis, & dignitas oris, ætatis inflexa maturitas, & festinatis senectutis insignibus, ad augendâ maiestatem ornata cæsaries, longè latèque principem*

## NVNCVPATORIA.

*pem ostentant* : Hæc tua certè cum tanto Imperatore similis effigies , te, si minus orbis vniuersi , saltem Ecclesiæ Imperiorum omnium moderatricis Principem , vbique gentium suspiciendum exhibet. Exigua tamen hæc sunt , si cum excelsis animi tui dotibus comparentur. Etenim magna & sublimis mentis agitata perfectio , quam dictorum , factorumque constantia , splendor & veritas ostendit : quam summa pietas , prudentia , temperantia , iudicium acerrimum , doctrina singularis , diuina sapientia , omniumque virtutum splendida congeries cumulatè declarant , summam in hominum animis admirationem excitauit. Quæ quidem animi decora in priuato  
etiam,

## EPISTOLA.

etiam , & à publicis Christianæ Reipublicæ cutis semoto conspicua forrent : At quantò illustriora in intento te semper operosis non Occitanæ modò , sed totius etiam Galliæ discutiendis ac expediendis negotiis. Gaudet nempe perpetuo motu , & iugi sese agitatione mens tua vegetat : & quidquid homines vocamus laborem , natura tua est. Verùm hîc me cohibeo , atque ut id præstem innuit animi tui moderatio , cui neglectâ gloriæ segete , semen gloriæ spargere propositum semper fuit. Desiderio itaque tuo eò pareo lubentiùs , quòd eximia tua decora cultâ satis oratione commendare non possum. Mihi ergo satis esse duxerim ( ARCHIPRÆSVL ILLVSTRISIME ) Celsitudinem tuam  
etiam



## N V N C V P A T O R I A .

etiam atque etiam deprecari , ut  
munusculum hoc minimum re , vo-  
luntate non minimum , amoris in te  
nostri debitique pignus , sis oculis ,  
eoque vultu excipias , quo tu in-  
tuentium omnium oculos rapis. Id  
si impetrari abs te fines , summo  
rerum omnium effectori ac mode-  
ratori Deo coniunctis omnes vo-  
tis supplicabimus , ut cum fausta  
tibi , ac fortunata omnia ; tum pla-  
cidam solidisque gaudiis affluen-  
tem senectutem indulgeat , utque  
integerrimæ vitæ tuæ cursum defi-  
nias , non annorum numero , sed sa-  
tietate viuendi. Non ij sumus nos ,  
quos minùs gratos appellat Sene-  
ca , *qui aliquid incommodi cupiunt*  
*iis , quibus obligati sunt , ut probent*  
*affectum beneficij memorem ; optant*  
*inopiam*

## EPISTOLA.

*inopiam, ut magis desideranti donent;  
optant morbum, ut assideant. Cum  
autem ingentes opes tuæ supra om-  
nes fortunæ casus ita emineant, ut  
circa eas non nisi inania vota quis-  
piam fundere valeat; superest tan-  
tum circa humanos casus hæc vota  
facere, ut potius ingratissimi toto or-  
bè videamur, quàm ut integra tua va-  
letudo aliquid detrimenti capiat, vn-  
de nobis quædam reponendi benefi-  
cij occasio præbeamur. Vale.*

*Celsitudinis tuæ observantissi-  
mus, tibi que ad omnia obse-  
quia paratissimus,*

LAZARVS RIVERIVS.



## Lectori beneuolo S.



N T E *quindecim annos*  
(LECTOR BENEVOLE)

*Auditorum meorum votis satisfacturus, methodicam inter-  
norum morborum Therapiam exponendam  
susceperam ; quæ ut breviori tempore ab-  
solueretur , integram ferè Theoriam sup-  
presseram , gnarus satis studiosis omnibus  
expeditum fore , variis eam ex Autoribus  
depromere : quod tamen iis circa curatio-  
nem ita proclive non erat , ob infinitam  
penè remediorum multitudinem ac varie-  
tatem , quibus scatent eorum qui de Pra-  
ctica Medicina scripsere , commentarij ,  
quibusve sic obruuntur tyrones Medici , ut*

\* \*

ancipites harent , & quàm sese tandem  
in partem vertant , vix habeant. Iis  
ego utilissimum fore duxi , si è tanta  
præsidiorum silua selectiora tantùm , usu-  
que frequentiora seponerem , eúmque in  
ordinem digererem , quem in ipsa Medi-  
cinæ praxi morborum curationibus incum-  
bentes obseruare consueuimus. Hæc Can-  
didatis nostris adeò placuit docendi metho-  
dus , ut quotquot post eam à nobis ab-  
solutam , hanc Vniuersitatem studiorum  
causa confluerent , certatim omnes exscri-  
bendam sibi postularent ; ex iisque non  
pauci frequenter hortarentur , & obnixè  
rogarent , eam ut typis committerem ,  
sicque cunctos à tedioso descriptionis labo-  
re subleuarem. Ego verò , cui nunquam  
in mentem venerat , utpote à philau-  
tia maximè alieno , tanti esse lucubratio-  
nes meas , ut in vulgus emanare pos-  
sent , istas præsertim , quæ rudibus à me  
inchoatæ commentariis excidissent , ad quo-

tidianarum praelectionum pensum exoluen-  
dum festinanter editas , & dimidia sui  
parte mutilas : malui certè conscientiae  
meae , quàm fauentiori eorum existimatio-  
ni credere. Hoc insuper animo reuoluebam,  
periculi plenum esse hominum omnium iu-  
diciis , ad quod plerumque fit , nonnul-  
lorum etiam inuidia , famam meam ar-  
rodendam subiicere ; elimato hoc praefer-  
tim saeculo , tersis & perpolitis ingeniis  
affluenti , quibus opera summa etiam in-  
dustria elaborata vix placeant , quique  
maculas id exerto nubibus sole curiosius  
inuestigent. At Verò praecocem hunc foetum  
meum , quem pressum apud me , abdi-  
tumque volueram , foras emisit è disci-  
pulis meis unus qui rude illud opus , in-  
cultum atque impolitum , me incio atque  
inuito , Typographo Parisiensi excudendum  
dedit ; placuitque partus iste meus , quem  
abortiūm putabam , & alienis oculis con-  
spectus est benignius , quàm paternis ; om-

nia enim prioris illius editionis exemplaria breui distraeta fuere. Secunda editio, ac postmodum tertia ab eodem Typographo procuratur, quibus tota Europa exemplaribus impleta est. Attamen post aliquot annos, tres alie editiones intra biennium prodire, una Lugduni, ac duae alie in Hollandia, Goudae nimirum & Hagae Comitum impressae. Interim ex praecipuis Galliae, Germaniae, Hollandiae & Italiae Ciuitatibus, litterae quamplurimae à Medicine Doctoribus mihi notis, dum in hac Vniuersitate Medicine studio incumberent, ad me veniunt, grauiter expostulantes mutilum opus esse, utpote morborum Theoria destitutum: moventes insuper pretium operis facturum me, si hanc in rem vigiliarum mearum partem aliquam deriuarem. Aquis eorum postulatis assentiendum tandem ratus, quantum mihi per otium & valetudinem licuit, hac in Theoria integrè publico danda tam contento studio elabo-

*raui , ut eam ( Deo sit laus & gloria )  
 ad Umbilicum tandem perduxerim. Hanc  
 tu ( LECTOR BENEVOLE )  
 grato animo excipe Therapiæ coniunctam ,  
 ut eadem serie singulorum morborum na-  
 turam , differentias , causas , diagnosim ,  
 prognosim & curationem videre possis Sum-  
 mam opinor , apud te gratiam merebitur  
 fœtus iste meus , nunc in omnibus suis  
 partibus exornatus , & ad maiorem lon-  
 gè perfectionem promotus ; quique in fas-  
 ciis & incunabulis placuit , auctior & in  
 iustam corporis celsitatem prouectus , non ,  
 uti spero , displicebit. Tu bonis auspiciis  
 frui , & quidquid inde hauseris , in pro-  
 ximi solatium Christiana charitate impen-  
 de. Hoc etiam admonendus es , in prio-  
 res editiones typographorum incuria innu-  
 meros irrepsisse errores , quos ego sedu-  
 lò correctos pro hac editione tradidi. Præ-  
 terea quamplurima remedia , eaque se-  
 lectissima antea editis curationibus ad-*

*adiunxi, quæ ad felicem morborum diffi-  
cium Therapiam non parùm conferre pote-  
runt. Vale. Datum Monspelij in Musæo no-  
stro, die prima mensis Iulij anni 1653.*







# I N D E X

## Librorum, & Capitulorum Praxeos Medicæ.

---

### L I B E R I.

De affectibus capitis.

CAP. I.	<b>D</b> E frigida cerebri intemperie: pag. 3.	
II.	De affectibus soporosis, comate, lethargo, caro, & apoplexia.	21
III.	De comate vigili.	40
IV.	De catoche, seu catalepsi.	42
V.	De paralyfi.	47
VI.	De convulsione.	62
VII.	De epilepsia.	75
VIII.	De epilepsia puerorum.	90
IX.	De vertigine.	95

X.	<i>De tremore.</i>	101
XI.	<i>De phrenitide.</i>	103
XII.	<i>De cerebri abscessus, &amp; sphacelo.</i>	119
XIII.	<i>De mania.</i>	122
XIV.	<i>De melancholia.</i>	132
XV.	<i>De catarrho.</i>	139
XVI.	<i>De dolore capitis.</i>	157

## LIBER II.

### De affectibus oculorum.

CAP. I.	<b>D</b> E gutta serena.	pag. 172
II.	<i>De humoris vitrei affectibus.</i>	
III.	<i>De humoris cristallini affectibus.</i>	184
IV.	<i>De humoris aquei affectibus, ac præcipuè de suffusione.</i>	187
V.	<i>De dilatatione pupillæ.</i>	205
VI.	<i>De angustia pupillæ.</i>	209
VII.	<i>De albugine, seu macula, &amp; aliis cornea coloribus mutatis.</i>	212
VIII.	<i>De ophthalmia.</i>	217
IX.	<i>De hypopyo seu pure sub cornea.</i>	227
X.	<i>De phlyctænis.</i>	240
XI.	<i>De cornea, &amp; adnata ulceribus.</i>	241
XII.	<i>De corneæ cancro.</i>	244

XIII.	<i>De ruptura cornea.</i>	247
XIV.	<i>De vnea procidentia.</i>	248
XV.	<i>De agilope, &amp; fistula lachrymali.</i>	249
XVI.	<i>De rhyade, &amp; encanthide.</i>	253
XVII.	<i>De epiphora.</i>	254
XVIII.	<i>De pterygio, seu ungue oculorum.</i>	259

---

## LIBER III.

### De affectibus aurium.

CAP. I.	<b>D</b> E surditate, & gravi auditu. pag. 264.	
II.	<i>De sonitu aurium.</i>	276
III.	<i>De dolore aurium.</i>	282
IV.	<i>De exentibus præter naturam ab aurium cavitatibus.</i>	298

---

## LIBER IV.

### De affectibus narium.

CAP. I.	<b>D</b> E narium ulcere, & ozæna. pag. 302	
II.	<i>De sarcomate, &amp; polypo.</i>	305
III.	<i>De laeso olfactu.</i>	309
IV.	<i>De fæore narium.</i>	312

V.	<i>De coryza.</i>	314
VI.	<i>De sternutatione.</i>	315
VII.	<i>De hamorrhagia narium.</i>	320

---

## LIBER V.

### De affectibus linguæ.

CAP. I.	<b>D</b> E lingua inflammatione, aliisque eiusdem tumoribus. pag. 344	
II.	<i>De ranula sub lingua.</i>	349
III.	<i>De Gustatu laeso.</i>	352
IV.	<i>De paralyfi linguæ, eiusque motu laeso.</i>	354

---

## LIBER VI.

### De affectibus dentium, gingivarum, faucium, vuulæ, & laryngis.

CAP. I.	<b>D</b> E dolore dentium. pag. 360	
II.	<i>De dentium nigredine, &amp; ero- sione.</i>	473
III.	<i>De gingivarum erosionem, &amp; exulcera- tione.</i>	375
IV.	<i>De fluxu sanguinis ex gingivis.</i>	377
V.	<i>De oris, &amp; faucium ulceribus.</i>	380

VI.	<i>De vñula relaxatione.</i>	384
VII.	<i>De angina.</i>	ibid.

## LIBER VII.

### De morbis thoracis.

CAP. I.	<b>D</b> E <i>asthmate,</i>	pag. 410
II.	<b>D</b> E <i>pleuritide.</i>	425
III.	<i>De peripneumonia.</i>	443
IV.	<i>De empyemate.</i>	451
V.	<i>De hydrope pectoris.</i>	458
VI.	<i>De hamoptysi, seu sanguinis spato.</i>	462
VII.	<i>De phthisi.</i>	475

## LIBER VIII.

### De affectibus cordis.

CAP. I.	<b>D</b> E <i>syncope.</i>	pag. 506
II.	<b>D</b> E <i>palpitatione cordis.</i>	517
III.	<i>De imbecillitate virium.</i>	526

---

## LIBER IX.

### De affectibus ventriculi.

CAP. I.	<b>D</b> E inappetentia, & cibi fastidio.	
	pag. 535	
II.	De fame canina.	551
III.	De pica, & malacia.	559
IV.	De siti morbosa.	565
V.	De ventriculi concoctione laesa.	569
VI.	De singultu.	577
VII.	De nausea, & vomitu.	586
VIII.	De vomitu sanguinis.	599
IX.	De cholera morbo.	608
X.	De dolore ventriculi.	613
XI.	De inflammatione, abscessu, & ulcere ventriculi.	612

---

## LIBER X.

### De affectibus intestinorum.

CAP. I.	<b>D</b> E dolore colico.	pag 632
II.	De iliaco affectu.	649
III.	De astrictione alui.	654
IV.	De lienteria, & celiaca passione.	659

V.	<i>De diarrhæa.</i>	664
VI.	<i>De dysenteria.</i>	679
VII.	<i>De tenesmo.</i>	700
VIII.	<i>De fluxu hepatico.</i>	704
IX.	<i>De lumbricis.</i>	712
X.	<i>De hamorrhoidum fluxu.</i>	729
XI.	<i>De dolore hamorrhoidum.</i>	738



SVMMA

---

## *Summa Priuilegiij.*

**C**AUTVM est Ludouici XIV. Franciæ & Nauarræ Regis Priuilegio, ne quis in Regno ipsius, intra nouem proximos annos ab hac impressione numerandos, excudat, vendat, aut excudendum vel vendendum curet, librum qui inscribitur, *Lazarj Riuerij Praxis Medica integrâ Theoriâ & multis remediis selectissimis in hac Editione aucta*, præter IOANNEM-ANTONIUM HVGRETAN & MARCVM ANTONIUM RAVAUD, aut quibus concesserint. Ne quis item ex Regis subditis librum eundem extra Regni fines excudendum curet, aut excusum vendat sine consensu dictorum HVGRETAN & RAVAUD, sub pœna confiscationis librorum, & aliis contra delinquentes, expressis in diplomate dato Parisiis die vigesima quinta mensis Aprilis, anno millesimo sexcentesimo quinquagesimo tertio.

CONRART.

*Hec ultima Editio typis mandata est, 3. Iulij 1660.*









I  
PRAXEOS  
MEDICÆ,  
LIBER PRIMVS.

---

*De affectibus capitis.*

P R Æ F A T I O.



N capitis affectuum serie illos omnes comprehendimus, qui cerebri substantiam, aut meninges occupant. Licet etiam oculi, aures, lingua, dentes, gingivæ, fauces, & columella, capitis constitutionem ingrediantur: earum tamen partium affectus, clarioris doctrinæ gratiâ, separatis libris exponere visum est, & cerebri ac meningum morbos, capitis affectuum nomine, per excellentiam, insignire. Illi autem affectus ex cerebri actionum læsionibus erunt desumendi: quæ quidem actiones sensum, & motum respiciunt, tum etiam actiones naturales, quæ ad illius nutritionem spectant. Sensus verò diuiduntur in internos, & externos. Interni principes actiones comprehendunt, imaginationem, & ratiocinationem, &

memoriam ; tum etiam somnum , & vigiliam. Ad quarum , functionum symptomata referuntur , phrenitis, mania, melancholia, coma, lethargus, carus, apoplexia, catoche , & coma vigil. Sensus verò externi quinque vulgò statuuntur, visus, auditus, olfactus , gustus, & tactus. Quia tamen quatuor prioribus partes peculiares, tanquam priora eorum organa, destinatae sunt, quæ varios patiuntur morbos , in propriis libris explicandos; ideo in hoc libro symptomata tantum exponemus, quæ sensum tactus respiciunt; quandoquidem illa à cerebro affecto, vel illius membranis , immediate procedunt; & vel paralyfim in sensu tactus abolito, aut imminuto; vel dolorem capitis in deprauato, respiciunt. Motus autem voluntarij læsiones reperiuntur in conuulsione, epilepsia, paralyfi, apoplexia, vertigine, tremore. Denique affectus ad actiones cerebri naturales spectantes, in intemperie consistunt, vel in excretorum vitio, ex quo catarrhus generatur. Nos omnes illos affectus ad propria capita reducimus, eo tamen ordine , qui ad thetapiam instituendam magis conueniens est. Atque ita primùm frigidam cerebri intemperiem proponimus; mox omnes affectus, qui ab illa oriuntur, subiungimus ; quia eorum curationis fundamentum ab illius curatione desumi debet. Postmodum verò affectus à calida intemperie , & calidis humoribus oriundos , exponimus. Quæ omnia in singulorum capitum perustratione clariùs apparebunt.

CAPVT PRIMVM.

*De frigida cerebri intemperies.*

**O**Mnes intemperies vulgò diuiduntur in pathologia in simplices & compositas, materiales & immateriales. Simples raro inueniuntur; tum etiam immateriales; nec nisi à causis procatarcticis producuntur; & vel sponte, vel leuissimis remediis euanescent: Materiales verò, omnes capitis affectus producunt: illarum idè tractationi sedulo incumbendum est; quod tamen seorsim paucissimi auctores præstiterunt: propterea quod in expositione affectuum, qui ab illis intemperiebus producuntur, earum etiam explicatio sufficienter proponitur. Nos itaque eorum vestigiis inhærentes, calidæ cerebri intemperiei, tum etiam humidæ & siccæ theoriam ad affectuum qui ab iis producuntur, tractiones remittimus. Sed quia maximus capitis affectuum numerus à frigida & pituitosa cerebri intemperie dependet, operæ pretium censuimus, illius theoriam in huius tractionis limine seorsim proponere, vt postmodum illius curatio sit veluti basis curationum omnium, quæ dictis affectibus erunt adscribendæ, & remedia quæ eorum causæ debebuntur, ex hoc capite depromi valeant: atque ita inanis eorum repetitio, (qua omnes propemodum practicæ Medicinæ scriptores laborare solent, & inde sua volumina inutiliter augere, artémque difficiliorē, ac magis tyronibus laboriosam atque tædiosam reddere,) à nobis euitetur.

Frigida igitur cerebri intemperies composita, & cum materia coniuncta vt plurimum pituitosa est; quia cerebrum est metropolis pituitæ, & frigiditas diu durans sibi accersit humiditatem. Quamuis enim inter-

dum humori melancholico copulata sit, rarò tamen ille humor in cerebro gignitur, quemadmodum pituita; sed in hypochondriis vtplurimum cumulatur, & ad cerebrum transmittitur, in eoque grauissima symptomata producit.

Causæ, frigida ac pituitosa cerebri intemperaturæ sunt:

Alimenta frigida & humida, quæ facile in pituitam abeunt; tum etiam, dum concoquantur, ventriculum & hepar refrigerando, faciunt, vt multam pituitam producant, quæ postmodum magnâ copiâ ad cerebrum transmittitur.

Nimia alimentorum, non solùm frigidorum, sed etiam laudabilium quantitas, quæ calorem natium obruit, & cruditates gignit.

Cibi assumpti statim à somno, vel ante somnum, vel antequam priores sint concocti: ex iis enim cruditates plurimæ oriuntur, quæ materiam pituitosam cerebro suppeditant.

Omissa naturalis consueto pituitam euacuandi per vomitum, aut secessum; vel artificialis per medicamenta purgantia, diuretica, & sudorifica, vel frequentes exercitationes.

Ortus ex parentibus frigida cerebri intemperie laborantibus.

Ætas senilis, quæ propter caloris inopiam multam generat pituitam; tum quoque puerilis, propter ingluuiem & incautam victus rationem.

Regio frigida & humida, quales sunt, quæ stagnis, paludibus, aut maioribus fluminibus sunt vicina, ac boreæ, niuib, imbribusque expositæ, & quæ sunt magis septentrionales.

Somni longi & profundi, præsertim à cibo.

Vita sedentaria, otiosa, sine curis, studio, mœrore,

*Cap. I. Frigida cerebri intemperie.* 5

aut cum his valdè excedentibus ; quia calorem nativum dissipando , præcipuè in cerebro , illud refrigerant.

Ad has causas etiam referri potest hepar calidum & humidum , quod multos vapores transmittit ad cerebrum, qui in eo concreſcunt, & in materiam pituitosaſe abeunt.

Signa frigidæ intemperaturæ cerebri deſumuntur tum à cauſis ſuprà propoſitis, quarum præſentia intemperiei huius magnam coniecturam faciet; tum præcipuè ab effectibus, qui, vt ſigillarim examinari queant, à ſuis fontibus illos mutuabimur, nempe ab actionibus paſſionibus, excrementis, & habitu corporis.

Actiones animales frigidam cerebri intemperiem indicantes, ſunt mens torpida & habes, ingenium tardum & obtuſum, inſœlix memoria, maxima ad ſomnum propenſio, & ſomni longiores ac profundiores, niſi catarrhus, dolor capitis, aut animi pathemata obſtiterint.

Inſomnia frigoris, aquarum, nempe pluuiarum, niuium, fluminum, ſtagnorum, marium, & rerum albarum.

Senſuum omnium inertia & hebetudo.

Motus tarditas, ſed in eo duratio ; quia ſpiritus craſſiores minus diſſoluuntur.

Paſſiones frigidam cerebri intemperiem indicantes ſunt, morbi frigidi, vt paralyſis, lethargus, catarrhus, & alij quamplurimi; quibus ſi æger antea obnoxius fuerit, cum hac intemperie laborare coniiciendum eſt.

Idiſſum confirmabit, ſi æger cœlo ſereno, & in calida & ſicca aëris conſtitutione melius habeat; in frigida verò & humida, hyemali nempe, pluuiosa & auſtrina, peius.

Excrementa pituitosa per os & nares frequenter, &

copiosè reiecta manifestissimè humoris pituitosi redundantiam in cerebro ostendunt.

Ex habitu corporis desumuntur signa, tam generalia, quàm specialia huius intemperiei.

Generalia ex toto habitu corporis desumuntur. Si enim totus corporis habitus frigidus sit & humidus, cerebrum proculdubio, omnium corporis partium frigidissimum & humidissimum, tale futurum est.

Cutis ergo ad tactum frigida, eadem mollis, lævis & alba, totus corporis habitus mollis & obesus, non autem carnosus, & venarum angustia frigidam temperiem significant.

Signa specialia frigidam cerebri temperiem indicantia in capite considerantur, vt sunt. Faciei pallor, venarum carentiâ in oculis, capilli molles, læues, ac tenues ab initio, tardè orientes, deinde rufi ac minimè crispī, ac totâ vitâ sine caluitio perseverantes; à frigore externo capitis facilis læsio, & calefacientibus iuumentum.

Quod ad prognosim attinet, hæc intemperies curatu difficilis est, & sæpè grauissimos capitis affectus producit. Quæ à longo tempore contracta est, difficiliùs curatur; quæ à natiuitate, nunquam; tum etiam quæ est hæreditaria, & quæ in corpore senili reperitur, si per longum tempus illud obsederit. Tempus hybernium huic curationi idoneum non est, æstate verò meliùs curatio succedit.

Curatio duabus indicationibus perficitur, nimirum pituitæ redundantis euacuatione, & ipsius intemperiei per contraria correctione. Quibus indicationibus debet satisfieri triplici instrumento, dietetico, chirurgico, & pharmaceutico.

Diætâ calefaciens & exsiccans instituenda est. Ac primum eligatur aër purus, ad calidum & siccum ver-



*Cap. I. Frigida cerebri intemperies.* 7

gens, qui tamen in caliditate non multum excedat; humores enim in capite contentos fundere ac liquare posset, sicque cathartos aliosque affectus producere; quod sæpè contingit iis, qui sub Solis radiis morantur, vel caput ad ignem calefaciunt. In siccitate verò non potest nimium excedere, modo in actiuis qualitatibus sit temperatus; ad calidum magis tamen, quàm ad frigidum defleat. Cubiculum in quo æger degere consuevit, non angustum sit, nec depressum, nec humescens, aut aliquo situ obductum, sed peruium & perflatum, siccioribus ventis expositum. Temporibus humidis, nebulosis, ac frigidis, alterari interdum poterit aër cubiculis herbis calidis ac odoratis pavimento stratis, vt saluiâ, maiorana, lauendula, roremarino, thymo, serpillio, vel etiam iisdem in ignem coniectis, aut etiam lignis siccioribus in igne accensis, vt præcipuè iuniperino. Ignis autem sit luculentus, qui aërem conclauis sufficienter exsiccat. Suffitus in ædibus excitati, nisi admodum graues sint, siccando, absumendoque humiditatem, non parùm conferre possunt. In eorum tamen vsu cautio magna adhibenda est, tum vt moderatissimi excitentur. Si enim nimij sint, quoscumque homines offendunt, & humores fœdendo, graues cathartos excitant. Tum etiam, vt patientis constitutio aduertatur; nonnullorum enim capita ita faciliè replentur, & à suffitibus alterantur, vt quilibet odor capitis dolorem inducat. Suffitus temperatus & utilis parabitur ex succino puriore, cuius tenuia famenta carbonibus erunt iniicienda. Minus grauis est, & optimè siccet, roboratque cerebrum suffitus ex Indico succino, quod *gummi anime* nominatur, vel magis compositus ita præscribi poterit.

℞. Ligni aloës & benjoini, ana ʒ. ij. styracis calamitæ ʒ. j. s. thuris & sandaracæ, an. ʒ. ij. gummi

aniniæ & garyophyllor. an. ʒ. β. Fiat pulvis crassior supra prunas iniiciendus.

Vitetur aër austrinus & pluuiosus, tum quoque nocturnus, & in primis caput non exponatur radiis lunaribus, qui cerebro mirum in modum sunt infensi. Vitandus quoque est aër valdè frigidus & aquilonaris, præcipuè quando subitò ad eum ab austrino fit mutatio. Is enim cerebrum humidis excrementis refferum, non minus quàm manus comprehensam madentem spongiam, exprimit, & in partes subiectas deturbat.

Secundò, alimentorum ratio maxima habenda est; quandoquidem, (vt docet Hipp. *lib. de natura humana*) morbi fiunt partim à victu, partim à spiritu, cuius attractione viuimus. Itaque cibi sint boni succi facilis coctionis, nec frigidi, nec excrementij. Atque adeò in frequenti vsu erunt carnes veruecinæ, hœdinæ, vitulinæ; his verò præcellunt pulli columbini, gallinacei, capones, gallinæ, perdices, turdi, & omne genus auicularum montanarum, & ouorum recentium vitelli. Prædictæ carnes magis assæ, quàm elixæ vsurpentur. Vitentur autem carnes duræ & concoctu difficiles, vt bouinæ, porcinae, ceruinæ, leporinae, anserum, anatum, aliarumque auium aquatiliu: ad hoc genus referuntur capita, intestina, extrema, & interanea animalium. Piscium vsus sit rarissimus, iique eligendi, qui carnem habent solidam & friabilem, in riuis rapidè fluentibus, aut iuxta saxa viuentes, saxatiles idèò dicti, in vino præcipuè decocti, addendo acetum, butyrum, & aromata, quorum vsus etiam in aliis cibis concedendus est, nisi calida hepatis intemperies contra indicet. Ex his præcipuè sunt nux moschata, garyophylli, cinnamomum. Herbarum refrigerantium & humectantium, vt lactucæ, portulacæ, spinaciæ, nul-

lus aut rarissimus sit vsus. Æstiuo tamen tempore , earum quæ mediocriter refrigerando siccare aliquantulum , & membris robur addere , massæque sanguinis, quo minùs euaporet , firmitudinem qualemcumque conciliare valent, mediocris vsus concedi potest. Tales sunt endiuia , cichorium , acetosa , quæ tamen coctæ , non crudæ vsurpandæ sunt. Conueniunt autem radices petroselini , dauci , & pastinacæ , folia menthæ , hyslopi , nasturtij. Vitanda quoque omnia quæ faciliè caput tentant , illudque replent : eaque duorum sunt generum. Vnum eorum , quæ acrimoniâ sua humores fundunt , vt cepe , allium , sinapi , eruca , raphanus. Alterum eorum , quæ crassis vaporibus caput replere solent , vt lac , & lacticia omnia , & legumina ; ex quibus tamen minùs nocent cicera rubra , propter exiniam aperiendi & detergendi vim quâ prædita sunt ; idèd conceduntur , præcipuè iuscula eorum. Fructus omnes recentes , & præcipuè fugaces multa aqua humiditate præditi , vt frequens cruditatum materia , vitandi. In bellariis fructus sicciore vsurpari poterunt , vt passulæ , amygdalæ , nuclei pinei , dactyli & similes ; quorum tamen vsus parcus esse debet , quia maiori ex parte difficilè concoquuntur. Pyra cocta saccharo contexta , vel conditura corticis citri , limonis , arantij in fine mensæ vsurpari poterunt. Sed multò vtilius erit pulueris digestiui cochlear vnum fumere post pastum , cuius vapor aromaticus , & cerebro amicus cum alimentorum vaporibus sursum eleuatur , sicque cerebrum roborat & exsiccat. Parabitur ex coriandor , fœniculo , aniso , cinnamomo , nuce moschata , cum dupla quantitate sacchari rosacei. Panis ex optima tritici farina conflatus sit , benè coctus & fermentatus , cui etiam aliquid salis & anisi vtiliter addi poterit ; in maiori intemperie biscoctus erit vtilior.

Potus sit vinum tenue ac oligophorum, quod caput vaporibus non replet, & aqua multa dilutum. Tum etiam valde conferet per horam ante pastum, vinum aquâ miscere, ut illius vapores infringantur; necnon coriandri tantillum in aqua decoquere, quo vis roborandi cerebrum & ventriculum ipsi conciliabitur. In grauiori affectu, si vinum etiam cum prædictis cautionibus usurpatum, suspectum esse videatur; illius loco hydromel tenue subrogari poterit. Hoc autem in omni cibatione semper obseruandum, ut cibi moderata quantitate sumantur, & cœna sit leuior prandio. Sobrietas, ut in omnium morborum curatione & præcautione magni momenti est: sic præcipuè in omnibus capitis affectibus maximè commendatur; à plurimo enim ingesto alimento caput vaporibus & humoribus repletur, & contrà ab eiuldem penuria plurimum inanitur.

Tertiò, corporis exercitatio moderata esse debet, & singulis diebus, quantum fieri poterit, continuari. Otium enim & quies corporis nimia, calorem natium debilitat, ac torpidum reddit; ita ut coctiones suas non ritè peragat, & corpus excrementis repleat; contrà verò motus & exercitatio calorem natium suscitât, concoctiones adiuuat, excrementa discutit, spiritus purificat & exhilarat. Debet autem fieri exercitatio ante singulos pastus, & vtilius est à pastu per aliquot horas quiescere, aut saltem non valde citatio motu corpus mouere.

Quartò in somno & vigilia modus adhibendus est. Ut enim somno mediocri reficiuntur vires; ita longiore torpescit corpus, refrigeratur & oneratur excrementitiis humoribus, præcipuè verò cerebrum. Nimia verò vigilia corpus extenuat, spiritus absomit, & quod in corpore sanum est depascitur. Somnus itaque longior non sit, is tamen metiendus pro consuetudine, &

*Cap. I. Frigida cerebri intemperies.* II

rebus incidentibus. Vulgò septem horis determinatur. Quod spatium produci, vel abbreviari potest pro ægrotantis ætate, vel consuetudine. Si in alterutro peccatur, præstat in vigilia immodica, quàm in superfluo somno delinquere. Non statim à cœna somno indulgendum est, sed duabus saltem horis interiectis, in quibus levis deambulatio prodest. Capite altiore & in alterutrum latus dormiendum. Supinus decubitus improbat.

Quintò, omnium corporis partium excrementa suis temporibus sunt euacuanda, cerebri potissimum, atque adeò quotidie manè screando è palato, emungendo à naribus, pectinando & linteo aspero, vel spongia caput confricando, è futuris cerebri superfluitates euocandæ. Aluus liberâ & mollis seruanda est, & si sponte non obediat, glande vel enemate sollicitanda, vel etiam interdum leuia medicamenta purgantia per os exhibenda. Non solùm enim alui excrementa istis auxiliis euocantur; sed etiam paulatim, & successiue reuellitur aliquid à capite, aut saltem retinetur deriuaturque, quod eo; tanquam ad partem imbecilliorẽ, amandabatur.

Denique animi affectuum maxima ratio habenda est, vtpotè à quibus corpus nostrum mirum in modum alteratur, & de sede sua deiicitur. Inter cæteros maximè cauenda est tristitia, & ira: illa calorem natium immittit, & spiritus conterit; vnde concoctiones infelicitèr obeuntur, & multus fit excrementorum prouentus: hæc verò magnam sanguinis ebullitionem, & spirituum agitationem efficit, vnde humores funduntur, liquantur & commouentur; & si quæ pituitosa excrementa in cerebro fuerint, affatim in partes debiles infirmasque præcipitantur, grauissimosque affectus parere consueverunt.

Reliqua duo instrumenta medica, nempe chirurgia, & pharmacia, huius affectus curationi in sequentem modum aptari poterunt.

Generalis euacuatio in omnibus ferè morbis humoralibus fieri solet venæ sectione, & purgatione.

Sanguinis euacuatio ratione pituitæ consentanea non est. Si tamen in reliquo corpore sanguis abundet, hepar sit calidius, ætas florens, aut consistens, cum detrahente conuenit. Sic enim vaporum ad caput effusio impeditur, & superfluum alimentum demitur; vt natura postea quidquid crudum & pituitosum in sanguine est, facilius concoquat; & purgantia medicamenta tutius postea vsurpari valeant.

At verò, nisi plethora vehementer vrgeat, melius erit venæ sectioni præmittere potionem phlegmagogam, bolum, pilulas, aut puluerem. Quorum formulæ tales esse poterunt.

℞. Sennæ mundat. ℥.ß. sem. anisi, & caryophyll. ana ℥.ß. fol. menthæ, & bethonicæ, ana M. ß. summitatum thymi P.ß. Coquantur ad ℥.iiij. In colat. infunde agarici recenter trochiscati ℥.ij. cinnamoni ℥.ß. In expresso dissolue diaphœn. ℥.iiij. syrupi rosat. ℥.j. Fiat potio, quæ detur cum regimine. Vel.

℞. Catholici duplicati, & diaphœn. ana ℥.ß. Cum saccharo fiat bolus. Cui potest etiam addi electar. diacart. ad ℥.j. vel ij. detrahendo partem diaphœn. quantitatem; tum etiam catholicum pro arbitrio detrahi, & bolus ex diacartamo & diaphœniconè componi poterit. Vel

℞. Massæ pilular. cocciar. min. ℥.ij. Malaxentur cum aqua betonicæ. Formentur pilulæ v. vel vj. deauratæ, quas capiat summo mane, præcedente leui coenâ.

*Cap. I. Frigida cerebri intemperies.* 13

Pilulæ de agarico, & coccia maiores huic etiam vsui accommodari poterunt. Vel

℞. Sennæ mundat. turbith, hermodactyl. ana ʒ. j. diagridij ʒ. ss. caryophyl. n. j. Fiat puluis, qui detur cum iusculo.

Post venæ sectionem, si quidem necessaria fuerit, aut eâ omisâ, si minùs utilis videatur, statim ad humoris præparationem, & purgationem veniendum est; quod fiet apozemate sequenti.

℞. Rad. cyperi, ireos Florent. angelicæ zedoariæ, & enulæ campanæ, ana ʒ. j. fol. beton. maioran. melissæ, pulegij, origani, calamenthi, ana M. j. summitatum thimi & saluiæ, ana M. ss. sem. anisi, feseleos, & fœniculi, ana ʒ. iij. liquiritiæ rasæ, & passularum mundat. ana ʒ. j. fol. sennæ mundatæ aquâ vitæ irroratæ ʒ. ij. sem. carthami contusi, & polypod. querc. recentis, ana ʒ. j. agarici recenter trochiscati, turbith, hermodactyl. ana ʒ. iij. zinziberis & caryophyll. ana ʒ. j. flor. stœchados, anthos, saluiæ, & lauendulæ, ana P. j. Coquantur ad quartaria v. In colatura dissolue sacchari albi ʒ. iij. Fiat apozema clarif. & aromatizat. ʒ. ij. cinnam. electi pro iij. dosibus matutinis.

In prima & vlt. dosi dissolue electarij diacarthami, vel diaphœnici ʒ. iij. Capiat cum regimine.

Vel si nihil addatur vltimæ dosi, postridie illius, pilulæ purgantes exhiberi poterunt, quales suprà descriptæ sunt.

Post purgationem, vt cerebrum alteretur & roboretur, & purgantium noxa corrigatur, capiat æger bolum sequentem.

℞. Theriacæ veter. ʒ. j. conferuæ anthos & rosarum, ana ʒ. ij. Cum saccario fiat bolus, quem capiat manè, duabus horis ante pastum, superhausto vini diluti momento.

Quia verò malum hoc sæpe pertinax est, & generosis etiam remediis semper non cedit, ad potentiora præsidia confugere necesse est. Ac primum corpore purgato diætâ sudorifica instituenda est, quæ cerebrum & totum corpus calefacit & exsiccât; crudos humores concoquit, crassos attenuat, viscidos icidit, lentos abstergit, & quidquid aquosum est, per urinam educit, ac per sudores aut insensibilem transpirationem discutit. Ad quæ omnia multum etiam facit tenuior illa victus ratio, quæ tempore diætæ adhiberi solet.

Illâ autem diætâ componi poterit, vel ex decocto guaiaci solius, vel addendo lignum sassafras aut radicem falsæparillæ, aut etiam cephalica specifica; prout videbitur Medico prudenti, varias corporum dispositiones, variæque temperamenta sedulo contemplanti. Quorum etiam respectu longiorem, aut breuiorem illius usum imperabit, v.g. xv. xx. vel xxx. dierum spatium. Decoctum verò sudorificum in hunc, aut similem modum componi poterit.

℞. Rasuræ ligni guaiaci & radic. falsæparillæ, ana ℥. ij. Infundantur per 24. horas in lb. iij. aquæ fontis supra cineres calidos. Bulliant lento igne, & sine fumo ad mediæ partis consumptionem. Colentur per manicam Hippocratis. Colatura seruetur in vase vitreo; de qua capiat lb. β. calidè, manè, corpus tegendo plus solito, ut excitentur sudores.

℞. Radic. falsæparillæ ℥. ij. Infundantur per horas xij. in lb. xij. aquæ fontis. Bulliant ad quartæ partis consumptionem. Colentur per maniciam Hippocratis, addendo coriandri, & liquiritiæ, vel sacchari, & cinamomi quantum satis ad saporis gratiam. Fiat bochetum, quo utatur pro potu ordinario toto diætæ tempore, utendo interea pane biscocto & anisato, carnibus assis & non



elixis, amygdalis torrefactis, passulis, nucleis pineis, prunis cum saccharo coctis, & similibus.

In usu decocti sudorifici hoc perpetuo obseruandum est, vt semel in septimana purgans aliquod medicamentum propinetur, omitta eâ die potione sudorificâ. Quandoquidem per sudores tenuior humorum portio tantum educitur, remanente crassiore, quæ per aluum expurganda est. Præterea, quia ut plurimum in usu diætæ aluus constingitur, clyster tertio aut quarto quoque die iniiciendus est.

Si adhuc pluribus machinis morbus iste oppugnandus videatur, durante diætâ sacculi sequentes capiti ad-moueri poterunt.

℞. Sem. anisi, fœniculi & baccarum lauri contus. ana ℥. iij. milij lb. j. salis communis lb. β. Torrefiant omnia in farragine, sensim affundendo vini generosi quantum satis. Iisque impleantur duo sacculi, qui applicentur sincipiti raso, calidè, vicissim, post assumptam potionem sudorificam.

Deterso sudore emplastrum caput roborans capiti ad-moueat in sequentem modum compositum.

℞. Succini pellucidi, thuris, mastiches, ana ℥. j. β. galbani, opopanax, ana ℥. j. visci quercini ℥. ij. sem. pœoniæ maris ℥. β. olei nucis moschat. q. s. Fiat ex omnibus massa emplastri, quæ extendatur super alutam in formam oualem, & applicetur sincipiti raso post detersum sudorem.

Vel ad-moueri potest emplastrum caput roborans, quod in officinis Monspel. Pharmacopæorum habetur, licet in dispensariis non repertiatur; cuius descriptio talis est.

℞. Storacis, benjoini, ladani, ana ℥. iij. rad. pœoniæ, ireos Flor. visci quercini, mastiches, ana ℥. j. styra-cis liquid. q. s. Fiat emplastri massa, de cuius ℥. j. fiat emplastrum oualis figuræ, applicandum futuræ coronali.

Si verò emplastrum magis attrahens & resoluens habere cupias, quod epispasticum vulgò nominatur, in hunc modum parari poterit.

℞. Massæ emplastri de mucilag. ℥.ij. radic. ireos Florent. hermodactyl. pyrethri, sem. staphysagriæ, cubebæ, stercoris columbini, & sem. sinapi, ana ℥.j. nucis moschat. caryophyll. cinam. piperis longi & nigri, ana ʒ.β. styracis liquidæ q. s. Fiat massa emplastri, cuius portio extendatur super alutam in formam oualem, &incipiti applicetur.

Post vniuersales euacuationes, particulares etiam commodè vsurpari poterunt: quæ fiunt per errhina, sternutatoria, & apophlegmatismos; quorum formulæ in hunc modum componi poterunt.

℞. Flor. maioranæ, saluiæ, & betonicæ, ana M. j. Terantur in mortario marmoreo, sensim affundendo aquæ betonicæ, & vini albi, ana ℥.ij. Exprimatur succus, & fiat errhinum, quod paulò acrius efficietur, si radic. ireos ʒ.β. prædictis adiiciatur.

Vfus hodie inualuit folia nicotianæ sicca & digitis contrita in nates immittere, vel puluerem eorum naribus attrahere: sicque paratu facile errhinum habetur, quo magna humoris copia è cerebro elicitur.

Sternutatoria verò sic parari poterunt.

℞. Fol. maioranæ, saluiæ & rorismarini siccorum, ana ʒ. β. radic. pyrethri, & hellebori albi, ana ʒ. j. moschi grana iij. Fiat pulvis, quæ pennæ tubulo insuffletur in nares. Vel

℞. Radic. zinziberis, & ireos Florent. ana ʒ. j. castorei ʒ.β. euphorbij ʒ. vj. Fiat sternutatorium. Præstantissimum sternutatorium fit ex helleboro nigro, cum parte æquali sacchari candi in subtilissimum puluerem redacto. Quod etiam ad catarrhi curationem plurimum confert.

Apophle

5

Apophlegmatismi componuntur in formam masticatorij, vel gargarismatis. Masticatorium ita parari poterit.

℞. Rad. pyrethri ʒ. ij. sem. sinapi, & staphisagriae ana ʒ. j. Excipiantur cera albâ, & formentur globuli, quorum vnus masticetur prono capite manè, continuò spūendo.

In vulgari vsu habetur radix ireos Florentiæ masticata, quæ in leuioribus affectibus potest sufficere. Mirior adhuc est mastiche sola, quæ humorem attrahit ad os citra illius calefactionem: quod reliqua non præstant.

Gargarisma verò in hunc modum erit præscribendum.

℞. Sem. staphisagr. ʒ. ʒ. sem. sinapi ʒ. iij. rad. pyrethri ʒ. j. Coquantur in hydromelite ad ʒ. ii. in quibus dissolue oxymelit. scillit. ʒ. ij. Fiat gargarisma.

In vsu tamen horum remediorum hoc obseruandum est, eam euacuationem, quæ per palatum fit, esse commodiorem, quandoquidem illa à natura cerebri expurgationi simpliciter destinata est. At nasus, odoratus & respirationis gratiâ, factus est, eoque natura abutitur, quando humores in cerebro maiori copia redundantes per hanc viam expurgat. Præterea per palatum via securior est, neque eâ excretionem tantoperè cerebrum concutitur, quemadmodum illâ quæ fit per nares. Attamen errhina humores potentius educunt, quia non solum medicamenti qualitas, aut vapor, vt in apophlegmatismis; sed & ipsa eius substantia cerebrum stimulat.

Obseruandum etiam errhinorum vsu esse suspectum, dum oculi sunt affecti, vel nares vlceribus obnoxia, vel æger in hæmorrhagiam faciliè incidit, aut etiam vertiginem, quam sternutatoria in primis excitare valent, cerebrum vehementiùs concutiendo.

Errhina liquida in nares ex vola manus attrahuntur, vel supino corpore naribus infunduntur; ore tamen prius aqua, vel vino repleto, ne liquor per palatum in os influat; quanquam quod sic influit, etiam humores efficaciter per fauces educit.

Apophlegmatismi cautè vsurpandi sunt in iis, qui fluxioni in pectus, & tibi sunt obnoxii.

Ad particularem etiam capitis euacuationem vtiliter adhibentur vesicatoria posteriori parti cervicis, in formam emplastri, quod à Pharmacopœis Monspelicnsibus compositum habetur, licet in ordinariis dispensatoriis non habeatur. Illius autem formula talis est.

℞. Galbani, ammoniac. ana ʒ. v. pulueris cantharid. lb. j. b. sinapi, pipetis, ana lb. s. vindis artis, pyrethri, ana ʒ. ij. s. euphorbi ʒ. j. s. ceræ lb. i. s. picis, resinæ, terebinth. ana quartaria iij. olei parum. Fiat massa emplastri; cuius ʒ. j. vel ij. extenditur super alutam, & posteriori parti cervicis admoventur.

Exteriùs capiti admoventur pulueres, & cucuræ, quibus cerebrum roboratur, eiusque calor intenditur, ac humoris reliquæ discutuntur.

℞. Pulueris ireos Florent. lb. s. storacis & benjoini, ana ʒ. ij. Fiat pulvis tenuissimus, capillis inspergendus in lecti introitu, & manè pectine decutiendus.

Hic pulvis est odore gratissimus, cerebrum roborat, & capillos valdè exsiccat, ita ut à delicatioribus in vsum vocari valeat. Si tamen illius efficaciam intendere voveris, caryophyllos, nucem moschatam, & cinamomum addere licebit.

℞. Flor. stæchados, anthos, & rosar. rub. ana P. s. betonicæ siccae ʒ. ij. sem. coriandri, ligni rodij, thuris, mastiches, nucis moschatæ, ireos Florent ana ʒ. i. benjoini, vernicis, macis & caryophyll. ana ʒ. s. Fiat omnium pulvis, qui excipiatur rasurâ scarlatæ, vel coto-

ne moschato, & cum panno serico rubro fiat cucufa inter puncta, pulco assuenda, vel informam calanticæ perpetuò gestanda.

Sequenti etiam suffumigio caput non parùm exsicari poterit.

℞. Ligni aloes, thuris, mastiches, succini pellucidi, fantali citrini, rosar. rubr. & fol. betonicæ siccorum, ana ʒ. j. cinnamomi, macis, caryophyllor. styracis calamitæ, ana ʒ. j. Fiat ex omnibus puluis crassior, qui aspergatur super prunas, & fumum hauriat manè ieiuno stomacho; ore, & naribus apertis, capite linteo circumuoluto, ne fumus tam facile exhalet, eoque utatur bis, aut ter in septimana.

Vel si à suffumigio dolor capitis excitetur, eo saltem suffumigentur singulis noctibus operimenta capitis. In quem usum potest etiam præscribi sequens paratu facilius.

℞. Thuris, mastiches, styracis calamitæ, benjoini, & sandaracæ, ana ʒ. ʒ. macis & caryophyll. ana ʒ. ij. Fiat puluis crassior pro suffitu.

Quia verò huiusmodi intemperies contumacissima est, nouumque pituitæ prouentum, etiam post vniuersales & particulares euacuationes, solet efficere; vsualia etiam remedia præscribenda sunt, quibus per interualla humor educatur, & in cerebro melior illa dispositio. quæ prædictis remediis inducta est, diutiùs conseruetur. In hunc finem syrupus magistralis componi poterit ex materia in apozematis supra propositis, triplicata, purgantium dosi, quo utetur bis, aut ter in mense ad ʒ. ij. vel iij. cum decocto betonicæ & maioranæ.

Vel in locum syrupi, sequentibus pilulis vsualibus assuescere poterit.

℞. Aloës optimæ ʒ. ʒ. turbith gummosi, hermodactyl. & agarici recenter trochiscati, ana ʒ. ij. diagry-

dij 3.j. zinziberis & caryophyll. ana ʒ. ʒ. croci & salis geminci, ana gr. viij. Puluerentur omnia, & perfundantur succo maioranæ, ac denuò exsiccentur in vmbra. Postea excipiantur oxymelyte scillitico, & fiat massa pilularum, de qua capiat ʒ. ʒ. vel ʒ. iij. semel in septimana, duabus horis ante prandium.

Postridiè syrupi, aut pilularum, tum etiam bis, aut ter in septimana capiat dosim opiata sequentis.

℞. Conser. rad. acori, aut zinziberis & corticis citri condit. ana ʒ. j. conseru. flor. saluiæ & rorism. ana ʒ. vj. nuscis moschata condit. ʒ. ʒ. myrobal. condit. n. j. theriacæ veteris, & confectionis alkermes, ana ʒ. iij. pulueris electarij diambrae & diamoschi dulcis ana ʒ. j. Cum syrupo conditura corticis citri fiat opiata, de qua capiat ad magnitudinem castaneæ manè duabus horis ante pastum, superbibendo parum vini generosi medio-criter diluti.

Potentius cerebrum roborabit balsamum sequens, cuius guttæ iij. vel iv. per interualla sumi potuerunt cum vino, vel iusculo.

℞. Ol. nucis moschatae ʒ. iij. pulu. maioranæ, anthos, & carabes, an. ʒ. ʒ. moschi, ambræ griseæ, an. ʒ. j. Cum sufficienti quantitate olei cranij humani, reducantur ad balsami consistentiam.

Oleum cranij humani huic vsui idoneum parabitur, ponendo rasuram cranij non humati in retorta cum vini albi s. q. & digerantur in B. M. per aliquot dies, postea distillantur in arena ad siccitatem prodibit oleum aquæ supernatans.

Hoc balsamo possunt etiam inungi nares interiores hora somni, ad cerebrum efficaciter roborandum. Aliud tamen balsamum paratu facilius ad nares saltem interiùs inungendas, & valde efficax componi poterit in hunc modum.

℥. Ol. è flor. arantiorum ʒ. iij. ceræ albæ ʒ. j. Lique-  
tur leuissimo calore. Deinde adde ol. succini purissimi  
ʒ. ʒ. olei stillatitij saluiæ, & rorismarini, ana gutt. xv.  
olei spicæ gutt. v. Fiat balsamum.

Vtilissimum etiam erit causticum inurere posteriori  
partis ceruicis, vt materia, quæ in cerebro sensim colligi-  
gitur, per hanc etiam viam sensim euacuetur.

Denique ad cerebrum exsiccandum atque roboran-  
dum efficacissimæ sunt aquæ thermales sulphureæ, ni-  
tro sæ, ac bituminosæ, quales sunt nostræ Belilucanæ. Ex  
quibus fiunt embrocationes, seu irrigationes capitis per  
aliquot dies, præmissis vacuationibus vniuersalibus: ea-  
túmque vsu grauissimos capitis affectus discuti quoti-  
diana docet experientia.

Vtilissimæ etiam erunt aquæ thermales in potu vsur-  
patæ ad roborandum stomachum, qui cerebro maximè  
compatitur. Ad eundem finem præscribendus erit pul-  
uis digestius in hunc modum.

℥. Coriandri præpar. ʒ. j. sem. anisi, & fœniculi  
dulc. ana ʒ. iij. cinam. & nuc. mosch. ana ʒ. ij. coralli  
præparat. rasuræ eboris, & marg. præp. ana ʒ. j. sac-  
chari rosat. ad pondus omnium, vel pro delicatioribus,  
pondus omnium duplum, fiat puluis, de quo capiat  
cochl. j. post singulos pastus, nihil desuper comedendo,  
vel bibendo.

---

## C A P V T II.

*De affectibus soporosis, comæ, lethargo, caræ,  
& apoplexia.*

**S**Omni præternaturalis quatuor præcipue propo-  
nuntur differentiz, coma, lethargus, carus, & apo-

B 3



plexia; quæ cum ut plurimum ab iisdem causis oriuntur eandem curationem postulant, ideo unico hoc capite comprehendi possunt.

Differunt autem inter se quatuor isti affectus, quod in comate, seu cataphora, seu subeta Auicennæ est quidem somnus profundus, sed à quo æger excitatur, & oculos aperit & respondet, moxque iterum profundè dormit: in lethargo est somnus comati similis, sed cum febre & delirio: in caro æger febre caret, ut in comate, sed in eo somnus est profundior, ita ut æger excitatus oculos vix aperiat, & non respondeat, sicuti in prædictis; attamen vellicatus sentiat, & integra maneat respiratio. In apoplexia somnus est profundissimus, & omnimoda sensus & motus priuatio, excepta respiratione; atque ita ægri neque oculos aperiunt, neque respondent, neque sentiunt & respirationem habent difficilem.

Causæ horum affectuum plurimæ assignari possunt.

Prima & potissima est humor pituitosus, vel aquosus in cerebro præternaturaliter contentus, qui in minori copia cumulatur, & cerebri substantiam irrorans, ac refrigerans, eiusque meatus insensiles obturans, coma generare solet. Si verò in eadem copia collectus putredinem concipiat, siue in tumorem collectus sit siue per totam substantiam dispersus, lethargum producit. Quando verò maiori copia collectus est sine putredine, & totius propemodum cerebri substantiæ imbibitus, carum efficere consuevit. Ac denique si copia adhuc maiori affluens non solum cerebri substantiam, sed etiam ventriculos oppleat, aut saltem mole cerebri concidente comprimatur & angustetur; necnon principium neruorum in basi caluariæ à cerebro prodiens prematur, & spiritui animali transitum præcludat, apoplexiam facit.



Secundò à sanguine etiam redundante in cerebro, soporosi affectus generari solent, si nimirum nimia copia in illius vasis contentus crudior, serosior, ac frigidior fuerit, spiritus animales condensat, & motui ineptos efficit, tum copia cerebrum grauando, liberum eorum comitatum impedit, ac pro maiori, vel minori copia maiori, vel minori frigidityte grauiorem, aut leuiorem affectum producit; sicque tum coma, tum carus, tum apoplexia ab hac causa generari potest.

A sanguine etiam extrauaso, & cerebri ventriculos opplente, vel comprimente. affectus soporosi, præsertim apoplexia, generari solet. Id autem contingit rupta vena in cerebro, vel ob plethoram ad vasa, vel ob contusionem capitis insignem, vel etiam ob vulnus punctum, aut casum factum, quo venæ in cerebro diuidi, multumque sanguinem profundere consueuerunt. Sola etiam cranij fractura cerebrum comprimendo stuporem ac comatosum affectum producere potest.

Tertiò à tumore in cerebro genito, & pondere suo grauante, comatosum affectum generari posse dubium non est. Et huius rei exemplum refertur à Platero in Barone quodam obseruatum, qui longo tempore attonitus, & somnolentus, nihil secundum rationem agebat, cibum nec petebat, nec nisi per vim intrusum capiebat, nec lectum nisi coactus accedebat, sed ad mensam tota die brachio innixus, oculisque clausis veluti dormiens sedebat, nec nisi interrogatus sæpiusque admonitus quicquam, sed tunc quoque quæ ad rem minime pertinebant, respondebat. At post obitum illius aperta caluaria, inuenta est in cerebro glandula magna dura supra callosum corpus genita, cuius causa esse potuit ictus quem in capite longè ante morbi principium acceperat.

Quartò vapores immodici ad cerebrum delati comatosi affectus sympathici causa esse possunt. Si enim copiosi & halituoſi ſint, ſpiritus animales aggrauant, & veluti caligine ſuffundunt, quemadmodum nubes in maiori mundo Solis radios obtenebrant. Si verò crudiores fuerint, cerebrum adeò humectant, vt languidum ad actiones obeundas fiat. Sic ebrij ſopore profundiffimo à vaporum ex vino, & crudis alimentis eleuatorum copia, detinentur. Sic pueri lumbricis laborantes comatoſis affectibus corripiuntur, à crassis & copioſis vaporibus ex crudorum & pituitoſorum humorum copia eleuatis. Sic in febribus nonnullis intermittentibus ſopor inexpugnabilis acceſſionis initio contingit, ob crudorum, & putreſcentium in venis humorum, præſertim meſaraicis contento. um, copia; qui à calore febrilis paroxyſmi attenuati, multos vapores ad caput tranſmittunt, talénque ſoporem inducunt, qui interdum ceſſante frigore, vel rigore ceſſat, interdum verò vſque ad finem paroxyſmi permanet, prout vapores craſſiores, aut tenuiores magis, aut minùs copioſi faciliùs, aut difficiliùs diſcutiuntur.

Quintò à medicamentis narcoticis nimia copia aſumptis ſomnus ita profundus excitatur, vt multi ex imprudenti opij vſu in ſomnum perpetuum demerſi fuerint. Talis etiam vis narcotica in quibuſdam animalibus reperitur, vt in torpedine. Sic etiam ex morſu Aſpidis ſoporem lethalem induci refert Plutarchus in Cleopatrà interitu. In humanis etiam corporibus qualitas hæc narcotica generatur ex maligna humorum putredine, quæ in malignis ac peſtilentibus febribus reperitur, vnde comatoſus affectus in huiuſmodi febribus ſæpiſſimè contingit, qui malignitatis certiffimus eſt index, & futuræ mortis non rarè prænuncius.

Signa diagnostica varias sopororum affectuum differentias indicantia, in earum distinctione in principio huius capituli fuere proposita. At signa causarum hos affectus producentium ita se habent.

A pituitosis humoribus in cerebro restagnantibus affectus soporosos produci testantur habitus pituitosus, ætas senilis, aut puerilis, regio & tempestas frigida & humida, consuetæ per os & nares pituitosæ excretionis suppressio; & quod æger ante inuasionem capitis grauitate, oculorum obtenebratione, & totius corporis segnitie affectus fuerit, quodque non rarò in ipso morbo pituita per os & nares effluat, aurin gulam defluens ab ægro frequenter deglutiatur.

A sanguine verò soporosum affectum generari significant, plethorica dispositio, rubor faciei, & capitis dolor affectum præcedens.

Tumor in cerebro genitus vix ullis indiciis internosci potest, sed sola caluariæ apertione post obitum ægrotantis deregitur, vt in casu supra proposito ostenditur.

Sympathicum affectum & à vaporibus ad cerebrum eleuatis oriundum ostendunt, primò absentia eorum signorum, quæ idiopaticum affectum significant. Secundò signa indicantia peculiarem affectum partium, à quibus vapores ad cerebrum transmittuntur. Sic à ventriculo vapores huiusmodi eleuari testantur, crapula præcedens, ructus acidi, aut nidorosi, aliæque crudorum humorum in ventriculo, aliisque partibus ventris inferioris redundantium indicia. Si verò à lumbricis oriantur, propria eorum signa apparebunt, proprio capite descripta.

Quod ad prognosim attinet: omnis soporosus affectus periculosus est; sed quod maior & profundior est somnus, à quo æger difficilior expergiscitur, eò maius

portendit vitæ periculum. Atque ita carus comare, & lethargo periculosior est; apoplexia caro, quæ si fortis fuerit, omninò incurabilis censetur ab Hipp. *Aphor. 42. sect. 2.* qui sic habet. *Apoplexiam fortem solvere est impossibile, debilem verò non facile.* Fortis verò dicitur apoplexia, in qua respiratio inæqualis, inordinata & interdum intermittens est. Si verò ita se habens respiratio magna vi exerceatur, fortior censenda est: si autem respiratio penitus prohibeatur, fortissima est. Contrà verò ubi respiratio aliquem seruat ordinem, debiliior existit, quæ doctrina proponitur à Gal. *comment. Aphor. prædicti.*

Valdè periculosus est comatosus affectus, qui acutissimo morbo superuenit. Vel enim caloris natiui extinctionem significat, vel malignam & venenatam qualitatem, quæ in febribus malignis cerebrum plerumque solet impetere. Qui per consensum partium inferiorum fit comatosus affectus, & à vaporibus ex iis eleuatis, minus infert periculum.

Lethargo affecti in septem diebus moriuntur; si verò hos effugerint, sani euadunt. Hipp. *secundo de morbis.*

• Affectus comatosi in senibus ut plurimum lethales esse consueuerunt. Cum enim propter caloris natiui inopiam, debilem habeant facultatem concoctricem, & expultricem, fit, ut materiam mobificam superare & expellere nequeant eam in primis quæ in cerebro redundat; siquidem cerebrum cum sit pars corporis frigidissima, aduentante senio caloris imminutionem, & tandem extinctionem, citius quàm reliquæ, pati consuevit.

In lethargo parotides superuenientes, vel pus ex auribus effluens cum immunitione symptomatum, salutare; significat enim dominium naturæ supra causam

morbificam, quam vel expellit ad emunctoria nondum perfectè concoctam, vel in pus conuersam per ductus naturales euacuat.

Qui ex lethargo seruantur, empyici sunt, ex Hip. in Coac. & 3. de morbis. Hæc sententia, vt sonat, & vt plerique interpretantur, experientiæ non respondet. Vix enim verum empyema ex lethargo genitum, vlli videre contigit. Sed veritati est consentanea Mercurialis interpretatio, quæ vel empyicos, seu suppuratos hoc loco esse intelligendos, quibus per aures, vel nares materia purulenta euacuetur. Docuit enim Gal. com. Aphor. 7. sect. 5. & Aphor. 44. sect. 7. per empyema Hippocratem non solum quæ in thorace, sed quæ etiam in singulis partibus sit, suppurationem intelligere.

Soporoso affectui à causa frigida oriundo phrenitidem succedere bonum: quandoquidem à calore intensiore phrenitidem efficiente materia pituitosa, affectum soporosum producens, concoquitur.

Apoplectici in septem diebus pereunt, nisi febris apprehenderit. Hip. 2. de morbis, & Aphor. 51. sect. 6. Illa autem febris acuta esse debet, & essentialis, ab humorum, & spirituum efferuescentia oriunda, vt possit materiam morbificam discutere. Si autem remissior fuerit, & symptomatrica, qualis apparere consuevit in apoplexia, quæ à dispositione inflammatoria cerebri, & nimia sanguinis copia in venis illius contenta, exoritur, morbum non icnminuit; quin potius phrenitica quædam symptomata accersit, quæ facultates animales debilitant. Et in hac causa phrenitis soporoso affectui superueniens non est bona, vt in superiori prognostico dicebatur. Præterea febris morbum solutura alia conditione indiget, vt nimirum à principio morbi accidat, dum natura adhuc in suo robore consistens validos co-

natus exercere potest; quæ enim iam progressu morbo superuenit, salutaris non est, ut docuit Hipp. in Coacis. *Apoplectica*, inquit, *affectiones derepente exolutorio modo fientes, febre temporis progressu accidente, perniciofa.*

Apoplecticis *εξιδρωσις* superueniens mala; illa enim sudatiuncula summam naturæ oppressionem significat.

Ad horum affectuum curationem, sicut & reliquorum omnium, tria instrumenta medica necessaria sunt, diæta, chirurgia, & pharmacia.

Diæta in horum affectuum principio tenuissima est imperanda, quia morbi sunt acutissimi; ideo solis iusculis ægri nutriendi sunt, per dilucida interualla usurpatis. In declinatione verò, & in curatione prophylactica eadem diæta conuenit, quæ in frigida cerebri intemperie descripta est.

Reliqua duo instrumenta sequenti methodo sunt usurpanda.

Quandoquidem huiusmodi affectus soporosi præcipientes sunt, & periculo pleni, sedulam Medici diligentiam postulant, & in talibus casibus remedia festinanter administranda sunt.

Primo igitur Medicus ad affectum aliquem soporosum vocatus, ægrum confestim à graui illo somno excitare conabitur, omnibus sensibus obiecta vehementia offerendo. Atque aded oculi radiis solaribus, & luci splendide obiiiciendi.

Aures clamoribus, strepitu, & sonitu concutiendæ, & in primis æger proprio nomine magnâ voce sæpè appellandus est.

Naribus acria, ut ruta, castoreum, acetum, obiiicienda. In os & palatum itidem acria iniicienda.

Tactus frictionibus, vellicationibus, pilorum euul-

sionibus, ligaturis, digitorum complicationibus, & aliis huiusmodi irritandus.

Clyster laxans præscribatur, primum ex decocto communi, ut citius paretur, in hunc modum.

℞. Decocti communis clysteris ℥. j. β. hieræ picræ, & diaphœn. ana ℥. j. ol. lilior. & rutac. ana ℥. j. β. mellis anthosati ℥. ij. salis ℥. j. Fiat clyster, iniiciendus statim.

Dum hæc fiunt, seriò apud se meditari debet Medicus, an venæ sectio celebranda sit quandoquidem in hisce affectibus, quod dixit Celsus de apoplexia, sanguinis detractio, vel occidit, vel liberat. Conuenit autem venæ sectio, si sanguis causæ principalis, vel adiuuantis, vel sine qua non rationem habeat, viresque ferant.

Vires autem non actionum animalium ablatione æstimandæ sunt, sed quales ante morbi inuasionem fuerant. Si enim tum satis fortes fuerunt, etiam nunc permittunt, nisi plane fortis sit apoplexia. Neque vires sunt debiles per resolutionem, sed per oppressionem.

Si verò nullo modo sanguis peccet, aut vires sint verè deiectæ, aut æger admodum senex, venæ sectio omitenda.

Statim verò & sine omni mora, siue noctu, siue interdiu, affectu quis corripiatur, venæ sectio instituat, & quidem ante clysterem, si quamprimum iniectus non fuerit. Fricetur tamen prius corpus, & aperiatur vena in brachio.

Hoc etiam aduertendum est, vtilius ac tutius esse non vnâ vice mittere quantum opus est sanguinis, sed per vices, intra tamen paucarum horarum spatium. Nam per iteratam illam sanguinis missionem, & materia facilius mouetur, & vires non deiciuntur. Inspiciatur post primam venæ sectionem ægri facies, & pulsus exploretur. Et si color faciei viuidior reddatur, & respi-

ratio faciliior, ac pulsus benè habeat, optimè sperandum, & confidentius venæ sectio repetenda.

Vulnus in venæ sectione fiat ampli.ori foramine: aliàs enim sanguis, qui crassior est, statim subsistit.

Quò magis abundat sanguis, eò liberalius detrahi debet. Si verò pituita magis luxuriat, parciore manu mittendus est, ne calor nativus, ad hunc affectum discutiendum tantoperè necessarius, quadamtenus infringatur.

Copiosæ & frequentis sanguinis detractionis in apoplexia exemplum singulare proponitur à Zacuto Lusitano, lib. 1. *historia Medicorum principum*, hist. 33. his verbis. *Nobilis quadam fœmina iuvenula, in omnium rerum obliuionem, deinde in veram apoplexiam cum menstrui effluvio incidit. Cui cum plurima, tam in superioribus, quam in inferioribus partibus essent celebrata auxilia, per ligaturas, acres clysteres, scarificatas cucurbitas dorso applicatas, neglectâ indicatione, qua à menstruo actu fluente desumitur, oburgens ex procrastinatione periculum, cum viribus esset valentibus, factis frictionibus crurum, & cucurbitulis femoribus apposis, octo horarum spatio, quater è cephalica copiosè sanguinem mitto, à quo presidio loqui cœpit, & conualuit.*

Quidam præcti recentiores audent in apoplecticis iugulares venas aperire, sicque omnes propemodum liberari affirmant: in eâque apertione hac methodo progrediuntur. Primò collum leuiter constringunt linteo, apertione facta statim laxant, sanguis spontè fluit sine ligatura, quæ posset sanguinem ad caput attrahere; vulnus postea occludunt emplastro glutinante sine ligatura, eoque facile sanguinem cohiberi asserunt. Quod confirmat Zacutus Lusitanus, qui tamen ligaturam, adhibet, *observat.* 79. lib. 1. *Praxis Medica admiranda*; vbi refert historiam anginæ acutissimæ, in qua pericis-



simorum Medicorum consilio venæ iugulares apertæ fuerunt vnde sequutus est irreparabilis ( vt ipse loquitur, ) sanguinis fluxus, quo æger in omnimodam varium iæturam lapsus est. Vocatus Zacutus accurrit, emplastrum Galenicum superimposuit, quo ipse *lib. 5. meth. c. 4.* ad arteriarum, & iugularium hæmorrhagias feliciter vtitur: sicque collo commodè ligato, æger iam exhaustus reficitur, à morbo liberatur. Emplastrum verò componitur ex thure, aloë, & pilis leporinis, albumine oui subactis, duplâ thuris ad aloën quantitate, vt docet Gal. *loco citato*; aliquando verò æquali vtriusque quantitate, in durioribus scilicet corporibus. Superiorem operationem Gal. comprobat, cum dicit hoc emplastrum venarum iugularium profluuium citra vinculum sistere. Hoc etiam animaduerti velim, in apoplexia sanguinem ex vena aperta tanto impetu non profluere, quemadmodum in angina; quia in illa sanguis est refrigeratus, ac veluti congelatus; vt docuit Hippocrates *. de morbis,* & eâ ratione creditur venas & arterias carotides obstruere; in hac verò feruidus est ac tenuis, cum anginosi febre acutissimâ laborare soleant.

Purgatio instituatur paucis horis post venæ sectionem, neglectâ temporum electione. Neque enim in purgando cunctabundus nimis, aut timidus esse debet Medicus, cum morbus valdè vrgeat, & breui sua percurrat tempora. Et illa purgatio forti medicamento debet fieri, quia humor contumax est, & obruta facultas, nec nisi vehementioribus irritatur.

Illud autem medicamentum vulgò fieri solet ex ℥. j. electarij diacarthami, dissoluta cum aqua betonica, addendo castorei ℥. ss. Vel

℥. Turbith. electi ℥. iiij. agarici recenter trochisc. ℥. ij. zinzib. ℥. ij. sem. foeniculi ℥. j. castorei gr. vj. Infundantur in sufficiente quantitate aquæ betonica. In co-

lat. ℥.iiij. dissolue electarij diacarthami ℥. iiij. syrapi ros. ℥.j. fiat potio. Vel.

℥. Massæ pilul. coch. min. ℥.j. castorei gr.iiij. Malaxentur cum aqua betonicæ, formetur pilulæ septem; & si æger non possit deglutire, dissoluantur in aqua saluæ, laucendulæ, vel betonicæ. Vel

℥. Missæ pilul. coch. mai. & de agarico, ana ℥. ℞. trochisc. alhandal, diagrydij & castorei, ana gr. iiij. Fiat massa cum melle anthosato, quæ dissoluatur in aqua saluæ. Vel fiat talis potio.

℥. Fol. scennæ ℥. ℞. agar. albi ℥. j. ℞. turbith elect. ℥. j. zingib. & galangæ, ana ℥. ℞. Coquantur in aqua saluæ & rorismar. Colat. ℥. ij. ℞. adde electarij diacarthami ℥. ij. castorei ℞. oxymelitis simplicis ℥. ℞. Fiat potio.

In lethargo purgatio ab initio mitior esse debet, propter febrem continuam coniunctam, ex agarico, cui aliquid rhab. addi potest, vel scammonij; aut pilulis de hiera cum agarico, cum bilis plerumque humorum ad caput vehiculum sit. In morbi tamen progressu, cum iam materia ad caput fluxit, & in hæret, purgantibus etiam prædictis utendum est.

Trallianus scammonij ℞. j. cum castorei ℞. ij. in oxymelite exhibet, quo multos lethargicos deploratos se restituisse refert. Et Oribasius ex Ruffo Ephesio refert, nullum aliud esse lethargo correptis æquè utile, atque efficax medicamentum ad purgandam pituitam, quam bilis admixta in caput detulit, quàm scammonium cum castoreo exhibitum.

Sæpè verò accidit facultates esse ita oppressas, ut medicamenta in actum minimè deducantur, atque aded etiam nihil operentur; quod mali ominis est, & ita affecti ut plurimum pereunt. Attamen, quia, ut inquit Celsus, quando huiusmodi tempestates ingruunt, remedia

media etiam cum aliqua temeritate rapienda sunt, & omnino periculum in hoc morbo aliquid tentare permittit. Nam ut Screnus habet, *Medici hac potiora putant, quam dulci morte perire.* Et, ut idem Celsus, *multa in præcipiti periculo rectè sunt, quæ alias essent omittenda.* Ideò propositis remediis non proficientibus, ad ea quæ ex antimonio parantur, licet transcendere, præsertim ea, quæ minùs vehementia sunt, qualis est aqua benedicta, ex croco metallorum composita; quæ per superiora & inferiora potenter expurgans, tantam pituitæ copiam non solum è ventriculo, partibusque inferioribus, sed etiam è cerebro educit, ut hac euacuatione interdum ægri liberentur. Et bonâ fide testari possum, me virum nobilem ex primoribus huius ciuitatis vidisse, ter intra biennium ab apoplexia hoc solo remedio liberatum. Quamvis autem nonnulli etiam viri doctissimi vomitorium vsum in hisce affectibus improbant; tamen experientiæ magis credendum est; quæ etiam nos docet quotidianis experimentis pueros comate affectos sale vitrioli vomituum promptius & tutius, quam vlllo alio remedio liberari.

Tinctura nicotianæ in aqua vitæ extracta, & ad 3. ij cum melle excepta, & in os infusa potenter educit.

Interim medicamento purgante exhibito, antequam operari incipiat, & dum etiam operatur reuellentiæ omnium generum in vsum reuocanda sunt, non solum frictions, & ligaturæ antea propositæ, sed etiam cucurbitulæ dorso, scapulis, brachiis, & femotibus affixæ, sine scarificatione, si sanguinis missio sufficiens celebrata sit; & cum scarificatione, saltem earum aliquæ, si phlebotomia fuerit omissa.

In apoplexia non admoveantur cucurbitulæ posteriori thoracis parti, aut hypochondriis, ne contractis thoracis & abdominis musculis, respiratio magis impediatur.

Summum & vnicum remedium habentur, præsertim in apoplexia, cucurbitulæ capiti impositæ. Quod remedij genus insignis ille Medicus Fracastorius apoplexia correptus matibus suis indicasse fertur; sed non intellectus perit.

Zacurus Lusitanus *hist. 31. lib. 1. de Medicorum principum historiis*, refert desperatam apoplexiam, cucurbitulâ bis occipiti admotâ cum profundis scarificationibus, a se curatam fuisse.

Vesicatorium posteriori parti cervicis & scapulis admo-  
ueatur.

Clysteres acres iniiciantur duo, vel tres eadem die.

℞. Fol. parietar. hyssopi, calamenti, origani, salvia, rutæ, & centaurei minoris, ana M. j. sem. carthami ℥. β. sem. feniculi & cumini, ana ℥. ii. agarici albi in nodulo inclusi ℥. ij. pulpæ colocynth. in eodem nodulo inclusæ ℥. j. β. Coquantur ad lb. j. In colat. dissol. hieræ pictæ ℥. β. diaphœnici ℥. j. olei rutacei ℥. ij. Fiat clyster.

Chymici clysteribus admiscant aquæ benedictæ ℥. ij. vel iij. & sic potenter purgant.

A quæ autem huius dosi augeri potest ad ℥. iv. & ℥. iv. Imò verò antequam è phiala educatur, aliquantulum agitari debet, ut nonnihil pulveris in fundo residens admisceatur, unde vires efficaciores evadunt. Idèd ut plurimum clysteres ex aqua benedicta, seu vino Emetico, hæc formulâ præscribere soleo, qui in multis affectibus, præsertim colicis doloribus, miranda præstant.

℞. Decocti emollientis lb. j. diaphœnici ℥. j. aquæ benedictæ turbidæ ℥. iv. Fiat clyster.

S: clyster debito tempore non reddatur, glande alius proutur.

℞. Pulu. hieræ picræ Gal. ʒ. ij. pulpæ colocynthidos, agarici albi, ana ʒ. ss. diagrydij ʒ. j. salis gemmei ʒ. ij. mellis ad debitam consistentiam cocti quantum satis; fiant suppositoria.

Sæpè tamen accidit, vt sphincter aui resoluatur, vnde anus planè pateat, ac clysteres sine fructu iniiciantur cum retineri non possint; qui casus plerumque desperatus est.

Naribus admoueantur castoreum cum aceto, quæ specificâ proprietate somnum excutere creduntur.

Efficax etiam remedium est, si acetum acerrimum supra laminam candentem effundatur, & vapor ab agro naribus excipiat. Adhuc efficacius erit, si aceto addatur semen nigellæ, rutæ, & castoreum. Ipsum etiam acetum modicè calefactum & naribus adhibitum excitat potenter, si acerrimum sit, & adhuc potentiùs, si ei piper & castoreum admisceantur. Excitat etiam à somno suffusus sulphuris.

Pili capræ vsti, & cornu cerui & capræ vstum, & naribus admotum, potentissima sunt ad excitandum altissimè dormientem.

Succini albi fumus ad apoplecticos excitandos præstantissimus est, situm illius oleo tempora & nares sæpè illinantur.

Fiant etiam frictiones in plantis pedum cum sale & aceto, manibus inunctis oleo rutaceo & de castoreo: lingua & palatum inungatur theriacâ veteri, in aqua cælesti, aut apoplectica dissolutâ. Sed aduertendum est, ne theriaca recens adhuc sit, nam ratione opij somnum inducit. Ad eundem usum reuocari poterit aurea Alexandrina, & confectio ancardina. Sinapi etiam potest coqui in vino forti, & eo palatum inungi. Pyrethri radices in oxymelite coctæ idem præstant. Omnibus verdè hisce castoreum utiliter admiscetur.

Vniuersali euacuatione peractâ, & purgato corpore, caput euacuandum est, tam sensibiliter, quàm insensibiliter.

Sensibiliter per nares, & palatum, errhinis, & sternutatoriis, in curatione frigidaë intemperiei cerebri propositis, & inunctionibus palati supra descriptis. Hisce omnibus addantur ruta, castoreum, acetum.

At de sternutatoriis hoc aduertendum, si affectus perseveret, & ager difficulter excitetur, eorum vsum commodissimum esse; non tamen diutius in iis persistendum, ne caput repleant, humores commoueant, ac fundant. Sed initio morbi ab intempestiuo sternutatoriorum vfu abstinendum, cum magis ab iis tum materia fundatur, & partibus impingatur; vnde morbus fit contumax, vel interdum leuior affectus in apoplexiam degenerat.

Tandem insensibiliter resoluentia applicanda, quæ in sequentem modum componi poterunt.

℞. Baccharum lauri & iuniperi, ana ℥. j. β. radic. angelicæ, zedoariæ, imperatoricæ, ana ℥. j. fol. beton. saluiæ, rorismar. ana M. j. rutæ, satureiæ, maioranæ, flor. lauendulæ, ana M. β. Coquantur in aceti sufficienti quantitate. Hoc decocto spongia, aut linteum imbutum, aut stupæ, capiti calidè applicentur. Mirum quantum auxilij soporosis affectibus hoc remedium afferat. Brachia quoque & manus eo abstergantur, eoque crura & pedes fricentur.

℞. Castorei ℥. β. capil. hominis vstorum ℥. iij. succi rutæ, aceti, & olei communis, ana ℥. ij. Coquantur ad vnguenti consistentiam, quo illinatur caput calidè post forum. Vel

℞. Olei costini, castorei, & de euphorbiæ, ana ℥. j. pulu. sinapi, euphorbij, ana ℥. j. aceti cochlear. j. ceræ quantum satis. Misce, fiat vnguentum.

Si prædictis remediis non cesserit affectus, vesicatorium magnum vertici, & sineipiti erit applicandum.

Efficacius multò euadet vesicatorium, si euphorbium ei addatur, quod è profundioribus capitis partibus humores attrahit ad superficiem.

Nonnulli etiam, cum morbi vis maxima est, audent cauterium actuale, occipiti inter primam & secundam vertebra[m] applicare.

Zacutus Lusitanus plura eodem tempore applicuit, cum foelici successu; ut testatur lib. 1. *praxis admiranda, obseruat.* 14. his verbis. *Vocatus ut inuiserem agrum, qui post dies triginta inexpugnabili dormiendi necessitate correptus, cum febricula lenta, agrè palpebras attollere poterat, profundo somno immersus. Hic varia reuellentia, & vacuantia erat expertus, quibus cum non leniretur, ad cauterium accessicum utilitate summa. Quare cadenti fer-ramento crustus in verticè capitis exciui, in occipite unam, & circumcirca multas: ex quibus cum excitaretur eger, & ichores effluerent, expergefactus ad mentem rediit. Hoc auxilio præter omnium spem, omnibus tentatis, memini me bis careticos persanasse. Hi enim ignis ope, liquatâ, pituita, & per multos dies, per os, & nâres excretâ conualuere.*

Alij, ex antiquorum præscripro, sarraginem candentem capiti admouent eâ distantia, ut pilos, non cutim capitis possit comburere.

Commodè quoque in huiusmodi affectibus, aliquid aquæ cœlestis, vel apoplecticæ agro infunditur. Aquæ enim hæ ob summam penetrandi vim, præstantissimum sæpè afferunt auxilium, (& multos ab imminente apoplexia, vel etiam iam præsentè liberarunt) modò sanguis non valdè abundet, qui aquarum istarum vsu posset fundi.

Aquarum autem apoplecticarum multæ descriptiones habentur apud Languium, VVecchernm, Quetceranum, Crollium & alios. Vnam tantum, exempli gratia, ex selectioribus simplicibus à nobis compositam hîc afferre lubet.

℞. Radic. pœoniæ, visci quercini, ana ℥. ij. calami aromat. galangæ, cyperi, ana ℥. j. fol. beton. saluiæ, maioranæ, ana M. j. sem. pœoniæ, anisi, fœniculi, caui, ana ℥. iij. flor. lauendulæ, stechados, & rorismar. ana P. j. nucis moschat. macis, caryophyl. cubebæ, granor. paradisi, cardamomi, ana ℥. ss. cinamomi ℥. ij. croci ℥. j. ss. specierum diambriæ, & diamoschi, ana ℥. ij. Contundatur & incidantur, vt artis est, & reponantur in alembico vitreo, desuper affundendo spiritus vini optimè rectificati q. s. vt tribus digitis materia superemineat. Digerantur in B. M. per octo dierum spatium, postea destillentur, & aqua seruetur in vase vitreo bene clauso.

Si tandem morbus ad declinationem translatus esse videatur, somnûsque ille profundus iam discussus fuerit, omissis prædictis remediis, soli roborationi cerebri incumbendum est. Quod satis commodè fiet vsu quotidiano opiatæ cephalicæ, pro frigida intemperie cerebri descriptæ. Vel si potentiùs agendum est, aqua apoplectica vsurpari poterit.

In primis verò castorei vsus continetur, si malum protrahatur, & manè per aliquod dies eius grana iij. vel iv. cum oxymelite simplici, vel scill. exhibeantur; testatur Trallianus, multos isto morbo victos, hoc solo remedio mortem euasisse.

Exteriùs etiam vtiliter admouentur balsama apoplectica, quorum variæ extant formulæ apud Chymiatros. Nos vnicam, e. g. hîc tantum subiiciemus.

℞. Olei nucis moschat. per expressionem parati ℥. ss. ambræ griseæ, moschi optimi & zibetæ, ana ℥. j.



ol. destillati lauendulæ. succini, cinnamomi, rorismar. caryophyll. ana ʒ. β. Misce, fiat balsamum, quod naribus & auribus instilletur, palatōque illinatur singulis diebus manē. Ad hanc rem etiam valdè commendatur oleum nucis moschatæ destillatum, eodem modo usurpatum.

Denique in horum affectuum generali curatione diligenter aduertendum est, in iis qui fiunt à sanguine, minùs calefacientia medicamenta esse adhibenda, at phlebotomiam largiori manu celebrandam, postea venam frontis aperiendam: tum etiam purgantibus phlegmagogis esse admiscenda.

Qui hisce affectibus semel affecti, ab iisque liberati sunt, in eos ut plurimum solent recidere. Quod ut præcaueatur, frigidior cerebri intemperies corrigenda est, eadēque illius cura instituenda, quæ suprà fuit proposita. Eadēque viâ, & methodo imminens apoplexia, vel carus, vel lethargus, vel coma præcauebitur. Et si cerebrum valdè refrigeratum est, post vniuersales vacationes, aqua apoplectica in usu frequenti esse poterit. Vel etiam uti poterit tabellis in sequentem modum compositis.

℞. Ambre griseæ ʒ. β. olei destillat, anisi, cinnamomi, nucis moschat. ana guttulas ij. olei caryophyll. gutt. j. sacchari in aqua flor. aurantiorum dissoluti ʒ. iv. Fiant tabellæ, capiat ʒ. j. vel duas manē.

Pilulæ caput roborantes etiam usurpari poterunt, in hunc modum compositæ.

℞. Cubeb. mastiches, nucis moschat. caryophyll. ana ʒ. j. ambre griseæ ʒ. β. moschi gran. vj Cum succo maioranæ tormentur pilulæ, capiat ʒ. j. horâ somnibis in septimana.

Commendatur etiam, & apud multos in usu est hie puluis,

℥℥. Succini albi ℥. ss. pulu. electar. diarrhod. abbatis  
 ℥. ij. radic. pœoniæ ℥. j. ss. Fiat puluis, de quo capiat ℥. j.  
 in aqua conueniente ante nouilunium.

Vtile quoque est nucem moschatam sæpè ore detinere, & masticare.

Tum etiam odoramenta sæpè naribus adinuenda sunt, & in primis balsama apoplectica.

Aromata in cibis vsurpentur: post pastus puluis digestius, in curatione frigida intemperiei cerebri descriptus.

Si à sanguinis copia affectus soporosus metuitur, illius in primis quantitas imminuenda est, dandaque sedulo opera, ut hæmorrhoides profluant, quo nihil utilius esse potest.

His etiam purgationes instituendæ sunt; ex senna & rhab. eaque remedia eligenda, quæ minùs calefaciunt.

Si denique ab humore melancholico metuatur apoplexia, fluxus hæmorrhoidum etiam utilissimus est, purgatio iterata humoris melancholici, & medicamenta proposita ad roborandum cerebrum; præcipuè verò puluis ex succino, diarrhodone & pœonia supra descriptus.

### C A P V T. III.

#### *De comate vigili.*

**L**icet coma ἀγρυπτιον, seu vigil ad soporosos affectus referri soleat, quia tamen longè diuersam à ceteris conditionem obtinet; ideò seorsim in hoc capite explicandum est.

Est autem coma vigil affectus, in quo ægri clausis

oculis decumbunt, ut dormire videantur, cum tamen vigilent, & delirent: ac si eos tetigeris, statim oculos aperiunt, & toruere aspiciunt, & iterum delabuntur in somnum, qui variis imaginibus & deliramentis impeditur, ita ut vigilare cogantur. Hunc affectum Gal. medium constituit inter phrenitidem & lethargum, & typhomaniam appellat.

Causa huius affectus vulgarissima, est bilis cum pituita permista, à quibus humoribus cerebrum tantum irrigatur, vel tumorem atque inflammationem concipit, unde erysipelas œdematosum, vel œdema erysipelatosum exoritur. Cum autem ea humorum miscella variis modis proportionibus fieri valeat, sic varij in diuersis ægotantibus isti affectus apparent. Si enim bilis in mixtione præualeat, delirium maius est, & ægri, licet clausos habeant oculos, minus dormiunt; si verò pituita prædominetur, ægri magis dormiunt, minus delirant, & expergefacti minus vociferantur, ac desipiunt.

Fit etiam coma vigil per sympathiam à vaporibus biliosis, & pituitosis simul mixtis in cerebrum translatis: quod non raro solet contingere in febribus ex humorum miscella oriundis, præcipue hemitritæis ex tertiana & quotidiana compositis. Non est tamen inconueniens asserere, vapores simpliciter calidos & humidos in febribus satis intercis hunc affectum producere, quia ab humiditate fit somnus, à calore autem vigilia.

Diagnosis huius affectus ex iis quæ antea dicta sunt satis elucescit. In eo enim laborantes clausis oculis permanent, & somnum capere videntur; attamen dormire nequeunt, & se variis modis exagitant, sese subito erigunt, è lecto surgere nituntur, & iterum in somnum relabuntur. Causarum varietas ex prædictis etiam facile dignoscitur.

Periculosus affectus maximè censendus est. Siue enim tumore & inflammatione cerebrum afficiatur, graue malum esse consuevit, seu alio quouis modo à prædictis humoribus obsideatur, siue à vaporibus ex febrium malignarum materia oriundis afficiatur.

Deliria vehementiora in comate vigili conuulsionem efficiunt: fiunt enim ab humore, vel vapore acerrimo, qui partes neruosas feriendo, conuulsionem faciliè concitare potest.

Curatio comatis vigilis idiopathici iisdem instrumentis perficitur, quibus phrenitis & lethargus curati consuevit: quod si magis ad phrenitidem deflectat, illius remedia magis adhibentur. Si verò magis ad lethargum inclinet, eiusdem remedia magis vsurpantur. Symptomatici verò comatis curatio à febris malignæ curatione dependet, à qua sumit originem. Peculiariter tamen remedia vapores illos à cerebro reuellentia, & repellentia vsurpanda sunt in principio, vt phlebotomia ex brachio, & malleolo, & oxyrrhodina frontis & sincipiti admota; quibus accedent clysteres frequenter iniecti, cucurbitulæ tum siccæ, tum humidæ scapulis, dorso, natibus, & cruribus affixæ; vesicatoria ceruici, brachiis, & femoribus admota: & siquid cerebro infixum videatur, deriuatio per apertionem venæ frontis, aut hirudines ponè aures, & temporibus affixas molienda erit, simulque resolutio procuranda animalibus tenellis calentibus capiti admotis.

## C A P V T IV.

### *De Catoche, seu catalepsi.*

**Q**uædam apud authores confusio reperitur circa catochi nomen, quod alij pro comate vigili, alij

pro catalepsi vsurpent ; illis autem occasionem dedit Paulus, qui lib. 3. cap. 8. de duplici catoche agit, & primum sub illius nomine de comate vigili tractat in fine verò sub eodem nomine catalepsim explicat. Vfus tamen inualuit, vt catochus, & catalepsis pro vno & eodem morbo apud omnes propemodum authores habeatur. Latini vulgò congelationem appellant.

Rarissimus est affectus, & admiratione dignissimus, & quicumque ex authoribus aliquem eius casum viderunt, obseruatione dignissimum censuerunt, eiusque historiam descripserunt. Primus omnium Gal. comment. in 1. prorrh. sect. 2. partic. 56. cuiusdam condiscipuli sui historiam proponit, qui cum assiduo studio se fatigaret, catalepsi correptus est ; Iacebat, inquit, veluti lignum prorsus inflexus rigidusque, atque extensus. Videbaturque oculis apertis ita nos intueri, vt ne conuinceret quidem nihil tamen loquebatur. Is quoque eodem tempore quæ loqueremur audire se dixit, quamquam non euidenter claresque ; nonnulla item & memoria tenens referebat, præsentisque omnes se conspiciere dixit ; ita vt quorundam actiones recordatus exponeret ; sed neque loqui posse, neque membrum vllum mouere. Fernelius verò lib. 3. de morborum partibus cap. 2. duas refert historias, quæ sic habent. Vnus dum literis & chartis sedulò innigilaret, repente hoc vitio percussus ita quidem obrigit, vt sedens calamumque digitis premens, oculis in libros defixis, putaretur in eadem studia incumbere, donec vocatus ac impulsus, deprehensus est omni sensu, atque motu carere. Alterum mortui ritu iacentem innisi, qui neque cernebat, neque audiebat, neque compunctus sentiebat quicquam. Facilis tamen inerat respiratio, & quicquid in os ingerebatur, promptè vorabat ; è lectulo sublatus, solus insistebat, impulsusque incedebat, & quocumque vel manus, vel brachium, vel crus inflecteretur, illic quasi fixum, vel stabile permanebat ; expressam

quandam dixisses laruam, aut arte progredientem statuam.

Similes historias videre est apud Schenkium, Marcellum Donatum, Rondeletium, Iacotium, & alios. Ex quibus colligitur, in hoc affectu sensuum internorum & externorum abolitionem cum membrorum rigiditate ut plurimum reperiri; interdum tamen sensus non esse prorsus abolitos, ita ut ægri colloquentes audiant; interdum etiam membra non esse rigida, sed ab adstantibus flecti posse, & in varios situs moueri.

Causæ huius affectus variæ assignari possunt. Gal. com. Aphor. 3. sect. 2. frigida & sicca cerebri intemperiei catalepsis generationem tribuit, quæ quidem intemperies partem cerebri posteriorem præcipuè occupat, eam constipat, & condensat; unde nervi ab ea oriundi etiam condensantur, & tensi ac rigidi euadunt. Talis etiam intemperies totum nervosum genus occupare potest, ab externa, vel interna causa producta. Hanc tamen causam nonnulli in dubium reuocant, existimantes tantam frigiditatem in viuente corpore reperiri non posse, quæ talem nervis congelationem inferat. Verùm hos tacite redarguit Gal. lib. de diff. morb. cap. 5. ratione ab experientia desumptâ, his verbis. *Nam qui quos in itinere usque ad mortem frigus oppressit, talibus rigoribus corripuntur, quales Græci emprosthotonos, opisthotonos, setanosque appellant; nonnulli verò his passionibus quas congelationes nominant, affliguntur.* Docet igitur Gal. à frigore externo catalepsim generari posse. Et ratio facile persuadet, in iis qui in itinere ex intenso frigore rigescunt & intereunt, rigiditatem mortem præcedere, atque aded minorem frigiditatem eam posse inducere, quam sit illa, quæ mortem inducit; sicque congelatio nervorum, seu catalepsis à frigida intemperie produci poterit,

quæ citius talem affectum pariet, si siccitatem comitem habuerit.

Frequentius tamen generatur hic affectus ab intemperie frigida & sicca cum materia coniuncta. Illa autem materia est humor, aut vapor melancolicus, à quibus constipatio partis cerebri posterioris, & neruorum tensio, atque rigiditas inducitur, non solum qualitate sua frigida & sicca; sed etiam quantitate, quæ replendo distentionem facit.

Aëtius lib. 6. cap. 4. à sanguine etiam fieri posse catalepsim asseruit, cui subscribit Rondeletius, dicens illud contingere quando venæ & arteriæ cerebri opplentur, vnde rigescit corpus, & distentum in modum corporum à frigore congelatorum conspicitur. Hanc sententiam confirmat historia nobilis mulieris febre synocha laborantis, quæ 19. die catalepsi correpta est, sed largo tandem fluente è naribus sanguine liberata.

Sennertus nouam excogitauit causam, quam dicit esse spiritum quemdā congelantem, à quo spiritus animales figuntur, & immobiles redduntur: illam autem vim congelatiuam, & fixatiuā ab intemperie frigida & sicca dependere negat: sed à qualitate quadam occulta exoriri asserit, cuiusmodi spiritus congelantes in Macrocosmo reperiuntur; vt in fulmine, à quo interdum homines rigidi, & veluti congelati redduntur; quemadmodum refert Cardanus octo melfores sub quercu cœnantes, fulmine percussos fuisse, & eandē figuram corporis seruasse, vt vnus comedere videretur, alter manum poculo adinouere, alius bibere, licet omnes essent exanimati. Vulgò etiā asseritur vinū in dolio à fulminis spiritu interdum congelari, in terræmotibus aliquando spiritus quosdam è terra erumpere, à quibus homines, & reliqua animalia repentè consistunt, & rigida manet. Addit Sennertus vim congelandi in nitro & pluribus aliis mineralibus

insignem reperiri. Exempla eorū non affert. Nos vnura proponimus ex plumbo desumptum, cuius vapor mercurium ita figit, & congelat, vt mal cabilis euadat. Hoc Sennerti inuentum non esset prorsus reiiciendum, nisi ille hanc vnicam catalepseos causam statuens reliquas omnes expungeret, quæ cum à Gal aliisque præstantissimis Medicis stabilitæ sint temerè non sunt reiiciendæ. Neque vlla necessitas cogit ad causas occultas confugiendi quando manifestæ habentur, talem effectum producendi capaces, vt in earum enumeratione satis demonstratum est. Et cum Sennertus huiusmodi spiritum congelantem ab humore melancholico excitari dicit, illius sententia à communi parum distat, quæ humori, aut vaporis frigido & sicco, atque adedò melancholico catalepsis generationem tribuit.

Diagnosis huius affectus satis manifesta est ex historiis suprâ ex Gal. & Fernel. propositis; malum enim subito hominem inuadit, eumque in eo statu detinet, in quo primò eum offendit. Sicque immotum seruat, ac si congelatus esset. Diuersitas verò symptomatum in differentiis proposita sensibus ipsis discernitur.

Prognosis huius affectus eadem propemodum instituenda est, qualis in soporosis affectibus fuit proposita: nempe affectum esse periculosum, & pro maiori, aut minori intensione symptomatum, maius aut minus portendere periculum.

Curatio autem duplex instituenda est; vna in paroxysmo, altera extrema paroxysmum. In paroxysmo ad ægrum excitandum conuenient ea remedia quæ in soporosis affectibus descripta sunt. Extra paroxysmum curatio melancholiæ morbi hîc omnino conueniet, si catochus ab humore, aut vapore melancholico generetur; quæ quidem causa frequentissima est. Si autem frigida intemperies sola, à causa externa, vel interna



producta, huic malo originem dederit; quæ illam emendant remedia è capite primo huius libri erunt depromenda. Ac denique si copia sanguinis hunc affectum generet, vel foueat, illius imminutio per venæsectionem erit consentanea.

Victus ratio calefaciens & humectans præscribenda erit, sicut in affectibus ab humore melancholico oriundis.

## C A P V T V.

### De Paralyfi.

**P**aralyfis est priuatio motus & sensus in quibusdam partibus ob impeditum influxum spiritum animalium.

Varie sunt illius differentie. Vel enim omnes quæ sub capite sunt partes occupat, & *ᾰπαργία* dicitur, vel dimidiam tantum corporis partem, & *ἡμιπαργία* nominatur; vel vnicam tantum particulam obsidet, & paralyfis particularis appellari solet. Quamuis nonnulli authores paralyfim, hemiplegiam, paraplegiam, paresim, & resolutionem pro vna & eadem motus, & sensus priuatione, quæ dimidiam corporis partem occupat, indiscriminatim vsurpent.

Duplex iterum paralyfis constituitur. Vna perfecta, in qua motus & sensus omnino abolentur. Altera imperfecta, in qua functiones ista tantum imminuuntur; & si leuis sit earum imminutio, nondum paralyfis, sed torpori, vel stuporis nomen obtinet, quia via est ad veram paralyfim, & quasi prodromus illius.

Alia etiam est species imperfectæ paralyfis, quando motus læditur illæso sensu, vel vice versa.

Causæ paralyſis in genere ſunt illæ omnes, quæ ſpirituum animalium influxum in neruos & muſculos impedire poſſunt.

Omniũ frequentiffima eſt humor pituitoſus, qui neruos obſtruendo, comprimendo, denſando, vel refrigerando, dictum ſpirituum animalium influxum prohibere ſolet.

Humor ille pituitoſus influit à cerebro in neruos & medullam ſpinalem. Sic apoplexia leuis degenerat in paralyſim, quia humor illam efficiens è cerebro excutitur in medullam & principium neruorum: ſicque vel in eorum ſubſtantiam ſeſe inſinuat, meatuſque inſenſiles, per quos ſpiritus inſluunt, occludit; vel per cavitatem vertebrarum dorſi descendens, & ſpinalis medullæ ac neruorum ductus ſequens, eos comprimit & anguſtat, ſicque ſpirituum animalium com meatum etiam impedit. Poſteſt etiam idem humor frigiditate ſua nerui ſubſtantiam denſare, vt deinceps ſpiritibus animalibus per uia non ſit. Ac denique ſimplici intemperie frigidiore humidiorique ſpirituum influxum impedire poſteſt, quandoquidem dum natiuum nerui temperamentum, & calor illius inſitus à nimia refrigeratione deſtructus eſt, ſpiritus animalis officio ſuo fungi non poſteſt; calor enim illius inſuens cum partis calore inſito coniungi debet, ad propriam illius actionem obeundam.

De aliis humoribus controuertitur, nunc paralyſis cauſæ eſſe poſſint. Attamen licet infrequentiores ſint, non ſunt omnino abdicandæ.

Trallianus *lib. 1. cap. 6.* refert, quemdam in paralyſim ex mærore incidiffe, deinde ſumptâ hierâ ad eò læſum, vt totus immobilis fieret, & propemodum interiret, niſi in contrarium mutatus fuiſſet, & humectantibus omnibus, cum potibus, tum cibis, & aliis quæ temperatum

raturum ipsum redderent vsus fuisset, maximè verò balneis compluribus, vnctionibus ex hydrelæo.

Paulus *lib. 3. cap. 28 & 43.* paralyfim proponit ex colica biliosa, cui refrigerantia maximè conferunt. Et nostro sæculo notissima est colica Pictonum, quæ in paralyfim vt plurimum degenerat, eamque ab humore bilioso produci apud omnes in confesso est, de qua fusius agetur in colici doloris theoria.

Eiusdem rei exemplum proponitur à Foresto, *observ. 27. lib. 10.* cuiusdam adolescentis, cum eorumdem partium extenuatione & atrophia; cumque calefacientium & exsiccantium medicamentorum vsu, ab aliis Medicis præscriptorum, in peius continuò rueret; tandem solis humectantibus assumptis & admotis ab eo restitutus est.

Ratio idipsum conuincit. Bilis enim, & melancholia, & quiuis alius humor & neruos influens, meatus eorum insensiles occludere potest, si eorum interiora petat; vel eosdem comprimere, si extrinsecus ambiat.

Neque rationes Rondeletij contrarium sentientis vlllo modo conuincunt, dum ait bilem & melancholiam siccare potius quàm emollire neruos; bilem ad conuulsionem magis, mordendo & vellicando, quam ad paralyfim efficiendam esse idoneam; siquidem emollitio neruorum, vt in paralyfi à pituita concedi potest, in omni tamen paralyfi necessaria non est, licet vulgo paralyfis, neruorum resolutio nominetur; cum illius essentia à sola priuatione influxus spirituum animalium dependeat; quæ dum à compressione neruorum, aliisque causis producit, eorumdem emollitio ad illius generationem minimè concurrit. Huius autem relaxationis & emollitionis neruorum opinio inde exorta est, quod partes paralyticæ tensione desti-

turæ, emollitæ videantur. Metus enim membrorum fit per tensionem masculorum & contractionem versus suam originem, quâ tensione cessante, resoluta dicuntur, licet nulla humectatio, aut emollitio extraordinaria illis acciderit. Deinde cum bilis variæ sint species, variique gradus, non est necesse, ut omni talem habeat acrimoniam, quæ convulsionem efficere valeat. Adde quod varia sit humorum permixtio, & pituita, aut serosus humor bili paralyfim producenti misceri potest, quæ illius acrimoniam contemperet. Talis permixtio in febribus tertianis nothi præcipue contingit, quales esse credibile est eas, quas dicit Ferrius in paralyfim migrare.

Denique res manifesta euadit, ex paralyfi scorbutica, quæ convulsionem sæpè habet comitem, ut docet Eulgalenus multis in locis, & Sennertus *lib. de scorbuto cap. 5.* Et licet verus scorbutus nostris regionibus penè ignotus sit, non raro tamen scorbuticas quasdam affectiones nobis videre contingit, in quibus nonnulla huius morbi symptomata elucebant. Vnde duo exempla paralyfis scorbuticæ, cui convulsionem frequenter superueniebant, recensuimus in observationibus nostris, nempe observatione 74. cent. 1. & observatione 98. cent. 2.

Aliæ causæ paralyseos minus frequentes, variæ esse possunt. Ac primum frigida & humida intemperies nuda, & sine materia, tum spiritus congelando, eorum influxum impedire potest; tum nervi temperiem destruendo, eum reddere potest ineptum ad spiritum animale recipiendum, eaque excitari potest ab aëre ambiente frigidiore, & cuiusvis rei frigida contactu, quemadmodum docet Gal. 4. *de locis aff. cap. 4.* quemdam tempore frigido ac pluuioso, cum madidum pallium collo ditiùs obuoluisset, in manus paralyfim in-

cidiffe, neruis qui à ſpinali medulla ad manum feruntur, nimirum refrigeratis & humectatis.

A vi etiam narcotica, medicamentis, venenis, & iſſis interdum humoribus inſita, paralyſim generari poſſe, neoterici nonnulli cenſuerunt; & ab hac cauſa produci paralyſim exiſtimant, quæ ex contractu torpedinis exoritur, quamuis ab hoc animali ſtupor quidam potiùs quàm vera paralyſis excitari ſoleat. Eiùdem generis eſt, quæ à contractu hydrargyri contingit aurifabris, & ſis artificibus, qui ſpecula parare ſolent, quod Veneriis frequenter conſpicitur. Vinum etiam virtute narcotica cenſetur à Platero ſtuporem & paralyſim inducere, licet alij aliter ſentiant. Ferneliuſ tamen huic ſententiæ fauere videtur, aſſerens loco ſuprà citato; ſe vidiffe aliquando vniuerſam corporis cutem ex crapula & vinolentia, ſtupore affectam fuiſſe. Et Petrus Fabius Diuerſus *innotis in Altimarum cap. 14.* refert hiftoriam cuiuſdam tonſoris, qui cùm vino & gulæ nimium indulgiſſet, nocte media expergefactus incidit ſubito in paralyſim omnium corporis partium infra faciem exiſtentium: in qua adeò motus & ſenſus erant deperditi, vt nec acu profundè perforatus, nec gladiolo ſcarificatus quicquam ſentiret. Hic tamen ſoluta in totum ebrietate & crapula, intra tertium diem omninò ſanatus eſt, factis tantummodo nonnullis reuulſionibus, ac inunctionibus quibuſdam reſoluentibus ad ſpinam. Attamen hic author non virtuti narcoticæ, ſed vaporibus craſſis ex crapula oriundis, & neruos obſtruentibus, paralyſis huius generationem adſcribit. Quam cauſam ſuprà propoſitis addere non eſt à ratione alienum. In humoribus etiam corruptis, & malignam qualitatem adeptis vium narcoticam reſidere, in ſoporoforum affectuum expoſitione oſtenſum eſt; qui humores, ſi ad neruos deferantur, actionum eorum labefactare

possunt. Et cum humores scorbutum producentes malignam qualitatem adepti sint, vis illius narcoticæ possunt esse participes, quæ etiam ad paralysem scorbuticam efficiendam concurrere potest, quamvis sola obstructio, vel compressio ad eum affectum producendum sufficiat, ut antea monuimus.

Tumores etiam iuxta spinam aut nervos concreti, eos comprimendo, paralysem sine dubio efficere possunt.

Sic etiam præcisio nervorum, & quæcumque continuitatis solutio eundem effectum parit.

Luxatio vertebræ, aliorumque articulorum spinam & nervos comprimendo idem præstat.

Ac denique condensatio nervorum spirituum influxum impedire potest: eaque fit, vel exsiccatione nimia; vel ab humore crassiori & terrestriori eorum substantiæ imbibito. Sic in elephanticis perit sensus multarum partium, propter earum densitatem nimiam, quæ inducitur ab alimento crasso & terrestri, quo illæ nutriuntur.

Causæ differentiarum huiusmodi se habent. In perfecta paralyse, quæ integram motus & sensus privationem supponit, materiæ morbificæ copia maior est, quæ integram nervi obstructionem, vel astrictionem producit: in imperfecta verò minor, quæ spirituum animalium influxum penitus non impedit, sed aliquam eorum portiunculam commicare sinit.

Motus læditur interdum illæso sensu, quia ad motum efficiendum maior virtus requiritur, quam ad sensum, quia sentire est quoddam pati; motus verò in actioni omnino consistit. Sensus autem læditur illæso motu, quia in aliquibus partibus nervi aut eorum ramuli sensui inservientes, motui non inserviunt, quemadmodum illi, qui ad cutem feruntur. Si igitur illi

nerui tantum afficiantur, ſolus ſenſus læditur. Quod tantum contingit in paralyſi particulari, quæ vnicam particulam occupat; ſi enim afficiantur nerui inſigniores, qui ad muſculos feruntur, non poteſt lædi ſenſus illæſo motu.

Diagnofis huius affectus ad tria dirigenda eſt; affectus ſpeciem, partem affectam, & cauſam affectum producentem. Affectus ſpecies per ſe notiſſima eſt, cum motus impotentia, & ſenſus priuatio, aut inminutio oculis iſtis pateat.

Partis affectæ dignotio difficilior eſt; ea tamen vniuerſa ex anatome deſumitur, in quâ neruorum origine, & inſerctiones docentur.

Si enim pars faciei dextra, vel ſiniſtra reſoluatur, reliquis partibus illæſis, cerebrum tantum afficitur ſecundum eam pattem, à qua nerui ad partes eas deferuntur. Si verò partes capiti ſubiectæ vnà cum facie lædantur, ſpina dorſi & cerebrum afficitur. Et ſi partes ſubiectæ lædantur facie illæſa, in ſola ſpina vitium conſiſtit. Et quidem in principio illius, ſi omnes ſimul, lædantur. Si verò dimidia pars corporis paralytica ſit, dimidia tantum ſpinæ portio obſidetur. Cruribus reſolutis affectio eſt circa finem ſpinalis medullæ, iuxta vertebraſ offis ſacri. Sic in cæteris inquirendus eſt locus à quo nerui exoriantur, qui ad partem paralyticam deferuntur.

Aliquando etiam cauſæ externæ inqueſitio ad loci affecti dignotionem plurimum confert: cuius rei exempladuo apud Galenum iuueniuntur, quorum vnum ſuprà propoſitum *ex 4. de loc. affect. cap. 4.* cuiuſdam hominis, qui cum tempore frigido ac pluuiſo madidum pallium collo diutiùs obuoluiſſet, in manus paralyſim incidit. Alterum habetur *1. de loc. aff. cap. 5. de Pauſanina Syro*, qui in tribus digitis ſenſum amiſerat,

quem cum Galenus è vehiculo in dorsum prolapsum cognosceret, coniecturam fecit, in primo exortu nervi post septimam vertebra[m] prodeuntis, partem quamdam ab ictu fuisse læsam. Ideoque medicamentum digitis frustra admotum, huic parti apposuit, & curatio subsequuta est.

Causarum diagnosi ex causis procataceticis, morbis prægressis, & temperamento ægrotantis eruitur. Atque adeo causæ externæ refrigerantes & humectantes prægressæ, ætas senilis, aut temperamentum pituitosum, tempus hyemale, victus frigidus & humidus, apoplexia præcedens, à frigida intemperie, & humore pituitoso morborum exoriri significant.

Paralysim verò à bilioso humore, aut melancholico exoriri testantur, febres prægressæ, & interdum præsentēs; temperamentum biliosum, aut melancholicum, tempus æstivum, vel autumnale, vsus aromatum, salforum, aliorumque ciborum calidorum, animi pathemata grauia, & diuturna, humorum biliosorum, aut melancholicorum, vel feri acidi, aut acris excretio. Fluxiones acres in varias partes decumbentes, & dolores in iis concitantes; ac denique cum motus & sensus imminutione adest dolor, & convulsio; & huiusmodi laborantes à calefacientibus, & exsiccantibus remediis læduntur, à frigidis & humidis iuuantur. Tumores, luxationes, & solutiones continui paralysim efficientes, per se satis innotescunt.

Quoad prognosim attinet: paralýsis ab humore pituitoso nervorum substantiæ impacto genita, curatu difficilis est, quia ægerrimè discutitur, propter frigiditatem partis, eiusque debilem expultricem, quæ cum remediis cooperari debet; & situm spinæ, nervorumque profundum, ita vt ad eas partes vis remediorum integra peruenire non possit. Et cum diuturnus eorum



uſus neceſſarius ſit, ægri ut plurimum tædio affecti, curationi adeò protractæ ſe ſubiicere nolunt.

Paralyſis apoplexiæ ſuccedanea rariffimè curatur, & plerumque in apoplexiam iterum degenerat, ex nouo eiufdem materiæ ad cerebrum affluxu, quod ex prior morbo debilitatum eſt.

Tremor paralyſi ſuperueniens, ſalutaris. Significat enim meatus neruorum aliquo modo aperiri, per quos aliquid ſpiritus animalis ad muſculorum motum efficiendum tranſire incipit.

Si pars paralytica calore actuali prædita ſit, ſanitatis ſpes eſt; ſi verò actu frigida continuò ſentiatur, difficillimè curatur.

Atrophia, aut inſignis extenuatio parti paralytica adueniens, & pallor ingens, curationis ſpem adimit. Non ſolùm enim ſpiritus animalis defectum, ſed & calorem naturalem propemodùm extinctum arguit.

Si reſoluti lateris oculus imminuatur, exigua curationis ſpes eſt: ſummam enim ſpirituum penuriam in ea corporis parte ſignificat.

Crurum & pedum reſolutio faciliùs curatur, quàm partium ſuperiorum, quia illi nerui duriores, ac robuſtiores ſunt.

In ſenibus paralyſis incurabilis eſt, ob caloris natiui inopiam.

Hyemis tempore paralyſis curari nequit, vere autem & æſtate curatio obtineri poteſt, ſi cætera conſentiant.

Paralyſi febris valida ſuperueniens, bonâ: materiam enim morificam abſumere poteſt.

Paralyſi debili & recenti diarrhœa ſuperueniens, bona: dicit enim Rhafis 1. contin. ſe multos paralyticos ex diarrhœa ſuperueniente curatos vidiffe.

Curatio paralyſis iuxta varietatem cauſarum varianda eſt. Et cùm vt plurimùm fiat à pituita, & frigida intemperie, huius cauſæ ablationi præcipuè incumbendum eſt. Hæc autem ab vniuerſalis totius corporis euacuatione inchoanda eſt.

Et quidem venæ ſectionem quod attinet, vix ea conferre poteſt, cùm ſanguis non peccet, ſed pituita; & plerumque hoc malum ſenibus, pituitosis, ac natura frigidis accidere ſoleat. Si tamen crudi ſanguinis copia humorem pituitosum producere videatur, eumque fouere, venam in brachio partis ſanæ aperire licet, attamen parca manu, ne languidus calor extingatur.

Prætermiſſa igitur phlebotomiâ, aut parca manu, vt dictum eſt, celebratâ, reliqua curatio inchoanda eſt à ſublatione cauſæ antecedentis, quæ eſt frigida cerebri intemperies; cuius curatio eadem omninò inſtituenda eſt, quæ antea fuit propoſita, per apozema, pilulas, diætam ſudorificam, ſacculos, emplaſtra, errhina, ſternutatoria, apophlegmatifmos, veſicatoria, puluerem cephalicum, cucuſam, ſuffumigium, ſyrupum magiſtralem, pilulas vſuales, opiatam roborantem, cauſticum, puluerem digeſtiuum, & aquas thermales.

Diætâ ad hunc affectum parari debet ex decocto guaiaci ſolius & corticis eiufdem. Poſt cuius hauſtum admouendi partibus paralyticis lateres igniti, extincti in decocto cephalico, factò in vino albo cum pauco aceto, & inuoluti linteo, vt partium calor languidus excitetur. Et quarto, aut quinto quòque die purgatio repetenda. Melius tamen erit, ſi decocto ſudorifico purgans præmittatur ad xv. dies, vt tota humorum crudorum ſaburra melius educatur, ac poſtmodum illorum reliquæ per habitum corporis diſcutiantur. Illud autem ita parari poterit.

℞. Raſuræ lignis guaiaci ℥. iij. cort. eiufdem ℥. j.

aquæ fontis lb. iiij. Infundantur per xxiiij. horas. Deinde bulliant ad mediæ partis confumpt. addendo sub finem, fennæ mund. ʒ. j. turbith, hermodact. ana ʒ. ij. Colaturæ capiat lb. ʒ. manè, sine sudore per xv. dies.

Causticum applicetur occipiti, vel brachio sano, si alterum sit affectum; vtrique, si tibiz tantum laborent.

Post diætâ vtratur pro potu ordinario bochetto ex guaiaco, vel hydromelite, in quo tantillum rorismar. bullierit, à vino abstinendo, quod in hoc affectu valde nocuum est. Si tamen ægrum vini cupiditas teneat, betonica & saluia in eo infundantur. Et longè efficacius erit, si tempore vindemiarum prædictæ herbæ in dolium vino recenti plenum coniiciantur.

Si affectus sit contumax, post diætæ vsum, omissis syrupo magistrali, & pilulis vsualibus prædictis fortiores vsurpandæ sunt, in hunc modum compositæ.

℞. Missæ pilul. fœtidar. maior. & cochiar. rin. ana ʒ. ʒ. trochisc. alhandal. gran. iiij. Capiat semel in septimana.

Sed quia humor ante quamlibet purgationem præparatione indiget, idè per biduum, aut triduum, ante singulas doses pilul. capiat ʒ. ij. vel iiij. aquæ sequentis, manè duabus horis ante pastum.

℞. Rasur. ligni guaiaci ʒ. iiij. corticis eiusdem ʒ. j. radic. salsæ paril. ʒ. j. ʒ. rad. chinæ ʒ. j. ligni sassafras ʒ. vj. ligni aloës, galang. ana ʒ. j. ʒ. rad. angel. pœoniæ, fœniculi, ana ʒ. ij. sem. pœoniæ ʒ. ij. Infundantur per 24. horas in aquæ fontis lb. vj. vini albi lb. iiij. Postea addæ fol. betonicæ, iuz arthet. saluiæ, ana M. j. flor. tiliz, primulæ veris, stœchados & anthos, ana P. ij. lauendulæ P. j. theriacæ ver. ʒ. ʒ. sem. & cortic. citri, ana ʒ. ij. ʒ. polypod. ʒ. ʒ. cinnamomi ʒ. vj. Fiat secundum

dum artem destillatio in B. M. Pro lb ij. ß. linguis de-  
stillati, adde manus Christi cum oleo cinnam. parata  
z. iv. Vel loco illius aquæ opiata caput roborans, in  
frigida cerebri intemperie descripta, usurpari poterit.  
Sed multò efficacius, & cum maiori fructu, opiata Mon-  
tagnanæ, in epilepsiæ curatione descripta.

Cæteris purgantibus parùm proficientibus, haud erit  
inutile ad vomitoria chymica transcendere, si æger sa-  
tis robustus sit, qualia in soporosis affectibus fuere pro-  
posita. Illa enim humores contumaces ex alto trahunt,  
& morborum interdum, qui vulgaribus remediis extir-  
pari nequiverunt, curationem absoluunt.

Diebus vacuis ab usu aliorum remediorum, utatur  
opiatâ cephalicâ, descriptâ in curatione frigida intem-  
periei cerebri, vel aquâ apoplecticâ, vel tabellis pro so-  
porosis affectibus propositis.

Post uniuersales euacuationes ad topica veniendum  
est, quæ & parti resolutæ applicanda, ad calorem &  
spiritus reuocandos, & spinali medullæ, ubi vtpurimum  
mali causa hæret, ad eam exsiccandam & discutien-  
dam.

Pars ergo affecta pannis calentibus quotidie fricetur,  
sed leniter: ne quod de naturali calore, & spiritibus  
attractum est, iterum dissipetur.

Cucurbitulæ etiam applicentur capitibus musculo-  
rum partis affectæ, cæque sint angustioris orificij, &  
cum multa flamma adhibeantur; ne tamen diu affixæ  
maneant, ne quoad attractum est dissipetur. Postea em-  
plastr. ex picæ & resina pini applicetur, ut quoad attra-  
ctum est, ibi conseruetur. Vel membrum resolutum vr-  
ticis viridibus leniter percutiatur, aut ipsi sinapismi im-  
ponantur, donec pars rubescere incipiat: ea tamen non  
sunt tam diu in parte relinquenda, ut vesicæ excitent,  
sic enim spiritus & sanguis dissiparentur; sed tam diu

solum, donec pars rubicunda digito pressa non albescat, sed rubicunda permaneat.

Postea inunctiones fiant & parti affectæ & spinali medullæ, oleis, vnguentis & balsamis, quorum descriptiones apud autores numerosæ habentur. Ad hanc rem peculiaris est efficaciæ, balsamum Guidonis, quod apud Pharmacopœos nostros perpetuò paratum invenitur. Hoc vel solo utimur, vel cum aliis permixto in nunc modum.

℞. Ol. vulpini, lumbricorum & de castoreo, ana ℥. j. balsami Guidonis ℥. ij. aquæ vitæ ℥. β. olei rosmar. destill. ℥. j. β. Misce fiat linimentum, quo inungatur tota spina dorsi, & partes resolutæ calidissimè, superregendo linteis calidiusculis. Sequens etiam vnguentum à Valeriola in observationibus plurimum laudatur.

℞. Fol. salviæ, maioranæ, betonicæ, lauri, rosmar. & primulæ veris, an. M. j. radic. acori veri, & ireos recentis, an. ℥. iij. olei vulpini, de nuce Indica, & rutacei, an. lb. j. olei terebinthinæ lb. β. vini potentissimi lb. j. aquæ vitæ lb. β. Coquantur simul ad vini consumptionem, & colentur. Colaturæ adde serapini, opopanax, bdellij, an. ℥. ij. castorei ℥. β. macis, nucis mosch. styracis calamitæ, benjoini, an. ℥. iij. piperis longi, pyrethri, an. ℥. j. axungie cati pinguioris, axungie serpentis, & anseris, an. ℥. j. medullæ cruris bouis ℥. ij. succorum ebuli, salviæ, & melissæ, an. ℥. iij. ceræ propoleos ℥. ij. Misce, & cum ceræ C. q. in prædictis oleis liquatæ, reducantur omnia ad formam vnguenti mediocris consistentiæ, quo uniuersa dorsi spina calidè inungatur, desuper admotis laniis mollioribus, vel linteis calidis.

Maioris etiam efficaciæ, & minoris operæ vnguentum parari potest in hunc modum.

℞. Succī scillæ ℥. iij. succī cucumeris syluestris, succī rutæ, an. ℥. j. euphorbij, castorei, sagapeni, ammoniaci, bdellij in aceto solutorum, an. ℥. j. β. myrrhæ, thuris, pyrethri, nitri, an. ℥. j. olei sambuci, terebinthinæ, & de euphorbio, an. ℥. β. cera q. l. Fiat vnguentum secundum artem.

Huiusmodi linimentis præcipuè vtendum est tempore diæte, post detersum Iudorem, & in vsu thermarum etiam post sudorem; quia tunc temporis pori cutis & partium reſerati, vnguenti penetrationem faciliùs admittunt.

Lintea post inunctiones applicanda suffumigentur, & incalescant suffitu ſequenti.

℞. Succini, mastiches, myrrhæ, ana ℥. j. thuris ꝯ. ij. coryophyl. nucis moschat. cinnam. macis, ana ℥. β. ligni aloës ꝯ. β. Puluerisfata irrorentur spiritu vini, postea exſiccantur, & iterum irrorentur quinquies, & exſiccantur. Et fiat puluis, qui iniiciatur prunis pro suffumigio.

Si his malum non cedit, cerata & emplastra supra spinam dorsi erunt applicanda.

℞. Massæ empl. de beton. melilot. & de baccis lauri, ana ℥. j. thuris ℥. β. castorei, euphorbij, ana ℥. j. sem. nigell. nasturtij, sinapi radic. pyrethri, salis nitri, ana ℥. β. Cum oleo de latiribus redigantur in formam emplastri, quod super alutam extensum applicetur. Longè maioris erit efficacix emplastrum in hunc modum compositum.

℞. Picis naualis, galbani, sagapeni, & gummi ammoniaci, an. ℥. j. rad. pyrethri, & sem. sinapi, an. ℥. β. euphorbij ꝯ. ij. ceræ flauæ ℥. iij. olei terebinth. q. l. Fiat massa emplastri.

Sudores quoque in parte prouocare vtile fuerit, per euaporationes ex decocto herbarum & radicum ce-

phalicarum cum vino albo, ita parato, ut halitus partem affectam attingant. Si nimirum decoctum calens in vas aliquod infundatur, in quo æger ieiunus ita sedeat contectus, ne decoctum attingat, sed vaporem tantum excipiat. Vel in balneo sicco, quod stupham vulgò appellant; vapor ex decocto prædicto, silicibus candentibus insperso excipiatur.

Ad sudores huiusmodi mouendos valdè commendatur decoctum rad. bardanæ, seu lappæ maioris. At nostrates mulieres ad hos affectus, & dolorem artuum diuturnos, vtuntur decocto ebuli, quo sudores copiosi eliciuntur. Vbi æger satis sudarit, in lecto componatur, exhibitâ theriacâ ʒ. j. cum aqua conueniente. Eiusmodi autem balneis bis, aut ter in septimana vtendum est. Autumni quoque tempore, vinaceis efferuescentibus membra per horam vnam, aut longius spatium, immergere, & postea linimento conuenienti inungere, toto vindemiarum tempore, summè vtile fuerit.

Denique thermæ sulphuræ nitrosæ, & bituminosæ supra recensitæ maximè conueniunt, & reliquorum remediorum vires plerumque superare solem, si iis æger vtatur per aliquot dies in potu, balneo, & lotionem capitis, & post sudores vngatur linimentis prædictis.

Chymici commendant multa remedia ad huius morbi curationem. Ex quibus non infimum locum obtinent elixir proprietatis, spiritus tartari & balsamum galbani.

Toto morbi decursu partes resolutæ probè muniuntur pellibus vulpinis, leporinis, agninis & similibus.

Paralysis verò, quæ à bilioso humore, aut melancholico producitur, eandem curationem postulat, quæ ad melancholiam hypochondriacam præscripta est.

tamen, vt in affectu magis bilioso, remedia magis ad frigiditatem inclinantia eligantur.

## C A P V T VI.

### *De Conuulsione.*

**S**pasmus, seu conuulsio est neruorum, musculorum-  
que versùs suam originem inuoluntaria & perpetua retraction.

Duplex autem est conuulsio. Vna propriè dicta, cui iam proposita definitio competit. Altera impropria, quæ potius motus conuulsiuus dici debet. Et ita distinguuntur, quod in vera conuulsione retraction musculorum est perpetua, seu continua & indefinens; in motu verò conuulsiuo retraction est interpolata. Præterea in vera conuulsione membrum est immobile; in motu conuulsiuo variè agitur, vt in epilepsia, quæ inter motus conuulsiuos principem locum obtinet.

Differunt etiam inter se ratione causarum; vera enim conuulsio fit à repletionem, vel inanitionem: motus verò conuulsiuus ab irritationem. Denique in eo distinguuntur, quod conuulsio à solo morbo fit; motus verò conuulsiuus à sola facultate. Quæ vt rectè à iunioribus intelligantur, sciendum est ex Gal. 2. *de sympt. caus. cap. I.* de prauati motus symptomata ita inter se distinguui, quod alia solius naturæ sint opera, quæ tamen à morbosa quapiam causa violenter moueri sit coacta; alia morbosos comitentur affectus, natura ad eorum generationem suppetias minimè ferente; alia denique concurrente simul naturâ, & morbo fiant. Naturæ autem nomine Galenus facultatem intelligit. Facultatis



ergo opera sunt sternutatio, tussis, oscitatio, pandiculatio, & singultus. Vnius autem morbi opera sunt palpitatio, & conuulsio. Vtriusque verò, morbi scilicet, & facultatis opera sunt tremor & imperfecta resolutio.

Ex Galeni dictis suprà propositis grauis difficultas emergit, cum ille singultum recenset inter opera quæ à facultatè fiunt; sit enim perpetuò ab irritatione, & est motus conuulsiuus: conuulsionem verò inter opera quæ à solo morbo fiunt, Gal. recenset. Attamen Hipp. *Aphor. 39. sect. 6.* conuulsionem & singultum à repletionem & inanitionem fieri affirmat, cum tamen repletio & inanitio veram tantum conuulsionem efficiant. Ad cuius difficultatis resolutionem dicendum est, repletionis nomen latè sumptum irrationem etiam comprehendere, iuxta multorum autorum sententiam; quia causæ irritantes materiales sunt, atque adèò replent aliquo modo partes in quibus continentur. Sed hoc modo repletio non est causa proxima singultus, sed tantum mediat, quatenus partem in qua est, quantitate, vel qualitate sua irritat ad expulsionem.

Denique sciendum est, & diligenter annotandum, Hippocratem & Galenum motum conuulsiuum communi & generico conuulsionis nomine: simpliciter enuntiare; ita ut non nisi per suprà propositas differentias inuicem distinguere possint.

Vera autem conuulsio rursùm diuiditur in vniuersalem, quæ totum ferè corpus contrahitur; & particularem, quæ certum aliquod membrum conuellitur.

Vniuersalis, vel causam habet in cerebro, quando nimirum cum vniuerso corpore, musculi etiam faciei conuelluntur: vel in exortu spinalis medullæ, cum musculi caput & spinam mouentes, vel anteriores, vel posteriores, vel vtrique conuelluntur; vnde tres exur-

gunt conuulsionis differentia. Prima Emprosthotos dicitur, quando corpus cum ceruice, & capite violenter ad anteriora contrahitur, vt mentum pectori annexatur, & corpus carinam naus referre videatur; imò verò interdum in arcum contorqueatur, & quandoque in orbem, ægrique caput genibus annexum habeant. In hac differentia duo muscoli caput ad anteriora flectentes præcipuè afficiuntur. Secunda Opisthotos nominatur, quando corpus ad posteriora conuellitur, & in ea muscoli duodecim caput extendentes, aut eorum nonnulli conuellantur. Tertia Tetanos dicitur, quando muscoli & nerui, tam anteriores, quàm posteriores contrahuntur æqualiter, partésque ab oppositis musculis attractæ, velut in æquilibrio positæ, rigidæ & erectæ permanent; & ille motus Tonicus appellatur, qui omnium violentissimus est, cum ex omnium musculorum contentione oriatur.

Particularis conuulsio fit ex contractione musculi partis alicuius à neruo illius motioni destinato malè affecto, & interdum ab effectu, vel symptomate peculiare nomen sortitur. Sic conuulsio musculorum oculos mouentium, strabismus nominatur: mandibularum & musculorum temporum *τεισμός* dicitur: oris conuulsio ex contractione lati musculi ex vna tantum parte oriunda, *spasmus cynicus*, conuulsio canina, & oris tortura nominatur; si verò in vtraque parte contractio fiat, risus sardonius appellatur. Interim tamen oris tortura sine conuulsione contingit, nempe ex palsy alterius musculi, quo relaxato, eius antagonista os ad partem sanam contrahit, & distortio in ea apparet, quæ conuulsio improprie nominatur. Musculorum penis conuulsio satyriasis, vel priapismus dicitur. Reliquæ verò conuulsiones propriis nominibus destituuntur.

Causæ

Causæ veræ conuulsionis immediatæ, iuxta Hippocratis, & Gal. placita, ad repletionem, & inanitionem referuntur, vt antea dictum est. Et confirmatur hæc doctrina exemplo chordarum, quæ in liris & citharis tendi consueuerunt, quod sæpè, & elegantissimè inculcatur à Galeno, nempe *lib. de tremore, palpit. & conuuls. cap. 8. tertio de locis affectis cap. 6. secundo de sympt. tom. caus. cap. 2. & comment. Aphor. 39. sect. 6.* Dum enim chordæ ab humore replentur, quod in austrinis constitutionibus solet contingere, tenduntur & disrumpuntur. Si verò præter modum arefcant, vt in constitutione Aquilonia fit, contrahi, & disrumpi etiam contingit. Eodem modo lora propè ignem liccescentia tenduntur & contrahuntur. Idem neruis omninò solet contingere, vel ab humore repleti, vel nimium arefacti, tenduntur & contrahuntur, & musculos simul ad quos inseruntur, retrahunt ad suum principium, vnde totum membrum conuellitur.

Causæ mediatae conuulsionis, quæ repletionem, aut inanitionem efficere possunt, variæ sunt. Ac primùm causæ repletionis referuntur à Galeno *lib. de tremore cap. ult.* ad humoris pituitosi affluxum, & inflammationem. Humor pituitosus ad neruos influens, eos distendere censetur secundum latitudinem, vnde secundum longitudinem contrahi necesse est.

Verùm hîc grauissima sese offert difficultas, quæ à quamplurimis auctoribus proposita est, nondum tamen plenè & perfectè resoluta, quamam scilicet differentia sit constituenda inter causam paralyfis, & conuulsionis, quando vtraque fit ab humore pituitoso, in neruos influente; cur materia paralyfim efficiens, neruos ita replendo, vt omnes illius meatus occludantur, vnde spirituum animalium transitus impeditur, non faciat nerui distensionem in latitudinem, atque adeò conuul-

fionem ; Et cur materia conuulsionem efficiens,neruos replendo , meatus illorum non obstruat , vt paralyfim efficiat , cùm tamen in conuulsione sensus integer maneat , & pars affecta vt plurimum grauissimo dolore torquëatur ? In hoc dubio resoluendo auctores variè se torquent , & qui inter subtilissimos principem locum obtinent,ingenij sui captum superare fatentur. Acutissimus Auerroës tertio colliget in hæc verba erumpit. *Vtinam scirem cur distendantur in latum nerui , & non in longum.* Mox subiicit. *Scias Medicorum verba in hoc symptomate vniuersè propiora esse verbis muscorum , seu fabellas canentium , quàm demonstratorum* Et subtilissimus Argenterius comment. Aph.26. sect.2. sic loquitur. *Non est facile profecto reddere omnium rationem ; & præsertim cur pituita, quæ resolutionis nervorum, & conuulsionis causa dicitur, nunc vnum , nunc aliud ex iis malis inferat : cùm enim eadem materia sit, & eadem pars affecta , nempe neruus , cur idem non semper sit effectus ?* Hæc Argenterius, Summa rei difficultas in varias sententias auctores distraxit , ita vt nonnulli ab Hipp. & Gal. doctrina omnino desciuerint , inter quos recenseri possunt , Auerroës , Erasius , Platerus, Cæsalpinus, Sennertus aliique, quorum varias cogitationes, & prolixas hac de re disputationes recensere , instituti nostri ratio non patitur, qui summam breuitatem in hoc opere affectamus , & omnes controuersias ablegamus , iis tantum inhærentes , quæ ad medicinam faciendam maximè necessaria sunt. Saniorum decisio à Galeni placitis recedere nolentium eò reuoluitur , conuulsionem fieri ab humore crassiori , qui nervos secundum latitudinem extendit , & secundum longitudinem coarctat ; paralyfim verò fieri ab humore tenui, qui per nerui substantiam decurrit , eamque emollit , poros autem illius non extendit. Hæc tamen animum veritatis

audum omnino non explent. Si enim humor crassus neruum replendo, cum latitudinem extendit, cur poros illius, & meatus insensiles non implet, & spirituum animalium influxum non impedit, atque adeo paralyfim inducit; Et cur paralyfi saltem successu temporis non succedit conuulsio, cum humor tenuis in parte diu hærens, necessario crassescat; ita ut etiam serosa materia arthritidem efficiens, longam moram in parte, tophaceam materiam acquirat. Alij dicunt in conuulsione partem tantum nerui exteriorem & membranofam ab humore obsideri, in paralyfi vero medullarem. Sed hoc multò minùs satisfaciât. Cum enim nerui maiori parte exiles admodum sint, non est facile concipere, quomodo humor partem tantum nerui exteriorem occupet, illa interiori, aut vice versa. Vel saltem si hoc ita posset contingere, paralyfi ut plurimum conuulsio succederet, & conuulsioni paralyfis, multiplicata materia morbifica, & quæ exteriorem partem solum, vel interiorem tantum ab initio occupabat, successu temporis totum neruum inuaderet.

Nos igitur licet in tanta difficultate nobis ipsis satisfacere nequeamus, donec certiora ab aliis proponantur, existimamus prædicta obiectiones dilui posse, dicendo, conuulsionem, & paralyfim in eo differre, quod paralyfis ab humore pituitoso puro, & impermixto generetur, qui quidem humor tensionem non efficit in partibus, sed eas potius relaxat, ut in œdemate videre est; conuulsio vero ab eodem humore fiat, non quidem sincero, sed plurimis flatibus permixto, à quibus flatibus præsertim tenduntur nerui ac masculi, & versùs suam originem contrahuntur. Nulla enim causa excogitari potest aptior ad tam vehementem contractionem efficiendam, quam spiritus flatuosus, quam etiam agnouit

Galenus 2. *de sympt. caus. cap. 2.* & docet experientia maximas distensiones à flatibus præsertim fieri, vt videre est in hydrope tympanitè, & colico dolore. Adde quod in conuulsione vt plurimum grauissimi dolores reperiuntur, quos à flatibus distendentibus fieri credibile est. Hac decisione dilui possunt omnes obiectiones suprâ propositæ. Si enim quærat, cur pituita conuulsione efficiens paralysem non afferat, spiritus animalis influxum impediendo, dicere poterimus eam esse in perexigua quantitate, vt meatus nerui insensiles occludere non possit, & multis flatibus permixtam ita attenuari, vt obstructionem parere non valeat. Vel certè dicamus spiritum flatuosum præcipuam esse causam conuulsionis, quam Galenus agnouit *loco citato*. Et lib. 6. *de loc. affect. cap. ult.* priapismi (qui à membri virilis conuulsione fit,) causam vnicam proposuit, spiritum flatuosum.

Altera causa conuulsionis à repletionem factæ, quam proponit Gal. *loco citato*, est inflammatio partium neruolarum, præcipue in neruorum principio, aut prope ipsum, qua nerui tenduntur, & contrahuntur. Et excitatur illa inflammatio, vel à causa interna sola, nempe à fluxu sanguinis in partem; vel à causis externis, vt vulnere, contusione, & punctura nerui.

Causæ conuulsionis ab inanitione sunt omnes immodicæ euacuationes per hæmorrhagiam, vomitum, alui fluxum, sudores; tum etiam maximæ humidi primigenij consumptiones, quæ contingunt in febribus ardentibus & colliquantibus, laboribus immodicis, vigiliis, sollicitudinibus, venere immodica, fame & siti, & vsu diuturno alimentorum, & medicamentorum calefacientium & exsiccantium.

Hæc etiam conuulsio ab inanitione à non paucis

relicitur, existimantibus tantam siccitatem in corpore viuentē reperiri non posse, vt inde nerui contrahi valeant; illa enim in febre hectica & marasmo præcipue contingeret: quibus tamen abunde satisfieri potest, dicendo non omnem inanitionem, aut siccitatem idoneam esse conuulsionem efficere, sed eam tantum, quæ confertim & inæqualiter fit, quandoquidem subito interni humidi facta inanitione, partes conuiuent, & in se concidunt, vacuum fugientes. Si verò æqualiter vndique, & sensim exhauriatur humiditas, nulla fit contractio, quia inanitæ partes ingressu aëris occupantur.

Motus conuulsius fit à materia pungente, vellicante, & irritante partes neruosas; estque vt plurimum humor, vel vapor, acrimonia, aut alia qualis maligna qualitate præditus; qualis in febribus malignis sæpissimè contingit. Fiunt autem isti motus conuulsioni plerumque cerebro & neruis per sympathiam affectis, & conuulsio sympathica nominatur. Compatiuntur autem vel per nudam condolentiam, & generis, officij, aut vicinæ societatem; aut à praua qualitate, vel aura venenata ad initium neruorum transmissa. Sæpissimè autem fit per consensum oris ventriculi à bile æruginosa, vermibus, veneno, aut alia materia acri, & vellicante: tum etiam per consensum vteri, sicut in hysterice affectibus contingit.

Diagnosis conuulsionis ex iis quæ in principio huius capitis proposita sunt, facile elicitur. In verà enim conuulsione pars contrahitur, ac rigida & immota manet, vt flecti, aut moueri pro arbitrio non valeat. In motu vero conuulsivo pars variè concutitur & agitur.

Quod ad prognosim attinet, conuulsio quæ multas

partes, & præsertim cerebro vicinas occupat, periculorior est. Tum etiam quæ musculos thoracis obsidet; metus enim est, ne ob difficilem respirationem æger suffocetur.

A copioso sanguinis fluxu, vel hypercatharsi conuulsio lethalis, ex Hippocr. in Aphorismis, quia, vt docet Galenus in commentariis, talis conuulsio ab inanitione fit. Attramen fieri potest, vt talis conuulsio interdum ab irritatione fiat, commotis humoribus acris biliosisque, & ad partes nervosas translatis, vel à qualitate maligna venenati medicamenti, vt ex assumptione hellebori contingit.

A phrenitide conuulsio lethalis. Aërius affirmat se neminem ex iis, qui ita conuulsi sunt, seruatum vidisse, neque qui vidisset, audiuisse.

Febrem conuulsioni superuenire, melius est, quàm febri conuulsionem, *Aph. 37. sect. 2.* febris enim conuulsioni superueniens, illius causam absumit. Conuulsio autem febri superueniens à materia maligna oritur, quæ vitæ periculum minatur.

Quicumque tetano corripuntur, in quatuor diebus pereunt, si verò hos effugerint, sani fiunt, *Aph. 6. sect. 5.* Maxima enim tensio omnium musculorum, respirationem impedit, ita vt ægri suffocati moriantur. Et notanda est causa interitus in conuulsione, quæ non videtur alioqui periculosa ratione causæ nervos obsidentis, quemadmodum paralysis à simili ferè causa oriunda, ad multos annos producit. Sed lethalis euadit conuulsio, ex eo solùm quod suffocationem inducit, conuulsis musculis respirationi dicatis.

Curatio huius affectus varia est pro varietate causarum. Quæ ab inanitione fit, rarissimè contingit, & incurabilis est, ideò illius therapie non immorandum. Authores humectantia omnis generis præscribunt



& inunctiones ex oleis chalasticis. Ea verò quæ fit ab irritatione, ab aliis morbis dependet, & illorum curationi subiicitur. Superest igitur vt conuulsionis à repletionem curationem proponamus, quæ cum à pituita & flatu potissimum dependeat, ad illorum sublationem dirigenda est. Eaque primum à venæ sectione auspicianda, si sanguis abundet, & vires sint validæ. In qua tamen euacuatione satius est peccare in defectu, quàm in excessu; cum illa causæ principali, quæ pituita est, contraria sit.

Post venæ sectionem, aut ea omiſſa, si conueniens non sit, purgatio instituenda est per pilulas, quæ satis potenter euacuent (habita tamen virium ratione,) iuxta formulam in frigida cerebri intemperie descriptas. His verò adiungenda sunt castorei. gr. iij.

Si pilulas fastidiat æger, potionis, pulueris aut alterius medicamenti forma vsurpari poterit, prout dicto capite habentur.

Post purgationem admoucantur cucurbitulæ cum sacificatione, si sanguis non fuerit detractus; aliqui siccæ: primò quidem partibus remotioribus, postea affectæ parti vicinis. At si crura sint conuulsa, natibus & lumbis applicentur: si brachia, collo & scapulis. Hoc in omnibus obseruando, vt fluxio versùs originem retrahatur.

Vesicatoriùm etiam partibus affectæ oppositis vtiliter admouebitur.

Interim post primam purgationem, materia præparanda est apozemate descripto in curatione intemperiei frigidæ. Purgante quidem, si vires & reliqua conseruiant: sin minus, detractis purgantibus.

Finito apozemate iterùm pilulæ exhibendæ, castoreum illis, & omnibus purgantibus adiiciendo.

Si apozema tantum alterans vsurpetur, per illius

vsus clysteres acres frequenter iniiciendi, quales in soporosis affectibus fuerunt propositi.

Fiant etiam inunctione supra partem affectam linimento conuenienti.

℞. Vnguenti de althæa ℥.vj. ol. terebinth. & chamæmelana ℥.j. ol. lauendulæ ℥.iij. ol. vulpini ℥.ß. styracis liquidæ ℥.ij. Fiat linimentum, quo inungatur pars affecta calidè frequenter, & spina dorsi. Vel

℞. Ol. anetini & chamæm. ana ℥.j. vnguenti martiati ℥.ß. ol. petrolei & de spica, ana ℥.j. spiritus vini ℥.iij. Misce.

Maximè laudatur axungia anatis, in sequentem modum parata.

℞. Anserem pingnem deplumatum, & exenteratum, quem reple materia sequenti.

℞. Fol. saluiæ, maioranæ, & stœchados, ana M.j. gummi ammoniaci & bdellij, ana ℥.j. calami aromât. nucis moschat. macis, caryophyll. ana ℥.ß. Contundantur in mortario, & malaxentur cum ol. lumbricorum, postea includantur ventri anseris, qui benè consuatur, ne quid effluat, & in veru assetur. Pinguedo extrillans excipiat in vase aceto semipleno, eaque illinantur partes affectæ.

Efficaciùs operabitur, si vsurpetur in sequentem modum.

℞. Pinguedinis prædictæ ℥.vj. oleor. ceræ, nucis moschat. & saluiæ arte chymica extractorum, ana ℥.ij. Misce fiat linimentum.

Post inunctionem partes conuulsæ contegantur pelle arietis adhuc calente: & cùm refrixerit, si nouarum non sit copia, recalescat oleo anethino, aut simili valdè calente.

Vtiliter etiam parti conuulsæ adhibentur pulmones veruecini calentes, tum etiam pulli columbini, catuli,

galli, gallinæ per medium scētæ.

Pars etiam affecta in intima bouis, aut veruēcis, aut maioris alius animalis recens cæforum immittitur. Et ibi tamdiū detinetur, quamdiū animal calet.

Balnea ex decocto herbarum cephalicarum etiam conueniunt, addita olei tertia parte, vel iunctis mox à balneo partibus conuulsis.

Alij hoc emplastrum commendant.

℞. Colophonix ʒ. ij. resinæ, picis naualis, ana ʒ. j. thuris, mastiches, cerussæ, ana ʒ. ʒ. sanguinis draconis, salis communis, salis ammoniaci, terebinth. ana ʒ. ij. ceræ nouæ ʒ. ij. vitrioli albi ʒ. ij. matris perlarum ʒ. ij. lapidis magnetis ʒ. ʒ. succini flauī ʒ. j. ʒ. ol. ouor. rosac. ana ʒ. ij. Fiat secundum artem emplastrum, quod alutæ inductum imponatur.

Præstantissima verò sunt balnea sulphurea, in diurnis præcipuè conuulsionibus. Conueniunt etiam balnea sicca seu vaporosa ex decocto saluix, roris-mar. stœchados, chamæp. origani & similium cum vino albo, lapidibus ignitis, aut scoris ferri ignitis infuso.

Optimum etiam est fouere occiput & ceruicem aqua vitæ calente.

Penotus sequens linimentum mirè prædicat, ad conuulsionem breui tempore dissoluendam.

℞. Ol. terebinth. ʒ. ʒ. ol. caryophyll. gutt. vj. mucaginis bryoniæ q. s. ad consistentiam linimenti. Misce, inunge locum affectum cum radice sui nerui.

Alij oleum seu spiritum salis cum oleo terebinthinæ, ceræ, chamæmeli & similium commixtum, membra conuulsa citò restituere asserunt.

Linimentum sequens eximia est efficacix.

℞. Butyri rancidi, & laridi veteris, an quart. j. bdellij, ammoniaci, an. ʒ. j. myrrhæ, castorei, an. ʒ. ij.

flor. stœchad. & anthos, an. P. j. nucis moschat. & garyophyll. an. ʒ. j. catum paruum exenteratum excoriatum, & in frustra diuisum. His inferciatur anser, & consuatur, ac torreatur in veru. Primus qui stillabit succus magis aqueus abiiciatur; secundus verò pinguior, colligatur in vase aceto semipleno, eoque illinantur partes conuulsæ, & tota dorsi spina.

Interdum verò dolor ita intolerabilis sentitur, vt ad eum prius cura dirigenda sit. Illi igitur conuenit sequens linimentum.

℞. Olei violacei, lilior. & chamæmeli, ana ʒ. j. β. olei amygdalarum dulcium, mastiches, & rosac. ana ʒ. j. Misce, inungatur pars affecta. Si potentiùs agendum sit, paretur sequens balneum.

℞. Rad. althææ, & liliorum, ana lb. β. fol. maluæ, violariæ, origani, saluiæ, absinthij, ana M. ij. sem. lini & fœnugr. ana lb. j. Decoquantur pro balneo, in quo diu non immoretur æger, sed dolore sedato confestim egrediatur; sufficiet autem partes conuulsas tantum immergere.

Alij parant balneum ex oleo puro, & si æger sit diues, in eo decoquant vulpem vnâ, aut alteram.

Dum hæc fiunt, cerebri expurgationi incumbendum est, apophlegmatismis & errhinis; suis capitibus descriptis.

Tum etiam eadem pars roboranda est opiatâ cephalicâ, aquâ apoplectica, theriacali, aut alia erumdem virium.

Rondeletius de qua sua hirundinum hæc habet. *Aqua ex hirundinibus & castoreo parata, exhibita conuulsionem à repletionem subito cessare facit.* Eius discretio est in cap. de epilepsia apud Authorem dictum.

## CAP. VII.

## De Epilepsia.

**E**pilepsia est conuulsio totius corporis non perpetua, sed interpolata, cum mentis & sensuum læsione.

Conuulsionis nomen hîc propriè, & strictè non sumitur pro vera conuulsione, sed impropriè pro motu conuulsiuo. Est enim epilepsia motus conuulsiuus, non vera conuulsio. Sed conuulsionis nomen retinere volumus, imitatione Galeni, qui eam passim conuulsionem appellat.

Hac autem definitione ex Gal. desumpta 3. *de loc. aff. cap. 7. & lib. de diff. sympt. cap. 3.* perfectam & integram Epilepsiam proponimus, in qua totum corpus conuellitur, & omnes sensus tum interni, tum externi abolentur. Dantur tamen imperfectæ Epilepsiæ, in quibus caput tantum, vel brachium, vel tibia, & femur, vel dimidia corporis pars conuellitur. Datur etiam Epilepsia, in qua mens integra remanet, & sensus etiam exteriores vigent, nec non quarumdam partium motus voluntarius. Vidi Monialem, quæ in paroxysmis Epilepticis contractiones varias patiebatur, nunc brachiorum, nunc crurum, nunc capitis, nunc trunci totius corporis; videbat tamen astantes & loquebatur; imò verò contra motum partium quæ conuolebantur, motu voluntario obtinebatur, ita vt motum inuoluntarium quodammodò minueret; in paroxysmo leuiori interdum stabat, & in cubiculo ambulabat, sed motu admodum inordinato, saltando scilicet, & motus præposteros edendo instar histrionum: quibus, reliquis Monialibus risum concitabat; & ipsa cum illis etiam

ridesbat, & pro arbitrio loquebatur.

Omnis motus convulsivus, ut superiori capite dictum est, fit ab irritatione. Irritatio autem fit à materiæ quantitate, vel qualitate: quantitas materiæ morbificæ naturam grauens, eam irritat ad expulsionem eius quod sibi molestum est. Vnde stabilitur Galeni doctrina, à quamplurimis neotericis variè exagitata, qua sancitum est, ab obstructione imperfecta ventriculorum cerebri Epilepsiam generari. Si enim humor obstruens naturæ molestus est, quidni cerebrum insurgere poterit ad illius exclusionem? De qualitate nulla est difficultas. Omnes enim in eo consentiunt, facultatem expultricem singularum partium irritari ab acrimonia & prava quavis qualitate naturæ infensa.

Causæ irritantes vel in ipso cerebro continentur, & Epilepsiam idiopathicam efficiunt, vel aliunde ad cerebrum transmittuntur, & sympathicam Epilepsiam generant.

Illam autem irritatio Epilepsiam facit, quandoquidem cerebrum, dum rem noxiam expellere conatur, seipsum concutit, & consequenter nervos sibi adnexos.

Triplex à Galeno constituitur Epilepsiæ differentia, & ab omnibus propemodum authoribus recipitur. Prima, qua cerebrum afficitur, consistente in ipso affectu. Secunda, in qua cerebrum per ventriculi consensum afficitur. Tertia, cum ab aliis corporis partibus ad cerebrum affectus transmittitur. Et propria etiam nomina apud nonnullos sortitæ sunt istæ differentiæ. Prima enim tanquam præcipua generis nomine Epilepsia nominatur; secunda analepsia; tertia catalepsia. Verum (pace Galeni, aliorumque dixerim) superflua est illa diuisio & frustra superatur Epilepsia à ventriculo genita, ab aliis quæ per aliarum partium sympathiam

oriuntur ; cùm omnes vno sympathicæ Epilepsia nomine comprehendi debeant. Neque satisfacit dicere Epilepsiam à ventriculo seorsim enuntiari , tanquam frequentissimam : siquidem ea quæ ex vteri , aut lienis consensu oritur , non minùs frequens , aut certè frequentior esse consuevit.

Diuidatur ergo Epilepsia in idiopathicam , & sympathicam. Sympathica rursum iuxta varias partes à quibus vapores acres , aut maligni ad cerebrum transmitti possunt. Nulla autem propemodùm pars in toto corpore reperitur , à qua malignus vapor ad cerebrum transmitti nequeat. Harum historiarum duæ proponuntur à Galeno loco citato. Vna de puero decimumtertium ætatis annum agente , in qua paroxysmus à tibia initium capiebat , mox illinc rectà ascendebat per femur , & superposita illa , ac per latera ad ceruicem , donec ad caput perueniret , quod cùm primùm tangeret , ipse haudquaquam sibi constabat. Altera est de adolescente , qui inuadentis paroxysmi initio veluti frigidam auram ascendere sentiebat.

A ventriculo autem , intestinis , & materia verminosa , tum etiam ab vtero , aliisque partibus Epilepsiam plerumque generari notissimum est , & variorum authorum historiis confirmatur.

Constat igitur ex prædictis , quomodo defendi possit Galeni doctrina , ab imperfecta ventriculorum cerebri obstructione idiopathicam Epilepsiam generari asserentis , quam tamen causam perpetuam esse defendere non possumus , vt Galenus innuere videtur , nullam aliam proponens ; quin potiùs eam cæteris infrequentiore esse confiteri cogimur.

Neque tamen argumenta aduersùs Galenum proposita vllò modo conuincunt ; quorum præcipua hæc sunt.

Primò enim inquit Fernelius, si Epilepsia ab humoris copia fieret, in sopore ea maximè contingeret, in quo magna humoris copia reperitur. Respondeo, humorem à quo sopor excitatur, esse in substantia cerebri, non in ventriculis, & ideo facultatem expultricem non irritare, quæ in ventriculis magis residet.

Secundò, ex eodem Fernelio, cum Epilepsia citò solvatur, desineret in paralytim, ut apoplexia excusso in nervos humore. Respondeo in apoplexia humores excuti ad partes viciniores propter debilitatem expultricis à copia humoris oppressæ, quæ cum liberior sit in Epilepsia, ad vias naturales expurgationi dicatas humores amandat. Falsum tamen est quod asserit Fernelius, numquam Epilepsiam desinere in paralytim; nos enim paralytim Epilepsiæ succedaneam vidimus. Et non rarò apoplectici in primâ inuasionem convulsionibus Epilepticis corripiuntur, nondum perfecta obstructione ventriculorum cerebri; tum etiam multi Epileptici tandem apoplexia pereunt, quando dimidiata obstructio in integram degenerat.

Tertiò, contra Galenum nonnulli ita argumentantur. Sicut completa ventriculorum obstructio functiones penitus tollit in apoplexia, ita incompleta eas tantum imminueret, non deprauaret, neque motus illos convulsivos ederet, sanis plerumque validiores. Respondeo, naturam omnino oppressam ab integra obstructione non excitari ad expulsionem; in dimidiata verò obstructione satis habere vitium, ut cerebrum commoveatur, & exagitet ad expulsionem. Confirmatur hæc doctrina exemplo catarrhi in pulmonem delabentis, qui si totum pulmonem repleat, summam spirandi difficultatem efficit sine vlla tussi, ut in asthma contingit. Si verò minor fluentis humoris copia extiterit, pulmo irritatur ad expulsionem, unde tussis excitatur.



Signa Epilepsiæ diagnostica in tres ordines distribuenda sunt, quæ scilicet imminentem Epilepsiam significant; quæ præsentem demonstrant, & quæ illius differentias patefaciunt.

Imminentis Epilepsiæ signa dupliciter considerari possunt, vel prout primam morbi inuasionem præfagiunt, vel prout imminentem paroxysmum significant. Eadem autem signa utriusque iudicio inseruiunt, sed multò certius in iis, qui ab Epilepsia actu possidentur, imminentem insultum indicant. In iis enim qui nunquam hætenus morbo affecti sunt, æquiuioca maiori ex parte sunt huiusmodi signa, & multos alios capitis affectus prænuntiare possunt; integra tamen eorum congeries aliquam certitudinem asserere potest.

Omnia igitur imminentis Epilepsiæ signa proponenda sunt, hanc præmissa admonitione, non omnia in omnibus epilepticis concurrere, sed nonnulla in his, alia in illis, pro varia causarum & corporum dispositione. Ut autem ea debito ordine proponantur, fontes signorum percurrendi sunt, qui ab actionibus animalibus, vitalibus & naturalibus, excrementis, qualitatibus immutatis, & propriis accidentibus scaturiunt.

Ratione functionum animalium, epilepsiam minantur, animi & corporis insueta conturbatio; capitis grauitas, cephalalgia, vertigo, vigiliæ, aut plurimus, somnus, à quo nullum leuamen emergit; insomnia turbulenta; mentis torpor, vel anxietas, obliuio, mæstitia, paor, formido, segnitie, artuum grauitas. Saltus & tremores membrorum, sensuum hebetudines, obtusus defixus, scintillæ oculis obseruantes, & interdum nubeculæ, aut marmariges. Aurium tinnitus, fœdi odoris perceptio, lingua inflexibilis, eiusque inordinata motio, oscitatio, sterinitatio.

Ratione functionum vitalium Epilepsiam minantur

cum aliorum signorum concursu. Iracundia, cordis palpitatio, pectoris constrictio, anhelitus mutatio.

Ratione functionum naturalium, Epilepsiæ prodromi sunt, cibi fastidium, aut, appetitus immodicus, nausea molesta, cardiogmos, seu oris ventriculi morfus.

Ratione excretorum, Epilepsiam portendunt, saluæ per os effluuium, urinæ tenues & crudæ; pollutio nocturna frequentior.

Ratione qualitatis mutatae, & propriorum accidentium, Epilepsiam portendunt faciei pallor, & præcordiorum inflatio.

Præsens Epilepsia etiam vulgo notissima est, si omnibus suis numeris absoluta sit; multas tamen habet differentias, quæ difficilem interdum faciunt diagnosim, ut ex sequentibus videre est.

In paroxysmo epileptico integro & absoluto sensus omnes tum interni, tum externi intercipiuntur. Æger subito in terram concidit, & totum corpus, aut partes tantum nonnullæ variis motibus concutiuntur; adest præterea oculorum prominentia, stridor dentium, respiratio suffocatoria, velut in iis qui laqueo strangulantur; semen, stercus & vrina inuoluntarie aliquando profunditur; & circa finem accessionis spuma per os & nares effluit: quæ non nisi in vehementi Epilepsia contingunt, & finita accessione rerum omnium quæ in paroxysmo actæ sunt, obliuio remanet.

Antiquorum nonnulli tres Epilepsiæ differentias faciunt; vnam quæ somno similis altissimo videtur; aliam quæ variis motibus corpus exagitat; tertiam denique ex vtriusque commixtione conflatam. Primam speciem recentiores quidam admittere nolunt, dicentes, illam coma potius, aut carum esse, quàm Epilepsiam, & non alia ratione distingui inter se hos duos  
affectus,

affectus quàm ex eo quòd in comate est somnus profundus sine conuulsione, conuulsio verò est signum pathognomonicum Epilepsia. Verùm aliter docet Auicenna; dicens sæpè euenire Epilepsiam sine spasmo sensato, id est, nulla conuulsione apparente. Et docet experientia multos epilepticos habere paroxysmos comati per similes. Esse autem Epilepsiam, non coma, vel carum, ex eo tantum cognoscitur, quòd sopor ille per interval- la, & periodicè recurrit, cum coma semel tantum inua- dat, neque periodico recursum obnoxium sit.

Idiopathica Epilepsia à sympathica distinguitur, quòd in idiopathica multa apparent cerebri affecti in- dicia, Mentis torpor, vel tarditas, memoriæ imminutio, insomnia turbulenta, sensuum hebetudo, corporis gra- uitas & segnities, capitis dolor, aliaque; præterea æger venientem paroxysmum non percipit, sed ab eo incautus subitò opprimitur; tum paroxysmus in coitu Solis, & Lunæ ut plurimum contingit. Hanc diagnosim confirmat bona partium inferiorum diathesis, & nullum vitium in iis apprens.

Dextram verò, aut sinistram capitis partem magis affici, & mali mineram continere ex eo dignoscitur, quòd visio alterius oculi obtusior est, vel auditus in altera aure hebetior, aut tinnitus eam afficit, & si partes dextræ, vel sinistræ ad motum, aliasque actiones igna- uiores fuerint.

A quo verò humore præsertim Epilepsia generetur, ex signis pituitam aut bilem, aut melancholiam in to- to corpore, & capite præsertim redundantem, indicanti- bus dignoscere poterimus.

Sympathica verò Epilepsia inde dignoscitur, quòd nulla apparent cerebri affecti signa; æger venientem paroxysmum percipit, & interdum veluti auram quandam à partibus inferioribus ad cerebrum ascendente; aut pars

aliqua inferior peculiari quodā vitio labefactata est, aut tempore inuasionis graui aliquo symptomate affecta.

Sic à ventriculo communicare Epilepsiæ causam ostendunt, cibi fastidium, difficilis inediæ tolerantia, nausea, vomitus, ventriculi dolor, erosio, compunctio; vel distensio, vel etiam interdum cordis palpitatio, ventriculo cordi affectum communicante.

Ab hepate, vel liene malum oriri significant, flatuum frequens & copiosa excretio, ventris inflatio, rugitus, & borborygmi, ructus acidus, præcordiorum molesta coarctatio, eorumque dolor ad dorsum vsque interdum procedens. Quibus addere licet vitia peculiarem ventris inferioris partem obsidentia.

A b utero affectum procedere indicat hysterica passio, conuulsionibus epilepticis implicis, tum si mensium aut seminis retentio præcesserit.

Si à parte aliqua externa Epilepsia oriunda sit, aura quædam percipitur à parte illa eleuari, & minera morbi in ea delitescens, vellicat interdum, aut titilla, quod imminentem paroxysmum prænuntiat; & si pars illa constringatur vniculo, impeditur paroxysmus.

Denique à lumbricis procedere affectum ostendunt signa lumbricos indicantia, vt anhelitus fætor acidus, narium pruritus, ventris dolor, fæces cineritiæ, stridor dentium, sopor, & similia: tum præcipue si lumbrici per aluum interdum excernantur.

Rariores verò causæ & extraordinariæ, vt abscessus, ossis caries urinæ suppressio, anadrome, & similia, ex propriis signis mutuari poterunt.

Quod ad prognosim attinet, Epilepsia morbus est diuturnus, & contumacissimus, & in infantibus vt plurimum lethalis.

Epilepsia hæreditaria incurabilis est; quæ verò à causis externis, & praua victus ratione ducit originem, curationem admittit.

Epilepsia ante pubertatem eueniens curabilis est; eadem verò post 25. annum curationem non admittit, ex Hipp. Aph. 7. sect. 5. Siquidem in pubertate magna sit caloris natiui eclampsis, quæ causas morbificas discutere potenter valeat. Adde quod tunc temporis in fœminis menstrua erumpere incipiunt, per quæ impuritates corporis expurgari solent. Licet autem post 25. annum incurabilis dicatur Epilepsia ab Hipp. hoc tamen non est perpetuæ veritatis: multos enim ætate prouectos ab hoc morbo liberatos fuisse plurimis observationibus relatum est; quamvis tamen hoc rarò contingat: sicquæ Aphorismum prædictum, ut plurimum, & ferè semper verum esse stantendum est.

Vehemens Epilepsia sæpè in paroxysmo ægotantem abripit, & de medio tollit; vel enim in apoplexiam degenerat, vel propter prauitatem symptomatum, & violentam cerebri concussionem, tota illius œconomia euertitur, ut interdùm particulae illius diffringantur; & contigerit aliquando processuum mamillarum particulas per nares explosas fuisse.

Epilepsia à melancholico humore oriunda in melancholicam insaniam nonnumquam degenerat; quando videlicet ille humor à ventriculis cerebri in substantiam eiusdem transmittitur. Idem etenim humor dum cerebrum afficit, ut partem instrumentalem, ventriculos illius obstruendo, aut tunicas eorù diuellendo Epilepsiam efficit: dum verò ipsam cerebri substantiam, quæ functionum principum sedes est, ut similem partem offendit, naturale ipsius temperamentum vitiando & animales spiritus corrumpendo, atque ob tenebrando, delirium melancholicum inducit. Vnde apud Hipp. 6. epid. sect. 8. textu 40. melancholici plerumque sunt epileptici, & epileptici sunt melancholici. Degenerat autè isti affectus in se invicem dupliciter, vel per materiam morbificam transpositionem.

sede derelicta, & sic vno exoriente alter desinit; vel per materiae propagationem, & tùm vterque affectus permanet.

Epilepsia pituitosa in apoplexiam, vel paralyfim degenerat.

Quartana febris Epilepsiae superueniens, & diù perseverans, eam soluit, quandoquidem à calore febrili materia morbifica sensim absimitur, si pituitosa sit; vel si melancholica fuerit, à parte affecta transmittitur in locum vbi minera morbi residet, vt nouis paroxysmis materiam suppeditet.

Curatio Epilepsiae duplex instituitur, alia in paroxysmo, alia extra paroxysmum.

Ad paroxysmi curationem raro vacantur Medici, nisi ipse interdum longius protrahatur, quo in casu conueniunt eadem remedia, quæ pro soporosis affectibus fuere proposita. Præsertim verò aqua apoplectica, cinamomi, aqua vitæ, & aliæ multum spirituosæ, ad paroxysmi materiam discutiendam efficacissimæ.

Extra paroxysmum curatio varianda est pro verietate causarum. Ac primùm Epilepsiae idiopathicae curatio proponenda est, quæ in totius corporis euacuatione, materiae morbigicae discussione, prauæque illius qualitatis emendatione, & cerebri roboratione consistit. Cùm autem materia peccans in idiopathica Epilepsia, vt plurimùm pituitosa sit, nos ad illius oppugnationem curationem vniuersam dirigemus, tyrones alioqui admonentes, vt si humores bilioli, aut melancholici in vitio esse videantur, medicamenta illos præparantia & expurgantia substituantur. Specifica verò remedia, à quacumque causa morbus oriatur, eadem perpetuò vsurpanda sunt.

Ad integram ergo curationem sequenti viâ procedendum est. Primum potio phlegmagoga erit propinanda, aut aliud medicamentum, ægrotatis naturæ

accommodum, ex iis quæ in frigida cerebri intemperie fuerunt proposita, iniecto prius clystere, si alius non sit libera.

Postea si plenitudinis notæ appareant, aut æger sit sanguineo temperamento præditus, phlebotomia erit celebranda: sin minus, omittenda.

Mox cura vniuersalis frigidæ intemperiei cerebri suprà proposita sigillatim celebranda erit, hoc obseruando, vt decoctis, apozematis, diætæ sudorificæ, & syrupo magistrali, tum etiam masticatoriis, & pulueribus cephalicis, addantur radix & semen præoniæ, & viscus quercinus, quæ proprietate specificâ epilepsiam curare tota credidit antiquitas.

In diætâ verò ex sudorificis guaiacum præferatur; cuius vsu se multos epilepticos curasse refert Iachinus. Continuetur autem per triginta, vel quadraginta dies.

Singulis dosibus decocti sudorifici aliquot guttæ spiritus vitrioli addantur, qui etiam specificus creditur ad epilepsiam.

Notandum est purgantia vsualia, nimirum pilulas, aut syrupum magistrale, in frequenti vsu habenda, nempe semel, aut bis in septimana, prout vires ægro-tantis ferre poterunt; & per plures menses purgationes esse continuandas: imò ad fortiora interdum purgantia esse transeundum, iuxta præceptum Massariæ, qui hinc fieri dicit, quòd epilepsia raro curetur, quòd Medici semper in leuioribus hæreant.

Hæc ratione Chymici purgantia mineralia vsurpare solent, quæ à remotissimis partibus humores attrahunt; at non sine periculo, præsertim si à peritissimo artifice præparata non fuerint. Si tamè in hoc casu felix euentus ex huiusmodi remediis aliquando contingat, ille in primis sperandus est ex mercurio, per se, vel cum auro calcinato in furno arenæ, longo ignis regimine; probe

cauendo, ne qua illius portio cruda adhuc & volatilis maneat, quæ summam vehementiam medicamento conciliaret, alioqui satis blandè purganti, si cum pilulis cochiis, aut, quod meliùs erit, cum extracto aliquo phlegmagogo, vel panchymagogo, pondere gr. iv. vel v. vsurpetur.

Recens autem Epilepsia sale vitrioli aliquando curatur; quemadmodum refert Angelus Sala, ex hoc remedio, quarto quòque die exhibito, se epilepsiam tertià exhibitione curasse. Posterius verò *CHYAL. 77. cent. 2.* gloriatur se stibio calcinato ter exhibito puellam vndecim annorum ab epilepsia hæreditaria liberasse.

Syrupus de peto Quercet. maximam vim habet ad curandam epilepsiam. Sed non nisi à prudenti Medico vsurpandus, quia vehementissimum est medicamentum.

Loco opiatae dicto loco propositæ, sequens, magis huic affectui specifica, erit subroganda.

℞. Conferuæ flor. anthosis, pœoniæ, buglossi, ana ℥. ʒ. ʒ. corticis citri saccharo cōditi ʒ. ij. pulu. visci querni, sem. pœoniæ decrecente lunâ collecti, & vngulæ alces, ana ʒ. ʒ. craniij humani non humati, ad albedinem calcinati ʒ. j. ʒ. coral. præp. margarit. præp. & cornu cerui præp. ana ʒ. iv. lapid. bezoard. veri ʒ. j. diamoschi dulcis, diatriasant. ana ʒ. ij. thériac. vet. & confect. de hyacinth. ana ʒ. j. spiritus vitrioli gutt. xv. Cum syrupo condituræ corticis citri, fiat opiata, de qua capiat ad magnitudinem auellanae, superbibendo aquæ cinam parum.

Sequens verò efficacissima est ad morbum radicitus tollendum, post diligentem corporis purgationem.

℞. Conferuæ flor. betonicae, & rorisim. ana ʒ. ij. ʒ. ad. eryngij conditæ, & mithridatij, ana ʒ. j. pulu. ligni



ſassafras ʒ. vj. caſtorei ʒ. iij. craniꝝ humani non humar  
vngulæ alces, ana ʒ. ij. rad. ſem. pœoniæ, ſem. nigel-  
læ. rutæ ſylueſtris, & rad. pyrethri, ana ʒ. j. oxymel. q. ſ.  
Fiat opiata, de qua capiat ʒ. ij. vel iij. Reliquas omnes  
efficacia ſuperat opiata Montagnanæ, cuius beneficio  
multi epileptici liberantur. Illius deſcriptio talis  
eſt.

℞. Rad. pœoniæ, maris, ſtœchados, coſti, an. ʒ. x.  
agarici ʒ. v. pyrethri, carui, ſem. anethi, aſſ. & fœti-  
dæ, & ariſtol. rot. ana ʒ. ij. ſ. ſucci ſcillæ, & mellis  
electi, an. lb. j. & ʒ. ij. Scilla & mel ſimul coquantur  
lento igne uſque ad bonam conſiſtentiam; deinde ſu-  
peradditis ſpeciebus fiat electarium, de quo capiat  
æger ʒ. ii. iij. vel iiij. pro ætatis ratione, continuando  
per 10.

Post uſum emplaſtri, epilpaſtici, veſicatorium etiam  
ſincipiti erit admouendum, & cauterium poſteriori  
parti ceruicis.

At ſetaceum multò efficaciùs humores extrahit à  
cerebro. Refertque Fabricius Hildanus, ſe iuuenem  
quotidie Epileſiā laborantem, & cui fruſtrā alia reme-  
dia adhibita fuerant, & puellam 8. annorum, ab ipſa  
infantia epilepticam, ſolo ſetaceo reſtituiſſe.

Si coniectura ſit, vapores ad cerebrum exhalantes à  
partibus inferioribus, affectum producere, vel fouere;  
vtiliſſimum erit cauſticum ſincipiti admouere, vitatis  
ſuturis: refert enim Carolus Piſo, duos Epilpeticos hoc  
cauterio fuiſſe curatos. Tum etiam ſi à partibus infe-  
rioribus affectus producat, aquæ acidulæ mirabiles  
ſæpè effectus producant, & morbum interdum radici-  
tus tollunt, ſi priùs euacuationes vniuerſales, & vena-  
rum inferiorum ſectiones celebrentur.

Peculiariter verò ab vtero procedens Epileſia cu-  
rationem ſortitur, puluere granorum actes à Quer-

cer. descripto in Pharmacop. restit. per triduum exhibitoad 3.j. cum aqua quadam hysterica.

Si cætera non profuerint, extremum remedium erit sinciput terebello perfodere, vitatis futuris, vt hoc veluti spiraculo aura maligna exhalare possit. Hoc remedio aliquando desperatæ epilepsiæ curatæ sunt; & sine përiculo celebrari potest, si periri Chirurghi manus adhibeatur.

Vtatur æger pro potu ordinario hydromelite, vel bochetto ex guaiaco, & rad. pæoniæ.

Sacculus de collo suspensus continuò gestabitur, in sequentem modum paratus.

℞. Rad. pæoniæ, visci querc. ana 3.j. vngulæ alces 3. ij. nucis mosch. caryophyll. macis, ana 3. ij. fol. rutæ & hyssopi, ana 3.j. β. Puluerentur, & rubrâ sindone excipiantur. Fiat sacculus, deferat appensum collo, sæpè illum odorando.

Post vniuersales euacuationes, inter aliorum remedium vsum, specificis præsertim morbus oppugnandus est, quorum infinitus ferè numerus reperitur apud Autores. Nos ex selectioribus nonnulla proponemus, præter opiatas suprâ descriptas, quæ ad hunc morbum expugnandum non infimum locum obtinent.

Rondeletius maximè commendat aquam hirundinum, quam etiam ab eo mutuatus est. Quercetanus in Pharmacopœa. Non minoris est pretij aqua theriacalis cephalica, & syrupus antepilepticus, ab eodem Quercetano dicto loco descriptus.

Radix valerianæ sylvestris à Fabio Columna tanto pere celebratur, vt semel, aut bis exhibitam ab epilepsia libere affirmet. Refertque se hanc multis amicis donodidisse, qui deindè, diuino priùs numine & fautore glòricato, puluere huius radicis sibi restitutam sanitatem affirmarunt. Dosis autem est cochleare semis

cum vino, aqua, lacte, aut quouis liquore appropriato. Pueris verò in minori dosi cum lacte datur.

Chymici valdè commendant mixturam spiritalem, quâ in epilepsia nullum medicamentum præstantius exoptari posse asserunt. Illius autem compositio talis est.

℞. Spiritus vitrioli partem vnam, spiritus tartari partes tres, aquæ theriacalis camphoratæ partes quatuor. Misceantur, & vitro benè clauso, per tres, aut quatuor septimanas digerantur. Dosis est ʒ. j. in conuenienti vehiculo.

Rulandus oleum ligni heraclei ( quod corylinum esse affirmant Chymiatri, ) in frequenti vsu habebat; & nonnullas historias refert in centuriis, eorum qui huius medicamenti vsu ab eo morbo liberati sunt. Dosis autem est trium, vel quatuor guttarum, cum liquore idoneo, per quinque dies.

Huic nullo modo cedit, aut fortè multò præstantius est oleum succini albi, à perito artifice extractum, quod nullum empyreuma redolet, imò verò fragrantissimum expirat odorem. Dosis à ʒ. β. ad ʒ. j.

Oleum buxi ad gutt. iv. cum pari quantitate spiritus sulphuris, & aquæ flor. tiliæ arboris ʒ. iv. per aliquot dies exhibitum, insignis est efficaciam, & à multis creditur verum ligni heraclei oleum; & per descensum elicitur.

Crato cinnabarin natiuam epilepsiam magnetem vocat, ex eaque talem puluerem parat.

℞. Cinnabaris natiuæ pellucidæ limatæ, & in tenuissimum puluerem tritæ ʒ. β. coralli rubri & margarit. præparat. ana ʒ. ij. croci orientalis ʒ. j. fol. auri n. x. v. Terantur omnia subtilissimè super lapidem. Dosis in ipsa accessione à granis vj. ad ʒ. j. in aquis appropriatis.

At non minoris virtutis censetur à non paucis Chy-

matris, cinnabaris antimonij, quæ post mercurij vitæ extractionem elicitur. Si enim æquali pōdere inungatur cum magisteriis perlarum, corallorum, & cranij humani, specificum esse aiunt in epilepsia etiam inueterata. Dosis à granis x. ad xv. in liquore idoneo.

Sympathicæ epilepsiæ curatio ad partem primariò affectam dirigenda est. Eaque remediis cōuenientibus, è propriis capitibus desumendi, euacuanda, & roboranda est; non omiſſis specificis, & antepilepticis, quæ in omni epilepsia perpetuò vsurpanda sunt. Attamen si à parte aliquâ externa concitetur epilepsia, præter curationem vniuersalem, ad eam peculiariter respiciendum est, & materia maligna in ea contenta educenda cucurbitulis scarificatis, velicatoriis, & cauteriis admotis. Et si malum perseveret, supra cauterium post escharæ casum cucurbitula frequenter admoueantur; ac tandem urgente necessitate ad cauterium actuale confugiendum est. Si à craniæ cavie malum oriatur, trepano & vſione illa auferenda est.

## C A P V T VIII.

### *De Epilepsia puerorum.*

**Q**uia iste morbus pueris familiaris est, in iisque plerumque acutus & valdè periculosus esse consuevit; idè peculiaris illius curatio hîc seorsim subnectenda est, vtpotè ab adultiorum curatione valde diuersa.

Primò igitur suppositorio vel clystere aluus soluenda est.

Postea, & ferè eodem tempore, purgans medicamentum exhibendum satis validum pro ætatis robore,

*Cap. VIII. De Epilepsia puerorum.* 91

ita vt non dubitemus in puerulis vnius anni electarium diacarthami ad ʒ.ij. exhibere, si fiat ex lacte corrupto.

℞. Hieræ picræ ʒ.ʒ. vel ʒ. j. pulu. de gutt. ʒ.ʒ. Cum liquore specifico, vel cum melie rosato dentur.

Cucurbitulæ scapulis & lumbis admoveantur, & cum scarificatione, si puer sit grandior.

Vesicatorium applicetur posteriori parti cervicis.

Si purgatio non rectè processerit, aut parùm profecerit, vomitus prouocandus est vitriolo albo præparato, vel etiam sale vitrioli. Quod bis, ter, & quater exhiberi poterit, si affectus protrahatur. Puluis epilepticus, de gutteta vulgò nominatus, frequenter exhibeatur cum lacte, iusculo, & panatellis à ʒ.ʒ. ad ʒ. j.

Ille autem puluis de gutteta in vulgaribus Pharmacopœis descriptus non habetur, sed in Monspelienfis officinis vulgò componitur ex traditiua descriptione, quæ talis est.

℞. Rad. pœoniæ, sem. eiusdem, dictamni albi, visci querc. ana ʒ.ʒ. sem. attriplicis ʒ.ij. craniij humani ʒ. iij. corall. rubr. præparati, hyacinthorum præpar. ana ʒ. j. ʒ. vnguiæ alces præpar. ʒ. ʒ. moschi ʒ. j. fol. auri. ʒ. j. Milce, fiat puluis.

Exhibetur etiam aquæ alicuius antepilepticæ cochlear exiguum, vel earum defectu aquæ cinam. vel imperialis vel guttulæ aliquot mixturæ spiritalis cum liquore idoneo.

Occipiti admoventur emplastrum de ammoniaco derafo capillitio: fluxionem enim impedit à capite in spinam ruentem per partes exteriores.

Sincipiti verò sequenti puluere sinapifetur.

℞. Nucis mosch. ʒ. ʒ. granor. pœoniæ ʒ. j. ʒ. flor. lauendulæ P. j. succini ʒ. ij. Fiat puluis.

Vel roborans emplastrum applicetur, in curatione frigidae intemperiei cerebri descriptum.

Olei succini guttæ ij. vel iij. cum pari quantitate spiritus vitrioli, in aqua betonica exhibita, puerulos à paroxysmo epileptico statim plerumque liberant. Idem oleum naribus illitum multum confert. Loco olei succini, oleum buxi per descensum paratum vtiliter exhibetur; tum etiam aqua fl. tiliæ arboris; aqua betonica vtilior in hoc casu censetur.

Fumus tabaci pueros ab insultu epileptico liberat, si minister cum tubulo attractum in os pueri apertum frequenter insufflauerit.

Spina dorsi, & membra quæ contrahuntur, inungantur sequenti linimento.

℞. Ol. rutacei, lumbricorum, ana ℥. ij. ol. de castoreo ʒ. j. aquæ vitæ parum. Fiat linimentum.

℞. Theriacæ vet. ʒ. j. confect. alķermes, & de hyacintho, ana ʒ. j. aquarum betonicae, saluiae, maioranae, & cinam. ana ʒ. ʒ. Misce, foueantur nares, tempora, & aures.

Eiusdem aquæ cochlear. j. per os poterit exhiberi.

Maiori tamen efficaciam inunguntur nares, tempora, & vertex capitis balsamo apoplectico, ad soporosos affectus descripto.

Interim etiam os, & palatum, urgente necessitate, eodem balsamo inungi potest.

Skenknius exotericorum experimentorum cent. 5. num. 85. ex Georgio Kufnero hæc habet. *De epilepsia puerorum expertum medicamentum. Detur de moscho fino ex mero subtili, bis vel ter in die parum, & sic perfectè, curantur.*

Dum hæc omnia sunt, clysteres semel, aut bis in die niiciendi sunt, in hanc modum compositi.

℞. Rad. aristol. rotundæ, polypodij quercini, sem. carthami, ana ℥. β. sem. pœoniæ, cumini, ana ʒ. iij. flor. chamomil. & anthos, ana P. j. Coquantur ad lb. j. De colat. cape lb. β. hieræ picræ ʒ. ij mellis anthosati ℥. j. olei rutacei & liliorum, ana ʒ. iij. Fiat clyster.

Inter specifica duo sunt maximè laudata, quæ ideo merentur ad experimentum reuocari.

Vnum est radix valerianæ syluestris, suprà à Columna commendata: quam ipse asserit in puluerem redactam, & cum lacte exhibitam, multos puerulos liberasse.

Alterum est fel catelli lactentis, quod ab Vntzero hisce verbis prædicatur. *Sume catellum paruum nigrum adhuc sugentem ( pro foemella verò epileptica sume catellam ) cùmque strangula ac interfice. Ex interfecti, & per sectionem aperti corpore extrahere totam cystim felleam vix ij. vel. iij. guttas sincera bilis in se habentem. Illum biliosum succum omnem puerulo, in paroxysmo epileptico, cum pauxillo aqua flor. ribia propina, & miraculi instar videbis illum ab hoc morbo è vestigio sanari, & curari.*

Si puer epilepticus adhuc lac sugat, habenda est cura nutricis: illiusque lac diligenter examinandum, ne vitio aliquo laboret. Victu nihilominus attenuante vtatur, & laudabili. Vino interdicitur, bibat aquam, vel hydromel, vel bochetum sal-separillæ.

Pueri denique nonnulli ita huic morbo obnoxij sunt, vt semel curati, tamen soleant recidere. Imò verò in quibusdam familiis omnes liberi hoc morbo solent interfici. Ideo tum iis qui nuper in lucem editi sunt, tum qui ad morbo conualuerunt, debetur prophylaxis.

Primò igitur recens natis, antequam lactari incipiant, detur pulueris de gutteta  $\text{℥. j}$  cum paucò lacte, eademque dosis ter repetatur intra duos dies.

Iisdem verò post aliquot dies à partu, tum etiam iis qui semel epilepsià correpti sunt, causticum occipitio inuerere vtilissimum est. At multò vtilius cauterium actuale, quod apud nostrates neutiquam vsurpatur, à vehementioribus remediis, aut terrorem aliquem incurtientibus, abhorrentes. Rondeletius tamen huiusmodi cauterium actuale Florentiæ ita vsitatum esse affirmat, ut ipsæ mulieres illud, ut torrem ignitum, plerumque applicare soleant. id ipsum testatur Aquapendens in operationibus chirurgicis, & modum applicandi docet cap. proprio de exustione occipitij in infantibus & puerulis.

Purgetur puer bis in mense, cum manna, syrupo rosaceo, aut de cichorio cum rhabarbaro.

Singulis interluniis capiat dosim pulueris epileptica de gutteta dicti.

Paretur cicufa cerebrum roborans, & suffumigium pro tegumentis capitis, iuxta descriptiones in curatione frigidae intemperiei cerebri propositas. Tum etiam poterit inspergi capillis puluis ad curationem huius affectus suprâ descriptus.

Nonnulli denique ad præseruationem hoc remedium commendant.

$\mathcal{R}$ . Spiritus vini  $\text{lb. iv.}$  castorei  $\mathfrak{z. j}$  ad pœoniæ  $\mathfrak{z. iij.}$  Macerentur, & colentur. Colatura totum corpus infantuli abluatur calidiusculè.



## C A P V T I X.

*De Vertigine.*

**V**ertigo est falsa imaginatio, in qua omnia obiecta & caput ipsum rotari ac circumagi videntur, vt æger sæpè in terram decidat, nisi propinquis adminiculis nitatur.

Obiici potest, in vertigine non esse læsam imaginationem; quia si hoc esse, vertiginosi putarent obiecta verè in gyrum verti, quemadmodum phrenitici, & melancholici verè putant illud esse quod imaginantur. Respondemus, in vertigine rationem manere integram, quæ cognoscit imaginationis errorem; in phrenitide verò & melancholia rationem cum imaginatione affici.

Duæ illius proponuntur differentiæ. Vna vertigo simpliciter, *ἁπλῶς* Græcis nominatur, in qua visio illæsa permanet. Altera *σκοτεινὴ*, seu *σκοτεινὴ*, & tenebrosa vertigo nominatur, in qua oculi simul obtenebrantur, iisque veluti fumus, aut nubes quædam offertur.

In vtraque vertiginis specie visio aliquantulum læditur, quia spiritus qui ad oculos tendere recta solent, per nervos visorios transuersim mouentur, vnde oculus illis non ita commodè fruitur. Sed in vertigine tenebrosa vehementior est spirituum commotio, ita vt minùs ad oculos ferantur, vnde visio obtenebratur.

Causa proxima vertiginis est circumuolutio spirituum, producta à materia vaporosa, vel flatulenta, quæ in cerebri ventriculos, ac plexum choroidem irruens, spiritus animales exagitat, & in gyrum commo-

uet, vnde species obiectorum per spiritus illos delata pari motu cientur; atque ita obiecta ipsa eodem motu cieri videntur.

Verum hinc dubitare licet, cum vertigo sit symptoma actionis læsæ, & omnis actio læsa ab aliquo morbo immediatè dependeat, quomodo circumuolutio spirituum potest esse causa proxima vertiginis, cum illa nullum morbi genus referri valeat. Cui dubitationi respondendum est, circumuolutionem spirituum esse morbum in situ; tunc enim spiritus non seruant eum situm quem naturaliter debet obtinere, sed perperam, & præternaturaliter mouentur.

Hæc tamen responsio grauem patitur instantiam. Morbus enim est affectus veræ partis, spiritus autem non sunt veræ partes. Respondemus, axioma illud verum esse vt plurimum, non autem perpetuè. Et vt consistere possit, Galeni doctrina, qua sancitum est; illud quod primo, & per se actionem lædit, esse verum morbum: dicendum est nomen partis latius paulò vsurpari debere, vt ea omnia comprehendat, quæ ad corporis constitutionem concurrunt; & quæcumque alicuius partis actionem lædunt, morbi nomine esse afficienda. Sic color flauus in oculo visionem lædit immediatè, & idè dicitur esse morbus in numero. Sic sapor amarus in lingua, & sonitus aurium sunt morbi in numero excedente, quatenus in iis partibus est aliquid præter illa, ex quibus naturaliter constituuntur, quod actionibus officit. Eodem modo circumuolutio spirituum in ventriculis cerebri est morbus in situ propter rationem dictam.

Vapores autem illi ex prauis humoribus eleuantur, non continenter & assiduè, sed per circuitus & interualla, quoties à causa aliqua externa excitantur. Illi autem humores sunt quicumque vapores vel flatus emittere nati sunt, sanguis nimirum, bilis, pituita, melancholico

lancholia, & humor serofus; cùm tam calidus, quàm frigidus vapor vertiginem excitare possit, vt doce Gal. 3. de loc. affect. cap. 8. & commentar. Aphorif. 23 sect. 3.

Humores illi prauì vel continentur in cerebro, vt in partibus inferioribus; hinc duplex emergit vertiginis differentia, idiopathica scilicet, & sympathica.

Humores aquei & pituitosi, in cerebro cummati, flatibus & vapores emittunt ad ventriculos eiusdem, qui in iis rotantur, & vertiginem excitant. Atque adedò vertigo idiopathica plerumque est epilepsiae, aut apoplexiae praenuntia.

In partibus verò inferioribus, ventriculo praesertim, & liene humores contenti faciliè ad cerebrum vapores transmittunt, qui si ventriculos & arterias imperant, vertiginem efficiunt.

Causae externae sunt quaecumque humores subito fundere, & in vapores dissoluere, vel flatibus illis, & spiritibus motum inordinatum conciliare possunt. Inter illas recensetur ab Hip. Aphor. 17. sect. 3. austrina constitutio, & subita aëris mutatio. His addantur Solis ardor, cibi vaporosi, & flatulenti, allium sinapi, raphanus, legumina, tum etiam ebrietas, ingluuies, exercitia immodica, & intempestiua, euacuatio solita suppressa, ira, balneum, inedia maximè in pichrocolis, frequens ac diuturna corporis circumgeratio, diuturnus rotarum, & rerum circulum motarum intus, & aquarum praecipiti cursu labentium, prospectus ex loco altissimo in profundum, casus, ictus, & percussio capitis vehemens; fractura, vel depressio cranij cerebri compressionem inducens.

Diagnosìs huius affectus in genere nulla proponenda est, quando quidem affectus satis per se patet. Attamen in specie signa partem affectam, & morbi mine-

ram continentem, tum etiam humorem peccantem indicantia proponenda sunt.

Idiopathicam vertiginem ex cerebri affectione ortam ostendunt capitis dolor, & grauitas & alicuius sensus oblatio; vt visus caligo, seu hebetudo; aurium tinnitus, vel grauis auditus, olfactus, gustusque imminutio. Arteriarum capitis pulsatio, & aliarum partium incolumitas.

Materiam peccantem signa indicantia hæc sunt. Pituitam exuberantem significant sensuum interiorum, & exteriorum hebetudo, capitis grauitas, ad motum pigrities, somnolentia, spiritio multa, inappetentia, sitis carentia, vrina alba, & cruda & reliqua pituitæ redundantis indicia.

Biliosam verò materiam peccare ostendunt vigiliæ, iracundia, actionum promptitudo, sitis, oris amaror, pulsus celeritas, vrina tenuis & flaua similia.

Atrabilarium humorem significant timor, inæstitia, cogitationes turbulentæ, vigiliæ importunæ, insomnia horrenda, ructus acidi, & similia.

Sanguinem verò redundare ostendunt, venarum tensio & tumor, faciei rubor & calor, pulsatio temporum, capitis grauitas ac tensio, somni longiores, in somnia rerum rubratarum, lassitudo, pandiculatio, vrina rubra & crassa, aliquando tenuis & perspicua ex translatione sanguinis ad caput.

Vertigo sympathica dignoscitur ex absentia symptomatum à capite manantium, & quòd nullum vitium in cerebro appareat, potius quin aliqua pars inferior sensibilem noxam patiatur.

A ventriculo procedere vertiginem ostendunt, inappetentia, nausea, ructus acidi, vel nidorosi, dolor ventriculi, aut inflatio.

Iecoris, lienis aut vteri consensu fieri vertiginem

ostendunt eadem signa, quæ pro epilepsia sympathica, ab iisdem partibus oriunda, superiore capite fuere proposita.

Prognosis huius morbi in hunc modum instituentia est.

Vertigo recens, & raro inuadens, & quæ non nisi à causis externis excitatur, leuior est ac curatu facilior: contra verò quæ grauior est, frequentior & antiqua in epilepsiam, aut in apoplexiam plerumque degenerat.

Vertigo in senibus magis periculosa, quia ipsorum cerebrum frigidius ac debilius est, pituita verò abundans.

Vertigo in qua non solum res externæ, sed etiam caput, & totum corpus circumagi videntur, & quæ cum visus læsione accidit, periculosior, maiorem enim causæ vehementiam significat. Et si æger in terram concidat, imminentem epilepsiam aut apoplexiam prænuntiat.

Vertigo à calidis humoribus oriunda citius soluitur, quàm quæ à frigidis, quia humores calidi facilius discutuntur.

Curatio vertiginis cum epilepsiæ curatione multum conuenit, cum ab iisdem propemodum causis vterque affectus oriatur, vnde fit vt vertigo sæpè in epilepsiam degeneret. Attamen cum vertigo sit leuior affectus, non tanto indiget remedium apparatus, vt epilepsia; sed ea sufficient quæ nos hîc summam indicabimus, quæque hic morbus peculiariter desideret, breuiter exponemus.

Primo itaque si sanguis in toto corpore, vel in capite abundet, phlebotomia celebranda est, & sanguis per interualla educendus, clystere præmissio aliquantum acriori,

Deinde purgatio solennis instituatur apozemate proposito in curatione frigida intemperiei cerebri.

Postea ad particulares cerebri euacuationes veniendum est, per errhina, sternutatoria, & apophlegmatismos dicto loco propositos.

Cucurbitulae tum siccae, tum scarificatae, fiictiones partium extremarum, & apertio hæmorrhoidum celebrentur reuulsionis gratia.

Vesicatoria & cauteria ad derivationem applicentur; tandemque adhibenda, quæ cerebrum roborant, vapores & humores discutiunt, tam interna, quàm externa. ut opiata, pulvis & cucufa, secundum formulas dicto loco descriptas.

Neque omittatur pulvis digestivus, qui ventriculi imbecillitas ad huius morbi generationem sæpissimè concurrit.

Ac denique usurpanda ea remedia, quæ proprietate specificâ vertiginem curare æstimantur; qualia sunt ea quæ pro epilepsia curanda fuerunt proposita; nimirum aquæ antepileptica, balsamum pro inunctione narium, temporum, & verticis capitis, oleum succini, pulvis ex cinnabari, & alia permulta.

Laudatur etiam à Quercetano in Pharmacopœa cap. 10. remedium stercore pauonis, cuius præparationem, & utendi modum apud Autorem videre est.

Si morbus pertinaciter obsistat remediis propositis ad diætam ex guaiaco veniendum est.

Conserua florum calendulae à nonnullis, tanquam specificum vertiginis maximè commendatur.

Cauterium sinicipiti admotum maximè laudatur à Zacuto Lusitano. lib. 1. *Praxis admiranda, obs. 28.* his verbis. *Vir quidam tenebricosa vertigine adeò vexabatur, ut illi cerebrum ferè continuò in gyrum ageretur: cumque plura expertus esset auxilia, & de futura apoplexia timor esse*

nullo alio praesidio (præter evacuationes uniuersales, & particulares, celebratæque in variis partibus fontanellæ sive nuchæ affixum) quàm cantherio bregmati imposito, potuit persanari. Quo solo plurimos cerebri morbi exitialibus correptos, præter Medicorum votum, ad sanitatem, ulceribus diu fluidis permanentibus, perduxit.

## CAPVT X.

## De Tremore.

**T**Remor Græcis *τρεμουρ* dictus, est motus voluntarius deprauatus, quo membrum vicissim eleuatur, & deprimitur, ex mutua facultatis, & grauitatis membri contentione.

Dicitur motus deprauatus à Gal. 2. de sympt. caus. cap. 1. idemque repetit lib. de sympt. different. cap. 3. sibi tamen videtur contradicere dum lib. de tremore, cap. 4. tremorem recenset inter motus diminutos. Verum conciliari potest illa contradictio, dicendo motum dupliciter considerari posse, vel secundum seipsum, vel ratione facultatis. Si consideretur secundum seipsum, est deprauatus, quia non sit eo pacto quo deberet. Si secundum facultatem, est motus diminutus, quia fit à facultate debili quæ satis fortes motus edere non potest.

Instabit aliquis à facultate debili semper imminutam actionem fieri, non autem deprauatam. Respondeo, id verum esse si tota actio à sola facultate dependeat. Sed tremor fit partim à facultate, partim à grauitate partis, idè est motus deprauatus.

Facultas motrix membrum attollere, & in eo situ continere nititur; grauitas verò membri illud deorsum exprimit, vnde motus ille tremulus contingit.

Causa proxima tremoris est imbecillitas facultatis motricis, seu potius instrumenti proximi illius, nempe spiritus animalis, qui non sufficit ad motum voluntarium perfectè exercendum.

Debiliores sunt spiritus, vel ob vitium proprium ipsorum, vel ob nervorum defectum, qui sunt canales per quos illi deferuntur, & actiones suas exercent.

In spiritibus vitium residet, vel quando sufficienti copiâ non generantur, vel geniti dissipantur.

Non generantur in sufficienti copia, vel ob frigidam; cerebri intemperiem, ut senibus plerumque contingit, vel ob inopiam vitalium spirituum, qui sunt materia animalium.

Dissipantur verò spiritus à multis causis externis, ut immodicis euacuationibus, venere immoderata, & intempestiva, dolore magno, & diuturno, ieiunio, mœrore, & morbis vehementioribus diuturnis.

Nervorum defectu vitiantur spiritus, ad debiliores fiunt, cum illi vel frigida intemperie laborant vel maligna quadam qualitate inficiuntur, vel obstruuntur, vel comprimuntur.

Frigida intemperie afficiuntur ab aëre valdè frigido, usu alimentorum frigidorum & largo frigidae potus, mutatione frequentis, in aqua frigida, & aliis huiusmodi.

Maligna qualitate afficiuntur ab usu opij, hyosciami, papaveris, vel ab hydrargyri vapore, ut in aurifabris contingit, & lue venerea affectis, qui per cinnabaris suffutim curati sunt. Sic in febribus malignis tremores ab eadem causa sæpè contingunt; qui tamen ad motus convulsivos potius referendi, & ab irritatione partium nervosarum frequenter oriuntur.

Obstruuntur non totaliter, ut in paralyfi, sed multò



leuius, ab eadem tamen causa, humore nempè pituitoso nervos leuiter irrigante, qui à crapula, vinolentia aliisque causis produci solet.

Denique à nervorum compressione potest interdum fieri tremor, quando humores excrementitij in toto habitu redundantes nervos comprimunt, & liberum spirituum animalium influxum impediunt.

Hercules Saxonia præter causas propositas, à Galeno mutuatas, alium tremorem agnoscit, à flatibus excitatum, & Cardanus alium qui à vellicatione partium nervosarum fiat. Verum in eo decipiuntur, quod motus ab illis causis oriundi ad palpitacionem, aut motum convulsivum referri debeant.

Diagnosin huius affectus nulla alia necessaria est, siquidem tremor per seipsum pater. Causæ verò illum producentes ex propriis signis dignoscendæ sunt; tum causæ externæ quæ processerunt diligenter inuestigandæ.

Quod ab prognosin attinet; tremor per se periculosus non est, sed inclinante ætate adueniens, ad mortem usque ægrum comitatur. Per accidens tamen lethalis esse potest, quatenus paralytim; aut apoplexiam sæpè præcedere solet.

Curatio tremoris eadem instituenda est quæ pro paralytis curatione fuit proposita, ut eam hîc frustra repetere non opus sit.

---

## C A P V T · XI.

### *De Phrenitide.*

**P**hrenitis est inflammatio cerebri, & membranarum eius cum delirio perpetuo, & febre acuta continuâ.

Inflammationis nomine verum tumorem intelligimus, qui vulgò sytrophica inflammatio nominatur, ex sanguine extrauafato, & in partis substantiam effuso, oriunda. Ille autem sanguis calidus, atque biliosus est, & in cerebri membranis, ipsaque substantia erysipelas exquisitum, vel erysipelas phlegmonodes, vel phlegmonem erysipelatodem inducit.

Per delirium autem ratiocinationis errorē præcipuè intelligimus; nam imaginationis solius errorem sine vitio ratiocinatricis in phrenitide contingere non posse censemus, quidquid alij sentiant Galeni autoritate persuasi, qui *lib. de symp. different. cap. 3.* exemplum proponit Theophili medici, qui tibicines quosdam angulum domus vbi decumbebat, occupasse, assidueque sonare putabat, atque illos se intucri rebatur partim stantes, partim verò sedentes, & continuò exclamabat vt foras eiicerentur. In eoque dicit Galenus imaginationem fuisse læsam, illæsa ratiocinatione. Primò enim dicere possemus. Theophilum illum phrenitide non fuisse affectum, Galenus enim huic morbum ipsi non ascribit, cuius verba hæc sunt, de delirio verba faciens, *quod genus Theophilo-medico agrotanti contingit*; sed cum potius melancholia morbo affectum fuisse: quandoquidem melancholici non rarò errant tantum circa vnum obiectum, & in reliquis constant & bene habent. Sic De Theophilo dicit Galenus, quod in reliquis illi prudentiâ supererat, & disputandi, & præsentis exactè noscendi. Verum vltèrius dicimus in Theophilo, non solum imaginationem, sed etiã ratiocinationem fuisse læsam. Quia verò putabat tibicines adesse, eosque eiici cupiebat. Nam quando sola imaginatio læditur, ratio illæsa illum imaginationis errorem agnoscit, vt in vertigine contingit, in qua ægris videntur omnia circumuolui. Attamen ratio cognoscit

non reuera ita fieri , sed in eo imaginationem errare.

Neque tamen recipienda est in hoc casu Eustachij Rudij sententia , qui statuit nunquam fieri posse , vt imaginatio lædatur, ratiocinatione illasâ ; Quia ratiocinatio circa phantasmata operatur ab imaginatione recepta, atque adeò si ratiocinationi absurda phantasmata offerantur , necesse esse putat , vt intellectus praua illa phantasmata speculando , prauè quoque , & absurdè speculetur. Et hinc colligit Eustachius Rudius, in vertigine non esse imaginationem deprauatam , sed meram fieri & simplicem visionis hallucinationem. Dicimus enim intellectû de vno ad aliud discurrere , & circa species memoria recentas etiam occupari. Atque adeò licet phantasia aliquid absurdi menti offerat, attamen si species antea perceptæ in memoria adhuc retineantur , & rationi offerantur , idè errorem illum phantasiæ cognoscere , & corrigere potest. si nempe iudicet absurda illa phantasmata , quæ illi ab imaginatione deprauata offeruntur, neque loco , neque tempori , neque aliis circumstantiis, quæ adhuc in memoria habentur, & vera esse scit conuenire. Sic in vertigine ratio benè se habens rerum omnium externarum, quæ visui offeruntur, vt parietum , laquearium , & pavementorum circumuolutionem impossibilem esse iudicat, atque adeò falsò imaginationi representari. Sic Philosophus ille , qui à cane rabido demorsus fuerat, dum illi imaginatio lædi incipiebat, balneum ingressurus , falsam canis imaginem in balneo percipiebat , quem tamen imaginationis errorem ratio adhuc integra redarguens, hæc illi verba supeditauit, *quid cani cum balneo?* Et statim in balneum se coniecit, cuius ope à morbi imminenti, nempe hydrophobiæ periculo liberatus est.

Phrenitidis species duæ sunt præcipuæ. Vera nempe,

& legitima, quæ proposita definitione exprimitur. Alia non vera, & spuria, quæ paraphrenitis appellatur. Vera phrenitis alia est in dispositione, quæ frequentissima est; alia verò in habitu, quæ hæctica nominatur, in qua biliosi humores altius in cerebro figuntur, & plures illius partes occupant, ac tincturæ instar adherent. Paraphrenitis verò fit dum calida interaperies cerebro communicatur, vel à toto corpore, ut in febribus ardentibus contingit; vel ex cuiusdam partis inflammatione, ventriculi v.g. hepatis, pulmonis, & potissimum diaphragmatis, quod inflammatione affectum delirium veræ phrenitidis æmulam, scilicet perpetuum excitare solet. Quod fit ex magno consensu qui inter cerebrum & diaphragma intercedit, propter nervos insignes qui ad illud feruntur, & ex motu perpetuo diaphragmatis, cuius ratione perpetuos vapores ad cerebrum transmittit.

Causa veræ phrenitidis est sanguinis biliosus, cui etiam bilis excrementitia ut plurimum admixta est; & pro variis illius gradibus, maiori scilicet, vel minori feruore, aut adustione, grauiorem aut leuiorem phrenitidem producit; sic bilis pallida omnium mitissimam, adusta verò ferinam excitat phrenitidem.

Ut verò fiat inflammatio cerebri, & membranarum, oportet sanguinem illum biliosum extrauasari, & in dictarum partium substantiam effundi, quod duobus præcipuè modis fieri consuevit, vel cerebro primario affecto, vel secundo.

Primario afficitur cerebrum, quando immediatè à causa aliqua externa incalescit, ut radiis solaribus, meri potu, irâ, & similibus, ut sanguis in venis cerebri commotus extra vasa feratur; quod etiam à vulnere, percussione, contusione capitis fieri potest. Et phrenitis hoc modo genita primaria phrenitis dici potest.

Secundaria verò phrenitis illa est, quæ febribus ar-

dentibus, vel malignis succedit, quando humoris morbifici portio ad cerebrum detruditur.

Fit enim plerumque in huiusmodi febribus, ut natura à causæ morbificæ malitia perturbata, illius portionem ad viscus aliquod deponat: unde videmus pleuritides, peripneumonias, anginas, hepatides, aliarumque partium inflammationes illis febribus superuenire. Ita si humores illi ad cerebrum transmittantur, veram phrenitidem efficiunt; & tunc febris delirium præcedit: in primarijs verò delirium ab initio cum febre apparet.

Signa phrenitidem imminentem indicantia sunt, vigiliæ, somni turbulenti, sermo immodicus, vrina primum crassa, mox tenuis, & diaphana; calor capitis. Hæc enim indicant materiam calidam ad caput ferri. Oculi immutantur, quia læso cerebro spiritu animali destituuntur. Dolor circa occiput perſentitur, quia venæ iugulares ad eam partem feruntur, & sanguinem biliosum refundunt.

Præsentem verò phrenitidem indicant, delirium assiduum, quia cerebrum indefinenter afficitur: vigiliæ turbulentiæ, ab intemperie calida cerebri productæ; respiratio magna & rara, quia phrenitici respirare obliuiscuntur. Cum enim per obliuionem, aut maximam mentis occupationem ab infinitis phantasmatis, quæ in imaginatione delira representantur, & spiritus animales auocant, rara fiat respiratio, magnitudine raritas compensatur. In phrenitide etiam sitis nulla est, aut saltem perexigua, quamuis præsentem sint intensæ sitis causæ, quia mens ægrotat, & quia animales spirituum ob læsum cerebrum non mittunt radios sufficientes ad eos ventriculi superius, ad quod sitis pertinet. Pulsus parvus est, quia cor compatitur: durus, aut membranam inflammata; celer & frequens, propter magnam necessitatem;

nonnihil vndosus, quia cerebrum afficitur. Febris etiam est continua, quia inflammatio cerebri necessario febrim accersit. Lingua denique aspera, & admodum nigra, vel citrina, propter vapores biliosos illius humiditates absumentes.

Hæctica phrenitis ex eo dignoscitur, iuxta Hippocr. præceptum 1. *prophet. text.* 3; quod in ea delirium sit mite, & obscurum, ægri non loquantur, & quieti maneant, atque dormire videantur.

Phrenitis vera à paraphrenitide distinguitur, ex eo quod affectus qui hanc producit, multò citius manifestatur, quàm delirium, & eo in grauescente, vel mitescente delirium intenditur, vel minuitur; imò per vires intermittit, & non est continuum. At verò paraphrenitis ex septi transversæ inflammatione orta, in qua delirium est continuum, aliis signis distinguitur. Quod nimirum in vera phrenitide respiratio est magna & rara; in ista verò parva & frequens. Parva quidem, propterea quod diaphragma inflammatione obsessum, non potest facile extendi & dilatari; frequens verò propter necessitatem, ut frequentia parvitas compensetur. Deinde in vera phrenitide vox est gravis, & in ea ægrotantes admodum vociferantur; in hac verò vox acuta, quia respirationis organum est impeditum. Ac denique in septi transversæ inflammatione hypochondria sunt sursum reuulsa, secundum Hippocrat. in *Coacis*. Et ratio, quia diaphragma inferiori parte tegitur membrana, à peritonæ, mutuata, atque ita dum inflammatur, peritonæum retrahit, & cum peritonæ hypochondria.

Causarum denique signa ex humoris in toto corpore prædominio, tum etiam ex modo delirij mutuari poterunt. Pallida etiam bilis phrenitidem efficit mitiorem, flava ferociorem, adusta ferocissimam. Sanguis verò

biliosus, omnium mitissimam & cum vsu coniunctam.

Prognosis huius affectus, vt plurimum lethalis est; pauci enim euadunt, quia pars nobilis grauissimè afficitur.

Maximam tamen solutionis spem præbent delirium cum risu, omnium symptomatum vehementia minor, virium constantia, tum si post summum morbi vigorem insignis aliqua euacuatio contingat, per sudores, hæmorrhagiam, alui fluxum.

Lethalem verò affectum ostendunt, lingua & manus tremulæ, stridor dentium, conuulsio, rigor in principio morbi apparens, & quando ægri floccos & sarcinas colligunt, festucas carpunt. Eiusdem efficacix sunt ad prognosim lethalem efficiendam, stilla sanguinis nigri è naribus emanans, albæ deiectiones, vrinæ albæ & pellucidæ. Hæc enim omnia significant magnam cerebri oppressionem, vel bilis à toto corpore in partem affectant translationem.

Ad huius affectu curationem sanguis ad caput affluens euacuandus, reuellendus, deriuandus, repellendus, interceptendus; qui iam affluxit euacuandus, & discutiendus est. Partis intemperies corrigenda, robur illius & totius corporis conservandum.

Hæc omnia præstari poterunt sequentibus remediis.

Ante omnia mox ab initio, & quacunq; dici horâ quia morbus est acutissimus, venæ sectio instituendo est, præmisso clystere, ex cephalica: vel si magna adsit sanguinis copia, ex basilica, vel mediana primùm, & post aliquot horas ex cephalica.

Si ex mensium, vel lochiorum, vel hæmorrhoidum suppressione malum oriat, saphena in pede aperienda. Postea da cephalicam veniendum, vt quod in capite receptum est, vel proximè in id mouetur, educi valeat.

Vnica phlebotomia ad huius affectus curationem ut plurimum non sufficit, sed bis, ter & amplius in principio vel augmento morbi, pro humoris copia & conditione, ægrotantis ætate, temperie & viribus, repetenda.

Si febre continuâ laboranti phrenitis superuenerit (ut non rarò fit in earum febrium augmento vel statu, naturam errantem, & materiæ morbificæ inalignitate perturbatam, biliosos humores ad caput transmittere,) licet antea ratione febris sanguis detractus fuerit, repetenda est venæ sectio. Sed quia vires à febre, & prægressâ euacuatione; debilitatæ sunt parcius sanguis detrahendus est. Idèd tunc temporis vena cephalica aperiat, vel si vires id non ferant, saphena in alterutro pede vel utroque, cuius venæ in talibus morbi apertio plurimum utilitatis affert. Neque minoris tamen est efficaciæ hæmorrhoidum apertio per hirudines.

In omni autem venæ sectione, quæ præsentè delirio fit, hoc obseruandum, ut foramen non amplum fiat. Sic enim vulnus citò coalescit; quod etiam accuratè obligandum est, ne ab ægro dissoluatur. Tum ad promptiorem coalitum utile erit emplastrum ex aloë, albumine oui, & pilis leporinis paratum applicare.

Post venæ sectionem prouocetur somnus. Nam si à sanguine euacuato procedant vigiliæ, de nouo accensis humoribus æger ferocior euadit. Conciliatur verò somnus tum repellentibus remediis sincipiti admotis, tum etiam refrigerantibus, & hypnoticis, quorum seriem infra proponemus.

Cum venæ sectioni non est locus; cucurbitulæ cum scarificatione profunda applicentur, primò partibus inferioribus, postea superioribus. Tum etiam cucurbitulæ non scarificatæ cruribus & alis partibus applicentur.



Frictiones in iisdem partibus, & ligaturæ in tibiis celebrentur reuulsionis gratiâ. Vesicatoria etiam scapulis & brachiis vtiliter admoueri poterunt.

Clysteres singulis diebus iniiciantur, ex refrigerantibus & humectantibus parati: his enim humorum acrimonia temperatur, eorumque motus ad inferiora promouetur. Eorum autem formula talis esse poterit.

℞. Radicum althææ ʒ. j. foliorum maluæ, violarum, lactuæ, parietariæ, betæ, ana M. j. florum nymphææ & sumit. anethi, ana P. j. prunorum par. vj. Coquantur in aqua hord. In colaturæ lb. j. dissolue cassiæ recenter extractæ, & diaprun. simpl. ana ʒ. vj. sacchari rubri ʒ. j. Fiat clyster.

Huiusmodi clysteribus ne misceatur olea, quia faciliè inflammantur.

Purgatio in Phrenitide primaria, quæ scilicet alteri morbo non succedit, nullo modo conuenit. In ea, verò, quæ feбри continuæ superuenit, aliquando confert. Si nimirum magna sit cacochymia, & phrenitis incipiens: tunc enim materia est errabunda, & pro turgente habetur, atque adeò ex consilio Hip. *Aphor. 22. sect. 1.* per initia statim euacuanda est.

Purgatio autem debet institui ex decocto refrigerante, cum purgantibus benignioribus, vt sennâ, rhab. cassiâ, tamarindis, catholicone, & syrupo rosaceo.

Statim verò post venæ sectionem ad repellentia veniendum est, quæ humorum ascensum impediunt, caputque refrigerant. In hunc finem oxyrrhodina vsurpantur, quæ ex oleo rosaceo, & aceto ab antiquis componebatur. Recentiores verò aquas stillatitias & succos herbarum adiiciunt; & magis vel minus refrigerantia ac repellentia fiunt, prout magis vel minus fluxio & inflammatio vrget, cui rei diligenter attendendum est. Ideò plures eorum formulas hîc describemus,

vt casibus particularibus aptiores eligi possint.

℞. Ol.rosac.℥.ij.aceti rosac.℥.j.aquæ rosar. & plantaginis,ana ℥.ij. Admoueantur sincipiti raso, & temporibus cum panntis quadruplicatis. Vel

℞. Aquæ rosar.℥.iv. olei rosac. ℥. ij. acetī rosac. ℥.β. albumina ouorum n.ij. Conquassata misceantur. Vel

℞. Ol.violar.rosar.nymphææ,an.℥.β. aquæ rosar. lactucæ,semperuiui,ana ℥.ij.aceti ℥.β. Misce. Vel

℞. Succī lactucæ,portulacæ,solani, vmbilici Vener. ana ℥.ij.ol.rosac.℥.ij.aceti rosac.℥.j. Misce. Vel

℞. Ol.rosac.omphac.℥.j.β.vnguenti popul. recentis, ( nam verus qualesfacit ) ℥. j. acetī rosac. ℥.β. albumen oui n.j. Agitentur omnia simul, excipiantur stupis canabinis,& applicentur.

Lac mulieris quæ puellam peperit,cum succo lactucæ, & oleo rosaceo subactum,instar oxyrrhodini admotum, mirè delirium cedit.

Circa huiusmodi refrigerantia hoc obseruandum, vt cautè,& cum iudicio vsurpentur, cùm cerebrum suapte natura frigidum sit, & membrum princeps: ac metus sit,ne diuturniori horum remediorum vsu æger in contrarium affectum, scilicet comatosum, inducatur, præsertim si senex fuerit, aut admodum debilis. Ac licèt nunc longiori, nunc breuiori tempore eorum vsus continuandus sit, tamen circiter ad dies tres potest extendi.

Vt verò ista medicamenta non faciliè disfluant, sicque oculos & faciem aliásque partes inquinent, corona ex panno lineo,vel lana conuoluta anteriori capitis parti imponatur, vt caput circumdet parte anteriore, in media fronte, lateribus, supra aures. Parte posteriore, versùs occiput, & in medio coronæ remedia applicentur. Ista verò remedia, iuxta Gal. præceptum. 2. de compos. med. cap. 2. hyeme actu calida, vel tepida,

tepida, & state frigida applicanda sunt. In sene tamen aut debili melius est actu frigida non admouere.

Si inflammatio ad cutem & partes exteriores vergere videatur, quod nunquam accidit, tunc temporis à repellentibus, præsertim fortioribus, abstinendum est, ne materia ad cerebrum repulsa grauius malum efficiat.

Ad humoris quoque ad caput fluentis impetum interceptiendum, fasciæ aquâ rosar. & aceto madidæ inter initia collo circumiiciendæ.

Cautica tibiis admota humorum reuulsionem ad inferiora plurimum adiuuant.

Interim dum hæc fiunt, quæ totum corpus & præcipuas partes refrigerant, tum interna, tum externa, in usum reuocanda sunt.

Interiùs vsurpari poterunt iulepi, emulsiones, & electuaria.

℞. Aquar. lactucæ, portulac. rosar. & papau. rhæados, ana ℥. iij. syrupi violac. & granat. ana ℥. j. β. salis prunellæ ℥. iij. Fiat iulep. pro. iij. dosibus, bis aut ter in die sumendis. Vel.

℞. Flor. lactucæ, portulacæ, plantag. ana M. ij. flor. nymphææ, & violar. ana P. j. Coquantur in aqua hord. ad lb. j. In colat. dissolue syrupi violac. ℥. iij. salis prunellæ ℥. iij. Fiat iulep. pro iij. dosibus.

Iulepis perpetuò præter salem prunellæ, optimum erit spiritum sulphuris, aut vitrioli admiscere, his enim bilis feruor optimè temperatur.

℞. Quatuor seminum frigidorum mai. mundat. 3. vj. sem. papau. albi 3. ij. aquæ hord. lb. β. aquar. lact. & nymphææ, ana ℥. ij. aquæ rosar. ℥. j. Fiat emulsio secundum artem pro duabus dosibus, addendo syrup. violac. ℥. ij.

℞. Conferuæ violar. & rosar. ana ℥. j. conferuæ flor. nymphææ, & caulium lactucæ condit. ana ℥. β. pulu.

electarij diamarg. frig. 3. s Cum syrupo violaceo fiat electuarium.

Parari etiam potest electuarium ex sem. papau. albi int mortatio marmor: contuso, & cum saccato permixto; quod diacodium albuin potest nominari; humores enim calidos & acres temperat, & somnum conciliat. Fit ex sem. papau. 3. j. contuso cum tantillo aquæ rosar. deinde adde sacchari 3. ij. vel vtriusque partes æquales.

Exterius verb admoventur epithemiata refrigerantia cordi & hepati.

℞. Aquæ rosar. 3. iv. aquar. borrag. bugloss. & acetos. ana 3. ij. aceti vini albi 3. s. pulu. trium santal. 3. j. s. spodij 3. s. ligni aloës 3. j. croci grana viij. camphoræ ʒ. vj. Fiat epithema cordi.

℞. Aquar. lactuc. & rosar. ana 3. iiij. aquarum endiu. & portulac. ana 3. ij. aceti rosar. 3. j. santali albi; rubri, spodij, ana 3. j. camphoræ, & spicæ nard. ana gr. vj. pulu. electarij diatrihod. abbat. 3. j. Fiat epithema hepatis.

Item hepatis & lumborum regio inungatur sequenti linimento:

℞. Vnguenti rosar. 3. j. s. cerati santalin. 3. j. succi lactuc. & olei rosar. ana 3. s. Fiat linimentum.

Pectus etiam oleis relaxantibus, vt violaceo, inungatur.

Testes linteis oxycrato madadis inuoluantur, vel quod erit præstantius, aqua rosarum cum tantillo aceti vsurpetur.

Lotio pedum ex decocto refrigerante aëti calido commendatur: nam calore humido eas partes relaxat, & humorum motum ad inferiora promouet. Frigiditas verò illius potentialis per nervos toti corpōri, & cerebro in primis communicatur, somnūque conciliatur. Illius autem formula talis est.

℞. Fol. violar. maluar. salicis, vitis, nymphaeæ, ana

M.ij. flor. nymphaeae, rosar. ana M.j. cap. papaverum n. x.  
Fiat decoctio ad usum dictum.

Aqua pura ad lotiones pedum sufficere potest, in qua subfrigida si pedes aegrotantis mergantur per tres aut quatuor horas, à delirio liberatur, somnusq; conciliatur.

Similem effectum praestat sedum maius contusum instar cataplasmatum, & plantis pedum admotum; tum etiam cucurbita contusa, & eodem modo appositae.

Odoramenta etiam naribus frequenter admota cerebrum refrigerant, in sequentem modum parata.

℞. Florum violatum, nymphaeae, ana P.j. rosar. P.ij. Santali citrini ʒ. j. Ligentur in nodulo raro, qui aqua rosar. adpersus naribus offeratur. Vel

℞. Santali citrini, flor. rosar. nymphaeae, ana ʒ. j. camphorae ʒ. β. Includantur in vase angusti orificij cum aqua rosar. & supra ignem ebulliant, vaporque naribus excipiat.

Quia verò in hoc affectu vigilae maximè vigent, omni arte somnus conciliandus est, ab ipso morbi initio. Cui usui non parùm conferunt repellentia medicamenta antea proposita. Praesertim si ante oxyrrhodini admotionem caput oleo violaceo frigido perfundatur; quod in vigiliis maximè proficuum est, tum etiam convulsionibus ex hoc morbo oriundis. Id ipsum tamen efficacius sequentia praestare poterunt.

℞. Capit. papau. albi cum sem. n. vj. florum nymphaeae P.ij. Contundantur omnia, & cum aquae rosar. & lactucae q. s. fiat instar cataplasmatum, quod fronti applicetur duobus linteis incrusum.

Nota, in medicamentis somnum conciliantibus acetum non esse permiscendum, nisi si quantitate paucissima, quia vigilias excitat. Vel

℞. Flor. lactu. M. j. β rosar. M. β. som. papau. albi ʒ. β. Coquantur in aqua ad mollitiem. Contusis addit fari-

nae hordei, lactis muliebri, ana ℥. ʒ. ʒ. ol. violac. q. s. Misceantur pro fontali. Vel

℥. Gl. violac. nymphaeae, vnguenti populi, recent. ana ʒ. iij. opij, olei nuc. mosch. ana gr. iij. Misce; fiat linimentum, quo frontis & tempora inungantur.

Sedum maius contul. & cum lacte muliebri mixtum; incipiti admodum inire sedat phrenitidem; & somnum conciliat. Sed statim ac dormire ceperit aeger, detrahendum, ne in comam præcipiterut. Ramenta cucurbitæ recentis idem præstant, & minori periculo.

Penotus sequens epithema miris laudibus effert; quod sic habet.

℥. Moschi gr. xij. camphoræ gr. xx. aquæ ros. rubrar. cum tinctura santalorum rubror. imprægnatæ ʒ. xx. Misce. Capite derafo madefiant lintea duplicata in hoc liquore, & tepida per omnes capitis suturas applicentur. Vbi resiccata fuerint, iterum imbibe, & per 24. horas applicationem continua, & somno conciliato, cerebroque confirmato, ægrum mirifice conualescentem pro species, nisi ipsamet cerebri substantia fuerit corrupta.

Interius vero cum iulepis; aut emulsionibus inter-dum exhiberi poterit syrup. de papau. ʒ. j.

Vel ladani opiati gr. iv. aut v. exhiberi potest, quod etiamnum in clysteribus usurpatum; satis potenter; & tutius somnum conciliat.

Attamen in narcoticorum usu cautus esse debet Medicus. Exhiberi enim non debent, si vires sint valde debiles, ne spiritus & calor ab iis extinguatur.

Celebratis sufficienter prædictis materiæ fluentis euacuationibus, reuulsionibus, derivationibus; & interceptionibus; ad materiæ fluxus educationem veniendum est. At primum vena frontis aperienda, si manifesta sit; & secari possit, fasciâ collum non astringendo, ut vulgo solet fieri; sic enim sanguis sursum impellitur.

Utilissime etiam aperientur venæ narium, & si villo modo morbus est sanabilis, hoc præcipue curabitur: sanguisque satis copiose per eas emittendus, idque satis mature, & statim post vniuersales euacuationes faciendum est. Aperiantur autem huiusmodi venæ, nares interius seris aliisque asperis frequenter pungendo atque lancinando. Vel adhibitis post aures, naribus, fronti, pedicis, hirundinibus sanguis exsugendus est.

Capiti verò applicentur resoluentia simul cum repellentibus, eâ proportionē, ut primò parum addatur de resoluentibus; quo verò morbus magis ad declinationem vergit, eorum quantitas augeatur, ut tandem sola resoluentia vsurpentur, ad materiæ morbificæ reliquias discutiendas. In hunc finem vsurpari poterit oleum chamæmel. vel anethinum, cum oleo rosæ, permixtum.

Sed inter resoluentia primas obtinent animalia tenella mactata, capiti statim adinota, vel eorum partes, ut pulli columbini, gallinacci, catelli per spinam secti, & pulmo veruecinus: suo enim calore naturali partem roborant humorem discutiunt, illiusque acrimoniæ contemperant.

Quibus vno aut altero die tentatis, si nihil commo- di consequaris, docet Mercatus summo capiti cucurbitulam affigere, ut per suturas aliquid expiret euoceturque ad cutem: ac si rubor compareat ac tumor subtus cucurbitulam, ipsam scarificare. Quo auxilio asserit Medicum consequi posse, quod reliquis omnibus non valuerit, inaximè si mox adhibeatur lauacrum, aquæ dulcis, in quo aliquid ex discutientibus coctum sit. Hoc tamen monet, in ea solùm inflammatione faciendum esse, quæ per se inceperit, non autem aliis febribus superuenerit.

Hoc remedium confirmat Zacutus Lusitanus, referens se desperatam phrenitidem curasse, admota sin-

capiti cucurbitulâ cum scarificatione.

Quidam maiori audaciâ vesicatorium sincipiti admovent, quod aliquando successisse aiunt; sed maxima indiget præmeditatione.

Pro potu utatur ager decocto hordei, vel rad. acetosæ, cum syrupo granatorum, berberis, aut limonum. Vel sequens infusum propinetur.

℞. Aquæ fontis lb. ij. fol. acetosæ, & papau. rhœados, ana M.ß. flor. borrag. nymphææ, violar. ana P.ß. spiritus vitrioli 3. j. fantali rubri limati 3. ij. Stent in infusione per aliquot horas frigide. Colentur per chartam emporeticam, addendo sacchari albi q. s. ad saporis gratiam.

Vrina in hoc morbo ut plurimum supprimitur, quia ægri eam emittere negligunt, unde partes illæ distenduntur, ac tandem inflammationem concipiunt, quæ vel sola agro interitum asferre potest. Itaque ægri ad urinam reddendam sæpius incitandi sunt. Mox vesicæ regio fouenda aquâ tepidâ Dein manu comprimendo vrina propellenda, aut ea elicienda penem contrectando. Et si leuioribus hisce symptoma non cedit, ad sequentia veniendum erit.

℞. Fol. parietariæ M. ij. petrosel. cum rad. M. j. Fiat decoctio. In colatura dissolue olei scorpionum 3. iij. Fiat fodus supra pæcinem.

Huius decocti residua frigatur in sartagine cum oleo scorpionum, & post fodus applicetur.

Si decoctum efficacius desideretur, adde sem. apij, petroselini, milij solis, seseleos, ana 3. ij.

Utiliter etiam post fodus, sequens vnguentum potest applicari.

℞. Pinguedinis cuniculi, olei scorpionum, ana 3. ij. sem. apij, petros. asari, & seseleos subtiliss. puluerat. ana 3. 6. Fiat vnguentum.



## CAPVT XII.

*De cerebri abscessu, & sphacelo,*

**C**erebri abscessus, & sphacelus à paucissimis Auctoribus describitur, licet ab Hippocrate annotatus fuerit 3. de morbis, & in vsu practico interdum occurrat, minusque exercitatos Medicos alterius morbi specie deludat.

Est autem cerebri sphacelus substantiæ cerebri suppuratio, vel corruptio, quæ gangræna, vel syderatio etiam nominatur.

Causa illius immediatæ est cerebri substantiæ inflammatio. Quæ tamen à phrenitide distinguitur ex eo quod in ea membranæ potissimum inflammantur, & ab iis inflammatio parti tantum exteriori & contiguæ communicatur. In hac verò inflammatio partes cerebri interiores, ac totam propemodum illius substantiam occupat. Magna autem illa inflammatio in parte mollissima & humidissima breui sphacelum acceperit.

Huius inflammationis causa est sanguis supercalefactus, vel admodum biliosus, in cerebri corpus & partes eius internas affatim irruens.

Causæ procatareticæ sunt illæ omnes, quæ sanguinem calidum copiosum in toto corpore cumulare, & ad caput transferre valent, vt exercitatio vehemens, insolatus, vel capitis ad ignem calefactio, ira, & similia. Sed frequentius hunc affectum inducere solent vulnera capitis grauiâ, & contusiones. Ab hac tamen causa oriundus abscessus, vel sphacelus, à prædicto diuersus aliquo modo est. Quia ex contusione factus abscessus, tot cerebri partes vix plurimum non occupat.

sed vni præcipuè adhæret. Vnde symptomata leuiora, fâtem ab initio esse solent, & affectus ad plures dies prorogatur.

Signa abscessus & sphaceli, qui sine vulnere aut contusione producitur, ita se habent.

Inuadente affectu ingens capitis dolor ægotantem adoritur, qui per occiput collo & vniuersâ spinâ communicatur. Cui mox succedit sensuum omnium tum internorum, tum externorum abolitio, sicut in apoplexia contingit, à qua tamen signis infrâ describendis distinguitur.

Variis motibus & inordinatis sese ægri exagitant, vt vix in vno loco contineri valeant. Manibus interdum partes superiores inuadunt, easque diuellere ac laniare conantur, faciem vnguibus dilacerant, crines auellunt. At procedente morbo corpus languescit, & ad motum impotens efficitur.

Febris acutissima & intensissima hunc perpetuò comitatur affectum, quæ ab ingenti cerebri inflammatione procedit.

Denique in hoc affectu ægotantes neque cibum, neque potum admittunt, vixque aliquid in stomachum illorum quocumque artificio ingeri potest, vnde citâ aduenit virium exolutio.

Abscessus ex vulnere aut contusione genitus sequentibus signis dignoscitur. Post acceptam contusionem capitis torpor quidam & mœstia apparet, animalibus spiritibus à materia extraneâ labefactari incipientibus. Morbo inualecente, febricula exoritur, materiâ putrescere incipiente. His capitis dolor succedit, & somnolentia. Mox aucta putredine omnia symptomata ingrauescunt. Febris intensior euadit; æger è profundiori somno emergens subito vociferatur, surgit è lecto, statimque iterum decumbit. Frequenter manum ad caput adducit,

Ex his plerique ante obitum purulentam materiam, & virescentem ore, aut naribus reiciunt.

Quod ad prognosim spectat, affectus iste periculosissimus est, & ut plurimum lethalis, imò intra triduum ægrotantes interimit, ut docet Hipp. Aphor. 51. sect. 7. Quibus, inquit, cerebrum sphacelatum est, in tribus diebus pereunt; si verò hoc evaserint, sani fiunt. Galenus in comment. docet per sphacelum hinc non esse intelligendam factam & completam partis corruptionem, quoniam hæc sapationem non admittit; sed quæ est in fieri, imminetque ob inflammationis magnitudinem.

In iis qui convalescunt (quod rarissime contingit) nulla est præteritorum memoria: ægri enim nec morbi, nec alterius rei ad morbum pertinentis meminerunt.

Ad curationem huius affectus magna festinatione opus est. Nisi enim in principio illius remedia statim adhibeantur, nullus amplius superest curationi locus.

In prima igitur morbi invasione statim sanguis detrahendus est; magnâ copiam; & iteratis vicibus, bis, ter, quater eadem die, quantum vires ferre possunt; in hoc enim unico remedio tota curationis spes residet. Cum enim magna sanguinis copia cerebri substantiam occupet, (quæ magna est, mollis & humidissima,) ab ea sufficienter reuelli ac deriuari nequit, nisi totus ferè sanguis in venis contentus educatur. Et in hoc casu locum habet vulgaris illa Celsi sententia, multa in præcipiti periculo rectè fiunt, quæ aliàs essent, omittenda.

Cum venæ sectionibus clysteres acriores incidendi sunt; ut humores superiora petentes ad inferiora reuelantur, & singulis diebus iterandi,

Eodem tempore oxyrrhodina admouenda sunt sinu-  
piti, & fronti, qualia in phrenitide descripta sunt.

Ad maiorem reuulsionem & deriuationem, cucurbitu-  
lae scapulis & dorso cum profundis scarificationibus ad-  
mouendae sunt, frictiones & ligaturae extremorum ce-  
lebrandae, venae primum malleoli, postea frontis, & arte-  
riae temporum aperiendae; hirundines pone aures, & haer-  
morrhoidibus applicandae; vesicatoria ceruici & bra-  
chiis adinouenda, & reliqua remedia usurpanda, quae in  
phrenitidis curatione à nobis proposita sunt.

Ac tandem si morbus ad declinationem vergat, lo-  
piter resoluentia capiti admouenda sunt, inter quae pul-  
mones veruecini ex animali ex tempore mactato calen-  
tes, principem locum obtinent,

## C A P V T VIII.

### *De Mania,*

**M**Ania est delitium sine febre, cum furore, & au-  
dacia.

A phrenitide distinguitur, quia in ea febris acuta  
viget, à cerebri & membranatum eius inflammatione  
oriunda. Mania verò febre caret, saltem ratione pro-  
priae essentiae; nihil enim impedit, quin febris cum ma-  
nia complicari possit, sed ab alia causa oriunda, non  
autem ab ea quae maniam producit. Atque adeò in  
phrenitide febris est symptomatica; in mania essentialis  
& primigenia, ab alia causa procedens; & sic Gal. cap. 3.  
de loc. affect. cap. 7. explicandus est. *Quemadmodum,*  
inquit, *alter atra bilis succus, qui ex praassata flaua bile*  
*nascitur, forina deliramenta inducit, modo sine febre, modo*  
*cum febre.*

A melancholia distinguitur per symptomata pathognomonica; siquidem mania est cum furore & audacia, melancholia verò cum timore & mæstitia.

Causa mania proxima & immediata, iuxta Galeni mentem, est calida & sicca intemperies ab humore atrabilario oriunda; quæ tamen gravissimis vrgetur difficultatibus.

Si enim tanta esset intemperies in cerebro, ut mentem de sua sede deicere valeret, febrem deberet parere, cum calor remissior delirium efficere non valens, febrem pariat, qualis est ea quæ ab insolatu exoritur.

Ad hoc dubium varij varia respondent. Solidiorum responsio est, calorem qui febrem excitat, debere esse fuliginosum, ut ad cor delatæ fuligines febrem efficiant; & calorem fuliginosum, in materia humida consistere debere, qualis est materia febrium putridarum; In mania verò humores esse adustos & incineratos, ita ut ab iis nullæ eleventur fuligines. Vno verbo aiunt; calor in mania est velut in pruna, in febribus verò ut in flamma.

Hæc tamen responsio fortissimâ vrgetur instantiâ, Quod nimirum in febre hæctica maior sit humiditatum cōsumptio, quàm in mania. Attamen febris vsq; ad integram & absolutâ omnium humiditatû, & ipsius humidi primigenij consumptionem, ægriq; interitum perseveret.

Platerus hac ratione aliisque nonnullis persuasus, existimat præter calidam & siccam intemperiem, adesse queque malignam & venenatam quandam qualitatem, quæ sit præcipua causa delirij. Magna huius sententiæ probabilitas inde elici potest, quod furor utrinus à semine corrupto & malignam ac venenatam qualitatem adepto exoritur. Quod hydrophobia, quæ est species mania, à morsu venenato canis rabidi in quocumque temperamento sine atræ bilis cō-

curſu inducitur ; morbus qui à morſu Tarantula exoritur , quædam etiam mania ſpecies appellatur , ac denique venena quædam maniam inferre poſſunt , vt de cerebro muſtelæ & ſolano maniaco referunt. Ideo veriſimile eſt , peculiare quoddam venenum in corpore humano genitum mania cauſam eſſe præcipuam ; cum etiam febres malignæ , quæ non raro mitiſſimæ ſunt , vt in iis pulſus ac vrinæ ſanis ſimiliſimæ appareant , deliria producere ſoleant potius quàm febres ardentes malignitatis expertes. Et docet experientia , maniam contingere frequenter , non tantum atrabilario temperamento præditis , ſed etiam omnibus naturis & ætatibus , præſertim ſi hæreditario iure contingerit , ac denique illam calidioribus medicamentis , ſpecifica virtute præditis , non raro curari. Et ſi diffiteri minimè oporteat in melancholicis & atrabilariis hunc morbum frequentius & vt plurimum produci , quia ille humor tali veneno ſuſcipiendo magis idoneus eſt. Et Galenus ipſe malignitatẽ iſtam humori atrabilario aduenientem agnoſcere videtur *comment. Aphor. 56. tract. 6.* vbi dicit mania cauſam eſſe melancholicum humorem , non ſemper , ſed cum ſupra modum exuſtus aut putrefactus malignam inducit acritudinem.

Sed manet adhuc difficultas ex eo deſumpta , quod maniaci frigus externum etiam hyemis tempore nudato corpore innoxie patiuntur , & præterea ad tactum calidi ſentiuntur , quod indicat calorem intenſiſſimum in iis vigere.

Verum reſpondemus hoc in omnibus maniacis minimè contingere , & multos hybernũ frigus auerſari , veſtibusq; plurimis gaudere. Alios verò ab aëre externo non affici , propter conſuetudinem , quia ab aſſuetis non ſit paſſio. Sic videmus puellas delicatulas hyemis tẽpore pectus denudatũ habere , quod tactu calidũ ſentitur.

quàmuis ex Hippocrate frigus sit pectori valdè inimicū.

Materia hunc affectum produciens in venis & arteriis continetur, vel totius corporis, vel cerebro propriis, vel ipsis cerebri vasis: & ex locorum varietate varia symptomata eaque graviora, vel leuiora emergunt. Non raro etiam in vteri vasis; ex sanguine vel semine corrupto, materia morbifica continetur, ex qua furor vterinus generatur.

Si materia peccans est in omnibus venis, aut cerebro vicinis, insania sit perpetua & indefinens. Si verò in parte tantum aliqua concludatur, delirium tunc temporis quoddam habet intermissiones; & per intervalla recurrit.

Signa diagnostica alia imminuentem, alia presentem maniam significant.

Ad imminuentem vel futuram maniam dignoscendam primò consideranda est ægrotantis natiua dispositio, quæ scilicet ad biliosam seu atrabilariam temperiem accedit. Sic apud Hippoc. 1. epid. 5. *cui vena in cubito pulsatur, furibundus est, & ad iracundiam præcepit, cui verò sensim mouetur, torpens ac stupidus.* Arterias nomine venarum Hippocrates afficit. Non autem simplicem pulsationem intelligit; sed vehementem, cui opponit illud; *quando sensim mouetur*; ut census huius sententiæ ita se habeat. Qui habent pulsum magnum velocem & vehementem à natiua constitutione ad iram & furorem maximè præclives sunt: qui verò tardum habent pulsum, torpidi sunt & stupidi.

Secundo, sexus ratio habenda est. Viri enim frequentius furore exagitantur; quàm mulieres. Quod intelligendum est de affectu primogenio; ex vtero enim mulieres non raro in furorem aguntur.

Tertio, ætas consideranda est. Iuuenibus enim frequentius mania contingit, quàm pueris & senibus.

Quartò anni tempus aduertendum. Sæpè enim vèro tempore contingit hic affectus, sæpiùs æstate, sæpi-  
simè autumnò, ex Hip. & Gal. *sententiis Aphor. 20. 21. & 22. sect. 3.* Vere humores aliis temporibus geniti, & per  
hyemem assèruati ac quiescentes, commouentur & exa-  
gitantur, morbosque analogos pariunt. Æstate multa  
bilis, non solùm flaua, sed etiam atra in dispositis gigni-  
tur, quæ maniam efficit eodè tempore, vel ad autum-  
nũ usque maiori cõpia cumulata, morbum tunc tem-  
poris producit.

Hæc signa rēmotiora sunt, & in genere tantũ dis-  
positionem ad hunc morbum significant. Proximè verò  
imminentem affectum ostendunt, dolor capitis assiduus,  
vigiliæ contumaces, somni leuissimi atque breuissimi, in-  
somnia turbulenta, curæ & sollicitudines molestæ, terro-  
res ex leui causa, præceps & frequens iracundia ex mi-  
nima vel nulla occasione, splendores oculis obuersantes,  
aurium sonitus, procliuitas ad venerem insueta, pallutio  
nocturno frequentior, risus præter assuetudinem & ra-  
tionem, loquacitas insueta, & ferè assidua, & interdum  
taciturnitas meditabunda. Posteriora hæc incipientem  
maniam significant.

Factam verò, & præsentem maniam ostendunt ea  
quæ in definitione prolata sunt, nempe delirium sine  
febre, cum furore & audacia. Variatamen sunt huius-  
modi deliria in variis ægotantibus, tum etiam in iis-  
dem, diuersis temporibus, pro maiori vel minori causæ  
vehementia. Alij enim feroci iracundia rapiuntur, &  
obuios quosque inuadunt, proprias vestes proscindunt,  
& sibi interdum violentas manus inferunt, sibi que vi-  
tam eripere conantur. Alij verò mitiores & pacatiores  
sunt, nullamque astantibus noxam inferunt, sed tantum  
varios sermones & ridiculos proferunt; interdum ea-  
nunt & ridet, & variis deliramentis afficiuntur, ac



ſymptomata patiuntur iis aliquo modo ſimilia, quæ in melancholia & ſtultitia ſolent contingere.

Ex illa autem varietate ſymptomatum, cauſarum varietas dignoſcitur. Riſus enim immodicus, hilaritas & cantillatio materiã peccantem multo ſanguine dilui ſignificant; iracundia verò, inquietudo, clãſior, percuſſio, pallidus & flauescens faciẽi color, bilem flauam in vitio eſſe oſtendunt. Inſania verò admodum furioſa, ut ægri obuios impetant, & aliquãdo interficiant, à flaua bile exuſta, quæ atra bilis dicitur, ducit originem. Si verò atra bilis non ex flaua bile, ſed à melancholia exuſta & præaſſata generetur; ægri iraculento vultu præditi ſunt, nãnet interdum in diuturno ſilentio, quod nonnunquam in ſermonem importunum erumpit, immites ſunt, pertinaces, ingenti mœrore interdum ac luſtibus afficiuntur.

Prognosis huius affectus in hunc modum instituenda eſt.

Mania grauiffimus eſt affectus, & non ſolum per menses, ſed per annos aliquando & uſque ad mortem perſeuerat, præſertim ſi hæreditaria ſit. Cùm omnes morbi ab atra bile ſint curatu difficillimi, iſte præ cæteris difficilior eſt, quod ægri medicis non obtemperent, & neceſſaria remedia uſurpare minimè velint.

Faciliùs curatur mania quæ cum riſu, & mitioribus ſymptomatis copulata eſt, quàm quæ cum ſtudio ac furore.

Bræui ſuccelluram morbi curationem oſtendunt quæcumque euaꝑuationes ex motu naturæ contingentes, per ſudores, alui fluxum, hæmorrhagiam per nares, aut hæmorrhoides, aut ſi varices ſuperuenerint: unde Hipp. Aphor. 21. ſect. 6. *Si inſanis varices, aut hæmorrhoides conſtigerint, morbi ſolutio fit.*

Dysenteria, aut hydrops, aut febris tertiana, vel quartana mania superueniens; eam tollit: fit enim metastasis humorum à cerebro ad partes inferiores, in quibus nouum morbum producant.

Ad huius morbi eurationem materia peccans euacuanda, reuellenda & repellenda est; calida intemperies corrigenda; cerebrum aliaque partes principes roborandæ. Quæ omnia sequentibus præfidiis adimpleri poterunt.

Primò sanguinis missio celebranda est, præmisso clystere, ex vena brachij insigniori: postridiè verò iteranda ex altero brachio, idemque remedium frequenter vsurpandum. Afferit enim Platerus innumeros hac ratione curatos fuisse à Chirurgis & aliis, qui ex professo hisce morbis curandis operam dabant, qui vigesies, imò sexagesies venas aperiebant. Non solum enim venæ brachij vtriusque, sed etiam malleoli, frontis, narium, hæmorrhoidum, etiam varices si appareant, & saluatellæ; idque per interualla, interiectis clysteribus, & medicamentis purgantibus infra describendis. Cucurbitulæ etiam scapulis & dorso cum sacificatione admotæ post multas venæ sectiones: tum etiam hirudines temporibus, & ponè aures, vtilissimæ sunt.

At frequentibus illis phlebotomiis materiæ peccantis præparationes & purgationes interiiciendæ sunt; eaque diu, multumque continuandæ. Cui vsui conferent ea omnia, quæ ad bilis & melancholiæ præparationem & expurgationem vsurpari solent, quibus & sequentia, utpote selectiora, adicere possumus.

℞. Lapid. lazuli ʒ. j. β. diagryd. ʒ. β. turbich. ʒ. j. sennæ. ʒ. β. epithymi, freinor. tartari, ana ʒ. ij. cinam. & cort. citri, ana ʒ. j. croci ʒ. β. fiat puluis, cuius dosis erit ʒ. j. vel ʒ. iv. cum iusculo, vel liquore appropriato.

℞. Rament. helleb. nigri ʒ. j. Infundantur per triduum  
in

in aqua pluuiæ, ℥.iiij. Decoquantur lento igne ad tertias. Colaturæ adde mellis optimè despumati ℥.ij.

Misce, capiat cochlear j. cum iusculo pingui. Vel

℥. Extracti hellebori nigri ꝑ. β. syrupi violac. ℥.j. Misce pro vna dosi.

Omnia medicamenta ex helleboro confecta, vt vinum, syrupus & oxymel, ad huius affectus curationem plurimum conferunt. Vnde olim ferunt Melampus Amythaonis Medici filium, vino helleborato Præti Argiuorum regis filias, quæ se boues existimabant, liberaſſe.

Antimonium in hoc morbo non ſolùm à Chymiatis, ſed etiam Galenicis omnibus commendatur, tum quòd humorem attrabilarium è toto corpore euacuat: tum quia eo ægrotantes commodè falli poſſunt, remedia alioqui inſuauiâ renuentes. Doſis varia eſt pro variis illius præparationibus.

Balnea aquæ tepidæ frequenter & poſt ſingulas purgationes uſurpanda ſunt.

Ordo medicamentorum purgantium in hoc morbo talis eſt, vt primò apozema alterans & purgans per tres aut quatuor dies exhibeatur, poſt venæ ſectionem in utroque brachio celebratâ. Deinde purgantia mediocria ex potionibus, pilulæ, aut ſyrupo magiſtraliſ bis in ſeptimana exhibeantur. Vehementia verò bis in menſe, interiectis continuo venæ ſectionibus, vt antea dictum eſt.

Diebus verò intermediis balnea, iulepi præparantes, aut iuscula alterantia, tum etiam opiathæ roborantes exhibeantur.

Præter iulepos vulgares, ſequens ex ſuccis paratus erit vtiliſſimus.

℥. Succorum borrag. bugloſſ. & pomor. redol. an. ℥. iiij. aquar. fumariz & ciehor. ana ℥. iv. ſacchari albi ℥.

vj. Coquantur, deputentur, & aromatisentur fantaro citrino. Capiat  $\mathfrak{z}$ .vj.manè & serò.

Opiata etiam in sequentem modum concinnari poterit.

$\mathcal{L}$ . Conferuæ rosar. violar. & bugloss. an.  $\mathfrak{z}$ .j. conferuæ flor. tamarisci & caryophylli hortensis, caulium lactuc. condit. & cortic. citri condit. ana  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . myrobal. emplsc. condit. n. j. confect. alkerm. & d. chycint. ana  $\mathfrak{z}$ . iij. pul. elect. diamarg. frig. & lætif. Gal. ana  $\mathfrak{z}$ .j. coral. præpar. & margarit. præpar. ana  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . Cum syrupo de pomis redol. fiet opiata, de qua capiat ad magnitudinem castaneæ, superbibendo parùm iulepi, aut aquæ cuiusdam appropriatæ.

Tabellæ etiam vsurpari poterunt, in hunc modum compositæ.

$\mathcal{L}$ . Confect. alkerm.  $\mathfrak{z}$ .ij. pulu. electar. de gemmis, & diamarg. frig. ana  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . sacchari in succo pomorum dissoluti  $\mathfrak{z}$ . iij. Fiant tabellæ pond.  $\mathfrak{z}$ .ij. Capiat vnam pro dosi.

Interdum etiam tentari poterunt specifica & amuleta, quorum non exiguum numerum collegit Sennertus. Nos verò vnum adiiciemus, quod in illustri, quadam familia Monspeliensi, pro secreto gentilitio, & hereditario habetur, illiusque descriptio talis est.

$\mathcal{L}$ . Fol. melissæ M. j. incidantur minutim, & infundantur in spiritus vini  $\mathfrak{z}$ . iij. Deinde adde margar. præp.  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . Misce. Dosis est cochlear. ij.

Interim dum hæc fiunt, somnus omni arte conciliandus est, & somnifera per intervalla vsurpanda. Quæ non alia esse debent, quàm quæ in phrenitidis curatione proposita sunt, tam interna, quàm externa.

Ac præter somnifera externa, adiuuenda quoque capiti sunt topica medicamenta, quæ æstum ac furorem vehementem temperent ac deinulceant. Illa verò non

solum refrigerantia, sed multo magis humectantia sint, & in principio morbi nonnihil repellentia.

Ideo in principio morbi oleum rosac. conueniet, cum violac. anethino, & chamæmelino; postea verò eadem olea detracto rosac. Vbi verò magis refrigerandum est, olea ex semine cucurbitæ & papau. addenda erunt. Ac denique vt in formam linimenti reduci queant, mucilagines sem. lini, fœnugr. & butyrum addi poterunt.

Plurimum etiam confert epithema, in sequentem modum compositum.

℞. Aquæ nymphææ ℥. j. salis prunellæ ʒ. j. camphoræ ʒ. j. Misce, & cum linteis complicatis admoueaturn tepidè sincipiti.

Epithema ex sale Saturni, & aqua rosarum utilissimum est.

Utilissimum quoque erit epithema ex aqua rosarum, santali rubri tincturâ imprægnata, cum moscho & camphora composita, quæ superiori capite descripta est.

Chymici verò balsamo Saturni palmam tribuunt, eoque caput inungunt instar linimenti.

Maximè etiam conueniunt in summo furore animalia tenella per medium secta; vel eorum partes, ac præsertim pulmo veruecinus: qui vbi semel refrixerit, iterum potest calefieri in aqua feruente.

In declinatione nonnulli discutientia validiora adhibent, Imò verò in ipso vigore morbi, post euacuationes sufficientes, fomentum sequens admirandæ creditur efficaciz.

℞. Herbarum cephalicarum cum floribus q. s. Decoquantur in aqua fontana. Deinde ℞. baccarum lauri & rad. hellebori nigri veri, ana q. s. Contundantur rassiuseculè, & insuantur sacculo oblongo

interbastato. Sacculus parùm bulliat in prædicto decocto.

Tandem per nouem dies continuos ℥. istius decocti ℔. ij. Eoque calefacto foueatur caput rasum per integram horam, cum linteis duplicatis. Postea sacculum istum applica futuræ coronali cum bona ligatura, linteis calidis inuoluendo. Patiens decumbat in lecto, & si fieri potest, quiescat. Tum mirè expurgatur per omnia capitis emunctoria, & alius simul aliquantulum fluit. Sic enim fuligines iuhærentes cranio & cerebro mirabiliter dissoluuntur, quod vix alia remedia præstare poterunt.

Denique cauterium futuræ coronali applicatum maximè probatur à Gordonio, cuiusque vtilitatem confirmat historiâ cuiusdam maniaci: cui cum esset vulnus inflictum capiti cum cranij fractura, quandiu fuit vulnus apertum, tandiu benè habuit; vulnere sanato reuerfa est mania.

Quamnis autem cerebrum in hoc affectu præcipuè laboret, tamen aliæ partes alterandæ, præcipuè cor & hepar, epithematis & linimentis in phrenitidis curatione propositis.

## C A P V T X I V.

### *De Melancholia.*

**M**elancholia est delirium sine febre cum timore & mœstitia.

A phrenitide distinguitur, per carentiam febris, & à mania per timorem & mœstitiam, quia hæc est cum furore & audacia.

Dicimus autem febrem abesse ab hoc affectu, quod

intelligendum est ex propria natura, & per se; attamen ex accidenti febris cum illa copulari potest. Nihil enim impedit, quin febris continua, vel intermittens, in melancholia laborante contingat; sed illa febris non erit de essentia melancholiæ, quemadmodum in phrenitide febris est esse de essentia illius.

Dubitare licet, quomodo timor & mœstitia dicantur esse de essentia melancholiæ; cum in multis melancholicis gaudium & lætitia maximè vigere videantur. Alij enim continuò rident, ali j canunt, ali j se ditissimos, a 1, Reges & Monarchas esse putant.

Respondemus varios esse melancholiæ gradus, & varias humoris melancholici cum aliis humoribus permixtiones, indeque maximam deliriorum varietatem emergere. Ita vt qui multum sanguinis, aut pituitæ cum humore melancholico permixtum habent, gaudio & lætitia affici possint. Ast ille affectus nunc temporis non est vera, & legitima melancholia; sed potiùs ad stultitiam & fatuitatem accedit.

Ex varia autem humoris melancholici dispositione maxima deliriorum varietas emergit: vnde ali j se Reges, Principes, vates, ali j vitreos, testas fragiles, grana tritici à gallinis deuoranda; ali j ceram igne liquabilem; ali j se canes, feles, lupos, cuculos, luscinnias, gallos esse putant, horumque aut aliorum animalium voces imitantur. Ali j se mortuos esse, nec quicquam edendum, aut bibendum esse, imaginantur. Ali j mingere non audent, ne diluuium inde oriat. Ali j se capite, vel membris truncatos esse, vel orbem digito sustinere, vel passerem in capite, serpentes, ranas, mures, aliaque animalia in ventre habere arbitrantur.

Causa melancholiæ proxima & immediata est spiritus tenebricosus, & ( vt Galeni verbis utar, )

nigro colore infectus. Cum enim spiritus animales, naturâ suâ puri, tenues & perspicui esse debeant ad actiones cerebri alacriter exercendas, & alacritatem ac lætitiâ inducendam, si ab ea constitutione deiciantur, & opaci ac tenebricosi euadant, mœstitiam, & timorem inducunt. Vnde Galenus 2. de symptom. caus. cap. 6. à tenebris exterioribus mutuato exemplo rem explicat. *Eorum, inquit, quæ extra corpus sunt, nihil videmus, quod nos perinde terreat, ac tenebra: ergo cum tenebra rationalis anima parti sunt circumfusa, necesse est hominem timere qui semper unâ cum corpore, sui timoris causam circumferat.*

Causa verò prauæ huius spirituum dispositionis est humor melancholicus, qui crassitie, opacitate & colore nigro præditus, spiritus animales inficit, & tenebricosos reddit. Et cum humor melancholicus frigida & sicca temperie donatus sit, ad figendos & densandos spiritus maximè conducit, quæ quidem densatio & fixatio spirituum ad mœrorem & tristitiâ necessaria est. Si enim humor tenuis sit & calidus, qualis est atrabilis, à qua mania producit, furorem potius & audaciam excitat. Ergo causa proxima melancholiæ est opacitas, & tenebrositas spirituum animalium. Condicio verò necessaria & sine qua non est frigida & sicca intemperies.

Si quis verò instauerit, in melancholia hypochondriaca, ex Galeno 3. de loc. affect. cap. 7. esse inflammationem in hypochondriis, atque adeò calidam intemperiem præualere.

Respondebimus illam inflammationem, seu potius phlogosim hypochondriorum fieri ex eo quod sanguis melancholicus in liene & venis mesaraicis diutius retentus propter obstructions incalescit, vnde multi vapores eleuantur ad cerebrum, qui licet calidi sint, vim



cuntur tamen à frigiditate cerebri , & facile ad temperiem humori melancholico propriam, nempe frigidam & siccam, reducuntur. Si verò tantus sit illorum vaporum calor , vt cerebri temperiem inuertat , & in calidam & siccam permutet , tunc mania , non melancholia generatur. Ita vt mania & melancholia in eo præsertim differant , quòd in illa est calida & sicca intemperies , in hac verò frigida & sicca.

Prædicta spirituum tenebrositas à Galenò sancita reii-  
citur ab Auerroë, ex eo quòd tenebræ spiritibus anima-  
libus inductæ, & color niger humoris melancholici non  
possint afficere, sensus internos ; iuxta vulgatum illud  
axioma, *Nihil est in intellectu, quod prius non fuerit in sen-*  
*su*; atque a leò cum color ille niger , aut tenebræ interio-  
res oculis non offerantur, à sensibus externis percipi non  
possint.

Respondemus colorem nigrum humoris melancholici, aut spirituum tenebrositatem non afficere sensus in-  
ternos sub ratione coloris ; sed quatenus aliquid præter  
naturam existens in cerebro , quo actiones illius lædat.  
Quia nimirum spiritus animales ad actiones cerebri  
perfectè obeundas debent esse puri, tenues & perspicui.  
Si contrà impuri , crassi & tenebricosi extiterint, actio-  
nes cerebri vitiant; quatenus species à sensoriis transmis-  
sas inficiunt veluti, & inquinant; sicut vitrum coloratum,  
aut aliter infectum species obiectorum eodem modo  
infectas oculis repræsentat.

Frigida etiam & sicca intemperies , quæ tanquam  
conditio necessaria proposita est ad melancholiam effi-  
ciendam , hoc argumento impugnari potest , ab Aui-  
cennæ autoritate desumpto , qui *sen. 1. lib. 3. tract. 4.*  
*cap. 18. Balbi* , inquit , *sunt plurimum dispositi ad me-*  
*lancholiam.* Sed balbi sunt valdè humido temperamen-

to donati, quod probatur ex Gal. *coment. Aphor. 32. sect. 6.* vbi Hippocrates sic habet. *Balbi ab alui profluuiio maximè capiuntur.* Galenus verò dicit balbos habere humidorem temperaturam, quemadmodum & pueros, ratione cuius alui profluuiio sunt maximè obnoxij.

Respondemus contextum Auicennæ non de verè balbis esse intelligendum, qui literam R. pronunciare non possunt, de quibus loquuti sunt Hippoc. & Galenus *Aphor. prædicto*, & illi quidem humidiori temperie prædicti sunt; sed de illis qui trauli nominantur, qui scilicet eandem syllabam sæpiùs repetunt, antequam verbum integrum pronuntiare valeant. Quod fit ex præcipatione mentis, cum celerius loqui contendunt; tunc enim lingua sese implicat, & in verborum prolatione hæsitare cogitur. Et illi trauli sunt melancholico temperamento donati.

Denique dubitare licet, quomodo tenebrositas spirituum sit causa immediata delirij melancholici, cum omnis actio læsa dependeat immediatè ab aliquo morbo; hæc autem tenebrositas ad nullum morbi genus referri valeat.

Respondemus tenebrositatem illam esse morbum in numero, quatenùs illius accessu augetur numerus eorum quæ necessaria sunt in cerebro ad actiones animales obeundas. Instantia verò quæ contra hanc responsionem afferri potest, quòd scilicet morbus sit affectus veræ partis, in vertiginis explicatione resoluta est.

Signa melancholiæ pathognomica in decisione proposita sunt, timor nempe & tristitia sine causam manifesta, quæ in omni melancholiæ specie reperitur. At verò singulæ melancholiæ species propriis signis innotescunt. Sicque primariam in solo capite residentem melancholiam significant, cerebri vitiosa constitutio, aut morbi calidi prægressi, quibus sanguis in ve-

nis illius contentus, exustus & torrefactus est: tandemque in humorem melancholicum conuersus Somni breues & interrupti, insomnia turbulenta, vertigines: aurium tinnitus, & symptomatum in reliquo corpore, ac præsertim ventre inferiori absentia.

A toto corpore prouenire hunc affectum ostendunt, habitus totius corporis melancholicus, vel naturalis, qui ex colore nigro, hirsutie, macilentia, aliisque dignoscitur: vel ascititius ex curis, laboribus, vigiliis, victu crasso & similibus contractus.

Ab hypochondriis procedere hunc affectum testantur, æstus in præcordiis sine siti, sputatio frequens, ructus acidi, flatus per superiora vel inferiora frequenter emissi, ventris rugitus, compressio interdum diaphragmatis, anxietas, nausea, appetitus interdum insatiabilis, cordis palpitatio, tumor aliquando & retinentia in hypochondriis. Et reliqua quæ fusiùs in affectione hypochondriaca exponuntur.

Ab vtero affectum procedere indicant ea signa quæ hystericas affectiones prodere in loco dicuntur.

Prognosis huius affectus in hunc modum instituentur. Chronicus est iste morbus, & contumacissimus, si semel altas corpore radices egerit. Humor enim melancholicus, præcipuè qui per adustionem genitus est, & ad atræ bilis naturam acedit, vim remediorum eludit, mitiora conterant, & à fortioribus efferatur. Vnde humor melancholicus flagellum Medicorum crux seu opprobrium Medicorum vulgò nominari consuevit.

Recens tamen melancholia, & à causis procatarctici oriunda facillè curatur. Refert enim Gal. 3. de loc. affect. cap. 7. se melancholiam incipientem solo aquæ

dulcis balneo frequenter curasse.

Melancholicis hæmorrhoides ; aut varices superuenientes, curationem interdum afferunt, si critice à natura humores ad illas partes inferiores detrudantur. Interdum enim symptomaticè contingunt, & per epigenesim multiplicatâ materiâ morbificâ, indéque ad plures partes diffusa.

Soluitur etiam interdum melancholia per fluxum hæmorrhoidum, & per scabiem aliosque cutaneos affectus.

Quod ad curationem spectat, vndecumque morbus primam traxerit originem, duo perpetuò aduertenda sunt. Primum, vt totum corpus ab humore melancholico omnique aliorum humorum illuie liberetur. Rarissimè enim contingit, vt vnica pars hoc humore obsideatur. Secundum, vt ab hypochondria curatio præcipua semper dirigatur; quandoquidem in hepate & liene prima humoris melancholici generatio, & in iisdem partibus totâque hypochondriaca regione illius collectio fieri consuevit: ideò curatio pro affectione hypochondriaca proposita ad reliquarum melancholiæ specierum curationem sufficere poterit. Vix enim hypochondria ab illius humoris redundantia, & noua eiusdem generatione liberari possunt, quin totum corpus consequenter ab eodem immune fiat.

Pro omnium igitur melancholiæ specierum curatione sufficient ea remedia, quæ in affectionis hypochondriacæ curatione proposita sunt.

## CAPVT XV.

*De Catharro.*

**C**Atharrus est humōris excrementitijè capite in subiectas partes præternaturalis effluxus.

Est ergo symptoma tertij generis , nempè vitium in excretis.

Cerebri substantia eximia mole prædita multo indiget alimento , ex quo necessariò copiosa generantur excrementa , concurrente potissimùm frigida humidâque partis temperie : quæ si naturalem & modicam quantitatem seruauerint , in prioribus cerebri ventriculis excipiuntur , & per choanam seu infundibulum ad glandem pituitariam transmittuntur , ac per palatum quotidie excernuntur. Si verò paulò vberius redundauerint , in statu tamen naturali constituta , circa cerebrum & meninges disperguntur ; commodè tamen, non solum per palatum , sed etiam per nares expurgantur.

Cùm verò cerebrum intemperie atque imbecillitate affectum est , vel alimentum copiosius & improporcionatum recipere cogitur , quod sufficienter concoquere nequeat , magnus fit excrementorum prouentus. Adde quod cerebrum (vt inquit Hipp.) tanquam cucurbitula corpori imposita , humores & vapores à partibus inferioribus attrahere non desinit: hinc non parùm adaugetur excrementorum cumulus, quæ quantitate & qualitate suâ facultatem expultricem stimulantia & retentricem superantia, quâ data porta, ruunt immodicè & inordinate per vias & loca non conferentia, magna cum corporis afflictione.

Cùm igitur fluxio sit motus materiæ ab vna parte in aliam, in ea perpetuo, (vt in omni motu,) quinque consideranda sunt. Terminus à quo, terminus ad quem mouens, mobile, & viæ per quas ipsa mouetur. Terminus à quo, est cerebrum; terminus ad quem, partes cerebro subiectæ; mouens est facultas expultrix irritata, vel retentrix debilitata; mobile est humor excrementitius; viæ per quas mouetur, sunt ductus patentes, nempe palatum nares, oculi, aures & meatus insensiles, tum etiam venæ, arteriæ & nervi.

In termino à quo, seu parte mandante duo causarum genera consideranda sunt: vnum est earum, quæ humoris pituitosi copiam in corpore gignunt, & cumulant; alterum earum, quæ fluxum eiusdem excitant & promouent, illæ generantes, hæ impellentes dici possunt.

Generantes consistunt in frustratione facultatis concoctricis, quæ contingit vel vitio ipsius facultatis, vel vitio alimenti.

Concoctrix cerebri facultas læditur potissimum ab intemperie, æque frigida vel calida.

Frigida intemperies efficit, vt alimentum ad cerebrum delatum malè concoquatur, & in pituitam commutetur: tum etiam vt vapores à partibus inferioribus translati sufficienter non discutiantur, sed in aqueum humorem condensentur.

Calida verò intemperies copiosius alimentum & copiosiores vapores allicit, vt non possint à natura sufficienter discuti ac resolui.

Vitio alimenti concoctrix cerebri frustratur, cum illud vel nimia copia cerebro suppeditatur, vel alienis qualitatibus infectum difficilius concoquitur. Sic frigida, crassa, & viscida alimenta immoderatus ingesta perfectè concoqui nequeunt, & crudum alimentum

cerebro suppeditant. Sic alimenta acria & vaporosa multos vapores ad cerebrum transmittunt.

His adiungendæ sunt causæ externæ, quæ superfluâ humiditate caput replere solent, vt austrina constitutio, somnus longus, præcipuè meridianus, vita deses & otiosa, & alia huiusmodi.

Licet autem cerebrum pars mandans præcipuè dici soleat, non est tamen perpetuò causa fluxionis præcipua, sed plerumque fluxionis materia aliunde ad cerebrum transmittitur. Postquam enim vitiosi humores vel in toto venoso genere, vel in aliqua parte peculiari, ventriculo nimirum, hepate, liene, mesenterio, vtero aliisque collecti sunt, non solum ab iis ad caput vapores multi ascendunt, sed etiam ipsi humores vitiosi ad caput feruntur, & inde rursùm ad subiectas partes descendunt; istorum autem viscerum vitia præcipua ad catarrhos generandos idonea sunt, intemperies variæ & obstructiones.

Calida viscerum intemperies copiosam facit anathymiasin, ex qua velut in alembico destillationes generantur; frigida verò, propter concoctionis defectum, humores crudos, generat qui datâ occasione ad caput transferuntur.

Obstructiones verò partium infimi ventris liberam excrementorum expurgationem impediunt, vnde fit vt illa sensim cumulata, cum liberum exitum non inueniant per vias naturales & ordinarias, ad superiora refluant, & ad cerebrum transferantur. Ad hoc autem opus eo modo perficiendum concurrere necessariò debet cerebri imbecillitas, horum excrementorum receptioni idonea, quandoquidem, (vt antea dictum est,) partes robustiores ad debiliores sese exonerant: frequenrissimè autem contingit, vt cerebrum sit debilius reliquis partibus, propter substantiam suam mollem &

laxam, quæ compactis & solidioribus minorem habet resistantiam.

Causæ in pellentes sunt nimia cerebri calefactio, vel refrigeratio, aut alia quævis humorum commotio. Nimia cerebri calefactio humores in eo contentos attenuat & fundit; meatusque referat, per quos illi fluere consuevere: talis est capitis calefactio à sole, igne, nimio capitis tegumento, olfactu aromatum calidiorum, ira, alioque animi pathemate excedente.

Refrigeratio verò cerebrum comprimit & humores in eo contentos exprimit, ut in spongia aqua repleta & manu compressa contingit; talis alteratio hyeme frequens est, sed præcipuè contingit in subitis aëris mutationibus, quando scilicet constitutio austrina calida & humida, in aquiloniam frigidam & siccam conuertitur, vel quando aliquis è loco calido egrediens, aëri frigido subito se exponit. His annumeranda est pedum refrigeratio; quæ sympathicè per neruos cerebro communicatur.

Prædictam cerebri compressionem à frigore factam multi negant, quia frigus humores densat & incrassat, minusque fluidos reddit. Neque quadrare videtur exemplum spongiæ aqua repletæ, quæ aëri exposita nullo modo comprimitur.

Verùm hæc sententia ab Hipp. tradita lib. de locis in homine, veritati consentanea est; *Fluxiones*, inquit, propter frigus fiunt, cum caro in capite & vena tensa fuerint: hæ enim horrente carne & ad angustias perueniente, adstrictæque ac excludente, humiditatem exprimunt. Et simul carnes ipsæ contra exprimunt ad angustias peruenientes, & capilli sursum erecti fiunt, utpotè simul undiquaque fortiter compressi: quidquid igitur inde expressum fuerit, id ipsum, quocunque contigerit, fluit.

Ex quibus coarctatione & compressione partiū à frigo-



re fieri , indeque humorum exprimi manifestum est.

Neque obstat densatio humorum & incrassatio à frigore facta suprà proposita; siquidem hæc locum habere potest quando totum corpus sensim & æqualiter refrigeratur. At cum à frigore subito irruente partes externæ offenduntur , tunc illæ subito coarctantur , & humores intus coërcitos exprimunt.

Multò minoris est efficacix, quod de spongia dicebatur eam nimirum à frigore aëris non exprimi. Alia enim est ratio partium viuentium, quarum calor & spiritus ad frigoris sensum refugiūt, & partes iis destitutæ consequenter coarctantur, quod in spongia aqua repleti non potest.

Attamen confiteri oportet non hunc vnicum esse modum, quo fluxio à frigore excitatur. Etenim refrigeratio pedum catharrum inducit, intemperie frigida cerebro communicata per nervos insignes , qui ab eo ad pedes deferuntur per spinæ medullam ; illa autem refrigeratio intimas cerebri partes petit , non verò externas vt frigiditas aëris , caput immediatè afficiens , facere consuevit. Ideò potius existimandum est in hoc casu re-tentricem cerebri facultatem debilitari , eo refrigerato vt non possit humores superfluos in eo contentos , ( si quidem illi copia luxurient, ) ampliùs retinere , sed eosdem effluere patiatur.

Est & alius modus admodum efficax & frequens quo catharrus à frigore generari consuevit , nempe pororum externorum constipatio , eo præsertim tempore facta , quo maxima fieri solet per corporis habitum diaphoresis, vnde fit vt excalefacti , frigidum aërem subito incurrentes , catharris maximè afficiantur. Sic in primis autumnii frigoribus catarrhi maximè fiunt , quia per æstatis decursum habitu corporis rarefacto , & poris valdè apertis ; multa fit per transpirationem insensilem excrementorum dissipatio, quæ si derepentè , con-

stricto corporis habitu, cohibeatur, vapores & humores in centrum cerebri & corporis percussi fluxionibus materiam suppeditant; ita vt circa autumnj initia, non solum catharrhi contingant, sed etiam copiosa fiat in omnibus ferè hominibus serosæ materiæ per vrinas excretio, & in nonnullis per aluum, vnde alui fluxus dictis temporibus frequentes esse consueuerunt.

Si quis verò quæsierit, cur per totum hyemis decursum catharrhi non perseuerent, cum perpetua fiat à frigore ambientis pororum externorum constrictio, respondebimus, naturam per alias vias superfluitates expurgare hyemis tempore magis, quam per diaphoresim, nempe per aluum, vrinas & sputa.

Quam copiosa autem sit euacuatio illa quæ per insensilem transpirationem fieri consuevit, luculenter docetur à Sanctorio, *libello de Statica medicina*, vbi dicit, perspirationem insensilem esse longè pleniorē, quam omnes euacuationes sensiles simul vnitas, ita vt si cibus & potus vnus diei sit ponderis octo librarum, transpiratio insensilis ad quinque circiter libras ascendat. Curiosa & laboriosa isthæc circa transpirationis mensuram speculatio, quantam lucem in morborum causis introspectiendis, eorumque curationibus instituendis, afferre valeat, peritioribus & solertioribus quibusque indicandum relinquo.

In parte recipiente consideranda est imbecillitas, vel alia quævis dispositio fluxioni recipiendæ, vel attrahendæ idonea. Ratione imbecillitatis vulgatissimum est Medicorum axiomia, partes robustiores in debiliores perpetuo onus superfluum deponere, sicut in Republ. Magnates & potentiores in debiliorem plebem graui onera deponunt.

Imbecillitas vero partium, vel insita est & natia, vel aduentitia. Insita imbecillitas pendet à mollitie & laxitate

tate partium, vnde glandulæ & pulmo fluxiones facile recipiunt. Aduentitia verò imbecillitas fit ab intemperie vel solutione continui.

Frigida intemperies calorem naturæ debilitando facit, vt pars minorem habeat resistantiam, sicque facilius humorem influentem recipiat.

Solutio continui partē etiam debilitando eam fluxioni recipiendæ magis reddit idoneā. Hinc ortus est cauteriorum vsus, quia parte vlcere debilitatâ humores ab aliis partibus eò decurrunt. Sic etiā pulmo in phthisi vlceratus humores à cerebro & toto corpore influētes recipit.

Inter alias verò dispositiones, fluxioni attrahendæ idoneas, calor præcipuè annumerandus est, vnde videmus partes inflammatas copiosos humores attrahere. Sic etiam in phthisi non solum propter vlcus, sed etiam propter calidam pulmonis intemperiem humores copiosi à capite proliciuntur. Vnde Hip. i. de morbis agens de phthisi sic loquitur: *Pulmo à calore ad se trahit pituitam ex toto corpore, & maxime ex capite. Caput verò calesfactum ex corpore hanc putrescentem subcrassam expuit.*

Via, per quas humores feruntur à capite in partes subiectas, duplices statuuntur, internæ, & externæ. Internæ sunt, cum è partibus sub caluaria contentis, potissimum è ventriculis cerebri humor defluit per vias interiores, & pro natura partium, ad quas defertur varios morbos variaque symptomata producit, quorum nonnulla propria nomina sortita sunt, iuxta vulgares illos versiculos scholæ Salernitanæ.

*Si fluat ad pectus, dicatur rheuma, catarrhus,*

*Si ad fauces, branchus, si ad nares, esto coryza.*

In pectus defluente humore, affectus generis nomen retinet, ad fauces verò & asperam arteriam, branchus, seu raucedo, generatur; si verò ad nares defluat, non solum coryzam, sed etiam ozanam, & polyrum efficit,

si humor insignior est.

In aliis etiam partibus varios producit affectus; in nervis torporem, paralyfin, convulsionem, tremorem; in auribus surditatem, tumorem; in oculis ophthalmiam, lachrymas, cœcitatem; in vulva tumorem, laxitatem, vlcus; in gutture anginam, in pectore & pulmone pleuritidem, peripneumoniam, tussim, asthma, hæmoptoën, phthisin; in ventriculo vomitum, inappetentiam; in intestinis diarrhœam & dysenteriam; ita vt maxima morborum corpus humanum infestantium pars à capite ortum ducere iure merito censeatur.

In venas etiam cum sanguine humor à cerebro defluit, vnde febris catarrhalis generatur, quando scilicet natura ad humoris superflui expulsionem acrius commouetur, vnde commoti vehementer spiritus accenduntur, & febrem Ephemeram efficiunt, hinc catarrhus inter febris Ephemeræ causas recensetur. Sic ante invasionem arthritidis, aut Erysipelatis eruptionem, tales febres sæpiissimè contingunt.

Externæ autem viæ, per quas humor à capite defluit sunt illæ, quæ caluariæ adiacent, & sub cute continentur; vnde censuit Fernelius, inter carnem & cutem humores vt plurimum deferri, quamvis etiam per continuitatem musculorum, membranarum & neruorum, tum etiam per venas & arterias defluere soleant in oculos, dentes, maxillas, cervicem, scapulas, brachia, articulos & alias partes externas.

Differentiæ catarrhi nonnullæ ab authoribus proponuntur, quarum præcipuæ sunt, quòd alius dicatur ferinus, alius suffocans, alius epidemicus.

Catarrhus ferinus ille est, qui sua acrimonia pulmonem exulcerat, & tabem inducit, fitque ab humore acro & falso in hepate feruido genito, & in cerebrum translato, vnde in pulmones propellitur. Suffocans verò

catarrhus fit, quando fluxio in bronchia pulmonis confertim irruit, ac subinde renouatur, unde suffocationis impendet periculum. Catarrhus denique epidemicus malignâ qualitate præditus est, & populariter grassatur, à vitio aëris dependens.

Diagnosis huius affectus ad tria dirigitur, subiectum, morbum, & causam.

Subiectum vel corpus catarrhis obnoxium indicant rara corporis & capitis textura, faciem aëri frigido, vel calido penetrationem præbens: tum etiam eadem textura nimis densa, liberam transpirationem impediens: cerebrum frigidum & debile vapores ad se transmissos discutere non valens, vel proprium alimentum sufficienter non concoquens: cerebrum item calidum vapores copiosos attrahens: ventriculi & hepatis ἀντιπαῖα, ut vnum sit calidum, alterum verò frigidum.

Signa morbum indicantia, vel imminensem prænuntiant, vel præsentem ostendunt.

Imminensem catarrhum prænuntiant causæ prædictæ, sed magis præcisè capitis grauitas, sensuum hebetudo & torpor, somni longiores, sternutatio frequens, emunctio narium, & exputio solito copiosior, alui segeties & flatuum copia.

Præsentis verò catarrhi indicia manifesta sunt. Humor enim à cerebro defluens vel manifestè percipitur, vel tumoribus ac doloribus in partibus quas inuadit, satis manifestatur.

Signa causarum satis etiam conspicua sunt. Si enim ab humore frigido catarrhus excitetur, aderit sensus frigoris, faciei pallor, sapor pituitæ dulcis, ructus acidus, materia viscosa vel aquosa, & in vniuersum, temperamentum corporis pituitosum.

Calidum verò humorem distillantem ostendunt ru-

bor faciei, sitis, falsedinis, vel acrimoniæ sensus in ore, inflammationes, dolores & vlcera in partibus affectis & temperamentum totius corporis biliosum.

Fluxio verò externa ab interna dignoscitur, quòd in illa dolor magis externus sit, imprimis sub cutè verticis, vbi interdum tumor mollis percipitur; sæpius verò pilorum inuersio dolorificata est; sæpe etiam ægri humorum descensum per partes exteriores cum dolore, calore aut frigore perferunt.

Prognosis huius affectus à Cornelio Celso eleganter proponitur his verbis: *Si ex capite in nares distillat humor, leue est; si in fauces, peius, si verò in pulmonem, pessimum est.* Hippocrates verò in valdè senibus catarrhum difficillimè concoqui asseruit.

Vbi magna humorum copia redundat, siue ea à plethora sit, sit siue à cacochymia, periculosus inducitur catarrhus; metuendum enim est, ne affatim irruens copiosus humor suffocationem, aut graue aliquod aliud malum inducat.

Huius affectus curatio duplex instituenda est, vna quæ frigidum catarrhum, alia quæ calidum respiciat.

Tota catarrhi frigidi curatio in eo consistit, vt materia peccans præparetur & euacuetur, & si ad pectus aliãve partem influat, reuellatur, illiusque motus inhibeatur; tandemque intemperies cerebri corrigatur.

Primò itaque si materia copiosa sit, aut nimio impetu ruat, & metus sit ne à reliquo etiam corpore affluat, præsertim si hepar sit calidum, (contingit enim non rarò, vt catarrhis obnoxij habeant cerebrum frigidum, & hepar calidum,) sanguis mittendus est, sed parciori manu. Si verò materia sit pauca, & lentè

moueat<sup>ur</sup>, ætas verò senilis, aut temperamentum hepatis minimè calidum, unde nulla an sit suspicio humorem aliunde cerebro suppeditari, venæ sectio omit<sup>tenda</sup> est.

Materia verò peccans primùm imminuenda est portione, aut pilulis, vel alio quouis medicamento purgante, ex his, quæ in frigida cerebri intemperie fuerunt proposita.

Mox reliquæ humoris præparandæ apozemate dicto loco descripto; aut si nimia humoris exagitatio non metuat<sup>ur</sup>, apozema purgans poterit institui.

Ac tandem pilulis fortioribus, aut alio cathartico integra purgatio erit absoluenda.

Si catarrhus admodum contamax fuerit, ad vomitoria confugiendum est, quæ illius materiam potenter eradicant.

Colocynthis ad cerebrum potenter expurgandum efficacissima est, sed summo amatore infensa est, vehemensque illius est operatio. Corrigitur vtrumque infusione in vrina, sic enim amaritudinem deponit, & fere insipiendum remedium euadit; tum vehementia illius irâ infringitur, vt ad 3. j. tutò exhiberi valeat; fitque excellens ad omnes capitis morbos à causa frigida oriundos remedium.

Interdum verò contingit, vt humores excrementitij, à partibus inferioribus ad cerebrum sublatis, catarrhum efficiant. Motum autem illum præternaturalem nanciscuntur, obstructis meatibus ordinariis, per quos humores illi expurgari solebant. Et tunc temporis opportunissimè curatur catarrhus apertione viarum, tum etiam blandâ, miti, & continuâ purgatione; quia humores *αυαρρῶντες* ad partes inferiores deturbantur, iisque motus contrarius sensim conciliatur.

Huiusmodi autem purgationes blandæ fieri possunt,

per decocta, vel iuscula, ad multos dies vsurpata. Interim tamen roborantia medicamenta non erunt omittenda.

Ad reuulsionem verò admovebuntur cucurbitulæ, & vesicatorium scapulis & ceruici, tum etiam cauteria occipiti, vel brachio. Zacutus Lusitanus lib. 2. *Praxis admiranda, obseruat.* 160. cauterium retrò aures, tanquam præstantissimum, ad omnes destillationes à capite manantes, remedium, plurimum commendat. Et nos in fluxionibus, oculorum præsertim, laudabiles effectus vidimus. Errhina, sternutatoria, apophlegmatismi, & masticatoria erunt vsurpanda; eâ tamen adhibitâ cautione, vt quando catarrhus in fauces, pulmones, aut ventriculum decumbit, errhina & sternutatoria tantum vsurpentur; quando verò in oculos & nares influit, masticatoria & apophlegmatismi.

Horum omnium formulæ capite prædito fuerunt propositæ. In his tamen aduertendum, quando materia tenuitatis cuiusdam particeps est, ne fortius resoluentia vsurpentur: his enim humoris impetus ad pectus & pulmonem, aliâsque partes adaugeri potest; sed nonnulla incrassantia, aut humoris impetum cohibentia admiscenda, vt rosæ rubræ, mastiche, coriandrum, nux moschata, aliâque in catarrho calido fusiùs proponenda. In hunc sensum errhinum in sequentem modum componi poterit.

℞. Aquæ maioranæ ℥. iv. succi betonicæ ℥. j. sem. nigellæ puluerat. ℥. β. nuc. mosch. ℥. j. Fiat errhinum. Pro ditioribus addi poterunt moschi, & ambræ griseæ, ana gr. ij. Vel

℞. Ligni guaiaci limitati ℥. j. aquæ puræ lb. j. Infundatur per noctem supra cineres calidos deinde coquantur ad mediæ partis consumpt. addendo sub finem maioranæ, & rosarum rubr. ana P. ij.

Sic etiam masticatorium, subgenui existente mate-



riâ, vel fiet ex mastiche sola, vel in hunc modum.

℞. Nucis mosch. ʒ. j. mastiches, gummi arabici, ana ʒ. ʒ. Redigantur in puluerem, & cum aqua rosar. fiant trochisci masticatorii.

Præstans sternutatorium componitur ex hellebori nigri, & sacchari partibus æqualibus, quod cerebrum potenter expurgat.

Extractum nicotianæ cum aqua vitæ paratum, linguæ impositum ad ipsi magnitudinem, magnam pituitæ copiam instar apophlegmatismi per os educit. Verùm si nimia copia vsurpetur, aut si in ventriculum effluere sinatur, vomitum excitat etiam vehementem.

Suprà dictum est cauteria brachiis, occipiti, & pone aures iniusta plurimum conferre; quod etiam efficaciter præstant posteriori parti ceruicis & inter scapulas admota; quæ hodie in maximo vsu sunt, & à practicis nostris passim vsurpantur. Nouus etiam locus à quibusdam inuentus est; nempe in ceruice prope venas iugulares, in muscutorum interstitio; & huius cauterij beneficio catarrhus inueteratus raucedinem efficiens in duobus curatus est.

Tandem post conuenientes euacuationes, cerebrum roborantia & exsiccantia tam interna, quàm externa, erunt vtilissima, vt opiata, pulueres, cucuræ, suffitus; prout in curatione frigida intemperiei cerebri descripta fuerunt.

Notandum autem est, opiata prædictæ, aut aliis similibus, in catarrhi curatione conseruam rosarum, nucem moschatam, & thus albiss. vtiliter admisceri.

Decoctum ligni lentiscini, in modum decocti sudorifici vsurpatum, cerebrum exsiccatur, & fluxionem cohibet.

Præterea sequentes morsuli ad hunc vsum vtilissimi sunt.

℞. Sem. coriandri præparati ʒ.ß. nucis mosch. thuris, ana ʒ. iij. glycyrrhizæ, mastiches, ana ʒ. ij. cubebæ. ʒ. j. confectæ rosar. rubr. ʒ. j. sacchari albi in aqua rosar. dissoluti ʒ. x. Fiat confectio in rotulis, pond. ʒ. iij. Capiat vnam manè & vespèri.

Trochisci sequentes valdè commendantur à Solenandro *conf. 10. sect. 4* quos ab antiquis, tum Græcis, tum Arabibus mutuatur.

℞. Thuris masculi, succi liquiritiæ ana ʒ. j. opij, croci, myrrhæ, ana ʒ. j. Cum syrupo papau. forma trochiscos, vel pilulas vrgente catarrho exhibendas per intervalla. Dosis erit ʒ. ij vel ʒ. ß.

Tabellæ etiamnum sequentes vsui esse poterunt.

℞. Puluer. electar. diambæ, & diamoschi dulcis, ana ʒ. j. succini albi ʒ. j. ol. anisi gutt. iij. sacchari in aqua lauendulæ dissoluti ʒ. iv. Fiant tabellæ pond. ʒ. ij. Capiat vnam manè & serò.

Inter remedia interna, capite de intemperie frigida cerebri descripta, summæ est efficaciæ ad catarrhi inveterati curationem, balsamum cephalicum ibidem post opiatam descriptum, quod intus assumi poterit, & in narium cavitates immitti.

Lac sulphuris, & flores eiusdem ad catarrhum exsiccandum maximè laudantur à Chymiatris; tum etiam Galenici in tabellis flores sapissimè vsurpant.

In recenti catarrho aqua nucum cum hydromelite exhibita hora somni per triduum, eum valde imminuit.

Ad cohibendum catarrhum vtiliter admoventur sinicipiti raso cataplasma ex fermenti ʒ. ij & carabes ʒ. ij. compositum. Si verò æger caput radere noluerit, supra ipsum capillitium aliqua ex parte detonsum; facculus ex chamæpit. & carabe conflatus apponi poterit.

Præter suffitus prædictos, qui ex gummi Tacama-

haca fit, summæ est efficaciæ; catarrhum enim exsiccat, eiusque motum cohibet, neque vehemens est illius odor, ita ut conclaue agrotantis eo sine molestia perfundi valeat.

Commôdissimum etiam est caput exsiccare sacculi ex furfure, milio, sale; foliis saluiæ, betonicæ, stæchados; sem. fceniculi, anisi, & similibus.

Denique si affectus sit contumax, omnia conuenient remedia, quæ pro frigidæ cerebri intemperiei curatione fuerunt proposita.

Calidus catarrhus curatur remediis materiam peccantem euacuantibus, incrassantibus & reuellentibus; tum etiam partium mandantium & recipientium intemperiem corrigentibus.

In hunc finem primò phlebotomia instituenda est si cætera consentiant, qua humor fluens reuellitur, eiusque acrimonia temperatur.

Deinde humoris eiusdem portio educenda est blando cathartico, quod humores nullo modo commoueat, in hunc aut similem modum.

℞. Rhab. electi ℥. iv. myrobalan. citrinor. ol. amygdal. dulc. confricat. ʒ. ʒ. ʒ. fantali citrini ℥. ʒ. Infundantur in aqua lactucæ & portulacæ. In expressione dissolue manna granat. & syrup. rosar. solut. ana ʒ. j. Fiat potio.

Vel loco aquarum prædictarum potest fieri decoctio ex herbis refrigerantibus, & tamarindis, cui purgantia prædicta permisceantur.

Deinde humor alterandus & incrassandus est iulepis conuenientibus.

℞. Fol. lactucæ, portulac. & plantag. ana M. j. sem. quatuor frig. mai. & papaueris albi, ana ʒ. ij. flor. violar. nymphææ & papaueris rhæados, ana P. j. Coquantur ad lb. j. In colat. dissolue syrupi violac. & rosar. sic

car. ana  $\mathfrak{z}.j.\beta$ . Fiat iulep. pro tribus dosibus, bis in die sumendis.

Vel loco decocti, aquæ stillatitiæ prædictarum herbatum, vel emulsiones quatuor sem. frigidorum mai. substitui poterunt.

Deinde purgatio paulò fortior vsurpanda, addendo purgantibus prædictis sennam, catholicum, diaprunum, & similia.

Leue ac blandum remedium incrassans, humorisque acrimoniam demulcens, desumitur ex vitellis ouorum recentium, quorum duo in vnciis quinque vel sex aquæ fontis dissoluantur addendo sacchari albi  $\mathfrak{z}.j$ . Coquantur parùm sine ebullitione, semper mouendo, & capiat calidè quantum ferre poterit, manè & sero per triduum.

Ac tandem maiori humorum incrassationi & fluxus cohibitioni incumbendum est, quod fiet syrupo sequenti.

$\mathcal{L}$ . Syrupi violac. & de ros. siccis, ana  $\mathfrak{z}.j$ . syrupi de papauere  $\mathfrak{z}.\beta$ . Detur ex cochleari  $\mathfrak{z}.j$ . horâ somni.

In eundem finem vsurpari poterit opiata sequens.

$\mathcal{L}$ . Conferuæ rosar. antiquæ 3. vj. pulueris electar. diatrag. frig. 3. ij. boli armeni loti in aqua rosar.  $\mathfrak{z}$ . ij. Cum syrupo rosar. siccatum, fiat opiata; capiat ad magnitudinem auellanae horâ somni.

Hordeatum sequens vtilissimum etiam est.

$\mathcal{L}$ . Hord. mundat. q. s. Maceretur per horas vj. postea coquatur perfecte, & traiiciatur. Deinde accipe amygd. dulc. excort.  $\mathfrak{z}$ . iiij. sem. cucurbitæ mundat.  $\mathfrak{z}.j.\beta$ . sem. melon.  $\mathfrak{z}.j$ . papau. albi, lactuc. ana  $\mathfrak{z}.\beta$ . Contusis omnibus cum aqua hord. eliciatur lac, quod cum  $\mathfrak{t}\mathfrak{b}$ . ij. pulpæ hord. permixtum coquatur parùm, addendo sacchari portionem. Bibat  $\mathfrak{z}$ . x. aliquot matutinis superdormiendo, & nonnunquam in introitu lecti. Tum

etiam trochisci sequentes in ore frequenter erunt detinendi.

℞. Gummi tragacanthi & arabici, ana ʒ. ij. boli armen. terræ sigillat. lotor. in aqua rosac. ana ʒ. j. sem. papau. albi, succi liquiritiæ, ana ʒ. ʒ. sacchari penidiat. ʒ. j. Cum mucilag. sem. cydon. extract. cum aqua rosar. fiant orbiculi parui, quos diu noctûque in ore detineat.

Spiritus sulphuris & vitrioli ad gutt. iij. vel iv. exhibitus manè, & serò cum liquore idoneo, contra omnes fluxiones magnas vires habet, præsertim verò eas quæ à calida viscerum intemperie ducunt originem. Potest etiam in minori dosi potui, permisceri, quia cum eo venas omnes peruatit, & motum humorum cohibet.

CrySTALLUM etiam minerale ad eundem vsum iulepis, aliisque remediis admisceri potest.

His nihil proficientibus necessitas cogit vti narcoticis. Inter quæ principatum obtinet laudanum opiatum; ad gr. iv. vel v. horâ somni exhibendum. Vel syrupi de papau. ʒ. ʒ. vel ʒ. j. exhiberi poterit. Hæc ab initio morbi usurpata miranda præstant. Eandem habet vim theriaca recens ad ʒ. j. vel ʒ. ʒ. noctu exhibita.

Benedictus Fauentinus sequentibus pilulis vsus est in catarrho falso, fœlicissimo cum successu.

℞. Succu glycyrrhiæ ʒ. ij. aloës lotæ ʒ. j. pilul. de cynoglossa ʒ. ʒ. Cum syrup. violac. fiat massa pilularum, de qua capiat. ʒ. j. horâ somni. Trochisci Solenandri supra descripti erunt etiam vtilissimi.

Huic vsui etiam maximè conferte potest diacodium album, in curatione phrenit. descriptum.

Interim reuellenda est materia fluens per clysteres, cucurbit. frictions & ligaturas extremorum, omnium.

que potentissimè per vesicatoria, posteriori cervicis parti adnota; ac denique cauterium occipitio vel brachio, si catarrhus sit diuturnus.

Ad caput etiam roborandum, fluxionem retinendam, eiusque reliquias absumendas conveniunt pulveres, cucuræ, & emplastra.

℞. Succini albi, sandarac. Arab. mastiches, benjoini, nucis moschata, ana ℥. j. thuris, gran. Kermes, & rosar. rubrar. ana ℥. β. santalor. omnium, myrtill. & balaust. ana ℥. ij. Fiat pulvis, qui inspergatur capiti horâ somni, manè pectine decutiendus.

℞. Gummi juniperi ℥. ij. rosar. rubrar. P. ij. myrtill. ℥. j. niacis, nucis moschat. ana ℥. j. thuris, sem. præniæ, cortic. papau. ana ℥. ij. nuc. cupress. ℥. β. Pulveriscentur, & cum floccis panni coccinei, ac sindone rubra, fiat cucurfa interpuncta perpetuò gestanda.

℞. Mastiches, cortic. thuris, ana ℥. β. sandaracæ, coralli rubri, rosar. rubrar. myrtill. balaust. cortic. granac. ana ℥. j. ladani ℥. ij. ceræ, & olei rosæcci q. s. Fiat emplastrum, applic. futuræ coronali.

Quia verò huiusmodi catarrhus à calida plerumque hepatis intemperie ducit originem, idè remedia quæ illius intemperiem emendant, erunt etiam usurpanda.

Denique hoc in primis notatu dignissimum est, quod etiamnum supra in catarrhi frigidi curatione propositum est; quòd nimirum non rarò humores excrementitij, à partibus inferioribus ad cerebrum sublari, catarrhos efficiant, & motum acquirant præternaturalem obstructis meatibus ordinariis, per quos expurgari solebant. Et tunc temporis opportunè curatur catarrhus aperitione viarum, simulque blandâ & continuâ purgatione per iuscula, aut alia decocta, ad multos dies instituta,

## C A P V T XVI.

## De Doloꝛe capitis.

**C**Ephalalgia nomen pro omni dolore capitis generaliter usurpatur: sed in specie, & magis strictè, recentem capitis dolorem significat; cephalæa verò inueteratum, & hemicrania cum, qui dimidiam tantum capitis partem occupat.

Sunt & aliæ doloris capitis differentiæ, quibus diuiditur in internum & externum, sympathicum, & idiopathicum; & ex his denuò aliud pungitius, aliud tensius; aliud grauatius, aliud pulsatorius.

Dolor capitis internus in meningibus locum habet, qui profundus est, & ad radices oculorum pertingit: externus verò in pericranio situs pilorum radices inuerti non finit, & ad capitis compressionem exacerbat. Hæc est Galeni doctrina, quam proponit 3. de loc. aff. c. 1. & l. 2. de comp. med. secundum locos c. 3. ubi disertè asserit, dolorem capitis internum hoc peculiari signo distinguere ab externo, quòd in interno dolor ad radices oculorum pertingat, in externo, verò minime. Et rationem reddit, quia tunica oculorum à cerebri meningibus prodeunt, unde fit, ut dolor eò usque facillè propagetur.

Attamen Fernelius huic doctrinæ contradicit lib. 5. sua Pathologia cap. 1. asseritque externos etiam dolores ad radices oculorum pertingere, quod pericranium, cui insident, oculorum cauum pertingat.

Huic respondet Rondelietius lib. 1. meth. med. cap. 5. ad dolorem pericranij oculi cauum non dolore, licet illud eo usque pertingat, propterea quòd pericranij dolor à frigore externo ut plurimum oritur, quia pars frigida à simili facillime patitur qualitate. Illud autem

frigus ad oculi cauum non potest peruenire, quia à calore oculorum, spiritibus & sanguine conseruatur. Si verò interdum ab æstu, aut simili causa dolor capitis externus excitetur, tunc cutem capitis tantum affici affirmat, non autem pericranium in profundiori loco situm.

Verum hæc Rondeletij doctrina non omnem omnino tollit difficultatem. Licet enim omnia, quæ ille adstruit, ipsi concederetur, tamen si dolor excitetur ab aliquo tumore iuxta pericranium collecto, aut ab alia causa continuum soluente, nulla ratio erit, cur dolor ad oculi cauum non feratur.

Dicere possumus ad Galeni defensionem, duplici ratione hoc signum fuisse à Galeno propositum. Primum quia membrana, quæ à pericranio ad oculi cauum fertur, est hebetioris sensus, atque ita non compatitur dolori pericranij, nisi admodum obtuse: tunica verò oculi, quæ prodeunt à meningibus sunt exquisitissimi sensus, atque adeò insignanter dolent. Deinde membrana illa, quæ à pericranio oritur, non ita intrinsecè & profundè attingit oculum versus neruos opticos, sicut tunica, quæ à meningibus procedunt. Vnde fit, vt dolor ille externus non possit sese extendere ad fundamenta oculorum, vt loquitur Galenus.

Idiopathicus dolor stabilis est & permanens, nec aliarum partium sequitur affectus: Sympathicus verò ab alterius partis affectu dependet, ita vt, dum affectus ille suscipit incrementum, dolor capitis intendatur; dum verò remittitur, conquiescat. Ille autem sympathicus dolor fit vel ex consensu totius corporis, sicut in febribus contingit; vel determinatæ partis, putà ventriculi, hepatis, lienis vel vteri.

Quænam verò sit illa pars, quæ dolorem capiti communicet, ex cuiusque partis affectæ propriis indiciis facile innotescet.



Dolor pungitius ab acri & bilioso humore, vel vapore membranas feriente excitatur. Grauius à copioso humore, crasso, frigido, pituita scilicet, vel melancholia, partes sensiles comprimente. Tensius fit à flatibus aut humoribus mitioribus intra membranas sese insinuantibus, easque distendentibus. Pulsatoris denique fit à tenui bilioloque sanguine, vel spiritu redundante; quo turgentes ac distentæ arteriæ vehementius pulsant, membranasque concutiunt, sicque partes vicinas percutiendo sensum pulsationis in iis efficiunt, vt fusiùs docetur à Galeno. 2. *de loc. aff. cap. 3.*

Et suprà propositis causæ præcipuæ doloris capitis satis declarantur, quæ in vniuersum ad solutionem continui, tanquam ad causam proximam & immediatam, referuntur. Quæcunque igitur continui solutionem manifestam vel occultam inferre possunt, ea capitis dolorem etiam inducere apta nata sunt.

Signa etiam diagnostica tum specierum doloris capitis, tum causarum eas producentium ex superioribus desumi possunt, vt prognostica tantum exponenda supersint.

Dolor capitis externus perpetuò minùs periculosus & curatu facilior est interno.

Dolor capitis in febre acuta cum vrina tenui & alba, periculosus. Significat enim raptum materiæ biliosæ ad cerebrum, vnde phrenitidis periculum impendit.

Dolor capitis fortis, subitò delitescens, nulla subsequente euacuatione, aut morbi imminutione, lethalis. Significat enim facultatis animalis abolitionem, quæ obiectum dolorificum ampliùs non sentiat.

In vehemēti capitis dolore extrema frigescere malum; ex doloris enim vehementia magna fit caloris retractio ad partem affectam, vnde periculum imminet inflammationis.

Quibus ex morbo partium inferiorum conualescentibus dolor capitis vehemens superuenerit, si non præcedat excretio manifesta, iis in cerebro futurus est abscessus; materiæ enim morbificæ translationem ad cerebrum significat.

Qui in doloribus capitis æruginosa vomunt, & cum surditate vigilant. ij cito vehementer insaniunt. 1. *Prorrh.* Significat enim bilis adustæ in cerebro collectionem, quæ ventriculum in consensum trahar.

Capitis dolores & sonitus aurium sine febre, aut vertigo, aut surditas, aut manuum torpor, imminentem apoplexiam, aut epilepsiam significat. *Hip. in Coacis.* Fiunt enim ista symptomata à pituitæ crassæ copia in cerebro cumulata.

Vtero gerentibus capitis dolores soporosi cum grauitate fientes, mali, 1. *Prorrh.* Significant enim humorum transfluxum ad cerebrum, qui cum multi & copiosi sint in muliere grauida ob purgationis menstruæ defectum, hinc grauius malum metuendum est.

Dolor capitis, qui à morbi principio non apparuit agitato & perturbato corpore obortus, imminentem crisin per hæmorrhagiam, aut vomitum significat.

Cum igitur capitis dolor tum à frigida causa, tum à calida dependeat, ad vtriusque oblationem curatio dirigenda est.

Ad prioris curationem materia pituitosa primum euacuanda est conuenienti præparatione adhibitâ, ut superiori capite dictum est. Deinde intemperies cerebri frigida corrigenda, ac reliquæ humoris discutientæ sacculis superiori etiam capite propositis, vel iis, qui in frigida cerebri intemperie descripti sunt. Quibus calentibus confricetur caput derafum manè, per  
seisqui

ſeſquihorā ſingulis diebus, dum doloris cauſa fuerit exauſta.

Post frictionem capitis per ſacculos, inſpergatur puluis ſequens, cotone lanā ſuperpoſitā.

℞. Nuc. moſchat. caryophyll. piperis, pyrethri, ana ℥. β. fol. ſaluiæ, baccarum lauri, ana ℥. ij. ſem. ſinapi, naſturtij contuſ. an. ℥. vj. Fiat puluis, capiti inſpergatur vt dictum eſt, & manē peſtatur ante uſum ſacculorum, vt puluis pridie inſperſus excidat.

Vtilia etiam erunt errhina, ſternutatoria & apophlegmatifmi, quorum deſcriptiones ſuprà fuerunt propoſitæ.

Vtilis etiam erit ſyrupus magiſtralis, in hunc modum compoſitus.

℞. Raſ. ligni guaiaci, & rad. chinæ in taleolas diuiſæ, ana ℥. j. β. Infundantur per horas xij. in lb. iv. aquæ fontis. Bulliant ad mediæ partis conſumptionem, addendo ſub finem fol. verbenæ M. j. flor. ſtœchados & maior. ana. P. j. In colatura diſſolve ſacchari albi lb. β. Coquantur in ſyrupum, & antequam ſit perfectè coctus, in eum conijce in nodulo, ſennæ mundat. ℥. iij. agarici recenter trochiſcati ℥. ij. rhab. opt. ℥. iij. Capiat ℥. ij. vel iij. ſemel in ſeptimana.

Conferent etiam plurimum pilulæ ſequentes, quæ in Italia olim magno in pretio habitæ ſunt tempore Euſtachij Rudij, in Academia Patavina profeſſoris Practicæ primarij, qui earum autor prædicabatur, & pro magno ſecreto habebat; ideoque vni dumtaxat Pharmacopœo confiendendas dederat, ne aliis innotefceret earum, deſcriptio, quam tamen mutuatus fuerat à VVecchero, qui eam poſponit ex Andernaco. Illa autem talis eſt.

℞. Colocynth. ℥. vj. agarici troc. diagrydij, hellebor. nigri, turbith. an. ℥. β. aloës ℥. j. ſpecier. diarrhod. abbatis

℞. Contundantur purgantia, & ponantur in vase vitreo cum spiritu vini, vt octo digitos superemineat, & digerantur per octo dies in loco calido, postea adiciatur puluis diarrhod. Et infundantur adhuc per quatuor dies. Mox colentur omnia, & fortiter exprimantur. Liquor expressus distilletur in balneo, donec in fundo alembici extractum redeat ad eam crassitiem, quæ pilulis efformandis idonea sit, quarum dosis est. ʒ. j.

Sequentes verò pilulæ Fernelio tribuuntur, quarum se tantam vim experiendo cognouisse affirmabat, vt nullam cephalalgiam, aut hemicraniam offenderit, quam non curauerit.

℞. Aloës opt. ʒ. β. pulu. electar. de gemmis, trium fantal. rosar. rubrar. ana gr. iij. Cum syrupo absinthi, & violar. fiat massa. Detur ʒ. j. bis in hebdomada hora j. vel ij. ante coenam.

Ac denique in contumaci dolore & inueterato omnia conuenient remedia, quæ pro curatione frigida: intemperiei cerebri fuerunt proposita. Inter quæ non infimum locum obtinent emplastra epispastica. Quibus etiam non conferentibus, nonnulli ausi sunt capiti ad-mouere emplastrum de Virgo cum mercurio, quod multis pituitosis humoribus per sputa euacuatis, inueteratos capitis dolores interdum cessasse asserunt.

Thermæ sulphureæ, ac bituminosæ in hoc casu efficacissimæ sunt, tum balneo, tum lotione capitis.

Plurimum etiam conferunt, in dolore inueterato, decocta sudorifica, quibus multos fuisse liberatos, apud celeberrimos Autores legere est.

Quibus non conferentibus, Mercatus ad stibij vsum audet confugere, eumque cum elogio commendat. *l. i. de intern. morb. curatione cap. 8.* In dolore autem diurno plus præstat caput frequētius roborare, quàm pertinaciter vacuationibus insistere. Idcò conferent pulue-

res & cucufæ, aliæque topica, in frigida intemperiei cerebri curatione propofita.

Magis, tamen probantur pulueres, quia virtus pilei non ita cerebro communicatur, & ex eiuſdem ſorditie dolor excitari poteſt.

Præterea fieri poterit inunctio ex ol. amygd. in quo ſerpillum lauri folia, maſtiche, ſpica, mentha, maiorana, thymus, pulegium, nux moſchata, caryophylli, & cinamomum, aut horum nonnulla bullierint, addendo, dum fit ebullitio, vini rubri parum.

Vel ſequens oleum arte chymicâ paratum componi poterit.

℞. Terebinth. lb. j. maſtiche, nucis moſchata, cinamomi, ana ʒ. j. caryophyll. zedoar. galangæ, ladani, ana ʒ. j. ſucci ebuli, & cucumer. agreſt. ana ʒ. j. ol. chamom. & liliorum, ana lb. ſ. vini rubri lb. j. ſ. ſerpilli virid. M. j. Pulueranda puluerentur, & coniiciantur in retortam vitream, extrahaturque oleum, quo deaſum caput illinatur.

Oleum ſuccini ad idem eſt efficax, eoque tempora inungere ſufficiet.

Dum prædicta remedia adminiſtratur, ab ipſo etiam curationis initio, ſpecifica remedia uſurpari poterunt, quale eſt hoc epithema.

℞. Pulu. zedoar. ʒ. j. aquæ betonica, verbenæ, ſambuci, ana ʒ. j. Miſce, applicetur calidè parti dolenti cum pannis ſcarlatinis.

Inter ſpecifica doloris capitis, à quacumque cauſa oriantur, principem locum obtinet verbenæ, cuius aqua deſtillata, & capiti admouetur, & intus aſſumitur ad ʒ. iv. cum ſpiritus ſalis gurt. iij. Imò verò ipſa verbenæ viridis, de collo tantum ſuſpenſa, duos ægros ſanauit apud Foreſtum, cum multa remedia fruſtra uſurpata fuiſſent.

Zacutus Lusitanus *Praxis Med. mirab. obseruat.* 7. 8. 9. & 10. quatuor proponit remedia, experimentis ibidem enarratis confirmata; nempe fonticulum in summa manu, hirudines temporibus affixas, apertionem venæ frontis, & iuxta canthum oculi, quorum historias dictis locis videre est.

Circa illas observationes hæc notanda. Primò, quòd fonticulus inter pollicem & indicem admotus, aliis experimentis comprobatus est, & rebellem capitis dolorem curauit.

Secundò, in curatione quæ per hirudines fit, Zacutum non esse contentum duas vel tres admouere, vt vulgò solet fieri, sed decem aut duodecim circulariter temporibus affigere, vnde maxima sequitur sanguinis attractio, quæ totam materiam morbificam exhaurire potest.

Tertiò in curatione quæ fit sectâ venâ frontis, notandum est eam venam bis sectam fuisse, vnde inuitur primam sectionem satis non profuisse; cum tamen præctici nostri rarò eam operationem repetant, si primâ vice non successerit.

Causa calida dolorem capitis primum & essentialem efficiens, est sanguis, aut bilis. Eademque vtrique conueniunt remedia, sed magis minùsve potentia, pro maiori vel minori causæ efficacia.

Primò igitur à phlebotomia incipiendum est, præmisso clystere, Maior tamen sanguinis copia educenda est, cum dolor fit à sanguine: minor, bile redundante.

Deinde medicamentum purgans bilem exhibendum est: non solum quando bilis causæ principalis rationem obtinet, sed etiam quando sanguis luxuriat, cuius portio tenuior faciliè in bilem vertitur.

Si unicâ euacuatione materia peccans sufficienter

educta non videatur, repetenda erit purgatio per debita interualla.

Postea admoueantur capiti repellentia, & oxyrrhodyna; qualia in curatione phrenitidis fuerunt proposita, mitiora eligendo.

Ac consequenter animalia recentè mactata, aut eorum partes, ad materiæ morbificæ reliquias dissoluendas, & dolorem demulcendum, erunt vtilissima.

In dolore capitis qui per febres continuas affligit, pulmo veruecinus ex recentè mactato animali extractus, & calidè admotus, dolorem potenter demulcet.

Ad idem valet cataplasma ex cucurbita contusa, vel semperuiuo maiore plantis pedum admotum.

Apertio saphenæ, præmissa sufficienti phlebotomiâ in brachio, capitis dolorem in febribus, sæpè in momento fugat.

Interim reuulsiones per cucurbitulas, tam siccas, quàm scarificatas, & frictions extremorum erunt celebrandæ.

Ac toto morbi decursu, si aluus non sit fluida, clysteres emollientes, refrigerantes, & leniter purgantes alternis diebus erunt iniiciendi.

Tum etiam deriuatio rectè & vtiliter celebratur post generales euacuationes & reuulsiones, sectâ venâ frontis, aut eidem admotis hyrudinibus, & vesicatoriis ceruici applicitis.

Dum hæc fiunt, tota humorum massa erit temperanda iulepis, emulsionibus & iusculis, in curatione phrenitidis propositis.

Si denique dolor valdè vrgeat, ad narcotica veniendum est, tam externa, quàm interna prout in dicta curatione phrenitidis usurpata sunt.

Apertio venarum frontis; & hirudines temporibus;

ex Zacuto Lusitano suprà commendatæ, hîc etiam conferre poterunt.

Paræus *lib. 16. cap. 4.* hemicraniam desperatam arteriotomiâ in temporibus celebrata curatam esse refert: nullumque in ea periculum esse testatur. Aperitur arteria ut in plebotomia, & sanguinis impetu ac sactu profluentis 3. vj. detrahendæ. Mox appositis, ut decet, plagulis delegatio faciendâ, & per quadriduum detinenda.

Eandem dicit Botallus in vetustis capitis doloribus, quasi miraculo conferre. Nos etiam illius usu atrocissimam hemicraniam curauimus, & nullum in ea arteriarum apertione periculum esse aduertimus.

Vulneri emplastrum admouendum est, ex thure, mastiche, bolo armeno & pilis leporinis albumine oui subactis. Deinde fascia admouenda, qualis in vulnerebus capitis concinnari solet.

In omni dolore capitis, à quacumque causa fiat, si aliis remediis non cesserit, & doloris atrocitas ad extrema confugere cogat, vesicatorium toti capiti admotum, deerso capillitio, curationem absolueret poterit.

Cauterium futuræ coronali ad motum dolorem capitis contumacem aliquando radicitus abstulit.

Multò maioris est efficaciz, si temporibus admoueat, de quo vide Poterium *observationum centur. 3. cap. 8.* & observationes nostras publico communicatas.





# PRAXEOS MEDICÆ, LIBER SECVNDVS.

---

*De affectibus Oculorum.*

PRÆFATIO.



CVLORVM affectus tam varij sunt atque multiplices, vt difficillimum sit eos perspicuè, atque dilucidè, enarrare ab inuicèmq; distinguere. Quod tamen vt nos; (quantum fieri poterit,) assequi nitamur, & tractationem istam praxeos vsui maximè accommodemus; eos ita partiemur, vt morbi à quibus visio immediatè laeditur, primum exponatur: postmodum: verò reliqui morbi explicentur; qui partibus oculum componentibus;

aut illi adiacentibus , citra ullam aut saltem perexiguam visionis lesionem , contingunt. Læditur autem visio imminutè , abolitè , & depravatè. Abolita visio τυφλωσις Græcis , cecitas Latinis , nominatur. Imminuta verò , pro variis imminutionis gradibus , & modis , varia nomina sortita est , quorum præcipua sunt, Amblyopia, Myopia, Nyctalopia, & acies siue acuties vespertina.

Cecitas vel à nervorum opticorum obstructione absoluta, ( & tunc Amaurosis nominatur, ) vel à suffusione integra, vel aliis humorum & tunicarum vitiis gravioribus exoritur. Amblyopia, quæ Latinis visus obscuritas, hebetudo, vel caligo nominatur, in qua obiecta non satis latè & perspicuè cernuntur, in quacumque distantia posita, ab iisdem cecitatis causis producit, sed levioribus, & imperfectis, ut nervorum opticorum obstructione imperfecta, suffusione levi, spirituum inopia, vel crassitie, & aliis huiusmodi. Myopia, Latinis lusciositas dicitur, in qua obiecta non nisi propinqua, & ferè oculis admota cernuntur, distita verò minimè, vel saltem imperfectè; ut ita affecti notos, & amicos pratercuntes non agnoscant. Fitque secundum Galeni & omnium ferè recentiorum doctrinam; à paucitate & tenuitate spiritus visorij, qui illius non eget medij

*illuminati copia ad perfectè visionem efficiendam, sed ab ea dissipatur. Contrà verò, qui spiritus habent crassos, remota melius vident, quia spiritus ille crassus maiori indiget collustratione, qua in maiori medijs illuminati copia reperitur. Verùm hac doctrina falsissima ex Optica ignorantia oriunda, ex illius theorematibus aperitè demonstratur, ex humoris crystallini situ diuerso, has visionum diuersitates emergere. Cum enim species obiectorum per pyramidem recipiantur in crystallino humore, ad quem conus pyramidis protenditur; si crystallinus ad anteriora & versùs pupillam magis vergat, obiecta remotiora melius videntur, quia ut conus pyramidis ad crystallinum perueniat; & in eo terminetur, obiecta remotiora esse necesse est. Si enim ad oculum magis accedant, conus pyramidis crystallinum transgreditur, & obiecta magis confusa percipiuntur: contrà verò si crystallinus in profundo oculi magis situs sit, & ab vnea tunica magis remotus, obiecta debent oculis esse viciniora, ut conus pyramidis ad eum accedere valeat: unde patet myopiam non aliter fieri, quàm ex situ crystallini profundiori, atque ita affectum hunc esse connaturalem, nèque remediis superabilem. Affectus verò myopia contra-*

rius, in quo nimirum obiecta remotiora melius videntur, scribis plerumque solet contingere: in quibus humoris aquei portio consumpta est, ut crystallinus ad pupillam accedat. Adde quod à longa capitis inclinatione, quæ vitæ decursu fit, vel in legendo, scribendo, vel alia negotia tractando, humor crystallinus sensim ad anteriora vergit. Hac demonstrantur usu specillorum; siquidem myopiâ laborantes iuvantur specillis concavis, à quibus radij specierum visibilium disperguntur, sicque efficiunt ut conus pyramidis longius protendatur, atque adeò res, quæ ob distantiam maiorem à myopicis percipi non poterat, postmodum percipiatur; protenso nimirum pyramidis cono usque ad crystallinum, qui antea in pupilla, vel humore aqueo seu albugineo desinebat. Senes contra iuvantur specillis connexis, quibus radij uniuntur, & conus pyramidis abbreviatur, atque ita res propinqua melius cernuntur, quarum conus antea crystallinum pupillæ propriorem transgrediebatur.

Nyctalopia seu nocturna cacitas, fit, quando interdum quidem satis vident, occidente sole obscurius, noctu verò nihil; fitque à spiritibus, humoribus, aut tunicis crassioribus, vel pupilla angustiore. In iis enim omnibus maius lumen necessarium est ad rectè videndum,

quo deficiente in Solis occasu, vel noctu ad lucernam, parum aut nihil vident.

Vespertina acies siue acuties est quando obscurius interdiu, noctu verò melius vident. Hac etiam aliquando nyctalopia nominata est, ut videre est apud Hipp. 2. prorrh. Vfus tamen retinuit apud recentiores Græcos, ut nyctalopia pro nocturna tantum cæcitate usurpatur. Fitque à tenuitate nimia spirituum, qui multo splendore disgregantur: vel à pupillæ dilatatione, in qua nimium lumen interdiu oculum ingreditur, & visionem ledit, noctu verò exiguum lumen magis illustrat, quàm in iis, qui minùs dilatatam pupillam sortiti sunt.

Quo modo imminutè, & abolitè & depravatè visio ledatur, diligentius exponemus, dum omnium oculi partium morbos sigillatim explicabimus. Cum enim omnes particule oculum constituentes, ad actionem illius, putà visionem, conferant, iisdem partibus vitiatis, visionem etiam malè affici necesse est.

Componitur autem oculus ex tunicis, humoribus & nervo optico, ad quarum partium actionem, spiritus animalis tanquam agens principale, & vniuersale concurrit. Atque, ut earum partium morbos percurramus à nervi optici vitiata constitutione ordiemur, mox ad humorum & tunicarum affectus progrediemur.

*Spirituum autem vitia, vel à cerebro malè affecto dependent, & tunc alij sensus quoque laeduntur, vel ab ipsius oculi vitiis, quibus curatis, pristinam, atque debitam constitutionem spiritus recipiunt, ut peculiaris eorum tractatio necessaria non sit. Sed in oculorum affectibus curandis, quibus visio laeditur, ea qua spiritus visus reficiunt, & visum confortare dicuntur, reliquis remediis perpetuò admiscenda sunt.*

---

## CAPVT PRIMVM.

*De Gutta serena.*

**Q**Vando visio aboletur, nullo sensibili vitio in oculis apparente, Amaurosis, seu Gutta serena, affectus ille nominatur. Fitque, dum spiritus animales à cerebro ad oculum transire nequeunt. Cùm autem spiritus animales à cerebro, per nervos opticos in oculos influant, influxus illius impedimentum in nervis opticis querendum est. Multis autem modis affici possunt nervi optici, potissimùm verò obstructione, adstrictione, & solutione continui.

Obstructio communissima est, & maximè ordinaria guttæ serenæ causa, quæ ab humore pituitoso generatur, à cerebro in nervos illabente, non secus ac alij nervi in paralyfi ab eodem humore obstruuntur, ita ut consimiles affectus ratione illius obstructionis, dici possint.

Certum tamen est, ab adstrictione & compressione nervorum opticorum hunc affectum etiam generari;

quæ quidem compressio fieri potest, tum ab humore pituitoso, circa nervos opticos collecto, eosque comprimente? tum etiam à sanguine, purè, aliâve materia in eodem loco cumulata. Vnde tumores quælibet in iis partibus geniti, similem affectum possunt producere. Docet enim experientia, cerebri inflammationi, tum etiam phrenitidi, in febribus malignis cæcitatem, interdum in vno oculo, interdum in utroque superuenire. Et refert Platerus *lib. 1. observationum*, cæcitatem à se visam, quæ à tumore globoso in cerebro enata, & nervos opticos comprimente ortum duxerat; quod per dissectionem cadaueris post ægri obitum innotuit.

Denique vulnera capiti inflicta, in quibus nervi optici præscinduntur, sine controuersia efficiunt, ut spiritus animales ad oculos amplius influere nequeant.

Dignoscitur hic affectus, quòd oculi in statu naturali constituti videntur, nullumque vitium in iis conspicitur, nisi quòd pupilla nigrior & amplior apparet. Verum in causarum differentiis distinguendis maxima difficultas est. Licet enim à sanguine aut pure genitus affectus, ex inflammatione, abscessu aut vulnere prægresso dignoscatur, nullum tamen signum certum dari potest, per quod compressionem ab humore pituitoso factam, ab obstructione distinguere possimus. Coniectura tamen id quodammodo assequi possumus quandoquidem in obstructione sola nervi optici solus oculus afficitur. Si vero eiusdem nervi compressio fiat humoribus pituitosis circa oculorum radices & processus mammillares collectis, vel illa materia alias etiam cerebri partes occupet; tunc reliqui sensus læduntur, aut eorum nonnulli. Si verò nervos tantum opticos obsideat, materia pituitosa so-

lito copiosior per nares excernitur, & grauitatis sensus in anteriori capitis parte, præsertim circa supercilia, percipitur.

Quod ad prognosim spectat, hic affectus, si absolutus sit, id est, si integra sit visus abolitio, ab obstructione nerui optici præsertim oriunda; plerumque incurabilis est: quemadmodum etiam videmus obstructiones aliorum neruorum, à quibus generatur paralytis, vix aut nunquam curari, præcipue in iis, qui ætate prouecti sunt. Si verò imperfecta tantum sit obstructio, quæ visus tantum imminutionem, non autem cæcitatem efficiat, maior salutis spes est; licet, ea non nisi magno labore & longissimo remediorum usu optineri possit.

Si verò hic affectus fiat ab humoribus in anteriore cerebri parte collectis, & neruos comprimentibus, facilius curari potest. Sic refert Fabricius Hildanus *obseru. 19. cent. 5.* virum quemdam, ex assumpto vomitorio vehementi visum amisisse, eumque, eiusdem medicamenti beneficio recuperasse: quandoquidem vehementis vomitorij, vt humores nimium exagitari, & versùs neruos opticos propulsi, eodem comprimendo, spiritum ad oculos com meatum impediabant; iisdem verò, eodem medicamento euacuat, morbus solutus est. Similis ferè historia refertur à Sennerto de quodam studioso, cui cum medicamentum purgans fortius exhibitum fuisset, subitò obcæcatus est. Idem etiam testatur foeminas quasdam, cum in utero concepissent, ex neruorum opticorum angustia obcæcatas fuisse, malumque hoc post quatuor aut quinque menses, vel tempore partus, omninò desuisse. Nos etiam nonnullos vidimus, qui subitò in maximam visus imminutionem inciderant, vacuationibus vniuersalibus & reuulsionibus quibusdam intra quindecim dies fuisse resti-



autos. Ex facilitate curationis coniecimus, humorem non intra nerui substantiam, impactum, sed in cerebro tantum circa eosdem neruos congestum fuisse.

Ad huius morbi curationem, materia neruis impacta vel adhærens, quæ obstructionem vel adstrictionem efficit, euacuanda est. Quod fieri non potest, nisi prius vniuersum corpus euacuatur, quemadmodum docuit Galen. 4. *meth.* oculum non esse sanandum ante totum caput; neque Caput, ante totum corpus.

Atque vt remedia conuenienti methodo describantur, victus ratio huic morbo conueniens primum instituenda est, quæ quidem attenuans & moderatè siccans esse debet. Ac primum aër ad calidum & siccum inclinare debet crassus verò, frigidus, nebulosus ac pluviosus, omnino vitandus. Cibi laudabiles ac boni succi vsurpentur, vitando eos qui crassum succum generant; quales sunt caro porcina, anserina, pisces, legumina, caseus & similia; tum etiam ea, quæ vaporosa cum sint, caput replent, vt lacticia & aromata calidiora, piper nimirum, zinziber, &c. Panis conficiatur cum aqua fœniculi, aut eiusdem semen permisceatur sedulo cauendo, ne tritico; ex quo panis conficitur, lolium admistum sit, quod visui maximè obesse tota credidit antiquitas. Vnde apud Comicum, ille qui alteri, visus defectum exprobat, *lolio*, (inquit) *credo victitare te*. In ciborum condimentis & iusculis; vtatur iis quæ extenuandi vim habent, vt hyssopo, fœniculo, maiorana, betonica, saluia, euphrasia, ac præsertim nuce moschata, quæ cerebrum roborat, visumque clarificat. Raparum vsus frequens esse debet, quia oculos acutiores reddere creduntur. Idem etiam præstant passeret & columbæ frequenter esitata. Vi-

℞. Contundantur purgantia, & ponantur in vase vitreo cum spiritu vini, vt octo digitos superemineat, & digerantur per octo dies in loco calido, postea adijciatur pulvis diarrhod. Et infundantur adhuc per quatuor dies. Mox colentur omnia, & fortiter exprimantur. Liquor expressus distilletur in balneo, donec in fundo alembici extractum redeat ad eam crassitiem, quæ pilulis efformandis idonea sit, quarum dosis est. ℞. j.

Sequentes verò pilulæ Fernelio tribuuntur, quarum se tantam vim experiendo cognouisse affirmabat, vt nullam cephalalgiam, aut hemicraniam offenderit, quam non curauerit.

℞. Aloës opt. ℞. β. pulu. electar. de gemmis, trium fantal. rosar. rubrar. ana gr. iij. Cum syrupo absinthi, & violar. fiat massa. Detur ℞. j. bis in hebdomada hora j. vel ij. ante cœnam.

Ac denique in contumaci dolore & inueterato omnia conuenient remedia, quæ pro curatione frigida intemperiei cerebri fuerunt proposita. Inter quæ non infimum locum obtinent emplastra epispastica. Quibus etiam non conferentibus, nonnulli ausi sunt capiti ad-mouere emplastrum de Virgo cum mercurio, quod multis pituitosis humoribus per sputa euacuatis, inueteratos capitis dolores interdum cessasse asserunt.

Thermæ sulphureæ, ac bituminosæ in hoc casu efficacissimæ sunt, tum balneo, tum lotione capitis.

Plurimum etiam conferunt, in dolore inueterato, decocta sudorifica, quibus multos fuisse liberatos, apud celeberrimos Autores legere est.

Quibus non conferentibus, Mercatus ad stibij usum audet confugere, eumque cum elogio commendat. *l. i. de intern. morb. curatione cap. 8.* In dolore autem diurno plus præstat caput frequētius roborare, quàm pertinaciter vacationibus insistere. Ideò conferent pulue-

res & cucufa, aliaque topica, in frigida intemperici cerebri curatione propoſita.

Magis tamen probantur pulueres, quia virtus pilei non ita cerebro communicatur, & ex eiufdem ſorditie dolor excitari poteſt.

Præterea fieri poterit inunctio ex ol. amygd. in quo ſerpillum lauri folia, maſtiche, ſpica, mentha, maiorana, thymus, pulegium, nux moſchata, caryophilli, & cinamomum, aut horum nonnulla bullierint, addendo, dum fit ebullitio, vini rubri parùm.

Vel ſequens oleum arte chymicâ paratum componi poterit.

℞. Terebinth. lb. j. maſtiches, nucis moſchatae, cinamomi, ana ʒ. j. caryophyll. zedoar. galangæ, ladani, ana ʒ. j. ſ. ſucci ebuli, & cucumer. agreſt. ana ʒ. j. ol. chamom. & liliorum, ana lb. ſ. vini rubri lb. j. ſ. ſerpilli virid. M. j. Pulueranda puluerentur, & coniiciantur in retortam vitream, extrahaturque oleum, quo deaſum caput illinatur.

Oleum ſuccini ad idem eſt efficax, eoque tempora inungere ſufficiet.

Dum prædicta remedia adminiſtratur, ab ipſo etiam curationis initio ſpecifica remedia uſurpari poterunt, quale eſt hoc epithema.

℞. Pulu. zedoar. ʒ. j. aquæ betonicæ, verbenæ, ſambucij, ana ʒ. j. Miſce, applicetur calidè parti dolenti cum pannis ſcarlatinis.

Inter ſpecifica doloris capitis, à quacumque cauſa oriantur, principem locum obtinet verbena, cuius aqua deſtillata, & capiti admouetur, & intùs aſſumitur ad ʒ. iv. cum ſpiritus ſalis gutt. iij. Imò verò ipſa verbena viridis, de collo tantum ſuſpenſa, duos ægros ſanauit apud Foreſtum, cùm multa remedia fruſtra uſurpata fuiſſent.

Zacutus Lusitanus *Praxis Med. mirab. obseruat.* 7. 8. 9. & 10. quatuor proponit remedia, experimentis ibidem enarratis confirmata; nempe fonticulum in summa manu, hirudines temporibus affixas, apertionem venæ frontis, & iuxta canthum oculi, quorum historias dictis locis videre est.

Circa illas obseruationes hæc notanda. Primò, quòd fonticulus inter pollicem & indicem admotus, aliis experimentis comprobatus est, & rebellem capitis dolorem curauit.

Secundò, in curatione quæ per hirudines fit, Zacutum non esse contentum duas vel tres admouere, vt vulgò solet fieri, sed decem aut duodecim circulariter temporibus affigere, vnde maxima sequitur sanguinis attractio, quæ totam materiam morbificam exhaurire potest.

Tertiò in curatione quæ fit sectâ venâ frontis, notandum est eam venam bis sectam fuisse, vnde inuitur primam sectionem satis non profuisse; cum tamen practici nostri rarò eam operationem repetant, si primâ vice non successerit.

Causa calida dolorem capitis primum & essentialem efficiens, est sanguis, aut bilis. Eademque vtrique conueniunt remedia, sed magis minùsve potentia, pro maiori vel minori causæ efficacia.

Primò igitur à phlebotomia incipiendum est, præmissò clystere, Maior tamen sanguinis copia educenda est, cum dolor fit à sanguine: minor, bile redundante.

Deinde medicamentum purgans bilem exhibendum est: non solum quando bilis causæ principalis rationem obtinet, sed etiam quando sanguis luxuriat, cuius portio tenuior faciliè in bilem vertitur.

Si unicâ euacuatione materia peccans sufficienter

educta non videatur, repetenda erit purgatio per debita intervalla.

Postea admoucantur capiti repellentia, & oxyrrhodyna; qualia in curatione phrenitidis fuerunt proposita, mitiora eligendo.

Ac consequenter animalia recentè mactata, aut eorum partes, ad materiæ morbificæ reliquias dissoluedas, & dolorem demulcendum, erunt vtilissima.

In dolore capitis qui per febres continuas affligit, pulmo veruecinus ex recentè mactato animali extractus, & calidè admotus, dolorem potenter demulcet.

Ad idem valet cataplasma ex cucurbita contusa, vel semperuiuo maiore plantis pedum admotum.

Apertio saphenæ, præmissa sufficienti phlebotomiâ in brachio, capitis dolorem in febribus, sæpè in inomento fugat.

Interim reuulsiones per cucurbitulas, tam siccas, quàm scarificatas, & frictiones extremorum erunt celebrandæ.

Ac toto morbi decursu, si aluus non sit fluida, clysteres emollientes, refrigerantes, & leniter purgantes alternis diebus erunt iniiciendi.

Tum etiam deriuatio rectè & vtiliter celebratur post generales euacuationes & reuulsiones, sectâ venâ frontis, aut eidem admotis hyrudinibus, & vesicatoriis ceruici applicitis.

Dum hæc fiunt, tota humorum massa erit temperanda iulepis, emulsionibus & iusculis, in curatione phrenitidis propositis.

Si denique dolor valdè vrgeat, ad narcotica veniendum est, tam externa, quàm interna prout in dicta curatione phrenitidis vsurpata sunt.

Apertio venarum frontis, & hirudines temporibus;

ex Zacuto Lusitano suprà commendatà, hîc etiam conferre poterunt.

Paræus *lib. 16. cap. 4.* hemicraniam desperatam arteriotomiâ in temporibus celebrata curatam esse refert: nullûmque in ea periculum esse testatur. Aperitur arteria vt in plebotomia, & sanguinis impetu ac factu profilientis  $\frac{3}{4}$ .vj. detrahendâ. Mox appositis, vt decet, plagulis delegatio faciendâ, & per quatrîduum detinendâ.

Eandem dicit Botallus in vetustis capitis doloribus, quâsi miraculo conferre. Nos etiam illius vsu atrocissimam hemicraniam curauimus, & nullum in ea arteriarum apertione periculum esse aduertimus.

Vulneri emplastrum admouendum est, ex thure, mastiche, bolo armeno & pilis leporinis albumine oui subactis. Deinde fascia admouenda, qualis in vulneribus capitis concinnari solet.

In omni dolore capitis, à quacumque causa fiat, si aliis remediis non cesserit, & doloris atrocitas ad extrema confugere cogat, vesicatorium toti capiti admotum, deraiso capillitio, curationem absoluerè poterit.

Cauterium futuræ coronali ad motum dolorem capitis contumacem aliquando radicitus abstulit.

Multò maioris est efficacîæ, si temporibus adinoneatur, de quo vide Poterium *observationum centur. 3. cap. 8.* & obseruationes nostras publico communicatas.



# PRAEIOS MEDICÆ, LIBER SECVNDVS.

---

## *De affectibus Oculorum.*

### P R Æ F A T I O.



**O**CVLORVM affectus tam varij sunt atque multiplices, vt difficillimum sit eos perspicuè, atque dilucidè, enarrare ab inuicèmq; distinguere. Quod tamen vt nos, (quantum fieri poterit,) assequi nitamur, & tractationem istam praxeos vsui maxime accommodemus; eos ita partiemur, vt morbi à quibus visio immediatè laeditur, primum exponatur: postmodum: verò reliqui morbi explicentur, qui partibus oculum componentibus,

aut illi adiacentibus , citra ullam aut saltem perexiguam visionis lationem , contingunt. Leditur autem visio imminutè , abolitè , & depravatè. Abolita visio τυφλότης Græcis , cacitas Latinis , nominatur. Imminuta verò , pro variis imminutionis gradibus , & modis , varia nomina sortita est , quorum precipua sunt, Amblyopia, Myopia, Nyctalopia, & acies siue acuties vespertina.

Cacitas vel à nervorum opticorum obstructione absoluta, ( & tunc Amaurosis nominatur, ) vel à suffusione integra, vel aliis humorum & tunicarum vitiis gravioribus exoritur. Amblyopia, quæ Latinis visus obscuritas, hebetudo, vel caligo nominatur, in qua obiecta non satis latè & perspicuè cernuntur, in quacumque distantia posita, ab iisdem cacitatis causis producitur, sed levioribus, & imperfectis, ut nervorum opticorum obstructione imperfecta, suffusione levi, spirituum inopia, vel crassitie, & aliis huiusmodi. Myopia, Latinis lusciositas dicitur, in qua obiecta non nisi propinqua, & ferè oculis admota cernuntur, disita verò minimè, vel saltem imperfectè; ut ita affecti notos, & amicos pratercuntes non agnoscant. Fitque secundum Galeni & omnium ferè recentiore doctrinam; à paucitate & tenuitate spiritus visorij, qui illius non eget medij



*illuminati copia ad perfectè visionem efficiendam, sed ab ea dissipatur. Contrà verò, qui spiritus habent crassos, remota melius vident, quia spiritus ille crassus maiori indiget collustratione, quæ in maiori mediij illuminati copia reperitur. Verùm hæc doctrina falsissima ex Optica ignorantia oriunda, ex illius theorematibus aperitè demonstratur, ex humoris crystallini situ diuerso, has visionum diuersitates emergere. Cum enim species obiectorum per pyramidem recipiantur in crystallino humore, ad quem conus pyramidis protenditur; si crystallinus ad anteriora & versùs pupillam magis vergat, obiecta remotiora melius videntur, quia ut conus pyramidis ad crystallinum perueniat; & in eo terminetur, obiecta remotiora esse necesse est. Si enim ad oculum magis accedant, conus pyramidis crystallinum transgreditur, & obiecta magis confusa percipiuntur: contrà verò si crystallinus in profundo oculi magis situs sit, & ab vnea tunica magis remotus, obiecta debent oculis esse viciniora, ut conus pyramidis ad eum accedere valeat: unde patet myopiam non aliter fieri, quàm ex situ crystallini profundiori, atque ita affectum hunc esse connaturalem, nèquet remediis superabilem. Affectus verò myopia contra-*

*rius, in quo nimirum objecta remotiora melius videntur, senibus plerumque solet contingere: in quibus humoris aquei portio consumpta est, ut crystallinus ad pupillam accedat. Adde quod à longa capitis inclinatione, quæ vitæ decursu fit, vel in legendo, scribendo, vel alia negotia tractando, humor crystallinus sensim ad anteriora vergit. Hæc demonstrantur usu specillorum; siquidem myopiâ laborantes inuuantur specillis concavis, à quibus radij specierum visibilium disperguntur, sicque efficiunt ut conus pyramidis longius protendatur; atque adeò res, quæ ob distantiam maiorem à myopicis percipi non poterat, postmodum percipiatur; protenso nimirum pyramidis cono usque ad crystallinum, qui antea in pupilla, vel humore aqueo seu albugineo desinebat. Senes contra inuuantur specillis connexis, quibus radij uniuntur, & conus pyramidis abbreviatur, atque ita res propinqua melius cernuntur, quarum conus antea crystallinum pupilla propriorem transgrediebatur.*

*Nyctalopia seu nocturna cacitas, fit, quando interdum quidem satis vident, occidente sole obscurius; noctu verò nihil; fitque à spiritibus, humoribus, aut tunicis crassioribus, vel pupilla angustiore. In iis enim omnibus maius lumen necessarium est ad rectè videndum;*

quo deficiente in Solis occasu, vel noctu ad lucernam, parum aut nihil vident.

Vespertina acies sine acuties est quando obscurius interdiu, noctu verò melius vident. Hæc etiam aliquando nyctalopia nominata est, ut videre est apud Hipp. 2. prorrh. Vfus tamen retinuit apud recentiores Græcos, ut nyctalopia pro nocturna tantum cacitate usurpatur. Fitque à tenuitate nimia spirituum, qui multo splendore disgregantur: vel à pupilla dilatatione, in qua nimium lumen interdiu oculum ingreditur, & visionem ledit, noctu verò exiguum lumen magis illustrat, quàm in iis, qui minùs dilatatam pupillam sortiti sunt.

Quo modo imminutè, & abolitè & depravatè visio ledatur, diligentius exponemus, dum omnium oculi partium morbos sigillatim explicabimus. Cum enim omnes particule oculum constituentes, ad actionem illius, putà visionem, conferant, iisdem partibus vitiatis, visionem etiam malè affici necesse est.

Componitur autem oculus ex tunicis, humoribus & neruo optico, ad quarum partium actionè, spiritus animalis tanquam agens principale, & uniuersale concurrat. Atque, ut earum partium morbos percurramus à nerui optici vitiata constitutione ordiemur, mox ad humorum & tunicarum affectus progrediemur.

*Spirituum autem vitia, vel à cerebro malè affecto dependent, & tunc alij sensus quoque laeduntur, vel ab ipsius oculi vitiis, quibus curatis, pristinam, atque debitam constitutionem spiritus recipiunt, ut peculiaris eorum tractatio necessaria non sit. Sed in oculorum affectibus curandis, quibus visio laeditur, ea quæ spiritus visuos reficiunt, & visum confortare dicuntur, reliquis remediis perpetuò admiscenda sunt.*

---

## CAPVT PRIMVM.

*De Gutta serena.*

**Q**Vando visio aboletur, nullo sensibili vitio in oculis apparente, Amaurosis, seu Gutta serena, affectus ille nominatur. Fitque, dum spiritus animales à cerebro ad oculum transire nequeunt. Cùm autem spiritus animales à cerebro, per nervos opticos in oculos influant, influxus illius impedimentum in nervis opticis querendum est. Multis autem modis affici possunt nervi optici, potissimùm verò obstructione, adstrictione, & solutione continui.

Obstructio communissima est, & maximè ordinaria guttæ serenæ causa, quæ ab humore pituitoso generatur, à cerebro in nervos illabente, non secus ac alij nervi in paralyfi ab eodem humore obstruuntur, ita vt consimiles affectus ratione illius obstructionis, dici possint.

Certum tamen est, ab adstrictione & compressione nervorum opti-  
corum hunc affectum etiam generari;

quæ quidem compressio fieri potest, tum ab humore pituitoso, circa nervos opticos collecto, eosque comprimente; tum etiam à sanguine, purè, aliâve materia in eodem loco cumulata. Vnde tumores quælibet in iis partibus geniti, similem affectum possunt producere. Docet enim experientia, cerebri inflammationi, tum etiam phrenitidi, in febribus malignis cæcitatem, interdum in vno oculo, interdum in utroque superuenire. Et refert Platerus lib. 1. *observationum*, cæcitatem à se visam, quæ à tumore globoso in cerebro enata, & nervos opticos comprimente ortum duxerat; quod per dissectionem cadaveris post ægri obitum innotuit.

Denique vulnera capiti inflicta, in quibus nervi optici præscinduntur, sine controuersia efficiunt, ut spiritus animales ad oculos amplius influere nequeant.

Dignoscitur hic affectus, quòd oculi in statu naturali constituti videntur, nullumque vitium in iis conspicitur, nisi quòd pupilla nigrior & amplior apparet. Verum in causarum differentiis distinguendis maxima difficultas est. Licet enim à sanguine aut pure genitus affectus, ex inflammatione, abscessu aut vulnere prægresso dignoscatur, nullum tamen signum certum dari potest, per quod compressionem ab humore pituitoso factam, ab obstructione distinguere possimus. Coniectura tamen id quodammodo assequi possumus quandoquidem in obstructione sola nervi optici solus oculus afficitur. Si vero eiusdem nervi compressio fiat humoribus pituitosis circa oculorum radices & processus mammillares collectis, vel illa materia alias etiam cerebri partes occupet; tunc reliqui sensus læduntur, aut eorum nonnulli. Si verò nervos tantum opticos obsideat, materia pituitosa so-

autos. Ex facilitate curationis coniecimus, humorem non intra nerui substantiam, impactum, sed in cerebro tantum circa eosdem neruos congestum fuisse.

Ad huius morbi curationem, materia neruis impacta vel adhærens, quæ obstructionem vel adstrictionem efficit, euacuanda est. Quod fieri non potest, nisi prius vniuersum corpus euacuatur, quemadmodum docuit Galen. 4. *meth.* oculum non esse sanandum ante totum caput; neque Caput, ante totum corpus.

Atque vt remedia conuenienti methodo describantur, victus ratio huic morbo conueniens primum instituenda est, quæ quidem attenuans & moderatè siccans esse debet. Ac primum aër ad calidum & siccum inclinare debet crassus verò, frigidus, nebulosus ac pluuiosus, omnino vitandus. Cibi laudabiles ac boni succi usurpentur, vitando eos qui crassum succum generant; quales sunt caro porcina, anserina, pisces, legumina, caseus & similia; tum etiam ea, quæ vaporosa cum sint, caput replent, vt lacticia & aromata calidiora, piper nimirum, zinziber, &c. Panis conficiatur cum aqua foeniculi, aut eiusdem semen permisceatur sedulo cauendo, ne tritico, ex quo panis conficitur, lolium admistum sit, quod visui maximè obesse tota credidit antiquitas. Vnde apud Comicum, ille qui alteri, visus defectum exprobat, *lolio*, (inquit) *credo vilitare te*. In ciborum condimentis & iusculis; vtatur iis quæ extenuandi vim habent, vt hyssopus, foeniculo, maiorana, betonica, salvia, euphrasia, ac præsertim nuce moschata, quæ cerebrum roborat, visumque clarificat. Raparum vsus frequens esse debet, quia oculos acutiores reddere creduntur. Idem etiam præstant passeret & columbæ frequenter esitæ. Vi-

tandæ herbæ frigidiores, ac imprimis lactuca, quæ oculis infensa est.

Ciborum quantitas moderata sit, neque vnquam æger iis se immodicè repleat. Cœna sit parcior prandio; & semel, aut bis in septimana, à cœna abstinere vtilissimum est. In pastu loco salis conferet vti puluere sequenti.

℞. Salis communis ℥. ij. euphrasie sic. ℥. ij. nuc. mosch. ℥. j. cinamom. ℥. ij. M. fiat puluis. Post singulos pastus capiat æger pulueris sequentis cochl. j.

℞. Sem coriand. præparati ℥. β. semin. anisi, fœniculi, ana ℥. ij. cinamom. nuc. mosch. ana ℥. j. euphrasie sicce ℥. iij. sacchari rosac. duplum pondus omnium, fiat puluis.

Vinum in hoc affectu non conuenit, quia vaporosum est, & caput replet, fluxionibusque promouendis maximè idoneum. Ideo decoctum salis parillæ, liquiritia dulcoratum, & coriandro aromatizatum erit vtilissimum. Sed quia diuturnus admodum est affectus, & omnes tam longam vini abstinentioniam ferre nequeunt, si illius vsus concedendus sit, eligatur oligophorum, quodque minùs generosum minùsque potens est. Multoque vtilius erit, si euphrasia sicca in eo ante maduerit. Atque vt ad longum vsum paretur vinum euphrasiatum, in doliolo musto repleto, vindemiarum tempore, euphrasia demittatur; eoque vino vtatur æger pro potu ordinario.

Somnus consueto breuior sit, & decubitus supinus quantum fieri potest, somnusque fugiatur meridianus, tanquam maximè noxius. Exercitia moderata sint, eorumque loco frictions inferiorum partium celebrentur. Alius luxa perpetuò seruetur, & grauia, animi pathemata fugiantur.

Instituta in hunc modum victus ratione, curatio ab vniuersali

vnictali euacuatione incipienda est. Ac primum purgatio instituenda est sequuti medicamento.

℥. Sennæ mund. ʒ. β. semin. fœnic. ʒ. j. folior. beton. euphras. & verben. ana M. β. liquiritiæ β. iij. Coquantur ad ʒ. iij. In colatura dissolue diaphœnici ʒ. iij. syr. rosac. ʒ. j. Fiat potio, quæ detur manè cum regimine.

Post primam illam purgationem, seridè apud se cogitare debet Medicus, an phlebotomia vsurpanda sit. Quandoquidem ea ab omnibus ferè practicis in hoc casu reiicitur, cùm affectus sit chronicus à frigida intemperie & materia pituitosa oriundus. Vnde metuunt, ne per sanguinis euacuationem cerebrum magis refrigeretur, sicque maiorem pituitæ copiam generet, & ne causa morbi coniuncta magis incrassetur, atque ita difficilius discuti ac dissipari valeat. Verùm, vt eorum sententia in senibus & pituitoso temperamento prædictis locum habere debet: in iis tamen, qui aut in iuuenili ætate constituti, aut calido temperamento præditi sunt, admittenda non est, præsertim si sanguinis redundantis notæ manifestæ appareant: tunc dubium non est, quin phlebotomia maturè vsurpata plurimum conferre valeat. Imò verò vbi sanguinis mittendi indicationes prædictæ reperiuntur, vtile erit ex Pauli & Aëtij sententia, post venæ sectionem in brachio celebratam, venas capitis particulares & oculis vicinas aperire, nempe venam frontis, temporum, & eas, quæ sunt in angulis oculorum iuxta nasi radicem. Temporibus tamen commodius hirudines applicabuntur, quæ etiam ponè aures admotæ, non parum conferre poterunt. Refertur practici nonnulli, ob frontis vulnera, nonnullos à cœcitate fuisse liberatos. In quibus cœcitatis causam verisimile est fuisse neruorum opticorum compressionem à venis & arteriis vicinis sanguine turgentibus,



quas dicta vulnera depleuere. Vnde Spigelius, referente Plempio *in ophthalmographia*, in gutta serena non sine fructu mediam frontis venam pertundere solebat, sanguinemque tamdiu euacuabat, donec sua sponte erumpere desineret.

Si verò mensium suppressio hunc affectum præcesserit, ex venis inferioribus sanguis detrahendus est, aut hirudines hæmorrhoidibus affigendæ, si æger earum fluxum antea passus fuerit, qui tunc temporis suppressus sit, vel si hepate calidiori, aut melancholico temperamento donatus sit.

Postmodum verò, totum corpus exactiùs vacuandum est apozemate sequenti.

℞. Rad. fœnic. salsa paril. ireos Florent. & enulæ camp. ana ℥. j. folior. betonic. maioranæ, melissæ, euphras. fœnic. vrben. & chelidon. maior. ana M. j. liquiritiæ rasa & passular. mund. ana ℥. j. semin. anisi & fœnic. ana ʒ. iiij. fennæ mund. ʒ. ij. turbith gummosi & agarici recenter trochisc. ana ʒ. ij. zinzib. & caryophyllor. ana ʒ. j. flor. stœchad. anthos, & lauendulæ, ana P. j. Coquantur ad quartar. ʒ. In colatura dissolue sacchari albi ʒ. iiij. Fiat apozema clarificat. & aromatizat. ʒ. ij. cinamomi electi, pro iiij. dosib. matutinis. Finitis apozematis, exhibeantur pilulæ sequentes.

Acc. massæ pilular. lucis maj. & cochiar. min. ana ʒ. ʒ. Malaxentur cum aqua betonicæ, formentur pilulæ sex deauratæ, quas capiat summo mane.

Præmissa hæc vniuersali euacuatione, causa antecedens reuellenda est, coniuncta verò deriuanda ac discutienda.

In hunc finem frictiones partium extremarum, & præcipuè inferiorum, matutinis horis celebrandæ sunt,

Cucurbitulæ scapulis & dorso sine scarificatione ad-  
mouendæ. Ac præsertim cucurbitula occipitio cum sca-  
rificatione admota, tanta efficacîâ humores à partibus  
anterioribus & neruorum principio detrahit, vt nonnulli  
post illius applicationem, quâs momento visum recu-  
perauerint.

Eodem tempore, vesicatorium posteriori parti  
cervicis admouendum, & vesiculæ excitatæ seruen-  
tur diu apertæ, betæ aut brassicæ foliis frequenter ad-  
motis.

Exsiccato vesicatorio, admoveatur causticum occi-  
piti, inter primam & secundam vertebram; vel ( quod  
iam apud nos in frequenti usu est ) duo caustica appli-  
centur posteriori parti cervicis, iuxta quartam & quin-  
tam colli vertebram, ita vt spina dorsî utrique cauterio  
intermedia sit, & utrumque eodem emplastro curari va-  
leat.

Loco cauteriorum, setaceum eidem parti admotum ef-  
ficacissimum est; sed nostrorum hominum mollities il-  
lius usum penè aboleuit.

Si prædicta cauteria non profuerint, futuræ coronali  
admoueri potest causticum potentiale, quod aliquando  
profuit, reliquis non conferentibus.

Dum hæc fiunt, statim post purgationem vniuersalem,  
diætâ sudorifica instituenda est ex decocto ligni gua-  
iaci, sassapar. & rad. salsæ paril. iuxta methodum, quæ in  
frigida cerebri intemperiei curatione à nobis proposita  
est. Hoc tamen aduertendo, vt decocto sudorifico, & cir-  
ca finem illius addantur ea, quæ oculos peculiariter res-  
piciunt, vt verbenâ, sceniculum, euphrasia & chelidonia  
maior.

Et ad cerebrum potentius exsiccandum, sacculi loco  
prædicto descripti, tempore sudoris capiti admouendi  
sunt, si nimia illius calefactio non metuat.

Imò verò, post diætam sudorificam, vsus thermarum sulphurearum & bituminosarum tum balneo, tum capitis irrigatione erit conuenientissimus; cùm huiusmodi aquæ ad frigidam & humidam intemperiem corrigendam, pituitam absumentam, & cerebrum roborandum efficacissimæ sunt.

Præter vniuersales totius corporis & capitis euacuationes, peculiares etiam institui possunt per apophlegmatismos; quibus pituita per palatum e cerebro elicitur: qui quidem formâ gargarismatis aut masticatorij præscribi possunt, iuxta formulas in cerebri frigida intemperiei curatione descriptas.

Erthina & sternutatoria ab omnibus propemodum practicis damnantur in hoc affectu, quia humores ad oculos attrahunt, si tamen post exactam totius corporis & capitis ipsius euacuationem, mitiora & benigniora per aliquot dies vsurpentur, vtilia esse poterunt: siquidem materiam morbificam neruis opticis intractam, sensim educere ac deriuare poterunt, neque ex profundioribus cerebri partibus quicquam elicient ad partes anteriores. Alioquin in omni deriuatione, quæ est euacuatio per partem affectam, aut ipsi vicinam, perpetuò metendum esset, ne ad ipsam partem affectam fieret attractio, quæ tamen ab vniuersalibus euacuationibus, quæ ipsam debent præcedere, faciliè impeditur. Illa autem erthina componi poterunt ex succo betæ & maioranæ cum vino albo extracto, in quo manna dissoluta fuerit.

Potentius autem & nihilominus tutum errhinum parari potest ex puluere nicotianæ, præcipuis cephalicis, & oxydorcicis correcto. Ab eo enim per palatum magis, quàm per nares, pituita educitur & cerebrum ita roboratur, vt non adeò faciliè humorum influxum ab

aliis partibus recipiat. Illius igitur compositio talis erit.

℞. Nicotianæ siccæ ʒ. j. fol. saluiæ, maioran. beton. euphras. flor. caryophyllatæ nostratis, & rosar. rub. an. ʒ. j. Fiat pulvis, qui naribus attrahatur manè per aliquot dies.

Neque sufficit purgatione vniuersali totum corpus ab humoribus excrementitiis semel liberare, sed in eo statu conseruandum est toto curationis decursu; atque adedò purgationibus interpolatis, quæ in dies congeruntur excrementa educenda sunt, quod fiet pilulis vsualibus in hunc modum compositis.

℞. Aloës optimæ ʒ. β. sennæ mund. turbith. hermodactyl. & agarie. recenter trochisc. an. ʒ. ij. diagrydij ʒ. j. maccis, caryophyllor. & croci Orientalis ana gr. vij. Irrorentur succo maioranæ & chelidoniæ mai. Deinde iterum exsiccentur in vmbra, & cum oxymelite scillit. fiat massa pilularum, de qua capiat ʒ. β. vel ʒ. ij. bis aut ter in mense.

Dum hæc fiunt, cerebri & oculorum roborationi perpetuò insistendum est, & varia medicamenta vicissim vsurpanda; ne æger, vnum & idem continuò sumendo nimium fastidiat, néve natura idem remedio assuescat: Inter ea verò, quæ hac dote prædita sunt, recensetur thetriacæ vetus, quæ ʒ. j. pondere sumi potest horâ somni, cum aqua fœniculi, euphras. & chelidoniæ, bis aut ter in septimana.

Commendatur etiam nux moschatâ manè, ieiunio stomacho, comesta, & dentibus diu attrita, vt vapor illius ad oculos deferatur. Si illius deglutitio metuatur, propter viscerum calorem; expui potest post comestionem.

Myrobalani conditæ manè assumptæ, vñ maxime clarificare existimantur;

Opiata etiam vsualis ita componi poterit.

℞. Conferuæ flor. beton. & anthos, ana ʒ.ij. myrobalanos conditas num.ij. theriacæ veter. ʒ.ij. pulueris fol. euphras. ʒ.ij. sem. fœnic. ʒ.ij. nucis moschat. cinam. & caryophyll. ana ʒ. j. Cum syrupo ex succis fœnic. rutæ, chelidon. cum melle confecto, fiat opiata, de qua capiat ad magnitudinem castaneæ, superhausto vini, aqua fœniculi diluti, momento.

Neque omittenda sunt externa remedia, quæ caput roborant, calefaciunt & exsiccant; qualia sunt puluis cephalicus capillis inspergendus, cucupha & suffitus, quæ in frigida cerebri intemperiei curatione à nobis tradita sunt.

Denique topica roborantia oculis admouenda, ab Autoribus passim proponi consueuerunt, quæ tamen nullius aut exiguæ sunt efficaciam; propterea quòd eorum vis ad nervos opticos penetrare non possit. Si quis tamen eorum nonnulla vsurpare desideret, ex suffusionis curatione (ubi ingens copia est) desumere poterit.

In casu desperato, postquam omnia remedia frustra vsurpata sunt, vesicatorium toti capiti raso instar cucuphæ admotum, multùm aliquando profuit, etiam bis aut ter admotum, ubi priores vesiculæ & excoriatione exsiccata fuerint.

## C A P V T II.

### *De humoris vitrei affectibus.*

**H**vmor vitreus crystallino subiectus est, & ideo diaphanus à natura factus, vt species puræ ac limpidæ ad neruum opticum deferri possint. Si igitur per-

*Cap. I. I. De humoris vitrei affectibus. 183*

spicuitas illius , humoris cuiusvis admixtione turbetur ; eique opacitas inducatur , pro maiori vel minori illius gradu, visum imminui aut aboleri necesse est.

Præterea iste humor laborare potest situ vitiatō; si nimirum, quædam illius portio, per ictum; & contusionem ante crystallinum transferatur, tunc enim visio obtenebratur; quandoquidem humor vitreus aqueo crassior est, atque ita species obiectorum puræ & sinceræ ad crystallinum deferri nequeunt.

Prior affectus nullis signis cognoscitur ; sed solâ ratione fieri posse iudicatur Vitreus enim humor introspecti non potest, neque illius dispositio internosci ; cogunturque proximam medicam exercentes , cum nullum vitium in oculis appareat , eum cum gutta serena confundere , idque sine ullo ægrotantium damno ; cum humores extranei in vitreum effusi , iisdem remediis discuti debeant , quibus gutta serena curari consuevit.

Situs verò vitrei vitiatō ex eo cognosci potest, quod sub pupilla albuminis instar appareat. A suffusione tamen non facillè distinguitur , nisi causæ antecedentes & procacitæ diligenter aduertantur. Fit enim suffusio à simplici humorum influxu : hæc verò vitrei humoris transpositio ab ictu , & vulnere solet generari.

Incurabilis est iste affectus , neque artis operâ vitreus humor ad pristinum locum reduci potest. Id tamen à natura fieri contingit , atque adeo totum negotium illi est committendum,

## CAPUT III.

*De humoris crystallini affectibus.*

**C**Rystallinus humor præcipuum visionis instrumentum, præ cæteris oculi humoribus suam puritatem & perspicuitatem retinere debet, ut visio perfectè exerceri valeat. Et si ab ea pituitate deflectat, visio plurimum læditur.

Præcipuus autem crystallini affectus, quo illius puritas turbatur, est glaucoma, seu humoris crystallini in glaucum colorem mutatio. Fitque hic affectus, quando humor crystallinus condensatur per exsiccationem, quæ in senectute contingit, concurrente tamen causâ aliquâ exsiccante & condensante.

Cognoscitur hic affectus, quòd circa pupillam insignis & profunda appareat albedo, & omnia tanquam per fumum & nebulam videantur. Difficilè tamen à suffusione distinguitur, quæ talem albedinem in pupilla repræsentat: unde factum est, ut autores quamplurimi glaucoma cum suffusione confundant. Verùm diligenter introsipientibus ex eo distingui possunt isti duo affectus, quòd in suffusione albedo in ipsa pupilla, & ferè iuxta corneam, in glaucomate verò profundior appareat.

• Incurabilis est hic affectus, præcipuè in senibus, in quibus siccitas partium emendari non potest: Si tamen non satis constet in crystallino affectum residere, sed suffusionis quædam coniectura sit, illius remedia in usum reuocari poterunt.

Præterea laborare potest humor crystallinus situ utriusque, cum nimirum latiori sua parte, quæ lentis infla-

*Cap. III. De humoris crystallini affectib. 185*

compressa est, pupillæ foramini non rectâ opponitur, sed vel sursum declinat, vel deorsum, tumque res geminæ solent apparere, si vnus tantum oculus hoc vitium patiatur; quia admittitur parallelus qui in vtroque oculo idem esse debet, vt res à duobus oculis percepta eadem appareat. Et si in eadem planitie constituti non sint, res geminæ apparent, quod facile experitur quicumque alterum oculum digito deprimit, vel attollit: tunc enim amisso parallelo res duplices apparent. Hæc tamen visionis deprauatio, quâ obiecta duplicia apparent, non solum ex causâ proposita exoritur; sed etiam à vaporibus aut tenui pituita crystallinum inficientibus, à quibus spiritus visui discinduntur; vnde fit, vt eiusdem rei species in duobus locis recipiatur; quod etiam in ebris sæpè solet contingere.

Secundò situs crystallini vitatur, quando versus anteriora aut posteriora inclinatur. Si versus anteriora & pupillam, tunc res propinquæ non rectè percipiuntur, melius verò dissitæ, quod in senibus plerumque contingit. Si verò versus posteriora & neruum opticum magis situs sit, propinqua rectè videntur, dissita verò minimè, & tunc fit Myopia, quæ in præfatione explicata est, dictumque est ibidem hos affectus solis specillis esse reparabiles.

Tertiò situs crystallini vitatur, quando ad dextra vel ad sinistra nimium inclinatur; qui affectus Strabismus nominatur, cum pupilla tebus videndis non directè, sed obliquè opponitur, neque ipsa in medio oculi apparet, sed ab eo declinat, ita vt in vna oculi parte plus albi appareat, quàm in alia.

Fit tamen hic affectus non solum à crystallini situ vitato, sed etiam ex praua musculorum oculos mouentium dispositione, quæ vel naturalis est, vel à dictorum musculorum paralyti aut conuulsione oriunda.



Verum à quacunque causa producat, si connaturalis est, incurabilis censendus. Si verò à prædictorum musculorum paralyfi aut conuulsione fiat, eorum morborum curatio à capitis affectuum curationibus desumenda est.

Denique ex maiori vel minori inuersione crystallini, aliæ visus deprauationes possunt contingere; quando nimirum quæ recta sunt, curua apparent, vel quando obiecta quasi inuersa videntur; quod contigit Medico cuidam, vt refert Sennertus, qui cum scalam, librum aliquem è forulis petiturus ascenderet, & oculos fortius sursum conuerteret, accidit vt omnia ei postea inuersa apparerent, & homines in platea capite ambulare viderentur; quod ex situ crystallini mutato contigit: siquidem post anni quadrantem, cum fortè iterum oculos sursum conuerteret, naturalis visio rediit, & omnia in recto situ vidit. Vnde patet violento oculi motu crystallinum è sua sede deiectum, simili postmodum motu ad eundem iterum transmissum fuisse. Eam autem crystallini mutationem ita contigisse existimo, vt crystallinus humor sic fuerit inuersus, vt pars illius anterior, quæ reliquis depressior est, pupillæ directè opposita non fuerit, sed potius pars illius lateralis, quæ cum gibbior & magis conuexa sit, species obiectorum inuersas repræsentare potuit, quemadmodum videmus in speculis rotundis obiecta inuersa apparere. Idque ea ratione contingere ex Opticæ præceptis docetur, quòd in medio conuexo, & densiori radij specierum visibilium ita refranguntur, vt sese cruciatim intersecant, & qui à parte obiecti superiori feruntur, eam tanquam inferiorem repræsentent, & vice versa.

Si verò minor fuerit humoris crystallini inuersione ita vt, tum pars crystallini depressa, tum eiusdem con-

uexa pupillæ aliquatenus opponatur, obiecta incurua apparere possunt. Quamuis etiam alia ratione fieri possit illa visus deprauatio, qua obiecta incurua apparent: nempe si portio humoris crystallini pituitoso humore suffundantur. Tunc enim propter diuersam crystallini tenuitatem, & crassitiem, diuersæ fiunt refractiones, quæ causæ sunt illius visus deprauationis, qua obiecta incurua apparent. Hoc dilucido exemplo demonstrari potest, scilicet baculi, cuius media pars in aquam demersa sit; tunc enim incuruus apparet, ex eo quod portionis in aquam demersæ species, quando ex aqua in aërem defertur, utpote à medio densiori ad tenuius, refrangitur à perpendiculari: portio verò quæ est in aëre, non refrangitur, quia non transit per diuersa media, quemadmodum ea, quæ est in aqua, inde fit ut baculus incuruus appareat. Eodem modo species obiecti, quæ fertur in portionem crystallini densiorem, magis refrangitur, quam dum fertur ad portionem illius tenuiorem, quæ scilicet in statu naturali constituta est, à pituitoso humore minimè suffusa: atque ita, propter varias refractiones, obiecta incurua apparent.

Cùm autem in horum affectuum curationibus remedia non conferant, in iis inquirendis frustra laborandum non est.

---

## C A P V T IV.

### *De humoris aquei affectibus, ac præcipue de suffusione.*

**H**Vmor aqueus à sua naturali constitutione deicitur, cùm quantitate vel qualitate peccat. Dum

quantitate peccat, augetur, vel imminuitur præter modum & pupillæ dilatationem, aut constrictionem efficit, qui affectus suo loco erunt exponendi. Dum verò qualitate peccat, crassior euadit, quod fit ab humore extraneo in eum effuso, & Suffusio nominatur, quæ hic explicanda est. Licet enim Galenus 1. *de symptom. caus. cap. 2.* ab ipsius humoris aquei condensatione fieri interdum suffusionem doceat, sine humoris excrementitij affluxu: tamen qui rarissimè id contingit, & imaginatione potius, quàm artis vsu dignoscitur; & si talis affectio detur, prorsus incurabilis est: illa omiſsa, de ea, quæ fit ab humoris excrementitij affluxu tantum agemus. Hæc autem *ὑπόχυμα* Græcis, Latinis suffusio, Arabibus aqua, vulgo *cataracta* nominatur. Auctores quidam hæc nomina inter se distinguenda esse volunt, ut varios huius morbi gradus significant. Incipiens enim affectus, in quo levis quædam visus obtenebratio contingit, suffusio ab iis nominatur. Cum verò ulterius progressus est morbus, & aliquid in pupilla collectum, aquæ instar apparet, aquam peculiariter nominant. Cum denique materia in pupilla omnimodè concreta est, visionemque prorsus aufert, cataracta ab iis nominatur. Fit igitur suffusio, ex serosi vel pituitosi humoris, in illud spatium quod inter corneam & crystallinum est, affusione. Cum autem in illo spatio humor aqueus contineatur, iure merito inter aquei humoris affectus recensetur.

Hæc quidem veræ suffusionis causa est. Aliâ tamen datur suffusio spuria, quæ fit à vaporibus, à ventriculo aliisque partibus in oculos translatis. A capite etiam vapores ad oculos transmitti, & suffusionem spuriam efficere posse docuit Galen. 4. *de loc. affect. cap. 2.* Quamuis autem duæ suffusionis differentię inter se distinctæ ab Auctoribus proponantur, ut plurimum tamen

complicatae sunt, saltem legitimae suffusioni spuria complicari solet: quia vapores à partibus inferioribus ad cerebrum translati, facile deferuntur ad eas capitis partes, quae à morbo aliquo debilitatae sunt. Id quidem ex eo docetur, quòd omnes suffusione laborantes, minus laeduntur, ac perspicacius vident matutinis horis, quàm meridianis & vespertinis, quia, nimirum à prandio & coena multi vapores à ventriculo ad oculos eleuantur & visum conturbant. Imò docet experientia, in dictis laborantibus visum est hebetiorem & caliginosiorē statim à pastu, quàm paucis post horis ab ipso. Præterea omnes suffusione laborantes referunt, sibi videri in aëre corpuscula quaedam volitantia, velut culices, muscas, pilos, telas araneorum & similia, quae non fiunt, nisi à vaporibus crassis ad oculum translatis, & in eo sese commouentibus. Licet enim Auctores existiment, huiusmodi repræsentationes dependere à particulis crassioribus humoris pituitosi in oculo contenti, & suffusionem efficientis, hoc tamen credibile non est, quia oporteret humorem illum pituitosum suffusionem efficientem, perpetuò moueri in oculo, vt species illas corpusculorum in aëre volitantium repræsentare posset; quod quidem rationi penitus aduersatur. Quin potius haud dubium est, vapores esse in perpetuo motu, atque adeò phantasmata illa volitantia repræsentare posse.

Humor quidem pituitosus præcipua est, ac magis ordinaria suffusionis causa: alij tamen humores exigua saltem portione, ei commisceri possunt: & si bilis misceatur, citrina; si melancholia, nigricans suffusio apparet.

Humores autem isti ad oculos confluere solent, quando aliqua debilitate affecti sunt, sed nativā, seu ascititiā.

Ad natiuam debilitatem pertinet oculorum prominentia; qui enim tales oculos habent, suffusioni obnoxij sunt; oculi siquidem prominentes magni esse solent, atq; adeo virtus diffusa in iis debilior est; tum etiam magni & prominentes oculi, humores & vapores facile suscipiunt. Debilitatem vero ascititiam faciunt causæ externæ, vt ictus, contusio, balneum, austriua & pluuiosa constitutio, insolatio, fumus, lectio assidua, præsertim ad lucernam, & alia huiusmodi. Quæ etiam causæ humorum fluxionem ad oculos commouere possunt.

Fluunt autem humores à cerebro ad oculos per venas, vucam tunicam, & neruum opticum. Venæ per quas humores deferri possunt ad eas partes, multiplices sunt; quæ scilicet vel feruntur à pericranio, ad coniunctiuam tunicam, inde ad corneam, & vucam; vel à meningibus cerebri, à quibus rami ad oculi membranas detiuantur. A quibus membranis, præcipuè vero vucæ tunica, ad humorem aqueum sibi contiguum excrementitij humores facile instillari possunt.

Denique per neruos opticos facile defetri possunt humores à cerebro, per tunicam retiformem & araneam humorem crystallinum: tumque materia suffusionis crystallini superficiei adhæret. Licet autem vt plurimum suffusio per fluxionem fiat, potest tamen aliquando per congectionem fieri; quando nimirum oculi nutrimentum probè non immutatur, & facultas expultrix debilis, illius residua excrementa sufficienter non expurgat, ita vt sensim congesta circa pupillam ea excrementa suffusionem efficiant. In quo casu, alij etiam humores plerumque labefactantur, & difficillimi affectus produciuntur.

Suffusionis differentia desumuntur ex humoris eam efficientis crassitie, quantitate & loco, in quo humor ille residet,

Ratione crassitiei maioris vel minoris, maior vel minor visionis læsio efficitur. Si enim tenuis & serosus humor existat, à quo suffusionem fieri, & punctione euacuari docuit Gal. 14. meth. cap. ultimo, visio parum imminuitur, & suffusio incipiens nominatur. Si crassior paulò fuerit, visionis obscuritas maior. Si verò crassissima, cæcitas omnimoda emergit.

Ratione quantitatis & loci, vel humor totam pupillam occupat, & tunc visio æqualiter læditur, quocunque modo ad obiecta dirigatur: vel vnā partem pupillæ magis, quā aliam occupat, & obiecta directo intuitu integra non cernuntur, nec vno tempore multa. Si verò humor perexiguus sit, & medium pupillæ occupet, obiecta fenestrata apparent. Si verò materia diuisa fuerit, & in varia corpuscula, varias pupillæ partes occupantia distincta, culicum species ante oculos versari videbuntur: quæ omnes differentiæ exactè distinguuntur à Gal. 1. de sympt. causis cap. 2.

Ratione loci etiam, vel situs materiæ, aliæ possunt desumi differentiæ; quòd scilicet aliquando materia in ipso vueæ foramine iuxta corneam tunicam sita est: aliquando iuxta vueam, & inter hanc & humorem aqueum: aliquando ipsi humori aqueo permista ac denique interdum inter crystallinum & aqueum.

Possunt & quædam differentiæ à figura materiæ desumi, quas recenset. Gal. 1. de sympt. causis cap. 2. & 4. de loc. affect. cap. 2. Prout enim varia est humoris pupillæ adiacentis figura, ægris representantur in aëre volitantes culices, pili, telæ araneorum, circuli circa candelam, & alia quamplurima.

Diagnosıs huius affectus primò dirigenda est ad legitimam suffusionem à spuria distinguendam; postea vero variæ legitimæ suffusionis differentiæ interno-scendæ sunt.

Imò verò, post diætam sudorificam, vsus thermarum sulphurearum & bituminosarum tum balneo, tum capitis irrigatione erit conuenientissimus; cum huiusmodi aquæ ad frigidam & humidam intemperiem corrigendam, pituitam absumendam, & cerebrum roborandum efficacissimæ sunt.

Præter vniuersales totius corporis & capitis euacuationes, peculiæres etiam institui possunt per apophlegmatismos; quibus pituita per palatum e cerebro elicitur: qui quidem formâ gargarismatis aut masticatorij præscribi possunt, iuxta formulas in cerebri frigida intemperiei curatione descriptas.

Errhina & sternutatoria ab omnibus propemodum practicis damnantur in hoc affectu, quia humores ad oculos attrahunt, si tamen post exactam totius corporis & capitis ipsius euacuationem, mitiora & benigniora per aliquot dies vsurpentur, vtilia esse poterunt: si eadem materiam morbificam neruis opticis impactam, sensim educere ac deriuare poterunt, neque ex profundioribus cerebri partibus quicquam elicient ad partes anteriores. Alioquin in omni deriuatione, quæ est euacuatio per partem affectam, aut ipsi vicinam, perpetuò metuumdum esset, ne ad ipsam partem affectam fieret attractio, quæ tamen ab vniuersalibus euacuationibus, quæ ipsam debent præcedere, facile impeditur. Illa autem errhina componi poterunt ex succo betæ & maioranæ cum vino albo extracto, in quo manna dissoluta fuerit.

Potentius autem & nihilominus tutum errhinum parari potest ex puluere nicotianæ, præcipuis cephalicis, & oxydorcicis cor ecto. Ab eo enim per palatum magis, quàm per nares, pituita educitur & cerebrum ita roboratur, vt non adeò facile humorum influxum ab

aliis partibus recipiat. Illius igitur compositio talis erit.

℞. Nicotianæ siccæ ʒ. j. fol. saluæ, maioran. beton. euphras. flor. caryophyllatæ nostratis, & rosar. rub. an. ʒ. j. Fiat puluis, qui naribus attrahatur manè per aliquot dies.

Neque sufficit purgatione vniuersali totum corpus ab humoribus excrementitiis semel liberare, sed in eo statu conseruandum est toto curationis decursu; atque adeò purgationibus interpolatis, quæ in dies congeruntur excrementa educenda sunt, quod fiet pilulis vsualibus in hunc modum compositis.

℞. Aloës optimæ ʒ. β. sennæ mund. turbith. hermodactyl. & agaric. recenter trochisc. an. ʒ. ij. diagrydij ʒ. j. macis, caryophyllor. & croci Orientalis ana gr. vij. Irroretur succo maioranæ & chelidonis mai. Deinde iterum exsiccentur in vmbra, & cum oxymelite scillit. fiat massa pilularum, de qua capiat ʒ. β. vel ʒ. ij. bis aut ter in mense.

Dum hæc fiunt, cerebri & oculorum roborationi perpetuò insistendum est, & varia medicamenta vicissim vsurpanda; ne æger, vnum & idem continuò sumendo nimium fastidiat, néve natura idem remedio assuescat: Inter ea verò, quæ hac dote prædita sunt, recensetur theriaca vetus, quæ ʒ. j. pondere sumi potest horâ somni, cum aqua fœniculi, euphras. & chelidonis, bis aut ter in septimana.

Commendatur etiam nux moschatâ manè, ieiunio stomacho, comesta, & dentibus diu attrita, vt vapor illius ad oculos deferatur. Si illius deglutitio metuatur, propter viscerum calorem; expui potest post comestionem.

Myrobalani conditæ manè assumptæ, vltimè maxime clarificare existimantur;



Opiata etiam vsualis ita componi poterit.

℞. Conseruæ flor. beton. & anthos, ana ʒ. ij. myrobalanos conditas num. ij. theriacæ veter. ʒ. ij. pulueris fol. euphras. ʒ. iij. sem. fœnic. ʒ. ij. nucis moschat. cinam. & caryophyll. ana ʒ. j. Cum syrupo ex succis fœnic. rutæ, chelidon. cum melle confecto, fiat opiata, de qua capiatur ad magnitudinem castaneæ, superhausto vini, aqua fœniculi diluti, momento.

Neque omittenda sunt externa remedia, quæ caput roborant, calefaciunt & exsiccant; qualia sunt puluis cephalicus capillis inspergendus, cucupha & suffitus, quæ in frigida cerebri intemperiei curatione à nobis tradita sunt.

Denique topica roborantia oculis adinuenda, ab Autoribus passim proponi consueuerunt, quæ tamen nullius aut exiguæ sunt efficaciam; propterea quod eorum vis ad nervos opticos penetrare non possit. Si quis tamen eorum nonnulla vsurpare desideret, ex suffusionis curatione (ubi ingens copia est) desumere poterit.

In casu desperato, postquam omnia remedia frustra vsurpata sunt, vesicatorium toti capiti raso instar cucuphæ admotum, multùm aliquando profuit, etiam bis aut ter admotum, ubi priores vesiculæ & excoriatione exsiccatae fuerint.

## C A P V T II.

### *De humoris vitrei affectibus.*

**H**vmor vitreus crystallino subiectus est, & ideo diaphanus à natura factus, ut species puræ ac limpidæ ad neruum opticum deferri possint. Si igitur per-

*Cap. I. I. De humoris vitrei affectibus. 183*

spicuitas illius , humoris cuiusvis admixtione turbetur; eique opacitas inducatur , pro maiori vel minori illius gradu, visum imminui aut aboleri necesse est.

Præterea iste humor laborare potest situ vitiato; si nimirum, quædam illius portio, per ictum; & contusionem ante crystallinum transferatur, tunc enim visio obtenebratur; quandoquidem humor vitreus aqueo crassior est, atque ita species obiectorum puræ & sinceræ ad crystallinum deferri nequeunt.

Prior affectus nullis signis cognoscitur ; sed solâ ratione fieri posse iudicatur Vitreus enim humor introspecti non potest, neque illius dispositio internosci ; cogunturque proximam medicam exercentes , cùm nullum vitium in oculis appareat , eum cum gutta serena confundere , idque sine ullo ægrotantium damno ; cùm humores extranei in vitreum effusi , iisdem remediis discuti debeant , quibus gutta serena curari consuevit.

Situs verò vitrei vitiatus ex eo cognosci potest, quòd sub pupilla albuminis instar appareat. A suffusione tamen non facillè distinguitur , nisi causæ antecedentes & procatareticæ diligenter aduertantur. Fit enim suffusio à simplici humorum influxu : hæc verò vitrei humoris transpositio ab ictu , & vulnere solet generari.

Incurabilis est iste affectus , neque artis operâ vitreus humor ad pristinum locum reduci potest. Id tamen à natura fieri contingit , atque adeo totum negotium illi est committendum.

## C A P V T III.

*De humoris crystallini affectibus.*

**C**Ryſtallinus humor præcipuum viſionis inſtrumentum, præ cæteris oculi humoribus ſuam puritatem & perſpicuitatem retinere debet, vt viſio perfectè exerceri valeat. Et ſi ab ea pituitate deſleat, viſio plurimùm læditur.

Præcipuus autem cryſtallini affectus, quo illius puritas turbatur, eſt glaucoma, ſeu humoris cryſtallini in glaucum colorem mutatio. Fitque hic affectus, quando humor cryſtallinus condenſatur per exſiccationem, quæ in ſenectute contingit, concurrente tamen cauſâ aliquâ exſiccante & condenſante.

Cognoſcitur hic affectus, quòd circa pupillam inſignis & profunda appareat albedo, & omnia tanquam per ſumum & nebulam videantur. Difficilè tamen à ſuffuſione diſtinguitur, quæ talem albedinem in pupilla repræſentat: vnde factum eſt, vt autores quamplurimi glaucoma cum ſuffuſione confundant. Verùm diligenter introſpicientibus ex eo diſtingui poſſunt iſti duo affectus, quòd in ſuffuſione albedo in ipſa pupilla, & ferè iuxta corneam, in glaucomate verò profundior appareat.

• Incurabilis eſt hic affectus, præcipuè in ſenibus, in quibus ſiccitas partium emendari non poteſt: Si tamen non ſatis conſtet in cryſtallino affectum reſidere, ſed ſuffuſionis quædam coniectura ſit, illius remedia in ſum reuocari poterunt.

Præterea laborare poteſt humor cryſtallinus ſitu vt tiato, cum nimirum latiori ſua parte, quæ lentis inſta-

*Cap. III. De humoris crystallini affectib.* 185

compressa est, pupillæ foramini non rectâ opponitur, sed vel sursum declinat, vel deorsum, tumque res geminæ solent apparere, si vnus tantum oculus hoc vitium patiatur; quia admittitur parallelus qui in vtroque oculo idem esse debet, vt res à duobus oculis percepta eadem appareat. Et si in eadem planitie constituti non sint, res geminæ apparent, quod facile experitur quicumque alterum oculum digito deprimit, vel attollit: tunc enim amisso parallelo res duplices apparent. Hæc tamen visionis deprauatio, quâ obiecta duplicia apparent, non solum ex causa proposita exoritur; sed etiam à vaporibus aut tenui pituita crystallinum inficientibus, à quibus spiritus visui discinduntur; vnde fit, vt eiusdem rei species in duobus locis recipiatur; quod etiam in ebriis sæpè solet contingere.

Secundò situs crystallini vitatur, quando versus anteriora aut posteriora inclinatur. Si versus anteriora & pupillam, tunc res propinquæ non rectè percipiuntur, melius verò dissitæ, quod in senibus plerumque contingit. Si verò versus posteriora & neruum opticum magis situs sit, propinqua rectè videntur, dissita verò minimè, & tunc fit Myopia, quæ in præfatione explicata est, dictumque est ibidem hos affectus solis specillis esse reparabiles.

Tertiò situs crystallini vitatur, quando ad dextra vel ad sinistra nimium inclinatur; qui affectus Strabismus nominatur, cum pupilla rebus videndis non directè, sed obliquè opponitur, neque ipsa in medio oculi apparet, sed ab eo declinat, ita vt in vna oculi parte plus albi appareat, quàm in alia.

Fit tamen hic affectus non solum à crystallini situ vitato, sed etiam ex praua musculorum oculos mouentium dispositione, quæ vel naturalis est, vel à dictorum musculorum paralyfi aut conuulsione oriunda.

Verùm à quacunque causa producat, si connaturalis est, incurabilis censendus. Si verò à prædictorum musculorum paralyfi aut conuulsione fiat, eorum morborum curatio à capitis affectuum curationibus desumenda est.

Denique ex maiori vel minori inuersione crystallini, aliæ visus deprauationes possunt contingere; quando nimirum quæ recta sunt, curua apparent, vel quando obiecta quasi inuersa videntur; quod contigit Medico cuidam, vt refert Sennertus, qui cùm scalam, librum aliquem è forulis petiturus ascenderet, & oculos fortiùs sursum conuerteret, accidit vt omnia ei postea inuersa apparerent, & homines in platea capite ambulare viderentur; quod ex situ crystallini mutato contigit: siquidem post anni quadrantem, cùm fortè iterum oculos sursum conuerteret, naturalis visio rediit, & omnia in recto situ vidit. Vnde patet violento oculi motu crystallinum è sua sede deiectum, simili postmodum motu ad eundem iterum transmissum fuisse. Eam autem crystallini mutationem ita contigisse existimo, vt crystallinus humor sic fuerit inuersus, vt pars illius anterior, quæ reliquis depressior est, pupillæ directè opposita non fuerit, sed potius pars illius lateralis, quæ cùm gibbior & magis conuexa sit, species obiectorum inuersas repræsentare potuit, quemadmodum videmus in speculis rotundis obiecta inuersa apparere. Idque ea ratione contingere ex Opticæ præceptis docetur, quòd in medio conuexo, & densiori radij specierum visibilium ita refranguntur, vt sese cruciatim interfecerint, & qui à parte obiecti superiori feruntur, eam tanquam inferiorem repræsentent, & vice versa.

Si verò minor fuerit humoris crystallini inuersio ita vt, tum pars crystallini depressa, tum eiusdem con-

uexa pupillæ aliquatenus opponatur, obiecta incurua apparere possunt. Quamuis etiam alia ratione fieri possit illa visus deprauatio, qua obiecta incurua apparent: nempe si portio humoris crystallini pituitoso humore suffundantur. Tunc enim propter diuersam crystallini tenuitatem, & crassitiem, diuersæ sunt refractiones, quæ causæ sunt illius visus deprauationis, qua obiecta incurua apparent. Hoc dilucido exemplo demonstrari potest, scilicet baculi, cuius media pars in aquam demersa sit; tunc enim incuruus apparet, ex eo quodd portionis in aquam demersæ species, quando ex aqua in aërem defertur, utpote à medio densiori ad tenuius, refrangitur à perpendiculari: portio verò quæ est in aëre, non refrangitur, quia non transit per diuersa media, quemadmodum ea, quæ est in aqua, inde fit ut baculus incuruus appareat. Eodem modo species obiecti, quæ fertur in portionem crystallini densiorem, magis refrangitur, quam dum fertur ad portionem illius tenuiorem, quæ scilicet in statu naturali constituta est, à pituitoso humore minimè suffusa: atque ita, propter varias refractiones, obiecta incurua apparent.

Cùm autem in horum affectuum curationibus remedia non conferant, in iis inquirendis frustra laborandum non est.

## C A P V T IV.

### *De humoris aquei affectibus, ac præcipue de suffusione.*

**H**umor aqueus à sua naturali constitutione deicitur, cùm quantitate vel qualitate peccat. Dum

quantitate peccat, augetur, vel imminuitur præter modum & pupillæ dilatationem, aut constrictionem efficit, qui affectus suo loco erunt exponendi. Dum verò qualitate peccat, crassior euadit; quod fit ab humore extraneo in eum effuso, & Suffusio nominatur, quæ hic explicanda est. Licet enim Galenus 1. *de symptom. caus. cap. 2.* ab ipsius humoris aquei condensatione fieri interdum suffusionem doceat, sine humoris excrementitij affluxu: tamen qui rarissimè id contingit, & imaginatione potius, quàm artis vñ dignoscitur; & si talis affectio detur, prorsus incurabilis est: illa ommissa, de eà, quæ fit ab humoris excrementitij affluxu tantùm agemus. Hæc autem *ὀφθαλμία* Græcis, Latinis suffusio, Arabibus aqua, vulgo *cataracta* nominatur. Auctores quidam hæc nomina inter se distinguenda esse volunt, vt varios huius morbi gradus significant. Incipiens enim affectus, in quo levis quædam visus obtenebratio contingit, suffusio ab iis nominatur. Cùm verò vltiùs progressus est morbus, & aliquid in pupilla collectum, aquæ instar apparet, aquam peculiariter nominant. Cùm denique materia in pupilla omnimodè concreta est, visionemque prorsus aufert, cataracta ab iis nominatur. Fit igitur suffusio, ex serosi vel pituitosi humoris, in illud spatium quod inter corneam & crystallinum est, affusione. Cum autem in illo spatio humor aqueus contineatur, iure merito inter aquei humoris affectus recensetur.

Hæc quidem veræ suffusionis causa est. Alia tamen datur suffusio spuria, quæ fit à vaporibus, à ventriculo aliisque partibus in oculos translatis. A capite etiam vapores ad oculos transmitti, & suffusionem spuriam efficere posse docuit Galen. 4. *de loc. affect. cap. 2.* Quamuis autem duæ suffusionis differentię inter se distinctæ ab Auctoribus proponantur, vt plurimùm tamen

complicata sunt, saltem legitimæ suffusioni spuria complicari solet: quia vapores à partibus inferioribus ad cerebrum translati, faciliè deferuntur ad eas capitis partes, quæ à morbo aliquo debilitatæ sunt. Id quidem ex eo docetur, quòd omnes suffusione laborantes, minus læduntur, ac perspicacius vident matutinis horis, quàm meridianis & vespertinis, quia, nimirum à prandio & cœna multi vapores à ventriculo ad oculos eleuantur & visum conturbant. Imò docet experientia, in dictis laborantibus visum est hebetiorem & caliginosiorē statim à pastu, quàm paucis post horis ab ipso. Præterea omnes suffusione laborantes referunt, sibi videri in aëre corpuscula quædam volitantia, velut culices, muscas, pilos, telas araneorum & similia, quæ non fiunt, nisi à vaporibus crassis ad oculum translatis, & in eo sese commouentibus. Licet enim Auctores existiment, huiusmodi repræsentationes dependere à particulis crassioribus humoris pituitosi in oculo contenti, & suffusionem efficientis, hoc tamen credibile non est, quia oporteret humorem illum pituitosum suffusionem efficientem, perpetuò moueri in oculo, vt species illas corpusculorum in aëre volitantium repræsentare posset; quod quidem rationi penitus aduersatur. Quin potius haud dubium est, vapores esse in perpetuo motu, atque adeò phantasmata illa volitantia repræsentare posse.

Humor quidem pituitosus præcipua est, ac magis ordinaria suffusionis causa: alij tamen humores exiguâ saltem portione, ei commisceri possunt: & si bilis misceatur, citrina; si melancholia, nigricans suffusio apparet.

Humores autem isti ad oculos confluere solent, quando aliqua debilitate affecti sunt, sed natiuâ, seu ascitiâ.



Ratione crassitie maioris vel minoris, maior vel minor visionis lætio efficitur. Si enim tenuis & serofus humor existat, à quo suffusionem fieri, & punctione euacuari docuit Gal. 14. *meth. cap. ultimo*, visio parum imminuitur, & suffusio incipiens nominatur. Si crassior paulò fuerit, visionis obscuritas maior, Si verò crassissima, cæcitas omnimoda emergit.

Ratione quantitatis & loci, vel humor totam pupillam occupat, & tunc visio æqualiter læditur, quocunque modo ad obiecta dirigatur: vel vnā partem pupillæ magis, quàm aliam occupat, & obiecta directo intuitu integra non cernuntur, nec vpo tempore multa. Si verò humor perexiguus sit, & medium pupillæ occupet, obiecta fenestrata apparent. Si verò materia diuisa fuerit, & in varia corpuscula, varias pupillæ partes occupantia distincta, culicum species ante oculos versari videbuntur: quæ omnes differentię exactè distinguuntur à Gal. 1. *de sympt. causis cap. 2.*

Ratione loci etiam, vel situs materiæ, aliæ possunt desumi differentię; quòd scilicet aliquando materia in ipso vueæ foramine iuxta corneam tunicam sita est: aliquando iuxta vueam, & inter hanc & humorē aqueum: aliquando ipsi humori aqueo permista ac denique interdum inter crystallinum & aqueum.

Possunt & quædam differentię à figura materiæ desumi, quas recenset. Gal. 1. *de sympt. causis cap. 2.* & 4. *de loc. affect. cap. 2.* Prout enim varia est humoris pupillæ adiacentis figura, ægris representantur in aëre volitantes culices, pili, telæ araneorum, circuli circa candelam, & alia quamplurima.

Diagnosıs huius affectus primò dirigenda est ad legitimam suffusionem à spuria distinguendam; postea vero variæ legitimæ suffusionis differentię interno-scendæ sunt.

Vera suffusio alterum tantum oculum plerumque occupare solet; aut si utrumque, non tamen simul, nec similiter, quod in spuria accidit.

Secundò in legitima suffusione tenebrosum quiddam in pupilla apparet, quod in spuria non contingit. Hoc tamen signum perpetuum non est. Si enim à tenui & seroso humore suffusio generetur, cum ille humor aqueo ferè crassior non sit, nulla in oculo immutatio apparet. Quo decepti plerumque Medici, eam suffusionem non agnoscunt, guttam serenam esse existimant, cum nempe nullam in pupilla mutationem percipiant. Sed facile distinguitur hæc suffusio à gutta serena. Primò, quod in gutta serena visio vel abolita, aut valdè imminuta est, nulla in oculo læsione apparente. Contrà verò in suffusione; quæ sensui non patet, est levis tantum visus imminutio, quia humor serosus, à quo illa producitur; tenuis est & diaphanus, ita ut à speciebus obiectorum, vitri instat, penetrari possit. Secundò, ex eo, quod ut plurimum in suffusione visio in omnibus pupillæ partibus æqualiter non læditur, sed obiecta aliquando directè oculis opposita, aliquando versus angulum collata, melius videntur; quia nimirum maior est ut plurimum humoris crassities vel tenuitas in una pupillæ parte, quàm in alia.

Tertiò, in vera suffusione symptomata sunt continua nec vlla habent interualla. In spuria verò, per interualla augentur, & remittuntur, prout vaporum anathymiasis maior vel minor ad cerebrum effertur. Sicque, ieiuno stomacho, multò minora sunt, quàm eo cibus repleto, præcipuè paulò post pastus; tunc enim maior vaporum copia sursum attollitur. Qui vapore ad oculos translatis, muscas, culices, araneorum telas, & alia huiusmodi corpuscula, visui quidem repræsentant; non continuò, sed tantum per interualla quædam.

quæ

Quæ quidem exigua corpuscula, in aëre repræsentata, à vaporibus dependent, vt antea dictum est: attamen, quia dum oculi à vera suffusione debilitati sunt, continua ferè sit ad eos vaporum transmissio, ideo continua est propemodum huiusmodi corpusculorum in aëre volitantium apparitio. Præterea, in vera suffusione, visus obtenebratio, qua omnia obiecta, veluti per nebulam aut vitrum densum conspiciuntur, (quod est proprium symptoma & pathognomonicum huius affectus) continua est & semper eodem modo se habet. In spuria verò suffusione, nunc maior, nunc minor, & aliquando ferè nulla est visus obscuritas, prout vapores, vel maiori copia, vel minori, vel nullo modo transferuntur ad oculos.

Denique vera suffusio breui tempore incrementum suscipit, & plerumque intra sex menses confirmata euadit. Interdum etiam paucis diebus crescit; & refert Fernelius *s. pathol. cap. 5.* consummatam suffusionem vno die subortam; quod nobis etiam non semel videre contigit. Spuria autem per multos annos sine incremento perseverat.

Veræ autem suffusionis differentiæ sequentibus signis erunt distinguendæ.

In suffusione incipiente corpuscula quædam, vt pili, culices, muscæ volitantes, lanarum araneorum fragmenta, oculis obuersantur.

Dum verò incrementum sumit, aër nebulosus apparet, & obiecta veluti per vitrum densius conspiciuntur; color pupillæ immutatus est, eaque vel turbida, vel nebulosa, aut vitreo contaminato similis, aut calore cæruleo infecta apparet. Quando suffusio perfecta est, visio omnino perit, pupillæ calor albus apparet, aut alio colore infectus.

Ex colore etiam quædam signa desumuntur; color

enim margaritæ similis, pituitam adhuc fluidam & diaphanam significant; gypsus crassam & compactam; citrinus pituitam cum bile mixtam; niger cum humore melancholico.

Locus suffusione dignoscitur ex eo quòd sit materia inter vueam & corneam sita sit, pupilla magis obtenebrata conspicitur, quia materia oculis intuentis propinquior est. Deinde pupilla dilatata apparet; ab humore enim in ea contento distenditur. Et in affectu confirmato albæ & virides fibræ, aut striæ, supra iridem proteusæ conspiciuntur, aut puncta quædam albicantia circa pupillam apparent.

Si materia inter chrySTALLINUM & vueam contineatur, contraria prædictis apparebunt symptomata; tum etiam pupilla angusta apparebit, si profundior materia sit: amplior verò, si minus profunda.

Prognosis huius affectus, pro variis illius temporibus, variè statuenda est. Incipiens enim suffusio, in qua ægri obiecta possunt discernere, eaque per nebulam conspiciere videntur, curabilis est, iuxta Gal. sententiam 14. meth. cap. ult. & Celsi lib. 6. cap. 6. Quæ tamen sententia restrictione indiget, modo scilicet æger in ætate florenti sit constitutus: in senibus enim hi affectus incurabiles sunt; & si oculi ex natua constitutione debiles non fuerint; Nos enim nonnullos in suffusionis principio, etiam quinquagesimum annum prætergressos, sola euacuatione vniuersali, diætâ sudorifica, & vesicatorio, sine vlla topicorum applicatione, intra quindecim dies curatos vidimus.

Curatio autem feliciùs succedit in aëre calido, & æstiuo; quia pori aperiuntur, materia morbifica mobilior & obsequentior redditur, ita vt sponte sua sæpe ad aluum deferatur. Qui motus, quantum momenti habeat ad huius morbi solutionem, docuit Hip.

*Aph. 17. sect. 6. his verbis, lippientem alui profluvio corripis, bonum.*

Si ex febre acuta, peripneumonia, phrenitide, aut dolore capitis intenso suffusio proueniat, difficillimè curatur.

Suffusio confirmata, in qua materia iam concreta est, discutì medicamentis non potest, & sola compunctione curabilis est.

Hæc tamen operatio quæ compunctione perficitur, & acu in oculum immisâ ad inferiores oculi partes suffusio deprimitur, tuta non est, & sæpè malè succedit. Vel enim vicia tunica laceratur, vel ex dolore & inflammatione noua fluxio in oculum iamdiu debilitatum influit, & alia contingunt incommoda, quibus visio in perpetuum aufertur. Cum tamen aliquando succedat hæc operatio, tentari potest ab iis, quibus nulla alia curationis spes superest; latius enim est, vt docet Celsus, anceps experiri remedium, quàm nullum.

In confirmata suffusione, si altero oculo clauso, pupilla dilatetur, curatio per acus immersionem sperabilis est: si verò non dilatatur, visus nunquam recipitur, docente Galeno 1. de sympt. causis, cap. 2. quia neruus opticus obstruitur, & spiritus ad pupillam, licèt aperta foret, peruenire nequit.

Licèt autem altero oculo clauso pupilla dilatetur, æger acu immisâ visum non recipiet, si lumen non percipiat; quia spiritus visuius turbidus & obscurus redditus est, atque ad eò visioni ineptus.

Suffusio nigra, & omni splendore orbata, neque medicamentis, neque chirurgia curari potest, quia spiritus visorij destructi sunt. Pellucida verò, & splendorem aliquem ostentans, curabilis est.

Curationem etiam plerumque non admittit vitidis, obscura & multum citrina, dura & quæ hydrar-

gyrum colore & mobilitate repræsentat.

Suffusio, quæ obiecta fenestrata repræsentat; tentanda non est; cum enim materia in centro pupillæ consistat, periculum est, ne acu immisâ, tota pupilla impleatur, & integra visionis iactura fiat.

Operatio, quæ per acus immissionem fit, felicius succedit in oculo pleniore, & naturalem magnitudinem seruante; si verò oculus minor & marcidus euaserit, succedere non potest.

In senili ætate prædicta operatio tentanda non est, neque in puerili; in illa morbus est incurabilis, in hac verò humor mollior est, & non satis maturus. Curationi aptissima ætas est iuuenilis, & consistens.

Si operatio exerceatur quando oculo digito compresso suffusio nonnihil disluit, & latior aliquantulum apparet; postmodum verò ad pristinam magnitudinem, & figuram reuertitur, non succedit; quia suffusio nondum matura est, sed adhuc tenuis & cruda. Si verò digito compressa nullam patiatur figuræ mutationem, matura est, & acu decuti potest.

Notandum tamen istam suffusionis, quam vocant, maturitatem seu concretionem, moderatam esse debere, ut deponi facile possit. Debet enim esse instar pelliculæ, quæ acu circumuoluitur, & ad inferiora oculi deponitur. Si enim crassior & solidior sit, decuti non potest, quod inde dignoscitur, quod gypsi aut grandinis speciem colore præ se fert. Contra verò quæ mediocrem maturitatem nata est, colorem cœli aut maris, ferri aut plumbi non admodum nigri repræsentare solet.

Suffusionis curatio non solum ad causam coniunctam, sed etiam antecedentem dirigenda est. Atque ita, primò totum corpus, & præcipuè cerebrum exactè euacuandum est. Mox humor pupillam obstruens discutiendus, aut alio quouis modo amoliendus est.

Quæ indicationes, cùm eadem fermè sint, quæ ad guttæ serenæ curationem fuerunt propositæ, eadem remedia, quæ victus rationem, totius corporis euacuationem, humoris peccantis reuulsionem, & capitis atque oculorum roborationem respiciunt, hîc etiam aptari poterunt, vt non opus sit eadem hic frustrâ repetere.

Præmissâ igitur totâ illâ curatione, quæ pro guttâ serena instituta est, ad ea remedia veniendum est quæ peculiarem materiæ iuxta pupillam contentæ educcionem respiciunt. Et quamuis topica remedia non multum conferre existimentur, iuxta Gal. sententiam. 2. *καὶ τὸ ὅπερ*, qui dicit ea plus promittere, quàm præstare: attamen legitimus eorum vsus reiiciendus non est; & docuit experientia, probatissimorum auctorum fide confirmata, suffusiones incipientes, præmissis vniuersalibus, vsu topicorum fuisse dissipatas.

Primò igitur à mitioribus resoluentibus incipiendum est, quæ non valdè exsiccent, ne materia suffusionis induretur, & resolutioni inepta euadat; tum resoluentibus emollientia admiscenda sunt, vt prædicta induratio impediatur, & resolutio faciliùs perficiatur. In hunc finem fatus sequens ab initio vsurpari poterit.

*℞.* Fol. rutæ. fœnic. euphras. chelidon. maior. ana M. j. sem. fœnugr.  $\frac{3}{4}$ . j. flor. chamom. & melilot. ana P. j. Coquantur in tribus partibus aquæ font. & vna vini albi sub finem additi. Colatura foueantur oculi manè & serò, cum spongia molli.

Ex eodem decocto suffitus parari poterit, fumum illius excipiendo oculis, vndique capite contexto.

In ipso morbi principio, dum fluxio fieri incipit, dumque reuellentia remedia vsurpantur, vtile est fouere oculos simpliciter vino rubro austero, quod astrictione sua fluxionem impedit, parte verò spirituosa discutit ac resoluit.

In progressu morbi, fœtus ex vino albo, in quo crocus metallorum infusus fuerit, vtilissimus est.

Non parum etiam utilis est pueri halitus manè oculis exceptus, si priùs aliquandiu puer semen fœniculi masticaucrit.

Neque minus conducibile est oculos lingere per longum tempus, matutinis horis, linguâ pueri aut catelli.

Ad suffitum etiam referri potest panis cum semine fœniculi contuso subactus, & dum calens è furno extrahitur, per medium sectus, si eius vapor oculis recipiatur; panem scilicet ita oculis admouendo, vt fixo intuitu in panem, oculis vapore illius madescant.

Remedia prædicta matutinis horis præcipuè vsurpanda sunt. Noctu verò sequens cataplasma admoueri poterit.

℞. Farinæ fœnugr. ʒ. j. aloës ʒ. β. croci ʒ. j. Fiat pulvis subtilissimus, excipiatur vino albo in quo crocus metallorum infusus fuerit, & fiat cataplasma applicandum calidè hora somni.

Multi laudant sanguinem columbinum, in oculum calidè instillatum eo enim calore natiuo animalis, resecta pars valdè corroboratur, & materia excrementitia dissolvitur. Sed quia in illo sanguine calor citò euanescit, multò conducibilius foret pullum columbinum iuniorem, & nondum plumis contextum, ac per spinam sectum, oculo applicare.

Prædictis remediis, præsertim materiæ coniunctæ dissipatio obtineri potest, si illa sperabilis est. Topica enim varia, quæ oculis instillantur, collyria vulgo dicta, exigua sunt efficacia, & illa sunt, de quibus dixit Galenus, ea plus promittere, quàm præstare; tota enim eorum virtus in cornea tunica ferè absumitur, neque potest ad interiores partes penetrare, nisi ea insigni acrimonia prædita sint, qua dolores in oculis excitantur.



& fluxio ad illos magis promouetur : vnde non pauci immodico eorum vsu , ex leuiori affectu in omnimodam cæcitatem perducti sunt. Quia tamen multæ reperiuntur apud authores collyriorum descriptiones, quibus præstantissimus effectus ab iis tribuuntur, ne hic aliquod deficere videatur , nos selectissimas non nullas proponemus, vt vnusquisque eorum effectus explorare valeat.

℞. Mellis optimi lb. ij. rad. fœnic. aristoloch. long. & rotund. ana lb. j. fol. rutæ , euphras. chelidon. maior. & summit fœnic. ana M. vj. centaur. min. M. iij. rosar. recent. P. iij. vrinæ pueri impubis lb ij. Misceantur omnia simul in vase vitreo , & destillentur in balneo Mariæ. Hæc aqua instilletur in oculos frequenter.

Vel parari potest panis ex tota farina, cum rutæ, chelidon. euphras. betonic. & fœnic. pulueribus, addito melle, qui recenter ex furno extractus, in partesque dissectus, intra vasa duo stannea vel argentea concluditur, inde aqua quædam colligitur, quam guttatim in oculos instillatam mirificè conducere Zechius affirmat. Sequens etiam collyrium ab eodem autore miris effertur laudibus.

℞. Fol. viol. alb. seu leucoij M. j. sem. raphani hortensis ʒ. j. ammoniaci ʒ. β. Misceantur, & puluerata maccarentur per horas 24. in aquæ fœnic. lb. j. Deinde bulliant vnicâ ebullitione leui. Postea colaturæ adde succi fœniculi depurati ʒ. j. balsami Peruuiani ʒ. ij. Fiat collyrium, quod manè & vespere instillatum (inquit Zechius) corpore (vt docet) prius euacuato, antiquas oculorum ægritudines ita detergit ac dissipat, vt cataractam, etiam citra ferrum mirabiliter auferat.

Hollerius aquam describit, aquam dicit restituisse visum cœconouem annorum, quæ talis est.

℞. Succı apij, fœnic. verben. chamædr. pimpinellæ,

caryophyllatæ, saluæ, chelidon rutæ, centinod. morsus gallinæ, caryophyllorum, farinæ volatilis, ana  $\mathfrak{z}$ . j. piperris crassiusculæ triti, nucis mosch. ligni aloës, ana  $\mathfrak{z}$ . iij. Omnia immergantur in vrina pueri incorrupti; & sextâ parte vini maluatîci. Bulliant breui tempore. Tum exprime, percola, & repone in vase vitreo obturato: horâ somni singulas guttas singulis oculis instilla.

Succus anagallidis aquaticæ solus in oculos per aliquot dies instillatus curauit aliquando suffusionem incipientem; cui tamen plurimum adiuuenti attulit cauterium futuræ coronali inustum.

Non minoris sunt efficaciz succi chelidoniz & calitrapæ simul mixti.

Quercetanus in Pharmacopea aquam ex infusione croci metallorum paratam valdè commendat, quæ in hunc modum componitur.

$\mathcal{R}$ . Aquar. chelidon. mai.  $\mathfrak{z}$ . vj. croci metallor.  $\mathfrak{z}$ . j. Infundantur simul. Et huius aquæ tepidæ guttas tres vel quatuor infunde intra oculos ter aut quater in die per longum tempus. Hanc aquam se expertum esse dicit Fonsæca visionem restituisse cuidam, qui eam offuscatam habebat per plures menses. Habet autem hoc egregij, vt sine morbo validissimè abstergat, quod vix in alio medicamento reperitur.

Idem Fonsæca aquam sequentem tanquam mirabilem prædicat.

$\mathcal{R}$ . Plures hirundines. Contundantur integrè cum suis pennis in mortario, illatum cuilibet libræ adde medullæ panis  $\mathfrak{z}$ . iij. vini albi maturi lb. iij. Infundantur per sex dies, & destillentur per balneum vsque ad siccitatem. Deinde expone illam aquam in vase vitreo ad solem per dies viginti, & instilla in oculos manè & sero.

Et floribus rorismarini liquor elicetur nebulis discu-

tiendis admodum idoneus, qui in hunc modum paratur.

℞. Flor. rorisinar. q. s. Impleatur ampulla vitrea, quæ probè obturetur, & soli meridiano exponatur ad parietem. Inde liquefcit oleofus quidam humor, quo oculi pennâ illinantur.

Auctores fella animalium commendant, quod potentiffimè abftergant & difcutiant. Sed acrimoniâ fua dolorem excitant, idèd rarò in vsum reuocantur.

Foreftus *obf.* 35. *lib.* 11. pifculum quemdam patriæ fuæ familiarem commendat, ex cuius iecore fuccus quidam elicitur, quo fuffufiones quafi momento & miraculo curari teftatur: eius hiftoriam & vtendi modum vide loco citato. Guillelmus Lozellus fe plures curaffe refert, nullâ lucis vfurâ fruentes, aquâ fequenti, poft vniuerfalia remedia vfurpata.

℞. Hepatis hirci fani & recentis lb. ij. calami aromat. & mellis, ana ʒ. ſ. fucci rutæ ʒ. iij. aquæ chelidonix, verbenæ, fceniculi, euphrasix, ana ʒ. iij. piperis longis, nucis mofch. caryophyllor. ana ʒ. ij. croci ʒ. j. flor. rorisinarini aliquantulum contritor. M. ſ. farcocollæ, aloës hepaticæ, ana ʒ. iij. fellis auium rapacium, vel caponum, aut perdicum ʒ. j. Incidenda incidantur, terenda terantur, de in omnia fimul mifceantur, addendo fackhari albiff. ʒ. ij. mellis rof. ʒ. vj. ponantur in alem-bico vitreo. Deftillentur in B.M. igne lento. Hæc aqua feruetur in vafe vitreo benè obturato, tanquam pretiofa, quæ in oculum laborantem inftilletur bis aut ter in die.

Zacutus Lufitanus aquam fequentem maximè commendat his verbis. *Ophthalmia diuturna noctisque oculorum affectionibus, quæ ex nimia humiditate craffisque humoribus & caliginofis fcaturiunt? vt denſitati, albugini, vngui, & ſuffuſioni. Et hanc aquam principatum obtinere*

diuino experimento compertum habeo; si corpore exquisitè & acutato, noctu solum tribus horis post pastum iuxta oculum sex guttas eius insilles actu frigidas: post duas horas, tanquam è fonte perenni, manabunt ichores in copia multa.

℞. Aloës ʒ. iij. rutæ, fœniculi, betonicæ, ana M. ij. verbenæ, tormentillæ, an. M. j. sarcocollæ ʒ. iij. spumæ nitri ʒ. ij. β. sacchari candi ʒ. iij. syrupi rosac. ʒ. iij. vrinæ pueri impubis lb. β. stercoris lacerti ʒ. ij. marrubij M. ij. euphrasie M. j. β. zinzib. spicæ nardi, piperis longi, caryophyll. tuthiæ, ana ʒ. ij. balsami ʒ. iij. mellis rosati ʒ. j. viridis æris ʒ. j. licij ʒ. i. fol. raphani M. j. Pulueranda puluerentur, misceantur omnia, & infundantur in vino albo generoso, in vase destillatorio, addita quarta parte mellis optimi, decem dierum spatio, dummodo quotidie agitentur, & deinde destillentur, & aqua quæ exierit, reseruetur.

Idem Zacutus sequens vnguentum maximè commendat his verbis. *Ad exsiccandas humiditates ad oculos à capite confluentes, simulque valentissimè per canthos expurgandas, vnguentum sit magistræ nulli secundum, applicitum post totius corporis, capitis & oculorum vacuationem vniuersalem. Eo bis in die, manè & noctu tribus horis post cœnam, palpebræ superiores leuiter illinantur. Post horam humoris serosi rinuli per angulum præsertim maiorem effluent vbertim.*

℞. Ol. rosac. ʒ. iij. aquæ ros. ʒ. ix. camphoræ ʒ. j. tuthiæ ʒ. j. mellis ʒ. ij. fellis hirci ʒ. β. fatinæ lupinorum ʒ. β. aloës socotrinæ ʒ. j. sacchari candi ʒ. β. succi marrubij fœniculi, rutæ, ana ʒ. β. myrrhæ ʒ. j. ammoniaci ʒ. β. sarcocollæ ʒ. j. β. Pulueratis puluerandis, misce, & lento igne coque modicè; & cum pinguedine hircina & arietina, & momento ceræ, fiat secundum artem vnguentum.

Denique, reliquis remediis non conferentibus, mor-

bo propemodum ad desperationem verso, ad experimentum reduci mereretur inunctio ex hydrargyro, quam à se excogitatam ait Fonseca, non tamen in vsum reuocatam, consultatione, enim 19. lib. 1. sic loquitur: *Aliquando cogitavi inunctionem argenti vini, ea ratione qua adhibetur in morbo Gallico, magna efficacia posse extirpare cataractas incipientes & increscentes, quod visum est in ophthalmiis gallicis, ubi humorum residua visionem impediunt, sed etiam in non gallicis. Isto remedio caput ita expurgari poterit, ut dissoluantur vestigia cataracta, & aliquando experiri decreuit.* Huic suae cogitationi maximè applausisset Fonseca, si Skenckhij obseruationem 309. lib. 1. vidisset, quæ ex Alexandri Traiani Petroni lib. 5. de morbo Gallico cap. 1. desumpta est. *Quidam, inquit, qui antequam morbo Gallico afficeretur, altero oculo cæcus erat, suffusione densissima (vulgus cataractam vocat) oculum occupante hydrargyri inunctione morbo Gallico, & à suffusione, quod maximè mirum est, erasit. Neque à ratione alienum est inunctione illa cataractas posse dissolui, cum frequens experientia doceat, pradueros tumores ex pituita crassa & concreta genitos, illius hydrargyri potenter dissolui.*

Cùm nullis medicamentis dissolui potest cataracta, vltimum remedium est Chirurgica operatio, qua acu in oculum immisâ, materia pituitosa suffusionem efficiens condensata, & in pelliculam conuersa ad inferiores oculi partes decutitur, & apertâ veluti fenestra visus recuperatur. Quæ operatio aliquando succedit feliciter, pluries verò infeliciter, ita vt ex ea non pauci visum in perpetuum amiserint. Quando tamen res eò deuenit, vt nulla alia supersit visionis recuperandæ spes, satius est, iuxta Celsi sententiam priùs laudatam, anceps experiri remedium, quàm nullum. Hæc autem operatio propter incertum euentum à Chirurgis

ordinariis non solet exerceri; sed ab Operatoribus vulgo dictis, qui per varias vrbes vagantes, frequentius sese in operationibus exercent: atque ita operandi tempus & modus illis prorsus committendus est. Quia tamen à Medico ignorari non debent, apud Practicos non paucos exactè descripta inueniri poterunt.

Curata suffusione, siue resoluentibus medicamentis, sine operatione Chirurgica, prophylaxi per longum tempus incumbendum est, quia recidiuæ maximum est periculum: oculi enim ex longo affectu debilitati admodum dispositi sunt ad fluxiones è cerebro denuò excipiendas. Idcirco purgationibus vsualibus incumbendum est, fonticuli ad fluxionis auersionem continuò gestandi & oculos roborantia frequenter vsurpanda, qualia in guttæ serenæ curatione proposita sunt. Quibus addi potest ablutio oculorum, quæ singulis diebus manè vsurpanda est in hunc modum. Ab exitu lecti masticeetur semen fœniculi aliquandiu, deinde os vino repleatur, eoque vino tantillum in ore calefacto abluantur oculi, donec acrimoniâ suâ eos vellicet, & dolorem aliquem inferat, qui cessante ablutione statim etiam cessare consuevit.

Præterea visus conseruationi plurimùm conferunt specilla, quæ obiecta, prout naturaliter se habent, nempe, neque maiora neque minora repræsentant. Nec non vtile est, per vices specillis viridibus aut cæruleis visum recreare.

Ac denique ea omnia vitanda, quæ visui nocent, & vsurpanda quæ ipsi conferunt, prout in victus ratione, pro guttæ serenæ curatione instituta, annotata sunt.

## CAPUT V.

*De dilatatione pupillæ.*

**V**vea tunica, ex Galen. 1. *de sympt. causis, cap. 2.* variis morbis obnoxia est, ac præcipuè ruptionem, distortionem, dilatationem & constrictionem pati consuevit.

Ruptio fieri potest, tum à causa externa, vt percussione & contusione, tum ab interna, humore scilicet copioso tunicam vueam distendente & rumpente. Cum autem ea arte reparabilis non sit, medicam tractationem non postulat.

Distortio vueæ tunicæ non potest contingere, nisi à prima conformatione, cum illa cornæ tunicæ vndique adhæreat. Ideo Galen. ipse, *loco citato*, nudam illius enumerationem facit, inter differentias symptomatum vueæ tunicæ: in ea autem explicanda non immoratur, quia nullius est vsus in praxi medica. Nos etiam prioribus duabus differentiis prætermisiss, dilatationis & constrictionis pupillæ explicationi tantum incumbemus.

Dilatatio igitur pupillæ, quæ est vueæ tunicæ foramen, per quod species obiectorum oculum ingrediuntur, Mydriasis Græcis appellata, visionem lædit, quod lumen nimia copia oculum ingrediatur: vnde fit, vt ea laborantes in obscuriori loco magis videant, quàm in lucidiori. Quod ostendunt naturales & ordinariæ pupillæ mutationes, quæ in locis splendidis & obscuris contingunt; dum enim visio fit in loco splendidiori & multum illuminatio, pupilla constringitur, vt minori copia lumen oculum ingrediatur, & ne maiori copia

visionem lædat, spiritus dissipando ac disgregando. Et hinc fit, ut qui à loco valde lucido in obcurior ingrediuntur, primò ingressu nihil ferè videant: quandoquidem pupilla contracta in loco obscuro, non satis luminis recipit ad visionem integrè perficiendam. Postea verò cum aliquandiu in loco obscuro morati fuerint, pupilla sensim dilatatur, ut maiorem luminis copiam recipiat, quæ sit sufficiens ad visionem efficiendam; & tunc res, quæ primo ingressu non videbantur, clarè perspiciuntur. Contra verò, qui à loco obscuro in valde lucidum transeunt, lumen ferè non possunt ab initio, & eorum oculi grauitèr perstringuntur. Quia cum pupilla magis dilatata fuerit in loco obscuro, ut sufficiens luminis copia oculum ingrediatur, si hoc modo dilatata subitò magno lumini obiiciatur, nimia copia lumen oculum ingreditur, eumque perstringit ac visionem turbat. Vnde patet, lumen visioni necessarium copia mediocri oculos ingredi debere, & ad illius receptionem, pupillæ latitudinem moderatam esse necessariam.

Fit autem dilatatio pupillæ præternaturalis, vel à primo ortu, quæ immedicabilis est; vel post ortum à causis præternaturalibus & aduentitiis, quæ vel internæ sunt, vel externæ.

Internarum proxima est & immediata, tensio vucæ tunicæ: illa autem tensio, vel à siccitate fit, vel à repletionè.

Siccitas vucam tendit, & foramen pupillæ amplius efficit; quemadmodum coria perforata, cum exsiccantur, patentiora foramina efficiunt. Fit autem sicca illa intemperies à vigiliis diuturnis, febribus aliisque causis exsiccantibus.

Repletio vucæ tunicæ, dum eam omni ex parte distendit, ampliorem pupillam efficit; eaque produci-



tur, vel à flatibus & vaporibus in oculum transmissis, vel ab humoribus in eundem conflexis, vel ab aqueo humore supra modum aucto, vel denique à tunica ipsius vueæ tumore. His causis addere possumus conuulsionem vueæ tunicæ, quæ in paroxysmis epilepticis præcipuè apparet. Cum enim tunc omnes partes nervosæ & membranosæ distendantur, vuea etiam tunica suam distensionem patitur. Et hæc præcipuè ac manifestè apparet in puerorum conuulsionibus epilepticis, in quibus tanta sit pupillæ dilatatio, ut totam ferè iridem occupet, & illius ratione visio prostris aboleatur.

Causæ externæ sunt percussio vel casus ab alto, vel spiritus retentio, ut in parturientibus & tibicinibus. Percussio & casus fluxionem ad oculos promouent, unde distensio pupillæ; spiritus retentio status & humores ad oculos impellit, à quibus etiam distensio producit.

Diagnosis huius affectus difficilis non est. Siquidem pupillæ dilatatio oculis est conspicua, præsertim si ante morbosam constitutionem pupillæ amplitudo naturalis Medico innotuerit: tum etiam si cum latitudine pupillæ mediocritatem excedente, visionis læsio adfuerit.

Præterea naturalis amplitudo pupillæ dignoscitur ex eo, quod clauso, vno oculo, alterius pupilla magis dilatatur; quod non fit in dilatatione morbose, quia tunica vuea à causa præternaturali distenta amplius distendi nequit.

Si denique dilatatio pupillæ in vno tantum oculo appareat & præternaturalis est, & vnicum tantum oculum affici significat.

Quod ad prognosin spectat, pupillæ dilatatio ab ortu contracta incurabilis est; quæ verò post ortum

accidit, difficile curatur, maximè verò quæ à siccitate producitur. Quæ verò ab aliis causis fit, si adhuc recentes fuerit, curabilis est; cùm affectus oculorum recentes, iuxta Gal. doctrinam, curationem recipiant; inueterari verò nunquam, aut saltem difficillimè tolerantur.

Curatio pro varietate causarum varianda est. Si à siccitate fiat, cùm vix illud valeat contingere à causa interna, quin totum etiam corpus eadem intemperie afficiatur; Idèò remediis atque alimentis humectantibus & analeptici totum corpus reficiendum est, qualia in febre hectica usurpari consueverunt. Peculiariter verò corpus humectandum est balneo aquæ tepidæ, & lactis recenter mulcti, quod etiam in oculos frequenter instillabitur, præsertim muliebri.

Si fiat ab humore oculum replente, cùm ille à capite defluat, etiam caput & totum corpus erit euacuandum, mox humor oculis impactus discutiendus. Quæ quidem, cùm sufficienter perfici valeat remediis pro suffusionis curatione propositis, ea hic frustra repetenda non sunt, sed à curatione prædicta desumenda. Quæ etiam ea remedia suppeditabit, quæ humori in oculo contento discutiendo ac dissipando idonea sunt. Iis tamen succedere possunt quædam astringentia, quæ pupillam nimis dilatatam angustiores efficiant. In hunc finem collyrium sequens usurpari poterit.

℞. Rosar. rubr. siccar. ʒ. ij. croci, spice nardi, corticis thuris, ana ʒ. ʒ. tuthiæ præparatæ, spodij, aca-  
ciæ, ana ʒ. j. In pulverem redacta includantur panno lineo raro, & fiat nodulus, qui infundatur in aquæ rosar. ʒ. iij. & illa aqua instilletur in oculum frequenter, toties nodulum exprimendo, quoties aqua usurpabitur.

Si fiat à flatibus, post vniuersales euacuationes, ea medicamenta erunt vsurpanda, quæ flatus discutiunt in toto corpore & ipsis oculis. Atque ita illi foueri poterunt decocto fœniculi, rutæ, aneth. rosar. rubr. myrtillorum, facto in aqua peculi rosarum, cum quarta parte vini albi.

Si denique à percussione fiat, pro contusionis magnitudine varianda curatio est; & si adsit inflammatio, instar ophthalmiæ curanda est. Si verò inflammatio non sit, admovebitur in principio cataplasma ex farina fabarum, foliis plantaginis & rosis rubris, cum aqua rosarum paratum. Postea verò sanguis columbini frequenter instillabitur, quod in omnibus oculorum vulneribus ac contusionibus excellens est remedium.

## C A P V T VI.

### *De Pupilla angustia.*

**P**upillæ angustia visui etiam officit, quemadmodum dilatio, vt dictum est capite superiori, quandoquidem moderata pupillæ amplitudo necessaria est ad species visibiles perfecte recipiendas. Sic quando in statu naturali, oculo in loco splendidiori posito, pupilla constringitur, ne lumen nimium recipiat, si subito in obscuriorem locum transferatur, res in eo contentæ primo ingressu vix, aut parum videntur, propter dictam angustiam. Postea verò quando pupilla dilatata est, omnia rite percipiuntur. Igitur in loco mediocri lumine affecto, pupillæ latitudo mediocris esse debet, vt mediocre lumen recipiat, ad visionem recte efficiendam. Si verò pupilla debito angustior sit, sufficiens lumen non reci-

pit ; ideò in iis, qui hoc vitio laborant, visio imminuta est. Illi tamen in loco valdè lucido rectè visionem exercent, quia iussiciens lumen tunc temporis per angustum foramen ingreditur, nisi alij oculorum morbi cum hoc affectu coniungantur.

Fit autem pupillæ angustia, vel ab ortu & prima conformatione, & tunc parum nocet: si enim eâ affecti minùs vident in loco obscuro, aut mediocriter lucido, quàm mediocri pupillæ latitudine præditi ; in loco tamen lucido melius & perspicacius vident. Vnde dixit Gal. 1. *de sympt. causis, cap. 2.* eos, qui à natiuitate pupillam angustam habent, acutiùs videre.

Vel fit angustia pupillæ à causis præternaturalibus, nempe nimia humiditate, siccitate ; defectu humoris aquei, & spirituum inopia.

Ab humiditate fit angustia pupillæ, quando ab eadem tunica vuea relaxatur, & relaxata foramen angustius efficit. Licet enim ab eadem humiditate fiat pupillæ dilatatio, non tamen contrarij effectus ab eadem causa fiunt quia vt causa eadem dici possit, debet eodem modo se habere ad suum effectum: at non eodem modo se habet humiditas, quando facit dilatationem ; eam siquidem efficit replendo & distendendo membranam, angustiam vero efficit relaxando : distendit, quando in illius capacitate continetur; relaxat, quando substantiæ illius imbitur.

De siccitate eadem est difficultas, quandoquidem illa inter causas dilatationis pupillæ recensita est. Hæc autem est differentia. Quando vuea tunica exsiccatur humoribus in debita quantitate permanentibus, tunc facit pupillæ dilatationem ; quandoquidem tensionem suam, quam antea habebat, non amittit, quemadmodum, ( vt superiori capite dictum est, ) coria tensa quæ exsiccantur, foramina sua ampliora reddunt. Si verò

vua tunica dum exsiccat, corrugatur & concidat, tensionemque priorem amittat, propter defectum aut imminutionem humorum oculi, tunc pupillæ foramen angustius efficitur.

Et sic constrictio pupillæ à siccitate eadem ferme erit, quæ à defectu humoris aquei contingit, quamvis etiam possit fieri sine exsiccatione, dum humore aqueo effusq tunica vua concidit.

Denique ex spirituum defectu vel paucitate fit angustia pupillæ, quando propter obstructionem nervi optici, aut aliam causam, spiritus visui non potest confluere ad oculum, qui eo repletus tunicarum suarum tensionem conseruat, eoque deficiente illæ laxantur & concidunt; unde pupillæ constrictio euenire solet. Hoc apparet in valde senibus, in quibus pupilla angustior efficitur propter spirituum defectum.

Hic affectus ex se facile dignoscitur, & sensui patet. Si enim vnus tantum oculus afficiatur, alterius comparatione angustia pupillæ dignoscitur. Si verò vterque oculus laboret, aliorum hominum rectè se habentium oculos inspiciendo laborantis pupillæ angustiores comparentur.

Quo ad prognosim spectat, pupillæ angustia, quæ ab humoris aquei iactura procedit, incurabilis est: quandoquidem ille semel effusus regenerari nequit, præcipuè in grandioribus. In pueris tamen aliquando per vulnus effusus humor aqueus reparatus atque regeneratus est. A siccitate etiam producta pupillæ constrictio, vix aut difficillimè saltem curari potest. Illa verò quæ ab humiditate sit, in suo principio, & adhuc recens; facile curari potest, inueterata verò difficillimè.

Curatio huius affectus à præcedente non variat, quandoquidem ab iisdem causis producuntur, nimirum siccitate vel humiditate, quæ intemperies, quamvis

contrarios effectus pariant, modo ante explicato, iisdem tamen remediis auferendæ sunt.

## C A P V T VII.

*De Albugine, seu macula, & aliis corneæ coloribus mutatis.*

**N**aturalis corneæ constitutio evertitur, quando perspicuitatem suam amittit, vel colore alieno inficitur.

Perspicuitatem suam amittit, quando crassior euadit. Crassescit autem cornea tunica per exsiccationem, ut in senibus, quæ affectio irreparabilis est, vel ab humoribus crassis in eam impactis, quod contingit frequenter in ophthalmia, quando vel à nimio resoluentium medicamentorum usu tenuiores humoris partes discutuntur, crassæ verò remanent; vel cum importuno refrigerantium usu humores incrassantur: & non solum crassior euadit cornea tunica, in ea parte, cui humor ille impactus est, sed etiam album colorem contrahit, unde Leucoma, seu Albugo nominatur. Fit etiam talis affectus à cicatrice ex ulcere relicta, in qua cornea densior redditur, & diaphaneitatem suam amittit.

Varie sunt illius differentiæ, prout alia magis, alia minus crassa est; alia corneæ superficiem tantum occupat, alia in profundo consistit & totam corneam penetrat; alia maior est & totam pupillam obsidet, vel maximam illius partem; alia minor & exiguum pupillæ spatium comprehendit, tuncque proprie macula nominatur.

Colore etiam alieno inficitur cornea, quando san-

guis in eam effunditur, qui affectus Suggillatio nominatur, & tunc omnia obiecta rubra apparent, vel quando bilis sese in eam insinuat, quod in ictericis contingit, & tunc obiecta flaua apparere solent iuxta Gal. doctrinam. Quod tamen intelligendum est de magna bilis effusione in corneam. Si enim leuiter tantum tincta fuerit cornea, quod plerumque contingit (maior enim bilis receptio in tunica adnata fit quàm in cornea,) tunc obiecta colore flauo minimè infecta, sed prout naturaliter se habent conspiciuntur.

Hi affectus peculiari non indigent diagnosi, quia sensibus conspicui sunt, speciatim verò albugo, quæ crassior est, magis albicat, & magis visum offendit; sic etiam quæ magis superficialia est, magis albicat: quæ autem profundior, ad nigredinem declinat, utpote vix tunicæ propior, quæ cum nigra sit, aliquid sui coloris illi communicat. Causæ eam producentes, ex iis quæ præcesserunt facile dignoscuntur, si nempe ophthalmia, vulnus, aut vlcus præcesserit.

Quod ad prognosim spectat, albugo quæ à pituita fit, humoreve crasso ex ophthalmia relicto, satis facile curatur, præsertim si inueterata non sit. Quæ verò à cicatrice relicta, difficillimè: quandoquidem in parte exquisita sensu donata, remedia acriora exterendæ cicatrici idonea vix tolerari possunt.

Curatio albuginis ab humore pituitoso in cornea concreto productæ, emollientibus, attenuantibus & discutientibus remediis perficitur, præmissis tamen vniuersalibus, quæ causæ antecedentis sublationem respiciunt & nouum humorum influxum ad oculos prohibent, qui facile proritari posset à topicis remediis, præcipuè iis quæ acrimonia quadam, aut calefaciendi vi prædita sunt, nisi illius materia prius submoueretur.

Itaque primùm vniuersales euacuationes vsurpandæ;

sunt, tum etiam reuulsiones & deriuationes, quæ in cura suffusionis & guttæ serenæ traditæ sunt.

Postmodum verò ad materiam concretam emolliendam, fofus admouendus est, cum spongiis mollioribus ex decocto fœnugræci, meliloti, chelidonix, & fœniculi paratus.

Vel eiusdem decocti vapor oculis excipiat, & in hunc finem sequens etiam decoctum parari poterit.

℞. Rad. alth. ʒ. j. fol. maluæ, euphras. chelid. mai. ana M. j. sem. lini & fœnugr. ana ʒ. iij. flor. melilot. P. j. Fiat decoctio in aqua fontis, cuius vapor recipiatur in oculum manè & serò.

Mox discentientia remedia vsurpanda sunt, qualia in suffusionis curatione descripta fuerunt: illa enim hæc etiam plurimum conferre poterunt, atque ita collyria attenuantia, & humorem oculo impactum resoluentia, inde erunt desumenda, & præcipuè ea quæ ex melle cum oxydorcicis remediis distillato componuntur. Aqua enim mellis destillata, etiam sola vsurpata, multum præstat ad omnes oculorum maculas extergendas, si illius vsus diu continetur.

Ad idem præstat saccharum candum, in aqua euphrasix, chelidonix, aut fœniculi dissolutum.

Tum etiam valdè conferet, si oculus linguâ pueri vel puellæ, quæ fœniculum masticauerit, frequenter lambatur.

Amatus Lusitanus nubeculas crassas in puella duodecim annos nata, se curasse refert, post decocti falsæ parillæ exhibitionem per viginti dies, sequenti collyrio.

℞. Mellis in ipso fauo ℥. ij. summitatum fœniculi, flor. sambuci, euphras. ana P. ij. sacchari candi ʒ. iiij. Destillentur in B. M. & aqua instilletur in oculos.

Semen homini oculo impositum horâ somni, pur-



gat oculum à sordibus, eúmque abstergit, sicque albuginis curationi conducit.

Potenter etiam albuginem discutit succus fœniculi recenter extractus, cui balsami Peruuiani gutta vna admista sit.

Idem præstat oleum ex linteis combustis, cum salina pueri mixtum, & pennâ illitum. Elicitur hoc oleum, linteo accendendo, & inter duas patinas suffocando, materiâ refrigeratâ, guttæ illius olei patinæ adhærentes inueniuntur.

Albugo verò seu macula à cicatrice producta, curatur iis remediis, quæ cicatricem emollire, attenuare, ac dissoluere possunt; cum autem ea, quæ cicatricem conterunt, acrimoniâ non careant, maiori curâ vniuersales euacuationes ac reuulsiones præmittendæ sunt, ne fluxio humorum attrahatur ad partem. Illis igitur, vt supra dictum est, vsurpatis; primùm fotus emollientes; aut suffumigia adhibere conuenit, quæ suprà proposita sunt. Deinde abstergentia & discutientia remedia ad-mouenda sunt. Primò leniora, qualia sunt suprà proposita, præsertim aqua mellis composita. Postea verò ad fortiora veniendum est, qualia sunt fella piscium, vt vranoscopi, pastinacæ, lucij; tum etiam aliorum animalium, vt perdicis, galli, anseris, bouis & aliorum: Eodem modo vsurpari poterunt succi chelidon. mai. centaur. minor. anagallidis & similium, quæ melli permiscenda sunt, tum quòd mel abstergendi & discutienti vi præditum est; tum etiam quia liquores in oculum infusi, diffluunt ad canthos; nec in pupilla morantur, in qua eorum actio desideratur, sed cum melle inspissato, faciliè pupillæ adhærent. Si tamen eorum mordacitas tolerari nequeat, dicti succi aut fella inspissari poterunt mucilagine gummi tragacanthi, psyllij aut cydoniorum, extractâ cum aqua fœniculi, euphras. aut

lia ophthalmica. Formula collyrij ex succis talis esse poterit.

℞. Succi fœniculi, chelidon. & anagallidis, ana ʒ. iij. succi centaur. min. ʒ. ʒ. mellis albi ʒ. j. M. instar linimenti. Si cum albugine adsit oculorum rubor, vtile erit collyrium ex vino albo, sale & tritico paratum in ophthalmia descriptum. Vel sequens.

℞. Aloës & agarici, ana ʒ. j. Puluerentur, & includantur nodulo, qui maceretur in aqua euphrasie, vel fœniculi, & confricentur oculi manè & serò. Aloë abstergit, roborat & fluxionem sistit, agaricus potenter abstergit.

Suggillatio, seu color oculi rubeus ex sanguine in eum effuso productus, si recens adhuc fuerit, optimè curatur sanguine columbino in eum instillato. In illius verò defectu lac muliebre instillari poterit cum pauco thure & croco, vel oui vitellus cum vino admouebitur, quod remedium à Galen. laudatur. 4. de comp. med. sec. loc. cap. 8. Si verò contumax fuerit affectus, fouendus erit oculus decocto fœnuigr. althææ, fœniculi, rutæ, chelidon. vel illius decocti fumus oculo excipiendus est. Ac denique ea omnia, quæ pro suffusione descripta sunt, ad huius affectus curationem poterunt esse idonea. Speciatim vero, in malo inueterato, quando rubor ad nigredinem declinat, à Galen. commendatur hyssopi coma trita, lintre inclusa, in aquam feruentem demersa, & oculo admota. Et docet experientia, hoc remedium tantæ esse efficaciz, vt cruor sensibilibiter attrahatur, & linteo adhæreat.

Ac denique color flauus ictericorum, qui in oculis maximè apparet, curato morbo sponte discutitur. Si tamen illius dissipationem accelerare lubeat, suffitu aceti oculis excepto id præstari poterit.

## CAPVT VIII.

## De Ophthalmia.

**T**Vnica adnata ita corneæ coniuncta est, vt quamplurimi affectus vtramque tunicam occupent. Sicque oculorum inflammatio, licet tunica adnatæ propria sit, ad corneam tamen non raro extenditur, in eaque varios affectus producit, vlcera nimirum hypopyon, albuginem & alia. Sic etiam pustulæ aliique tumores, vûlnera & vlcera, vtrique tunicae communia sunt. Ita vt omnes harum tunicarum affectus seorsim, tractari nequeant. Ideo nos adnatæ tunicae affectus aggredi cogimur, priusquam corneæ morbos vlteriùs persequamur.

Ab Ophthalmia igitur incipientes, dicimus, illam, quæ, vt verbum sonat, nihil aliud est, quam oculi inflammatio, ab omnibus authoribus pro tunica adnatæ seu coniunctiua inflammatione vsurpari. Lippitudo à Latinis post Cornelium Celsum nominatur.

Hæc autem inflammatio, prout maior vel minor est, triplicem differentiam sortita est. Prima *τάραξις* Græcè, Latinis conturbatio dicitur, quæ iuxta Pauli sententiam, à causâ extrinsecâ oritur, nempe sole, fumo, puluere, oleo & similibus. Sed nihil impedit fieri etiam à causâ interna, vitio scilicet ventriculi post vini potationem, vel alios errores; estque levis inflammatio seu phlogosis, cum exiguo rubore & dolore miti, quæ tamen in veram ophthalmiam non raro degenerat, & est illius principium.

Vera autem ophthalmia à causa interna perpetuo producit, estque vera inflammatio cum tumore, ru-

bore & dolore; lippitudo à Celso nominatur, quia in ea crassum excrementum, quod lippa vocatur, oculis adhæret.

Tertia *χημωσις*, Græcè, Latinè etiam chemosis appellata; est quando inflammatio ita ingrauescit, ut magna sit cum dolore vehemente, & utraque palpebra inuersa sit, ut vix ab eis oculi contegantur; & album oculi sublimius euaserit, rubrumque magna ex parte iridem occupet. In pueris oculos prominentes habentibus sæpius contingit, fitque à magna plethora & pituitosis humoribus.

Alia desumitur differentia ophthalmiæ ex Hipp. *Aph. 14. sect. 3.* quâ nimirum ophthalmia diuiditur in humidam, & siccam. Humida illa est quæ iam fuit proposita, & lacrymarum effusionem secum habet coniunctam. Sicca verò, quæ ex eodem Hipp. *Ξηροφθαλμία*, nominatur, & in sicciore ætate & autumnò contingit; fit à bile aut melancholia exassata, cuius pars humida & aquosa absumpta est, idèò nullas humiditates aut lachrymas emittit. Alias etiam patitur subdivisiones ab adiunctis. Si enim fit cum pruritu, *†υρεφθαλμία* dicitur; si cum duritie palpebræ: *σκληροφθαλμία* nominatur.

Alia etiam desumi potest differentia ophthalmiæ ex Gal. 2. *de diff. febrium cap. 11.* ubi quandam dicit ophthalmiam esse periodicam, quæ scilicet per interualla repetit in iis, qui illi valdè obnoxij sunt, & qui caput habent calidum & humidum, oculosque debiles fluxioni recipiendæ idoneos. In iis autem, postquam frequenter per multos annos ophthalmia affecti sunt, oculi tandem contabescunt, & visus prorsus amittitur, unde tabida ophthalmia nominatur; vel potius ophthalmia in oculi tabem degenerat.

Alia denique desumitur differentia à causa proxima & immediata, quæ est fluxio, vel congestio. Per fluxio-

sem ut plurimum fieri solet ophthalmia. Aliquando tamen per congestionem generatur, si nimirum aliqua intemperies seu imbecillitas coniunctiæ acciderit, ex qua *opacitas* in parte rectè non exercetur; sed multa excrementa in ea congeruntur, à quibus pars sese eximere sufficienter non potest, unde inflammatio succedit.

Causa ophthalmiæ coniuncta est sanguis biliosus, pituitosus aut melancholicus, in oculos defluens, vel in iis per congestionem cumulatus.

Fluxionis causæ sunt multiplices, tum externæ, tum internæ, etiam vulgò notissimæ.

Congestionis verò causæ sunt illæ omnes, quæ oculos intemperie aut imbecillitate afficiunt; ita ut, quæ à sola fluxione initium duxerat, successu temporis partem debilitans, illius coctionem vitiet, & ophthalmia partim à fluxione, partim à congestionem fiat, quòd in chronica ophthalmia plerumque solet contingere.

Cùm autem ophthalmia per viam fluxionis generatur, à capite, ut plurimum fluxionem eam deriuari certum est, & omnes propemodum authores hanc unicam fluxionis originem agnoscunt. Verùm docet experientia contumaces ophthalmias ab hepate non rarò exoriri, & humoribus ab eo in oculos confluentibus; ita ut tunc temporis cauteria occipitio admota, morbum foueant, quæ alioqui fluxioni à capite oriundæ maximè conducunt: tunc enim humorum motum ad partes superiores magis promouent. Et vidimus sæpe veteres ophthalmias, nullisque cedentes remediis, clauso fonticulo, qui diu in occipitio gestatus fuerat, breui & spontè defuisse, cessante nimirum humorum motu à partibus inferioribus ad superiores, qui à cauterio continuò fouebatur, naturâ humores amandante ad illud emissarium, quorum portio ad oculos, tan-

quam partes vicinas, & à longo affectu debilitatas ferebatur.

Quæ à capite fit fluxio, vel à partibus interioribus ad oculos deferitur, per venas scilicet quæ sub cranio existunt; vel per partes externas, quod frequentius est; per venas scilicet & arterias, quæ à pericranio per frontem & tempora ad coniunctiuam deferuntur.

Diagnosis ophthalmiæ facillima est, quandoquidem sanguis in coniunctiuam effusus oculis obicitur. Et si rubor sine tumore appareat, atque ab externa causa genitus fuerit, *τάρσις*; seu conturbatio dicetur. Si verò præter ruborem, tumor & calor cum lachrymis adfuerit, vera erit ophthalmia. Ac tandem, si adedò ingrauescat, ut nigrum oculi occupet, & palpebræ inuertantur, *χρημασις* erit appellanda.

Signa causarum inde repetenda erunt: quod si fiat à plethora & sanguine proprie dicto, non solum in adnata tunica, sed etiam in tota facie rubor apparebit, tum etiam venarum latitudo, sensuum grauitas, & totius corporis, ac tumor erit insignis.

Si à sanguine bilioso oriatur, aderit lachrymarum acrimonia, ut non solum oculorum anguli, sed etiam genæ ipsæ erodantur: dolor aderit pungitius & intolerabilis; tumor parvus cum rubore ad citrinitatem vergente; exercitationes immodicæ, insolatus, ita & acrium esus præcesserunt; temperamentum erit biliosum, ætas florens & tempus æstiuum.

Si fiat à pituita, aderit dolor grauius, calor exiguus, non intensa rubedo, dolor paruus, lachrymæ non acutæ, sed cum multa lippitudine & viscositate.

Si fiat à melancholia, tumor erit exiguus, rubor ad fuscum vergens, lachrymæ paucae, pauca viscositas, sed densa; temperamentum melancholicum, & alia melancholiam indicantia.

Si ab interioribus capitis partibus fluxio oriatur, dolor capitis apparet, isque magis internus, & ad radices oculorum peruenit. Si verò per vasa exteriora fluxio in oculos irruat, dolor capitis magis externus est, frontis venæ distenduntur, & pulsatio in temporibus persentitur.

Prognosis respicit ophthalmiam imminuentem, vel præsentem.

Imminens lippitudo cognoscitur ex eo, quòd pruritus quidam aut puncturæ in oculis cum calore percipiuntur: Illiusque præfagium auget dispositio oculorum ad fluxiones recipiendas; sic qui oculos prominentes habent, huic affectui sunt magis dispositi. Malo etiam huic generando maximè conducit constitutio temporum, quemadmodum docet Hip. Aph. 11. sect. 3. *Si hyems fuerit sicca & aquilonia, verò verò pluuio- sum & australe, æstate lippitudines fieri consueuerant, præcipuè in mulieribus, & viris naturâ humidiori- bus.*

Alui fluxus ophthalmiæ superueniens, bonus, ex eodem Hip. Aph. 17. sect. 6. quia humorum abundantia euacuatur, & ad inferiora retrahitur.

Dolor oculorum valdè diuturnus malus est; causæ enim contumaciam arguit, & periculum est, ne suppuratio aut exulceratio succedat.

Ophthalmia in vno oculo incipiens, ad alterum vt plurimum transire consuevit.

Ad ophthalmiæ curationem causæ externæ primùm submouendæ sunt, tum antecedens euacuanda, reuel- lenda ac repellenda; coniuncta deriuanda ac discutien- da, & pars affecta roboranda. Quibus adimplendis in- dicationibus tria medica instrumenta de more aptanda sunt.

Victus itaque sit refrigerans & humectans, ex ali-

mentis euchymis, elixis potius quàm assis, sordibilibus potius quàm solidis, quia mandendo oculi exagitantur. Viter acria, salsa & piperata; tum etiam vaporosa, quæ caput replent; tum quæ in bilem faciliè conuertuntur, vt lac, saccharum, mel & omnia dulcia. Vinum in principio non conuenit, cuius loco ptisana ex hordeo & liquiritia, aut alia refrigerans vsurpanda est.

Somnus valdè vtilis est, quia oculus quiescit à motu, qui dolorem & fluxionem irritat, tum somno dolor sedatur, & materia morbifica concoquitur; æger dormiat eleuato capite, & in latus magis sanum.

Motus omnis corporis vitandus est, & quies imperanda; quæ tantopere vtilis est, vt Celsus primo die à sermone quoque astinere iubeat, ne motu illo materia ad caput attrahatur.

Aluius fluida seruanda est, lippientem enim (ait Hipp.) alui profluuiο corripi, bonum.

Vitentur animi pathemata, & præ cæteris ira.

Aër sit temperatus ac purus, expers fumi, pulueris & ventorum; obscurior etiam & tenebriosior: lux enim fluxiones commouet, spiritus agitando. Linteolum nigrum, viride, aut cæruleum oculo obducatur, habeatque æger non solum oculum ægrum, sed etiam sanum clausum, vel tectum, quia sanus oculus, dum ad obiecta mouetur, ægrum etiam commouet, vnde doloris incrementum. Et hæc ratio est, cur vno oculo tantum inflammato, maiores fiant dolores, quàm vtroque affecto.

Victus ratione hoc modo institutâ, Taraxis curatio primùm exponenda est. Et cum ea à causis externis plerumque oriatur, illæ statim submouendæ sunt, ne morbum foueant, & in ophthalmiam conuertant. Mox collyrium paretur, ex aqua rosarum, plantaginis, albumine oui, & lacte muliebri, idque instilletur in oculum.



pluries in die , tum pannus lineus in eo malefactus applicetur. Eodem tempore æger somno indulgeat quantum poterit ; plurimum enim valet somnus ad materiam morbosam concoquendam & discutiendam. Si his non sedetur affectus , ad veræ ophthalmiæ remedia confugiendum est , quæ hac serie vsurpanda sunt.

Statim ab initio morbi vena secanda est , præmissis clystere ; eaque è directo partis affectæ aperienda, sæpèque iteranda phlebotomia , donec sufficiens euacuatio , & reuulsio facta fuerit : docetque Auicenna in vera ophthalmia sanguinem mittendum esse vsque ad lipothymiam. Galen. verò *lib. de curatione per sanguin. miss. cap. 17.* refert historiam cuiusdam ceconomi , qui à gravissima ophthalmia liberatus est , sanguine detracto , primum ad lb. iij. deinde verò post quatuor horas ad lb. j. & *cap. 16. eiusdem libri* , testatur ophthalmias sæpè sola phlebotomia intra vnam horam fuisse curatas ; quod non potuit contingere , nisi magna sanguinis copia detracta fuerit, quemadmodum eo tempore passim fieri consueuerat. Moderanda tamen est ista sanguinis missio , iuxta temperamenti , ætatis , sexus , virium , & speciei ophthalmiæ rationem. Maior enim quantitas sanguinis detrahenda est in ophthalmia , quæ sit à sanguine , & in corpore plethorico ; minor verò in ophthalmia biliosa, melancholica , aut pituitosa , & aliis circumstantiis magnam sanguinis detractionem dehortantibus. Si sanguis in toto corpore redundet , primum basilica , vel mediana aperienda est , postea vero cephalica. Si verò minori copiâ sanguis mittendus esse videatur , statim cephalica erit aperienda.

In iis autem , quibus aliqua sanguis euacuatio consueta suppressa est, per menses, aut hæmorrhoidas, venæ

inferiores aperiendæ sunt, aut hirudines hæmorrhoidibus affigendæ.

Postquam verò sufficiens sanguinis copia per venæ sectionem detracta est, vterius molienda reuulsio per cucurbitulas scapulis & dorso affixas, tum siccas, tum scarificatas.

Ad eandem reuulsionem non parum etiam conferent frictiones & ligaturæ in partibus inferioribus celebratæ.

Reuulsionibus prædictis derivationes quoque adiungendæ sunt, quæ fiunt per apertionem venarum frontis & temporum, quibus addunt nonnulli apertiones venarum, quæ sunt in angulo oculi. Alij hirudines temporibus admouent; alij ponè aures. Quæ omnia derivationum genera post sufficientes euacuationes vtilissima sunt.

Galenus 13. *meth. cap. 22.* arteriotomiam laudat in arteriis temporum celebratam, quando ophthalmia sit à sanguine valdè calido & feruenti. Et quamvis hoc remedij genus nostris temporibus ferè obsoletum sit, præstantissimum tamen atque vtilissimum est, omnis experti periculi. Solâ enim ligaturâ impeditur sanguinis arteriosi effluxus in minoribus illis arteriis. Neque necessarium est emplastrum à Galeno propositum *loco citato*, ex bolo armeno, thûre, mastiche & pilis leporinis, cum albumine oui compositum, quod tamen ad maiorem cautelam, qui hanc arteriam apertionem reformidant, in vsum reuocare poterunt. Quæ de hac arteriarum apertione à nobis sunt dicta, in doloris capitis curatione videri poterunt.

Vesicatoria quoque in hoc affectu vtilissima sunt, tum posteriori parti ceruicis, tum ponè aures admota.

Sanguine sufficienter detracto, purgatio etiam celebranda est, vt biliosi humores, præterum qui sanguine, feruorem

feruorem & impetum conciliant, euacuetur. Eam autem maximè conuenire docuit Hip. *Aphor.* 17. *sect.* 6. vbi ait, *Lippientem alui profluuio corripì, bonum.* Galenus 13. *meth. cap.* 11. *Ex iis*, inquit, *quibus oculi tentari phlegmone cæperant, nonnullos solatione per aluum uno die sanatos vidimus.* Debet autem fieri purgatio ex medicamentis blandioribus, ac sanguinis feruorem cohibentibus vitatis diagrydiatis quæ in sequentem aut consimilem formulam reduci poterunt.

℞. Thamarindor. ʒ. β. senæ mund. ʒ. iij. semin. anisi ʒ. β. folior. endiu. cichor. fumar. ana M. β. Coquantur ad ʒ. iij. In colatura infunde rhabar. electi & mirobalanor. citrin. oleo amygdalar. dulcium confricatarum ana ʒ. j. fantali citrini ʒ. β. In expressione dissolue mannæ syrupi rosac. ana ʒ. j. M. Fiat potio. Vel in forma boli.

℞. Cassiæ recenter extractæ ʒ. vj. cathol. dupl. ʒ. iij. rhabarb. puluerati ʒ. j. Cum saccharo fiat bolus.

In ophthalmia pituitosa pilulæ non rarò præscribuntur, nempe lucis maiores, de agarico, & aliæ huiusmodi: quæ quidem, licet in statu morbi commodissimæ sint, satius tamen est in principio ab iis abstinere, ne vehementi medicamento humores commoti magis in partem irruant.

Neque vnica purgatio sufficit, sed ea per interualla repetenda, si morbus in longitudinem abeat; præmissis præparationibus conuenientibus per apozemata, vel iulepos humori peccanti appropriatos. In primis verò ab initio morbi humorum feruor temperandus est iulepis refrigerantibus & incrassantibus, vel emulsionibus semin. quatuor frig. maior. lactucæ & papauer. albi in decocto refrigerante, additâ aquâ rosaceâ.

Præmissis vniuersalibus euacuationibus & reuulsionibus, ad topica veniendum est, quæ quidem ab ini-

tio repellentia esse debent. Monent tamen saniores Practici, ne primis statim diebus collyria repellentia oculis admoucantur, quia plerumque humorem in oculos impetu irruentem in parte retinent, & dolorem atque inflammationem augent. Galenus enim *comment. Aph. 3. 1. sect. 6.* Ocularium quemdam reprehendit, qui hisce remediis ab initio inflammationis uti proposuerat. Suspecti enim esse ait ab initio, quod vehementes fluxiones non reprimant, sed ne excernantur prohibeant. Unde, si acres humores extiterint, corneam exulcerari accidit; si verò multi, distendi & irritari vehementer, & interdum disrumpi. Auicenna verò *sen. 3. lib. 3. tract. 1. cap. 9.* sic loquitur; *Et oportet quantum possibile est, ut retardetur in ophthalmia collyriorum administratio usque ad tres dies.* Et paulò post, *Oportet, inquit, ut in principio non adhibeantur inspissantia fortia & quae sint vehementer, styptica, quoniam inspissant tunicas, & prohibent resolutionem, & augent dolorem.* Non tamen ita exactè dierum numerus praefiniendus est, cum morborum tempora in quibusdam breuiora, in aliis longiora esse soleant. Utilliter tamen astringentia fronti & temporibus statim à principio admoueri poterunt; illis enim venæ, per quas humores defluunt ad oculos, comprimuntur, humorque influens repellitur. Horum formula talis esse poterit.

℞. Boli armenæ, sanguin. dracon. thuris, mastichæ, ana ʒ. j. rosar. rubr. balaustior. & farinæ lentium, ana ʒ. ij. Excipiantur albumine oui & aceto rosaceo. Fiat cataplasma, fronti & temporibus applicandum.

Ad fluxionem etiam cohibendam, plurimum valere creditur cataplasma ex succo vrticæ & farina tritici, fronti & temporibus applicatum; quandoquidem vrticæ succus specificâ vi omnem sanguinis fluxum cohi-

bet, & narium hæmorrhagiam iisdem partibus adnotus potenter sistit: tum ore sumptus eandem hæmorrhagiam, aliaque sanguinis profluvia efficaciter cohibet.

Interim tamen, si dolor valdè vrgeat, qui fluxionem ad oculos magis ac magis promouere consuevit, anodyna medicamenta ipsi oculo admouenda sunt; inter quæ lac recens, præsertim mulieris benè sanæ, primum locum obtinet, idque ex ipso vbere in oculos emulgendum & sæpè mutandum; citò enim acescit, sicque oculo infensus est. In eius locum suffici poterit cæcus ouillus recens, qui etiam sæpè mutandus est, ne butyrescat, sicque oculum inflammet.

Oui albumen diu agitatum, & in aquam conuersum, maximè commendatur à Galeno, quia dolorem lenit, & fluxionem leniter cohibet.

Pomum sub cineribus coctum dolorem oculorum etiam valdè temperat.

Mucilagines seminum psyllij, cydoniorum, scœnugr. extractæ cum aqua rosar. dolorem valdè leniunt. Illæ tamen biduo quoque renouandæ, quia diutius seruatæ, acorem contrahunt.

Ex his variæ formulæ in rem præsentem concinnari poterunt. V. g.

℞. Medullæ pomi dulcis sub cineribus cocti ℥. j. mucilagin. semin. psyllij & cydoniorum extractæ in aqua rosar. ana ℥. vj. liquoris albuminis oui recentis, & lactis mulieris ana ℥. j. Fiat cataplasma oculo applicandum. Vel

℞. Pulpæ pomi cocti ℥. j. micæ panis albiss. ℥. ss. ouum num. i. Cum lacte muliebri fiat cataplasma.

Laminæ carnis recentis, hædinæ, vitulinæ, aut veruecinæ oculis frequenter admotæ, dolorem potente demulcent.

Simplicius cataplasma parari potest ex medulla parvis, in lacte muliebri, & aqua rosarum macerata.

Si dolor vehementissimus sit atque intolerabilis, ad narcotica confugiendum est; quibus tamen parcè & cum religione utendum, quia spiritus visorios condensant, humores & tunicas incrassant, sicque visum hebetant. Inter narcotica ocularia primas tenent trochisci albi Rhasis cum opio, qui in hunc modum præscribi possunt:

℞. Aquæ rosar. ℥.ij. liquoris albuminis oui fortiter agitati ℥.j. trochiscor. alb. Rhasis cum opio ℥.j. Fiat collyrium in oculos instillandum.

Sedato aliquantulum dolore, ad repellentia veniendum est, quæ tamen mitiora esse debent, & iis anodyna quædam perpetuò adiniscenda; in hunc finem collyrium sequens præscribi solet.

℞. Acquir. Plantag. rosar. (vel ad magis repellendum peculi rosar. ana ℥.j. ℥. liquoris, albuminis oui ℥.j. trochisc. alb. Rhasis sine opio ℥.j. Fiat collyrium, in oculos frequenter instillandum.

Si dolor sit acerbior, possunt addi collyrio lac muliebri, & mucilagine prædictæ.

Remedium sequens inflammationem potenter sedat, & fluxionem cohibet.

℞. Albumen oui vnius. Agitetur cum frusto aluminis satis magno in patina stannea, & tamdiu moueatur, donec vnguenti consistentiam adeptum sit, quod extendatur supra linteam, & oculis tepidè applicetur. Post duas aut tres horas auferendum est remedium, ne longiori mora & astringendi vi satis insigni, quam ex alumine habet, humores in oculo retineat.

Aqua etiam aluminis destillata in alembico supra cineres, & oculo cum linteis cæ madidis admota, inflammationem efficaciter temperat.

Sal Saturni in aqua rosarum vel oxycrato dissolutum, vel cum pomata permixtum, oculorum inflammationes potenter extinguit.

In augmento morbi, digerentia cum repellentibus miscenda sunt; atque ita collyriis prædictis addi poterunt aquæ euphrasæ, fœniculi, chelidonis & mucilagine seminum lini, althææ, fœnugræci. Gal. 1; meth. decoctum fœnugræci præcipuè commendat, quod digerit, concoquit & modicè repellit. Debet autem fœnugræcum antequam decoquatur, vel ex eo mucilago extrahatur, excuti per cribrum, ut pulvis quo abundat auferatur, postmodum verò aquâ frequenter ablui. Collyrij formula talis esse poterit.

℞. Mucilagin. semin. fœnugr. & cydoniorum extractæ in aqua rosarum & euphras. ana ʒ. j. β. trochiscor. albor. Rhasis sine opio ʒ. j. tuthiæ præparatæ ʒ. β. Fiat collyrium.

Quando morbus ad statum magis vergit, sarcocolla etiam, collyriis additur, quæ paulò potentiùs digerit. Sed cum siccitate sua & acrimonia quadam oculos lædere possit, priùs lacte nutrienda est, macerando scilicet in lacte per dies aliquot, lacte frequenter mutato. Et parua illius quantitas vnâ vice præparanda est, diu enim asseruata acescit, & oculi infensa est. Illius vsus talis esse poterit.

℞. Florum chamomill. melil. rosar. rubr. ana P. j. semin. fœnugr. optimè mundati ʒ. j. Coquantur in aqua plantaginis. In colaturâ ʒ. iiij. dissolue sarcocollæ nutritæ ʒ. j. tuthiæ præparatæ & trochiscorum albor. Rhasis sine opio, ana ʒ. β. Fiat collyrium.

Aquæ etiam nonnullæ ab authoribus commendantur tanquam efficacissimæ.

Quercetanus in Pharmacopœia laudat infusionem croci metallorum in aqua euphrasæ & fœniculi, quæ

fatis efficax est, & nullo morfu oculum afficit, quemadmodum reliquæ ferè omnes.

Crollius & reliqui chymici miris laudibus efferunt sal Saturni in aqua rosarum dissolutum, cui etiam salis ammoniaci grana aliquot addunt. Huius formula talis esse poterit.

℞. Salis Saturni ꝑ. xij. salis ammoniaci gr. iij. aquæ rosar. ꝑ. iij. M. instillentur in oculum manè & serò.

Ex plumbo etiam calcinato, vel lythargyro, aut minio in aceto infuso paratur aqua, quæ cum panno lineo oculi admota, eorum inflammationibus citissime medetur.

In vulgari vsu habetur aqua ex vitriolo albo: in aqua rosar. aut plantag. dissoluto, quæ inflammationes temperat, discutit & fluxionem arcet. Eorum proportio talis est.

℞. Vitrioli albi ꝑ. j. aquæ rosar. vel plantag. ꝑ. iij. Vitriolum pulueratum in aqua ad ignem dissoluatur, Coletur aqua per linteum, & in oculos instilletur. Si acrimonia sua nimium eos vellicet, additione aquæ rosar. vel plantag. ad libitum temperabitur. Sequens minoris acrimoniæ particeps est, & magis resoluit.

℞. Radic. ireos Flor. & rosar. rubr. ana ꝑ. j. aquæ rosar. & plantaginis, ana ꝑ. iij. Bulliant lento igne ad tertias. Colaturæ adde vitrioli albi puluerati gr. viij. Fiat collyrium.

Vnguenta etiam quamplurima ad ophthalmiæ curationem vsurpari solent, ex quibus tria sequentia cætera longè superant, & mirabiles non rarò effectus producant. Primum describitur à Renodæo in Pharmacopœa, titulo vnguenti ophthalmici, in hunc modum.

℞. Boli armenæ in aqua rosar. lotæ ꝑ. j. lapidis calaminaris in aqua euphrasiæ abluti, tuthiæ præparatæ



ana 3. ij. margaritarum tenuissimè læuigatarum 3. β. camphoræ 3. β. opij gr. v. butyri q. f. Fiat vnguentum secundum artem, ad oculorum angulos, & palpebrarum oras adhibendum.

Secundum est Ioannis Cratonis, quod proponitur in consiliis Medicis à Laurentio Scholzio collectis, consilio 6. in hunc modum.

Accipiat butyrum, si haberi potest mense Maio factum, aut aliud recentissimum diligenter elotum, vel loco illius medulla bouina è cruribus, vel ceruina; atque huic admisceatur lapidis calaminaris in tenuissimum puluerem triti quantum excipere poterit. Fiat vnguentum.

Tertium habetur apud Penotum in denario, in hunc modum compositum.

℞. Tuthiæ præparatæ 3. j. β. camphoræ 3. j. viridis æris gr. xij. Tuthiam cum camphora simul contere in mortario, æs seorsim, omnia verò ad pulueris impalpabilis consistentiam. Tum ℞. Butyri recentis 3. j. aquæ rosar. 3. j. Bulliant leniter simul, & ab igne remotis. primum tuthiam cum camphora, deinde æris viride sensim immisce, agitato optimè, & in vase vitreo reconde. Fiat vnguentum, quod per sericum transcoletur. Inunge interiores palpebras, præsertim circa angulos & breuissimè sanabitur. Probatissimum est ad oculorum inflammationes tam materiales, quam siccas, & palpebrarum pruritus, & lachrymas singulare remedium.

Aliud vnguentum habetur magnæ efficacæ in cista medica, quod tamen acrimoniæ valdè particeps est, idcirco papebris tantum admouetur. Illius descriptio talis est. Cæteris omnibus nihil conferentibus hoc remedium profuit in rebelli ophthalmia. Quod fit ex succo nicotianæ & butyro maiali simul coctis

ad vnguenti consistentiam, quod clausis palpebris admoueatur, in loco obscuro, quamprimum patiens oculos aperit, statim mordicare incipit, & feliciter curat.

In statu resoluentia remedia repellentibus præualere debent. Ideò eadem remedia, quæ pro augmento descripta fuerunt, in statu etiam conueniunt, si resoluentium quantitas augeatur, repellentium verò minuatur. Præcipue verò vnguenta duo posteriora, non solum in statu sed etiam in ipsa declinatione, & vsque ad perfectam curationem vsurpari potuerunt.

Fotus in primis ad discutiendam materiam morbigicam, in statu idonei sunt, qui in hunc modum parari possunt.

℞. Florum chamomil. meliloti & rosar. ana P. j. femin. fœnugr. vt supra dictum est præparati, ʒ. ij. Fiat decoctio, quâ foueantur oculi cum pannis lineis tenuibus quadruplicatis. Hic fotus in fine augmenti, & principio status conueniet, & calidè applicabitur hyeme; æstate verò tepidè, aut subfrigidè.

In fine status & declinatione, magis resoluens fotus efficitur, si prædictis simplicibus addantur folia euphrasie, maioranæ, betonicæ, & tantillum vini albi.

Præstantissimum etiam, & paucis notum ad discutendas opthalmias remedium paratur ex oleo, seu liquore, qui ex lineis accensis, & inter duas patinas suffocatis elicitur; cuius liquoris gutta vna cum salua pueri permiscetur, & penæ apice oculis admouetur.

In declinatione non solum remedia prædicta, sed etiam collyria magis resoluentia vsurpari poterunt, in hunc modum.

℞. Thuris & aloës ana ʒ. ʒ. sarcocollæ nutritæ in lacte muliebri ʒ. j. ʒ. croci ʒ. ʒ. mucilagin. fœnugr. ʒ. ʒ.

aquæ fœniculi & euphrasæ, an. ʒ. j. β. Fiat collyrium.  
Vel si magis siccandum & simul dirigendum est.

℞. Sarcocollæ nutritæ ʒ. j. β. tithiæ præpar. ʒ. j.  
aloës ʒ. j. myrrhæ ʒ. β. mucilagin. sem. fœnugr. ʒ. β.  
aquar. verbenæ & chelidonix ana ʒ. j. β. Fiat colly-  
rium.

In fluxione pituitosa, potenter resoluentia non solum  
in declinatione, sed etiam in statu & augmento aduci  
všurpari possunt.

Præterea in declinatione, duo insignia remedia ab  
auctoribus proponuntur, nempe balneum & vini vsus:  
quæ primùm ab Hipp. tradita sunt *Aph. 31. sect. 6.* his  
verbis, *Dolores oculorum vini potio, aut balneum, aut  
fomentum, aut vena sectio, aut medicamentum epotum  
soluit.* Galenus in commentario huius *Aph.* distinguit  
casus & tempora, in quibus prædicta remedia conse-  
runt; quæ etiam à nobis exposita sunt, quoad ve-  
næsectionem; purgationem & fomentum spectat.  
Balneum verò docet Galenus *dicto loco, & cap. 22.  
lib. 13. meth.* tunc temporis conuenire, quando oph-  
thalmia sit ab humoribus acris, & corpus sufficien-  
ter per phlebotomiam & purgationem euacuatum est.  
Quandoquidem humorum acrimoniam temperat, eo-  
rumque motum atque fluxionem sistit, maxima eo-  
rum parte per insensilem transpiratum excretâ; &  
quod superest humoris biliosi contemperatum, facilius  
vincitur à natura. Conuenit etiam balneum ex Gale-  
no in ophthalmia pituitosa, præmissis perpetuò eua-  
cuationibus ideonis, quandoquidem humores crassi  
oculis impacti per balneum attenuantur, sicque faciliè  
discutiuntur.

Vni autem meracioris potio, ex eodem Galeno  
*com. prædicto*, utilis est, quibus sanguinis copia  
crassioris in oculorum venulis continetur, sine ple-

thorica in toto corpore dispositione, quia sanguinem illum crassiores liquat, fundit ac discutit, tum etiam obstructions aperit.

Ad ruboris & inflammationis reliquias auferendas, fons sequens parari poterit.

℞. Folior. euphras pulegij, ana M.j. flor. chamomil, meliloti, rosar. rubr. & palear. auenar., ana P.j. semin. fœnugr. 3. iij. semin. fœniculi 3. j. Fiat decoctio, addendo sub finem parum vini albi, qua foueantur oculi, cum pannis lineis, vel sacculis prædictis simplicibus semipenis.

Aqua fœniculi sola cum vino astringente permixta vtiliter admouetur pro fove, ad reliquia discutiendas, & oculum roborandum.

Ouum ad duritiem coctum detractâ testâ, & per medium sectum, calidè oculo admotum, ruboris reliquias absorbit.

Fons ex decocto hyssopi soli ruboris reliquias etiam efficaciter discutit.

Ophthalmia inueterata, & quæ per multos sæpè annos perseverat, diuersam aliquantulum, & longiorem curandi rationem postulat, & illa non rarò magnum Medico curanti facessit negotium, cum difficillime impedire possit, quo minùs pars nobilissima & delicatissima, à longo tempore debilitata fluxionem recipiat. Adde quòd non solum per fluxionem fouetur hic affectus, sed etiam sæpè numero per congestionem, ex intemperie in parte contracta, quæ difficillime corrigi potest.

Ad illius curationem primò aduertendum est, num à calidiori hepatis intemperie, quod non rarò fit, affectus iste foueatur; & tunc remedia calidam illam intemperiem corrigentia primùm administranda sunt. Et in primis post phlebotomia & purgationes conue-

nientes, maximè conferunt balnea, serum lactis, & aquæ minerales vitriolata, tum etiam hirudines hæmorrhoidibus affixæ.

Si verò ophthalmiæ materia à sola cerebri intemperie oriatur, cuius ratione humores pituitosi ad oculos defluant, cum aliqua sanguinis portione permisti: tunc temporis cerebri expurgationi incumbendum est per pilulas vsuales, ( post euacuationes vniuersales, per apozemata, aut alia huiusmodi remedia, ) bis, ter, aut quater, in mense vsurpatas, quæ similes esse poterunt iis, quæ pro frigida cerebri intemperie præscriptæ sunt.

Si purgationes prædictæ cum aliis remediis infrà descriptis, ad curationem non sufficiant; ad purgationes mercuriales per intervalla repetitas, tanquam ad sacram anchoram confugiendum est.

Tum etiam, ad humoris influentis diuersionem, cauterium occipitio admotum erit vtilissimum. Cuius loco setaceum posteriori ceruici infixum multò feliciùs operabitur, in iis qui hoc remedij genus ferre poterunt. Vesicatorium sincipiti admotum mirificè profuit in vetula quadam lippitudine contumaci laborante vt refert Forestus *obs. 11. lib. 11.*

Rondeletius verò cauterium futuræ cotonali affixum magis prodesse asserit, quàm in aliis partibus.

Masticatoria etiam ad fluxionis deriuationem proficua futura sunt, minimè verò errhina, quæ propter partium viciniam, humores ad partem affectam attrahere possunt.

Si autem cerebrum maiori exsiccatione indigere videatur, ad diætam sudorificam confugiendum est, ex china, salsa parilla, & aliis etiam sudorificis confectam.

His accedent topica resoluentia & oculos roborantia, qualia sunt in primis fofus & vnguenta, pro statu & declinatione ophthalmiæ suprà proposita; quæ

etiam inueteratas ophthalmias discutere plurimum valent.

Neque omittenda est ablutio oculorum supra memorata, ex aqua fœniculi & vino rubro, ad ruboris reliquias discutendas, & oculos robotandos, quæ singulis diebus manè iteranda est. Ad huiusmodi etiam ophthalmias inueteratas aqua sequens magnæ est efficaciz.

℞. Aloës opt. & tuthiz præparatæ, ana ʒ. vj. sacchari albissimi ʒ. j. aquæ rosar. & vini albi non acidi, an. ʒ. vj. Infundantur in ampulla vitrea benè clausa ad solem per 40. dies. Huius aquæ non colatæ instillentur guttæ aliquot in oculum.

Vel ℞. vini albi lb. iij. aquæ ros. lb. β. tuthiz præparat. ʒ. iij. garyophyl. puluer. ʒ. j. camphoræ ʒ. β. Misceantur omnia in vase vitreo benè clauso, & agitentur per duas horas, ac soli exponantur per mensem integrum, ea cautione vt singulis diebus ante solis occasum ab aëre remoueantur, nec illi vnquam, nisi à sole illuminato, exponantur. Huius aquæ per filtrum traiectæ guttæ duæ, vel tres in oculum instillentur horâ somni, vel etiam horâ vnâ aut alterâ ante exitum è lecto vel cubiculo. Ruborem oculorum etiam inueteratum tollit; lachrymantes oculos, & fistulosos siccatur; omnem superfluam humiditatem citra membranas extetiores absorbit; visum acuit.

Sequens etiam præstantissima est. ℞. Tritici M. ij. salis triti M. j. Ponantur in vase cupreo, & affundatur vinum album, vt materiæ supernatet altitudine duorum digitorum transuersorum. Tegatur vas, & simul stent in umbra per 6. aut 7. dies, donec liquor colorem viridem acquirere incipiat, mouendo pluries in die cum spatula lignea. Liquor tandem effundatur per inclinationem, & coletur, si opus fuerit, per chartam emporeticam. Eius

gutta vna instilletur in oculum. Ruborem discutit, fluxionem arcet, oculos abstergit à maculis omnibusque sordibus, & visum acuit.

Solenander plurimum laudat decoctum foliorum citoniorum, quæ primo vere integra & illæsa colligenda sunt, & diligenter asseruanda, ne sita, puluere aliisque inquinamentis oblædantur, & vsus tempore, eorum manipulus incoquatur aquâ purissimâ, eâque sæpenu-merò oculi abluantur; Mirum, (inquit,) quàm oculos præseruant, ruborem discutunt, & influentem humorem arcent.

Aliquando cum ophthalmia pertinaci, sordes quamplurimæ, puris instar, in oculis colliguntur, quæ vix collyriis aliisque remediis curari possunt. Attamen hoc casu maxime confert gossipium optimæ carptum, aut digitis discreptum, & ad prunas diligenter exsiccatum, cuius paucâ quantitate instar plumaceoli oculi contegantur; fascia superinducta. Manè gossipium aufertur dictis sordibus imbutum: hocque remedio per plures noctes continuato, morbus curatur, qui aliis remediis non cesserat. Et præcipuè succedit in pueris & infantibus tali morbo laborantibus.

Pro huius capitis coronide, non erit abs re Zacuti Lusitani experimentum proponere, qui ophthalmiam desperatam, & omnibus remediis per annum integrum pertinaciter obstitentem, vnguento mercuriali curauit. Quamuis enim nulla luis venereæ apparerent indicia; Mercurialis admonitione persuasus, qui lib. de Morbo Gallico, Cum videris, inquit, morbum quempiam communibus remediis non curari, putato esse morbum Gallicum cognominatum; ægotantem interrogauit, num esset passus aliquando luem veneream, aut cum fœda obscœnâque fœmina concubuisset; omnia negauit, vnum solum confessus, se per noctem in lecto huius

contagiosi morbi suspitione non carente decubuisse. Hac solà fretus coniectura, diætã sudorificã ex decocto falsæ parillæ per viginti dies præscripsit, attamen citra fructuum; quamobrem, licet in superis partibus premeret affectio, vt timor esset, ne vacuato humore per os, mercurij vi, fluxio rueret in oculos, & ingrauesceret ampliùs affectus; tamen cùm esset diuturnus, & confluentis humoris impetus sedatus, vnguentum mercuriale corpore exquisitè purgato præscripsit, eoque admoto septem dierum curriculo, post copiosam sputi vacationem, dolores cessarunt; euasit inflammatio, mitigatus pruritus, qui antea percipiebatur in palpebris cum acrimonia multa: & sic relicto solo in brachio sinistro fonticulo, vt spiraret cerebrum, & seruatò victu, pristinam recuperauit sanitatem.

Idem Zacutus Lusitanus in praxi ad historias, ad ophthalmiam inueteratam, & admodum contumacem, valdè commendat aquam & vnguentum, quæ à nobis descripta sunt cap. de suffusione.

## C A P V T IX.

### *De Hypopyo, seu pure sub cornea.*

**O**culorum inflammationes, quando insignes sunt, & in magnam tumorem eleuatæ, aliquando per resolutionem terminari nequeunt; sed in suppurationem abeunt, quod maximè metuendum est, & omni ratione auertendum: inde enim vlcera succedunt, & aliquando pus sub cornea colligitur, qui affectus *ὕπὸ τοῦ κ* dicitur. Contusionibus etiam oculorum non rarò succedit, & suggillationibus inde ortis. Interdum



totam pupillam contegit, & visionem impedit. Interdum verò iridis circuitum amplectitur, & vnguis reſecti figuram reſert, eaque ratione *στυξ*, ſeu vnguis nominatur.

Cognoſcitur hic affectus non ſolùm ex colore albicante puris naturam referente, ſed etiam ex præcedente inflammatione, aut ſuggillatione. Commoto etiam oculo, pus ſub cornea commoueri videtur: adeſt color rubeus in oculo; & dolor pulſans, aut ſaltem præceſſit.

Ad curationem, præmiſſis vniuerſalibus remediis, ſi inflammationis reliquiæ ſuperſint, auferendæ ſunt remediis in ophthalmia deſcriptis. Poſtmodùm leuiter diſcutientia admouenda ſunt emollientibus permiſta, ne tenuiori parte reſolutâ, craſſior materia fiat, & reſolutioni minimè idonea. Fiant igitur fomenta ex decocto ſorum chamomil. meliloti, ſemin. pſyllij, & ſcœnugr. cum pannis lineis, vel ſacculis applicanda. In progreſſu verò addi poterunt decocto folia euphrat. chelidon. & ſemin. ſcœniculi: vel ſequens collyrium uſurpari poterit.

℞. Aquar. verbenæ, rutæ, chelidon. roſar. & ſcœniculi, ana ʒ.ß. aloës opt. tuthiæ præparatæ, ana ʒ.ß. ſacchari candi ʒ.j. Pulueriſentur & miſceantur, addendo lactis muliebris tantillum; & fiat collyrium; de quo bis terve in die guttæ aliquot oculis inſtillantur.

Sequens erit valdè efficaciſ.

℞. Croci, aloës, myrrhæ, ana ʒ.j. vini ʒ.iiij. mellis ʒ.vj. Diſſoluatur crocus in vino. Deinde cum aloë & myrrhæ miſceantur. Tandem mel addatur. Hoc remedio oculi illinantur.

Denique ea remedia, quæ in declinatione ophthalmiæ, in oculorum maculis, & ſuffuſione præſcripta ſunt, hîc etiam conueniunt.

Si resoluentibus medicamentis materia discuti nequeat, ad alia remedia confugiendum est. Gal. 14. meth. refert, Ocularium quemdam sui temporis Medicum, cui Iustus nomen erat, concussione capitis multos hypopos sanauisse. Collocans enim eos in sella rectos, ac capita eorum vtrinque à lateribus apprehendens, mox quaticbat, adeò vt manifestè descendere pus ipsi videretur.

Si neque hac ratione pus visum impediens dimoueri valeat, Galenus loco citato ad chirurgiam confugit, quem sequitur Aërius & alij quamplurimi, quæ oculi punctione perficitur, qualis in suffusione fieri consuevit. Quæ quidem operatio vt parum nostris temporibus visitata est, sic peritissimi chirurgi manum desiderat, & verendum maximè est, ne apertâ corneâ, cum pure humor aqueus effluat.

## C A P V T X.

### De Phlyctenis.

**I**N cornea & adnata tunica, quemadmodum in reliquis corporis partibus, generari solent vesicæ parvæ, aqua repletæ, bullis seu vesiculis similes, quæ à combustionē aquæ feruentis excitantur, *φλύκταινας* Græcis, Arabibus *Bothor* nominantur: suntque tumores quidam parui instar granorum milij, ab acri quodam aut seroso humore oriundi.

Harum pustularum cognitio facillima est, cum sensibus pateant. Quæ in adnata oriuntur, rubrum colorem referunt: quæ autem in cornea, subnigrum, si in illius superficie consistant; album verò, si in parte corneæ profundiore sitæ sint.

Quod

Quod ad prognosim spectat, phlyctænæ in adnata minùs periculosæ sunt, quàm in cornea. Superficialiæ pustulæ, minùs periculosæ, profundiores verò magis: metuendum enim est, ne tota corneæ densitas erodatur, & vel humor aqueus effluat, vel vucæ procidentia contingat.

Curatio in materiæ coniunctæ resolutione tota versatur, & causæ antecedentis auersione. Et omni modo pustularum suppuratio prohibenda est, quæ in vlcus degenerat.

Vniuersales igitur euacuationes, reuulsiones, ac deriuationes, quæ in ophthalmiæ curatione propositæ fuerunt, hîc etiam celebrandæ sunt.

Postmodum topica administranda, quæ leuiter repellant in principio, tum etiam discutiant; qualia in ophthalmiæ augmento proposita sunt, quæ magis conuenient, quando inflammatio pustulas comitatur, quod plerumque fieri consuevit.

In progressu verò, magis exsiccantia & resoluentia erunt vsurpanda, qualia in statu & declinatione ophthalmiæ descripta sunt: ac præsertim vnguenta ibidem proposita, quæ pustulis illis discutiendis & exsiccandis aptissima sint.

---

## C A P V T X I.

### *De cornea & adnata vlceribus.*

**O**phthalmiæ succedere solent vlcera in cornea tunica & adnata, quando in suppurationem versa est. Succedunt etiam phlyctænis, seu pustulis, in cornea oriundis, iisque disruptis. Fieri etiam solent ab hu-

moribus acerbis & erodentibus in oculos confluentibus.

Variae eorum differentiae ab auctoribus proponuntur, ex variis circumstantiis desumptae: prout scilicet vel superficialia sunt, vel profunda; lata, vel angusta; varias figuras habentia, & alia huiusmodi. Sic vlcus cauum, angustum, & durum *βόθρον*, i. fossula nominatur. Latum & minus profundum *κοίλωμα* dicitur. Quod in iridis circulo situm est, *ὑγρῖμον* appellatur, & à nonnullis *vicus coronale*. Quod denique profundum, solidius, asperum, & quasi crustosum est, *ὀγκυμα* & *ἑγκυμα* vocatur.

Cognitio ulcerum non est difficilis, cum per se oculis pateant. Si vlcus sit in cornea, vlcusculum album apparet in nigro oculi; si tunica adnata, punctum veluti rubicundum in albo oculi conspicitur, ob illius tunicae venas sanguine refertas.

Vlcera oculorum curatu difficilia & periculosa sunt, multò magis tamen in cornea, quàm in adnata. Vlcus quod è regione pupillae situm est, magis periculosum; quia in eo sanato relinquitur cicatrix, quae corneae diaphaneitatem aufert, sicque visionem laedit; & si tota tunica erodatur, fit effluxus humoris aquei, & vuae proidentia.

Curatio huius affectus, quemadmodum & reliquorum ulcerum, detergentibus & exsiccantibus perficitur, quae tamen mitissima esse debent, propter partis molliem, & exquisitum sensum. Praemittenda tamen ea, quae fluxionem ab oculis reuellunt, eamque reprimunt; qualia in ophthalmia, tum recenti, tum antiqua fuere proposita. Et si inflammatio vlceri coniuncta sit, remedia illam respicientia cum praedictis erunt permiscenda. Quibus etiam dolorem lenientia addere conueniet, quoties ille partem infestauerit.

Detergentia & exsiccantia moderata sunt, saccharum, mel, crocus, myrrha, thus aloë, sarcocolla, tuthia, & cerussa, ex quibus formulæ sequente componi poterunt.

℞. Decocti hordei & fœnugr. ℥. iv. mellis optimi ℥. 6. vel syrupi de rosis sic. ℥. j. Fiat collyrium, quo oculi sæpè abluantur. Vel

℞. Aquar. verberæ, & plantag. ana ℥. ij. sacchari candi ℥. 6. Misce pro collyrio. Vel

℞. Aquæ mellis in B.M. destillatæ, & aquæ rosar. ana partes æquales. Vel

℞. Ouum coctione induratum & à putamine mundatum. Diuidatur in duas partes, & detracto vitello repleatur fouea saccharo cando puluerato. Optimè ligetur & ponatur in cella vinaria. Extillabit liquor, qui detergendis vlceribus sine morfu valdè idoneus est. Et si potentius remedium desideres, myrrha puluerata cum saccharo cando admiscenda est.

Montanus puluerem sequentem valdè commendat.

℞. Albumina ouorum recentium num. xx. Ponantur in vase stanneo ad solem, donec exsiccentur, postea puluerentur subtilissimè cum æquali pondere sacchari, & pulvis inimitatur in oculos, qui sine erosionem plurimum adiuuat.

In progressu morbi si potentiùs detergendum sit & exsiccandum, adde collyriis prædictis trochiscos albos Rhasis, thus, aloës, myrrham, sarcocollam & alia huiusmodi, in parua tamen dosi, ne oculos exasperent, & iis etiam lac, albumen oui, mucilagines, aliaque anodyna addi poterunt.

Tuthia præ cæteris valet, quia minime dolorifica est, & sine morfu siccatur, ac cicatricem inducit, ideò collyria & vnguenta ex ea parata vtilissima sunt. Et præ cæteris vnguentum in ophthalmiæ curatione descriptum,

quod magnam tuthiæ quantitatem recipit, erit vtilissimum.

Collyrij valdè detergentis & exsiccantis, ac cicatricem inducentis formula talis esse poterit.

℞. Sarcocollæ nutritæ in aqua rosar. cerussæ & aloës lotæ, myrrhæ, tuthiæ præparatæ, ana ʒ. ss. sacchari candi ʒ. j. cum mucilagine gummi tragacanthi extractâ in aqua rosar. Fiat collyrium, quo palpebræ illinantur.

## CAPVT XII.

### *De cornea cancro.*

**V**T singulis corporis partibus cancer solet accidere, sic etiam in oculis aliquando contingit. Et cum ea quæ communem canceri theoriam & praxim respiciunt, è morborum externorum tractatibus desumenda sint; nos hic tantum ea, quæ ad oculum peculiariter tali morbo affectum pertinent, paucis attingemus.

Cancer vel occultus est, vel ulceratus. Occultus ad tumorum genera refertur, & in oculo tumor cancriformis, seu cancer oculi nōminatur. Vulceratus verò, vlcus cancriformis oculi dicitur.

In utroque tamen adest durities inæqualis & renitentia, color plumbeus & liuescens, dolor intensus & pungitius, caput & tempora præsertim occupans; venæ lividæ & varicosæ in tumore, & partibus vicinis apparent. Sanguis acerrimus & adustus à parte affecta non raro effluit, quando cancer ulceratus est. Ac denique à medicamentis tantillum calefacientibus dolor admodum exasperatur.

Incurabilis est affectus, in oculo quemadmodum in reliquis corporis partibus, quando iam radices egit; nisi operatione chirurgicâ radicatus extirpetur.

Curatio duplex ab auctoribus proponitur, vera scilicet, & palliativa. Vera, ut dictum est, in cancro iam genito, & parti valdè radicato, non potest obtineri nisi chirurgiâ. Recens tamen cancer ac ferè incipiens, curari potest frequentibus euacuationibus humoris atrabilarij, præmissâ venæ sectione conuenienti, ut docet Gal. 2. ad Glauconem cap. 10. vbi gloriatur se hunc morbum per initia sæpe sanasse adiungendo remediis prædictis optimam victus rationem.

Curatio palliativa, quæ ad symptomatum mitigationem dirigitur, non solum per dictas euacuationes, sed etiam topica conuenientia perficitur.

Primum igitur victus ratio refrigerans & humectans, qualis humori atrabilario debetur, instituenda est.

Postea sanguis detrahatur è directo oculi affectu, hircudines ponè autem eiusdem lateris applicentur: tum etiam hæmorrhoidibus, si aliquantum tumeant. Cucurbitulæ scapulis admoveantur, & reliqua reuulsionum genera celebrentur.

Purgationes & præparationes humoris atrabilarij, fient per potionem, apozemata, iuscula medicata, syrupos magistrales, & alia huiusmodi. Sed præ cæteris multum confert ad humorem atrabilarium euacuandum, helleborus niger ritè præparatus: cuiusque extracto bis aut ter exhibito, cancer incipiens aliquando à nobis sanatus est.

Hæc remedia humoris affluxum ad oculos, dolores & reliqua symptomata vehementia valde imminuunt. Ad id tamen non parum etiam conferunt topica remedia; qualia sunt in ophthalmia, ad dolorem leniendum descripta sunt; præcipue autem collyria eo mucilagin

bus, trochiscis albis Rhafis, & ruthia præparata, cum aqua rosarum, solani & plantaginis.

Aqua sequens pro collyrio & oculi ablutione erit præstantissima.

℞. Radic. scrophulariæ mai. & geranij Robertiani, ana M.ij. arnoglossæ; solani, borragin. buglos. portul. euphras. beton. ana M. j. ranarum viridium & albuminum ouorum ana num. vij. sem. fœnugr. & cydonior. ana ℥. j. radices & semina contundantur, & folia incidantur. Deinde affunde aquæ rosar. & euphras. ana lb. j. Misceantur omnia & distillantur in alembico plumbeo.

Pullorum caro ad doloris sedationem plurimum potest, & morbum ipsum aliquando hoc solo remedio curatum fuisse à nonnullis creditur. Sic Maritus Cordæus, *comment. 7. in lib. 1. Hipp. de morbis mulierum.* refert historiam nobilis cuiusdam fœminæ, cui tota pars dextra faciei cancro, eoque ulceroso obcessa fuit diutissimè, quæ cum variis auxiliis, à Medicis Italis, Gallis, Germanis, Hispanis, petitis vsa esset, tandem vulgari hoc barbitonforis remedio sanata est. Pullos gallinaeos in partes tenues & latas concidebat, quas sæpiusculè commutando interdiu admouent parti affectæ. Alij admouent carnes pullorum columbinorum, sectas & adhuc tepidas.

Denique curatio vera canceri confirmati, sola extirpatione obtineri potest, quæ fit omnimodâ oculi extractione: quàm tutò & salutariter fieri posse docet Fabricius Hildanus, & extractionis modum, omnesque illius circumstantias fusissimè describit *obs. 1. cern. 1. v. c.* ea hîc frustra repetere non opus sit.



## CAP V T XIII.

*De ruptura Corneæ.*

**C**ornea tunica tantam aliquando patitur continui solutionem, vt humor aqueus, interdum tunica vtea egrediatur, & illa solutio ruptura corneæ ab auctoribus nominatur.

Huius causa est vlcus, aut vulnus illius membranæ, aut magnus humorem affluxus, à quo dicta membrana ista distenditur, vt media crepet, & contenti humores effundantur: vt in muliere quadam Parisiensi contigisse, refert Paræus lib. 16. cap. 13.

Incurabilis est plerumque hæc affectio, & visus priuationem relinquit, quandoquidem humores oculi effusi regenerari nequeunt. Si tamen vulnus sit exiguum, ex quo portio tantùm humoris aquei effluat, curationem suscipere potest: quandoquidem aqueus humor interdum regenerari potest, vt docuit Gal. 4. de sympt. caus. cap. 2.

Curatio huius affectus glutinantibus remediis tentanda est. Et præmissis vniuersalibus euacuationibus venæ sectione scilicet, & purgatione, si eæ necessariæ sint, astringentia, & glutinantia oculo admoucantur, & in oculum instilletur albumen oui, cui trochisci albi Rhafis admisceantur.

Eadem pars foueatur decocto rosar. rubr. fol. polyg. ni, rubi, bursæ pastoris, & plantag. in vino astringente parato, si non adsit inflammatio, alioqui in aqua simplici. Vel

℞. Carnis cydonior lb. β. rosar. rubr. P. iij. acacie 3. ij. croci 3. j. decoquantur in vino astringenter & fiat

fiat cataplasma parti applicandum.

Ad integram consolidationem sequens collyrium adhibeatur.

℞. Aloës lotæ, tuthiæ præparatæ, & sarcocollæ nutritæ in lacte muliebri, ana ℥.ss. croci gr.v. cum mucilagine gummi tragacanthi, fiat collyrium.

## C A P V T XIV.

### *De vueæ procidentia.*

**V**ueæ procidentia cornæ rupturæ non raro succedere consuevit, quæ Græcis, πρόπτωσης ῥα; οὐδ' ἔς nominatur. Quatuor illius differentiæ ab autoribus, & præsertim Paulo, proponuntur, quatum prima μυοκέφαλον dicitur, quodd foramam capitis muscæ habeat; & contingit, quando exigua portio vueæ egreditur. Secunda σφυλωμα dicitur; & fit, quando maior portio vueæ excidit, ut acini vueæ figuram repræsentet. Tertia verò μῆλον nominatur, quando maxima est vueæ eruptio; ut ad pomi magnitudinem accedat. Quarta denique ἥλθ, id est, clauus dicitur, quando vueæ procidentia inueterata est & callosa reddita.

Curatior huius affectus difficillima est, & eò difficilior, quò maior est vueæ procidentia: si verò minor sit, ut in myocephalo, curationem admittit; quæ astringentibus moderatis perficitur, qualia in cornæ ruptura supra fauere proposita.

Antiqui, ut Paulus, Aëtius, & Celsus, procidentias inueteratas, quæ medicamentis non cedunt, chirurgiâ perficere tentant, quæ tamen nostris temporibus obsoleta est, propter summam illius difficultatem, & ancipitem euentum. Si quis tamen eam tentare cupierit,

exactè descriptam inueniet apud Hieron. Fabric. ab  
Aquapend. cap. de *staphylomate*.

## C A P V T XV.

### *De Aegylope & fistula lachrymali.*

**H**Actenus affectus oculorum, qui in humoribus, & tunicis eorum contingunt, expositi sunt. Superest iam, vt angulorum & palpebrarum morbi explicantur.

Ac primùm sese offert tumor inter maiorem angulum & nasi radicem apparens, qui *ægylops* & *anchylops* nominatur. *Anchylops* quidem, si nondum sit ruptus, *ægylops* verò, postquam ruptus est.

Tumor iste, seu potius tuberculum, duplici modo se habet, cum inflammatione scilicet, vel sine ea.

Quando inflammationem habet comitem, est veluti phlegmone parua furunculo similis, rubore in ambitu perfusus, cum dolore lancinante; Fitque à sanguine tenui & bilioso, per temporum frontis, faciei que venas in partem delato. Vnde in abscessum plerumque degenerat, qui apertus vlcus producit, quod sinuosum breui efficitur, vnde fistula lachrymalis nominari consuevit. Si autem fistula per annum perseueret, cariem in osse producere consuevit, iuxta Aph. Hipp. 45. *sect. 9. In ulceribus annuis os abscedere necesse est.* Et insuper caries iam facta dignoscitur ex cavitare, quæ digito comprehenditur, saniei ex vlcere manantis foetore, & asperitate per specillum demonstrata.

Sine inflammatione etiam dictum tuberculum sese prodit; tuncque generatur ab humore crasso, & viscido, puli aut melli per simili, & ad tumores illos accedit,

qui atheromata, steatomata, & melicerides nominantur, quique doloris expertes esse consueuerunt.

Curatio ægylopi valde difficilis est, tum quod medicamenta difficile admoueri possunt, propter oculi viciniam; tum quia, ob partium molliem, abscessus in vlcus sinuosum facile degenerat, vt antè dictum est. At multò adhuc difficilius curatur, si abscessus ad nares rumpatur, & pus per illas effluat, quia subiectorum ossium corruptio vt plurimum consequitur.

Aliquando verò ægylops ad canceri naturam accedit, quod dignoscitur ex dolore pungituo, venarum tensione, cutis duritie, atque liuiditate; tuncque satius est omnino non attingere, quia remediis magis efferatur, doloresque acerbiores excitat.

Fistula lachrymalis recenter genita, & quæ orificium habet extrinsecum ac manifestum, medicamentis curabilis est; quæ verò profunda & inueterata, ac cum ossis carie coniuncta, vix sine cauterio auferri potest.

Varia horum affectuum tempora, variam remediorum administrationem desiderant. Ac primùm ægylope incipiente, fluxio quæ ad partem fit, reuellenda est phlebotomiâ & purgatione: simulque repellentia fronti admouenda, quibus aliquando morbi progressus prohibetur, & suppuratio impeditur. In hunc finem ceratum sequens concinnari poterit.

℞. Cortic. malor. granator. acaciæ, balaustior. gallar. nuc. cupressi, aluminis rochæ, boli armenæ, ana ʒ. j. ceræ albæ ʒ. iiij. terebinthinæ ʒ. iiij. Fiat ceratum.

Post vsum repercutientis remedij, per aliquod tempus resoluentia parti affectæ admouenda sunt: quale est hoc decoctum.

℞. Mellis puri, aloës, ana ʒ. ij. myrrhæ ʒ. j. croci ʒ. j.

*Cap. XV. De Ægylope & fist. lach.* 251

ß. aquæ fß. ij. Coquantur lento igne ad mediæ partis consumptionem. Hoc decocto imbuatur frustulum spongiæ mollioris, & mediocriter exprimatur, ac parti applicetur calidè. Postea fasciâ deligando, & sæpè iterando.

Amatus Lusitanus ceratum contra ægylopos describit *curatione* 68. *cent.* 5. & multis laudibus effert, quod ita se habet.

℥. Puluer. testar. cochlearum ʒ. ij. myrrhæ, aloës lotæ, thuris, ana ʒ. ß. sarcocollæ, sanguin. dracon. cerusæ, ana ʒ. iij. opopanax aceto soluti, & lapidis hamatidis, ana ʒ. j. ß. croci ʒ. ij. ceræ & resinæ, ana ʒ. iij. M. simul ad ignem secundum artem, & fiat ceratum, angulo oculi applicandum.

Si prædictis remediis tumor resolui nequeat, sed ad suppurationem tendat, illa iuuanda est emplastro diachylo simplici: aut si dolor & inflammatio vrgeat, cataplasma de mica panis vtiliter admovebitur. Si sponte abscessus non rumpitur, ferro aperiendus est, idque quamprimum: si enim apertio differatur, pus partes vicinas erodit, & fistulam incurabilem sæpè producit. Multi cauterio aperiunt, sed ferrum non ignitum tutius est.

Aperto abscessu vlcus detergendum est, & ad cicatricem ducendum, more aliorum abscessuum. Si verò vlcus pertinacius euadat, & in fistulam abeat, curatio sequens illi adhibenda est.

Ac primùm vacuatio vniuersalis per phlebotomiam & purgationem repetenda est. Fluxio à capite auertenda per cucurbitulas, vesicatoria & caustica idoneis locis apposita, quibus succedere poterit decoctum chinæ, vel salis parillæ, per plures dies exhibitum. Eodemque tempore cerebrum exsiccandum suffumigiis, pulueribus cephalicis, & aliis in catarrhi curatione propositis.

Cauterij loco setaceum ceruici vtiliter admouebitur eo enim solo curatam fuisse fistulam lachrymalem refert Fabr. Hildanus *obs.* 41. *cent.* 1.

Si iccoris intemperies fluxionis causa antecedens (vt sæpè fit) esse videatur, illi peculiariter est prouidendum remediis idoneis.

Ad topica veniendo, vlceris orificum aperiendum, & dilatandum est lentè & paulatim, cum penicillo ex medullâ sambuci, spongiâ præparata, vel radice gentianæ confecto. Eoque satis aperto, sequens medicamentum à Foresto commendatum, *obs.* 17. *lib.* 11. apponatur.

℞. Mellis communis ℥.ij. viridis æris ℥.j. aquæ rutæ ℥.iiij. Æs viride puluerisetur, & cum aliis lento igne decoquatur ad tertiæ partis consumptionem; & colatura per syringam tepidè ac suauiter imponatur. Si acrius medicamentum videatur, aquâ rutæ vlcus abluatur quotidie, & post lotionem exiguum vnguenti apostolorum admoueatur. Hæc remedia vicissim per tres septimanas continuanda, superponendo emplastrum conueniens, & oculum aquâ rosaceâ defendendo.

Vlcere satis repurgato, ad incarnandum & cicatrizandum, sequens collyrium vsurpabitur.

℞. Thur. sarcocol. aloës, sanguin. dracon. bala ustor. alumin. antimonij, ana ℥.j. viridis æris gr.v. Subtiliter puluerisentur, & cum aqua rutæ fiat collyrium, satis liquidum, instillandum leuiter cum stipite rutæ, ter in die, & turunda in eo ma defacta immitatur, superimposito emplastro diapalma. Turunda paulatim minuat, & circa finem omninò auferatur, abluendo tantum partem collyrio prædicto & diapalma imponendo. Hac methodo fistulas recentes curatas fuisse refert Forestus *loco citato*, ab insigni quodam sui temporis chirurgo.

Si os carie affectum manifestè appareat, solo cauterio actuali curari potest; cuius adhibendi modus exactè describitur à Paræo, Fallopio, & Aquapendente, in operibus chirurgicis Fabrici. tamen Hildanus obs. 22. cent. 5. se fistulam lachrymalem cum ossis carie, à quatuor annis infestantem, & pro deplorata habitam, in puero tredecim annorum, solis medicamentis, scilicet curasse gloriatur; eam dilatando cum spongiis præparatis usque ad ipsum os, postea euphorbium per se fistulæ inspergendo, & quidem in copia; deinde emplastrum ex solo gummi elemi applicando. His eâ, quâ fieri potuit, diligentia per septimanas aliquot adhibitis remediis, squamula ossis se obtulit, quæ extracta est; & postquam per paucos dies semiguttulam balsami Tolutani, semel in die, cum filamentis vlceri imposuisset, fistula breui plenissimè consolidata est.

---

## C A P V T XVI.

### De Rhyade, & Enanthide.

**F**istulis lachrymalibus ut plurimum succedit alius affectus, qui Rhyas nominatur, & est carunculæ anguli maioris absumptio, vel imminutio, à qua & angulus latior euadit. Fit tamen ab aliis causis, nempe ab humoribus acris, & erodentibus in eam partem decumbentibus; vel à medicamentis cathæreticis, pro fistulæ curatione adhibitis.

Rhyadi opponitur Enanthis, quæ est ipsius carunculæ immodica excretio & eminentia; eaque generatur à sanguine redundante ad partem translato, & vlcere eiusdem partis non satis maturè exsiccato.

Rhyadis curatio sarcoticis & consolidantibus medicamentis perficitur, qualia sunt quæ sequuntur.

℞. Rosar. rubr. P. j. nucum cupres. & myrtillor. ana ʒ. ij. aloës, ʒ. j. β. vini austeri lb. j. Coquantur ad quartæ partis consumptionem. Hoc decocto abluatur pars frequenter. Vel

℞. Aloës, thuris, ana ʒ. j. sanguin. dracon. ʒ. β. rosar. rubr. & granor. sumach. ana ʒ. j. aquæ rosar. lb. j. Bulliant ad quartæ partis consumptionem. Fiat instar collyrij.

Encanthis curatur ablatione carnis superflue in oculi angulo adnatæ, quod perficitur excedentibus medicamentis, à mitioribus ad potentiora progrediendo. Igitur alumen vstum prius admouendum est, quod si non sufficiat, ad vnguentum Apostolorum, vel ægyptiacum, vel vitriolum vstum progrediendum. Quod si ne hæc quidem sufficiant, ferro abscindenda est caruncula vel cauterio actuali absumenda.

Antequam autem hæc fiant, corpus prius præparandum est euacuationibus conuenientibus, ne noua fluxio ad partem attrahatur.

In excisione autem, & cauterij administratione, vel etiam in absumptione carunculæ, quæ medicamentis fit, hoc diligenter obseruandum, ne tota caruncula absumatur, sed illud tantum quod superfluum est, auferatur; alioquin in contrariū affectum, rhyadē putā, deducetur.

## C A P V T XVII.

### *De Epiphora.*

**E**piphoræ nomen humoris fluxum generatim significat, in quamcumque partem irruat. Vfus tamen



obtinuit, vt pro tenuis humoris per oculos effluxu speciatim accipiat, vnde lachrymæ inuoluntariæ etiam nominantur, quæ per oculorum angulos assidue defluere consueuerunt.

Ad harum autem lachrymarum præternaturaliter effluentium generationem, concurrunt prauæ partis mandantis & recipientis dispositiones. Pars mandans est cerebrum, quod frigidiori, aut calidiori intemperie præditum serosos humores congerit, eosque ad partes inferiores, & fluxioni recipiendæ idoneas transmittit. Pars recipiens est glandula, iuxta oculi angulum maiorem constituta, & caruncula eidem angulo superposita: quarum partium raritas, aut densitas aut alia quæuis imbecillitas efficit, vt humorum influentium decubitus facile recipiant. Ideò sæpè solet contingere epiphora in ægylope, fistula lachrymali, rhyade, & encanthida; quod nimirum humores superflui ad partes laborantes facile transmitti soleant.

Fertur huiusmodi humor à cerebro in oculorum angulos, interdum per venas internas, & interdum per externas, vt propriis signis paulò inferius distinguemus.

Ille autem humor epiphoram efficiens, aliquando frigus est, & nullum aliud incommodum ægrotanti adfert, præter fluxionis molestiam: aliquando verò acrimoniæ & fædæ partis particeps dolorem, ardorem, & ruborem, tum etiam exulcerationem palpebris afferre solet.

Signa præsentium lachrymarum nulla sunt, cum ipsæ satis per se patant. Apparet etiam ex prædictis, num lachrymæ frigiditatis, an caliditatis, & acrimoniæ sint participes. Superest tantum distinguere, an per interna vasa, an per externa efferantur. Cum per internas venas humores defluunt, dolores in intimo capitis perferuntur.

tur, & acres sternutationes nonnunquam excitantur. Si verò per venas externas, quæ extra caluariam posita sunt, humores defluant; vasa in fronte, & temporibus distenta apparent, & caput veluti reuinctum sentitur, & ab abstringentibus remediis exterius applicitis iuantur.

Quod ad prognosim spectat, recentes epiphoræ, & à causis externis præcipuè oriundæ, faciliè curantur, maximè verò in iuuenili ætate. Antiquæ & in senibus difficilimè curationem recipiunt. Quæ verò ex aliis morbis procedunt, vt ægylope, fistula lachrymali & similibus, ab illorum affectuum curationibus omninò dependent.

Curatio huius affectus in fluxionis ablatione, & partis recipientis roboratione consistit.

Fluxio auferenda est humoris peccantis euacuatione, reuulsione, deriuatione, & partis mandantis roboratione.

Humor peccans, seu serosus humor in cerebro redundans, euacuabitur venæ sectione & purgatione.

Venæ sectio in frigida cerebri intemperie non conuenit, nisi manifesta plethoræ signa adfuerint. In calida verò intemperie, quando humores acrimoniâ præditi sunt, maximè conuenit, eaque bis, aut ter, si opus videatur, iterari poterit.

Purgatio fieri potest per potiones, apozemata, pilulas, & alia huiusmodi, quæ ægrotantis naturæ aptari poterunt.

Reuulsio humoris effluentis fiet per cucurbitulas, scapulis frequenter admotas, vesicatoria posteriori parti ceruicis apposita, & cauteria occipiti, aut brachiis inusta.

In contumaci affectu vesicatorium sincipiti admotum mirificè prodest, vt narrat Forestus. *obs. II. lib. I. de*

de vetula quadam, quæ cum oculos haberet lippientes, lachrymantes, & saniosos, cum intenso dolore, & prurigine, & nullis remediis curari posset; admoto capiti ralo emplastro, ex puluere cantharidum, fermento & melle, perfectè curata est.

Rondeletius verò cauterium supra commissuram admotum, magis conferre asserit, quàm si aliis partibus applicetur.

Ad derivationem conferunt hirudines ponè aures admotæ, & masticatoria horis matutinis vsurpata.

Nè verò humores semel euacuant de nouo generentur, cerebrum roborandum, atque exsiccandum est. Et quidem, si frigida fuerit illius intemperies, omnia remedia, quæ pro intemperiei frigidæ cerebri curatione, à nobis proposita sunt, vsurpari poterunt. In calidiori verò, ea quæ in calidi catarrhi curatione præscripta sunt, præcipuè cerebrum respicientia, hîc etiam conuenient.

Dum prædicta remedia vsurpantur, parti recipienti providendum est topicis remediis. Ac primùm si humor fluat per venas externas, astringentia fronti & temporibus admouenda sunt, & si fluxio fiat ab humore calido, & acri, sequens cataplasma admouendum est.

℞. Boli armen. sanguin. dracon. balaustior. & myrtillor. ana ʒ. j. β. acaciæ & hypocistidos ana ʒ. j. thur. mastich. ana ʒ. ij. rosar. rubr. P. j. Puluerentur & excipiantur albumine oui, & pauco aceto. Fiat cataplasma, quod linteo inductum, dictis partibus applicetur, & quoties exsiccatum fuerit, renouetur.

Si fiat ab humore frigido, ceratum sequens admoueatur.

℞. Thur. mastich. ana ʒ. j. β. gummi anime, tacamahacæ, & lapidis hæmatitis ana ʒ. j. gummi iuniperi ʒ. ij. terebinthinæ, & ceræ q. s. Fiat ceratum.

Ipsi verò parti affectæ collyria astringentia & exsiccantia aduocenda sunt, in sequentem modum composita.

℞. Tuthiæ præparatæ ʒ.j. sarcocollæ nutritæ ʒ. ʒ. thur. mastich. ana ʒ. ʒ. spicæ nardi gr. vj. Fiant trochisci, qui oui albumine, vel succo cydoniorum excepti, cantho oculi applicentur.

Vel tuthia præparata linteo raro excipiat, & filo alligetur, in vino austero immergatur, eoque oculus sæpe abluatur. Vel

℞. Tuthiæ præparatæ, cortic. ouorum puluerisator, aloës optimæ ana ʒ. j. Inuoluantur in panno lineo, & fiat pila, quæ infundatur in aqua fœniculi suspensa cum filo, postea sæpè in die exprimatur pila in oculo.

Sola aloë puluerata, & in pilam, vt dictum est, concinnata, & in aqua rosar. posita, non parum conducibilis est: Vel

℞. Aloës, nucis cupres. thur. mastich. myrrhæ, ana ʒ. ij. tuthiæ præparatæ sarcocollæ nutritæ, ana ʒ. j. ʒ. sanguin. dracon. berberis, sumach, rosar. rubrar. ana ʒ. j. Puluerentur tenuissimè, & excipiantur aquâ fœniculi, fiatque collyrium.

In calida fluxione sequens præcipuè conuenit.

℞. Trochiscorum albor. Rhasis sine opio, sarcocollæ nutritæ, lycij, acaciæ olibani ana ʒ. j. ossium myrobalanor. adustorum, coralli albi & rubri ana ʒ. ʒ. margaritar. ʒ. ʒ. succi mali punici ad medietatis absorptionem cocti, quantum satis. Fiat collyrium.

Si rubor oculorum epiphoræ coniunctus sit, sequens erit vtile.

℞. Granor. sumach contusor. ʒ. j. aquæ plantagin. calidæ ʒ. j. Macerentur aliquandiu, deinde fortiter exprimantur, addendo aquæ rosar. euphras. aquæ albumin. oui diu concussi ana ʒ. ʒ. sacchari candi sub-

tilissimè triti, & cum pauca aqua colati & j. Fiat collyrium.

Denique ea collyria, quæ pro ophthalmia inueterata præscripta sunt, hîc etiam aptari poterunt.

## CAPUT XVIII.

*De terygio, seu vngue oculorum.*

**V**Nguis oculi est membranula dura & nervosa, quæ ex angulo oculi maiore prodiens, album oculi primum contegit, mox & successu temporis ad nigrum extenditur, pupillam tegendo visionem impedit.

Aliquando tenuis est hæc tunica, colore albicante prædita: interdum verò carnosa euadit, venis multis cruentis contexta, diciturque *panniculus*, & *sebel* ab Avicenna. Quamvis nonnulli panniculum ab vngula distinguant, quòd scilicet vngula sit nervea quædam tunica, sine venarum repletionem, & tunicam tantùm adnatam contingat: Sebel verò, seu panniculus totum oculum cooperiat, & rubro colore præditus sit, ac venulis intertextus.

Oritur hic affectus ab exulceratione carnis, quæ est in angulo oculi, aut tunicæ adnatæ, vnde scabrities parit & inæqualitas emergit, quam dum facultas nutrienda æquare & complanare nititur, copiosorem sanguinem affundit, eique incrementum præternaturale producit, aut quoddam veluti tegumentum ei ingenerat. Quia tamen in oculum malè affectum quamplurima excrementa confluunt, ideo non ex sanguine puro sed pluribus excrementis permixto vnguis generatur. Vnde variæ illius differentiæ exurgunt, quod alius durus, alius mollis; alius albo, alius citrino, alius

rubro, alius fusco colore præditus sit; Alius facile separabilis ab adnata & cornea, alius tenaciter adhærens; Alius simplex & prauæ qualitatis expers, alius putridus & cancrifus.

Huius affectus diagnôsis ex dictis facillè intelligitur. Tum causæ illum producentes, humores scilicet, ex quibus generatur, ex colere internosci poterunt: rubra enim vngula fit à sanguine puro, citrina à bile, alba à pituita, fusca ac nigricans à melancholia.

Quod ad prognosim attinet, malum hoc difficillè curatur, & non nisi longissimo tempore; siquidem remedia acria vngulæ conterendæ necessariâ, non nisi sensim & paulatim vsurpari possunt, propter exquisitum oculorum sensum.

Si oculus affectus minor euaserit, malum est signum, partis enim debilitatem arguit.

Recens vngula & magnitudine mediocris, pharmaceuticis remediis curari potest. Quæ verò aucta est, ad nigrum oculi se extendens, & iam inueterata, non nisi manuali operatione curari potest.

Vngula, quæ crassa est, euerfa, eminens, indutata, & nigricans curari non potest, cancrifam enim naturam obtinet.

Curatio ad causam morbi antecedentem & coniunctam dirigenda est.

Ratione antecedentis, primùm victus ratio idonea præscribenda est; qualis in aliis oculorum affectibus à fluxione oriundis supra proposita est.

Simulque euacuationes, ac reuulsiones in dictorum affectuum curationibus præscriptæ, etiam hîc vsurpari poterunt: nempe purgationes, phlebotomiæ, cucurbitulæ, vesicatoria, & alia huiusmodi.

Ac sufficienter corpore repurgato, ad topica veniendum est, quæ vngulam absumere valeant, a mitioribus

incipiendo ; qualia sunt ea omnia, quæ pro macularum curatione suprâ propofita sunt. Quæ fi non fufficient, ad fortiora veniendum eft, quæ ab auctoribus paffim defcripta inueniuntur. Forestus collyrium fequens maximè commendat.

℞. Succi fœniculi ℥.iv. succi chedilon. ℥.iij. succi rutæ ℥.ij. succi maluæ ℥.ij. β. aloës ℥.j. vitrioli ꝯ. ij. æruginis æris ꝯ. j. zinziberis & cinnamomi ana ꝯ. β. fellis anguillæ ℥. β. fellis tauri, bouis, aut porci ℥. ij. facchari candi ꝯ. ij. bulliant succi addendo reliqua, & depurentur. Fiat collyrium.

Sequens etiam ab eodem commendatur.

℞. Lapid. hæmatitis Drach. ij. vitrioli albi, viridis æris vftorum ana ℥. iij. myrrhæ & croci ana Drach. j. piperis longi Drach. β. facchari candi ℥. β. Puluerifentur subtiliffimè vt alcohol. Huius pulueris ℥. j. mifceatur Drach. ij. aquæ raphani, & applicetur bis terve in die, prout æger tolerare poterit.

Ante vsum horum remediorum, pars fouenda eft decocto emolliente, quod etiam post eorum applicationem iterandum eft, ad dolorem leniendum.

Inter remedia minùs vehementia, fequens fructu vfurpari poterit.

℞. Offis fœpiæ ꝯ. j. facchari candi Drach. j. vitrioli ꝯ. β. tuthiæ præparatæ Drach. β. M. Fiat puluis subtiliffimus, vngulæ infpergendus.

Si topicis hifce remediis vngula abfumi nequeat, ad chirurgicam operationem veniendum eft ; quæ fit hamulo perforato vngulam ad bafim, deinde filium lineum duplicatum, acutu traiciendo, vtrinq; ad bafim arctè deligando, atque fic apprehenfam inciforio inftrumento abfcindendo, prout fufius docetur à Celso, Paulo, Aëtio, Hieronymo ab Aquapendente, in operationibus chirurgicis, aliisque quamplurimis.

Factâ incisione , linteum aquâ rosaccâ & albumine  
qui imbutum, est apponendum, ad dolorem sedandum,  
& inflammationem prohibendam. Ac denique siccantibus  
medicamentis ; collyriis ex tuthia , thure , aloë,  
trochiscis albis Rhasis , aliisque siccantibus medica-  
mentis cicatrix inducenda est.



PRAXEOS





# PRAXEOS MEDICÆ, LIBER TERTIVS.

---

*De affectibus Aurium.*

PRÆFATIO.

**A**URES pluribus morbis conflictari solent, similaribus, organicis, & communibus, ut docet Gal. 1. de sympt. caus. cap. 2. qui cum nonnisi per symptomata cognoscantur, ad symptomatum seriem eos reducere est animus. Symptomata verò quæ in auribus contingunt, ad actiones lasas aut vitia excretorum referuntur. Actio lasa, vel est auri propria, vel communis omnibus sensoriis. Actio auri propria, nimirum auditus.

R 4

*leditur abolitè, imminutè & depravatè. Abolitè in surditate, imminutè in graui auditu, depravatè in sonitu aurium. Actio communis omnibus sensoriiis est sensus tactus, cuius ratione doloribus obnoxia sunt. Vitia denique in excretis, ea omnia continent, qua ab auribus praternaturaliter egrediuntur. Sicque totus hic tractatus quatuor concludetur capitibus. Primum erit de surditate, & graui auditu. Secundum de tinnitu aurium. Tertium de dolore aurium. Quartum de exeuntibus prater naturam ex aurium cavitatibus.*

## CAPVT PRIMVM.

### *De surditate, & graui auditu.*

**S**URDITATEM & GRAUEM AUDITUM eodem capite complectimur, quia fiunt ab iisdem causis, secundum magis & minus tantum differentibus: ita ut valde excedentes auditum prorsus auferant, remissiores vero eum tantum imminuant. Imò verò vterque affectus vulgò surditas nominatur; qui enim alios audire nequeunt, nisi altâ voce loquentes, surdi esse dicuntur.

Surditas autem propriè dicta κώωσις Græcis nominatur, cum nempe auditus omninò aboletur, adeo ut eâ affecti, vel nullum penitus sonum audiant; vel si sonum aliquem auribus excipiant, illius tamen differentias percipere nequeant. Hi etiam sæpè muti sunt, si nimirum ab ortu surdi nascantur; non solum ex eo,

quòd per auditum homines loquendi formulas addiscunt; sed etiam propter maximum consensum, qui est inter auditus & loquelæ instrumenta, per neruum quintæ coniugationis, cuius rami præcipui ad aures quidem feruntur, nonnulli tamen ad linguam, & laryngem protenduntur; unde fit, vt aurem interiorem vellicando, tussis excitetur. Et ratio euidens est. Si quidem surdi à natiuitate; si loquelæ instrumenta non haberent vitata, aliquam vocem articulata ex naturali instinctu ederent; quemadmodum reliqua animalia, etiam si natiuitate ab aliis eiusdem speciei animalibus segregentur, vt nunquam ea audire valeant, vocem tamen sibi connaturalem proferunt. At surdi à natiuitate nullam vocem articulata edunt, sed sonum tantum confusum, qui partium loquelæ inferuentium læsionem manifestam arguit. Læsiõ autem illarum partium potissimum est ab humiditate, quæ cum neruum illum afficiat, qui ad aures, linguam & laryngem protenditur, auditum & loquelam simul affici necesse est.

Grauis auditus *ἁρπυξία* Græcis appellatur, eoque affecti ægrè somnum percipiunt, nec loquentes intelligunt, nisi alta voce clamantes. Alij verò, ne sic quidem audire satis possunt, nec nisi colloquentes aures ipsis loquantur, ac vociferentur.

Vterque affectus à cerebri, vel auri vitio exoritur.

Cerebri intemperies frigida, aut repletio, aut imbecillitas, aut alia quælibet læsiõ, in ea præcipuè parte, quæ nerui auditorij exortum; aut progressum occupat, surditatem, aut grauem auditum potest efficere.

Auris affectus, vel in exteriori, vel in interiori auris parte versantur.

In exteriori cauitate auditus defectum efficit obturatio perfecta, vel imperfecta, à tumore, abscessu, san-

guine, pure, pituita, aliisque rebus, tum intrinsecus, tum extrinsecus incidentibus. Aduertendum tamen est, meatus exterioris obturationem, integram & absolutam surditatem non posse efficere, sed tantum grauem auditum; quandoquidem per os etiam soni ad aures deferri possunt. Etenim meatus patens est ab auris interna cavitare ad palatum, per quem soni facile ingrediuntur & ad aures sese insinuant, qui etiam meatus aurium expurgationi dicatus est. Et sonum per os apertum excipi multa ostendunt experimenta. Videmus enim surdastros, ut melius loquentes audiant, aperto ore sermones eorum excipere. Et si utraque aure diligenter obturata, musica instrumenta baculo contingas, quem dentibus apprehenderis, exquisitiùs audiuntur. Et in via, noctu alicuius procul aduenientis strepitum captamus, & è longinquo magis audimus; si baculi, aut ensis alterum extremum terræ affigamus, alterum verò dentibus apprehendamus.

In parte auris interiore surditatem, aut gramam auditum efficiunt humores in cavitare interiori collecti, & à capite præsertim defluentes: qui plerumque pituitosi sunt, nonnunquam tamen biliosi; ut patet *Aph. 28. sect. 4.* ubi Hipp. biliosas deiectiones surdis prodesse asserit; interdum etiam sanguinei, siquidem surditatem, quæ crasim comitatur, ex sanguinis fluxu per aures fieri compertum est. Illi autem humores à toto corpore interdum ad aures transmittuntur, ut in febribus continuis, & præcipuè malignis. Eundem affectum producit mala auditus organorum conformatio; qualis est, si tympanum nimis laxum euaserit à sono vinolento, vel humectatione. Eâ ratione surdastri quamplurimi in constitutione austriua grauiorem habent auditum, quia membrana ab æris humiditate relaxatur, aut nimis tensum, exsiccaturque post morbos acutos, vigi-

lias, aut ieiunia, aut disruptum ab iisdem motibus ingentibus aut erosum à pure. Egreditur tamen aliquando pus ex suppurata aure, & sanguis in magnis concussionibus sine læsione auditus; quando exitus est inter os & membranam, sic enim septum illæsum permanet. Vel si reliquæ auris particulæ ab ortu; aut aliqua causa externa, vt ictu, casu, aliisque à debito naturali statu deiectæ sint. Intemperies denique frigida ab aëre frigidiorè, vel aqua frigidissima in aurem immissa; vel narcoticorum, aliorumque medicamentorum usu nimio, hunc affectum producere solita est.

Has omnes causas per propria signa diagnostica sigillatim distinguere difficillimum est. Arte tamen & coniectura in hunc modum elucidari possunt.

Si à cerebri vitio surditas contingat, aut alij etiam sensus læduntur, aut aliquis affectus peculiaris in cerebro apparuit, aut dolor capitis, aut grauitas, apoplexia, lethargus, aut alij huiusmodi.

Obturationo externæ aurium cavitatis oculis ipsis dignoscitur, si ad Solem cavitatem illam introspicias; tumque apparebit, num tumor, aut materia crassa, aut alia quæpiam substantia heterogenea cavitatem illam repleat. Tum etiam, si aliquid extrinsecus in aurem illapsum sit, ex relatu ægrotantis dignoscitur.

Si vero cavitas interior aliquo humore repleatur, pituitam esse iudicabimus, si fluxio pituitosa ægrotantem prius infestauerit, aut si ille huiusmodi fluxionibus frequenter fuerit obnoxius.

Biliosum verò humorem hunc affectum producere indicabit febris biliosa progressa, aut iam ægrotantem detinens, & acutissimi doloris præsentia. A sanguine verò fieri ostendit dolor grauans, & sanguinis redundantia in toto corpore. Et hæc in perturbationibus criticis præcipue contingit.

Tympani laxitas & humectatio dignoscitur ex causis prægressis humectantibus, & humida intemperie aliquam aliam partem affligente: vix enim fieri potest ut causæ humectantes hanc vnicam particulam affecterint.

Eiusdem tympani tensio & exsiccatio nimia, ex totius corporis siccitate, & causis exsiccantibus prægressis erit dignoscenda.

Tympani etiam disruptionem aut erosionem conii-cere poterimus; si causæ vehementes rumpentesque, aut erodentes enumeratæ præcesserint.

Prognosis huius affectus in hunc modum instituen-da est.

Surditas à natiuitate, & quæ longo tempore contra-cta est, eaque integra & absoluta, incurabilis est. Quæ verò non absoluta, sed diuturna, difficillimè, & ut plu-rimum nunquam curatur.

Surditas à bile, aut sanguine oriunda, cum in feбри-bus continuis, & acutis tantum soleat contingere, cum earum febrium curatione solui consuevit.

Gravis auditus, si breui tempore non curetur, in om-nimodam surditatem degenerat; teste Gal. 3. *de compos. med. sec. loc. cap. 3.*

Membrana tympani rupta, vel cicatrix in ea relicta incurabilem surditatem efficit.

Surditas per intervalla crescens & decrescens cura-bilis est: ab humore enim mobili, qui interdum minui-rur & augetur, eam produci significat.

Surditas quæ à vitio cerebri excitatur, facilius cura-tur, quàm quæ à proprio auri affectu producitur.

Curationem quod attinet; illa surditas quæ ab ali-quo cerebri affectu dependet, non aliam curationem requirit, quàm quæ dictis affectibus destinata est, à pro-priis capitibus repetenda. Quæ à tumore exoritur, si

ille durus sit & inueteratus, curationem non recipit: si verò calidus & inflammatorius; illius curatio in aurium doloris curatione proponetur. Si verò à pure in aure collecto producat, ex capite ultimo huius tractatus curatio erit desumenda, vbi de his agitur quæ præternaturaliter ex aure egrediuntur.

Si à siccitate hic affectus oriatur, curandus est, iuxta Rhasis præceptum, victu humectante, somno longiori, & capitis perfusione cum aqua tepida: quibus addi possunt humectantia in aurem immixta, vt oleum amygdal. dulc. & similia. Si ab aliqua re extrinsecus in aurem illapsa, surditas, vel grauis auditus oritur, ea protinus auferenda est eluendo, aut excutiendo, aut extrahendo: & si animalcula quædam sint, quæ auris cauitatem subierint, alliciendo, aut enecando. Eluuntur, infundendo quæ viam hanc lubricam reddunt, & humectant, dilatantque, vt lac, oleum amygdal. dulc. vel decoctum aliquod emolliens & relaxans. Excutiuntur impetu quodam, vt sternutatione mota; sic enim spiritus impulsu, commotis illis partibus, quod in meatu auris latet, sæpè excluditur, idque citius, si prius viâ, vt dictum est, dilatata & lubrica facta fuerit. Prodest etiam inclinata aure affecta, supra pedem illius lateris saltare; quâ ratione pueri post natationem aquam auribus influxam excutiunt. Si hæc non succedant, extractio mollienda est auriscalpio, cauendo tamen ne dum intromittitur, illud quod inhæret vterius propellatur. Ideò auriscalpij cocleare admodum tenue sit, vt facilius in aure contentis postponi possit. Vel forcipe ad id accommodata, vtrinque acuta & aspera, illa apprehendi & eximi debent. Vel si neque hoc succedat, cum corpora dura sint, vt nucleus, vel lapis, alio instrumento apprehensa confringenda sunt, & dein, vti dictum, humore infuso eluenda. Si auriscalpium intro-

mitti nequeat, specillum cotone inuoluatur in extima sui parte, deinde immergatur in terebinthinam, aut in aliquod aliud viscidum, post immitatur in aurem, ut agglutinet id quod obstruit. Idem fit ex candela cerea, extremâ sui parte visco inducta. Quod si aliquid visci, aut glutinis post extractionem intus inhæserit, id auriscalpio extrahendum. Sunt qui calamum aperiunt in extremis eius partibus unam eius partem in aurem immittunt, alteram ore comprehendunt; ut inde frequenti succtu, quod intus conditum est, attrahant.

Animacula ex aure alliciuntur; ad motus quibusdam, quæ illis grata sunt, ut extrorsum repant; ut si lac cum saccharo, in spongiola auri adhibeatur, vel leuiter intrudatur, vel ficus inuersa, vel pulpa pomi dulcis, vel laridum, quo vermiculi citius eliciuntur; idque præsertim, si aures Soli obuertantur, dum hæc continent. Peculiariter verò hirudines casu ingressæ alliciuntur sanguine immisso in aures. Pulices verò pilis caninis in aurem introductis. Si autem viua sint animalia, enecanda sunt; mortua enim non amplius auditui obstrepunt, & facilius extrahuntur. Enecantur autem, si salina auribus instilletur, aut propriâ urinâ infusâ.

Amara autem citius infecta enecant, ut centaurij, vel absinthij succus, aut decoctum aloës, & fella quælibet. Acrâ idem præstant, ut acetum, succus ceparum, & similia.

At cum frequentissima surditatis & grauis auditus causa sit frigida intemperies, & humoris pituitosi influxus in eam partem; ad illius oppugnationem hæc præcipuè curatio dirigenda est.

Quia verò huiusmodi pituitæ influxus à cerebro ducit originem, illius ideo curatio ad eam partem dirigenda est, non absimilis ei, quæ frigida cerebri intemperiei assignata est; quam prudens Medicus, pro va-



rio intemperiei gradu, eiusdemque contumacia, moderari poterit.

Summa autem huius curationis erit, vt præmissâ vitus ratione attenuante, & modicè calefaciente, atque exsiccante, qualis in gutta serena præscripta est: vitando in primis ventos austrinos, & ab iis aures muniendo; vaporosa alimenta, & in primis allium & cepe, quæ auditui nocent; tum etiam quæ humores crassos ac pituitosos generant; vt, inquam, primùm euacuatio vniuersalis instituatur per pilulas, apozema cephalicum & purgans, tum etiam per phlebotomiam, si illius indicationes adfuerint. Cui subnectatur, si affectus sit contumax, diætâ sudorifica, eique succedant particularia remedia fluxionem reuellentia, vt cauteria, vesicatoria, errhina, sternutatoria, masticatoria, apophlegmatismi: peculiariter verò masticatoria sunt maximi vsus in hoc morbo, propter meatum qui ab interna aure ad palatum defertur, & aurium excrementa deponit. Ad denique morbo in longitudine abeunte, ad pilulas vsuales, aut syrupum magistralem, opiatam, cephalicam, puluerem, aut cucupham caput roborantem, & alia huiusmodi veniendum erit. Quæ omnia in frigidæ cerebri intemperiei curatione proposita sunt.

In vsu diætæ, si affectus sit contumax, conuenient etiam sacculi, post assumptam potionem sudorificam capiti admouendi; quales in dictâ curatione descripti sunt, iisque non sincipiti tantùm, vt ibi dictum est; sed etiam auribus erunt admouendi.

Peculiariter verò conducunt ad huius affectus curationem thermæ sulphuræ & bituminosæ, cum balneo, tum lotione capitis Balneo siquidem sudores copiosi prouocantur, & materia fluxionis antecedens educitur. Lotione verò capitis cerebrum roboratur & exsiccat, humores in ipsam aurem impaui-

discutiuntur. Utendi modus peculiaris à Penoto describitur, & valdè commendatur, his verbis. *Nihil aquè conducit in surditate, etiam post centum remediorum usum, quàm ut patiens optimè prius corpore mundato, & deinde capite purgato, sulphureis balneis caput madefaciat, hoc modo. Ex spongiis magnis confutis veluti cucupham ferat in capite, ad supercilia & infra aures descendentem. Sedeat sub canali balneorum, & verso epistomio aquam accipiat; quæ absorta spongiis, caput continuo calore suo fouebit, atque omnes capitis suturas aruumque commissuras diducens atque aperiens, vapores tollet; vel materiam impactam nervis viisque auditoris resoluit per halitum, aut adeò mutabit, ut breui sit abitura. Bis in die ita sedere eum convenit ad horas duas, ac deinceps statim sudare in lecto, diatamque adhibere tenuem, ex succis & iure carniuum; unoque, nisi oligophoro, planè abstinendum est.*

Tandem ad topica materiam auri impactam discutientia veniendum est, quæ in hunc modum administrari poterunt.

℞. Fol. origani, absynth. puleg. serpilli, saluiæ, menthæ, centaur. min. maluæ, & althææ, ana M. j. florum chamomil. melil. stœchad. & anth. an. P. j. cinnamomi & caryophyll. ana ʒ. ʒ. Decoquantur in æquis partibus aquæ font. & vini albi sub finem additi. Colatura foueatur auris affecta cum spongia, calidè, manè & serò.

Ex eodem decocto poterit fieri suffitus in aurem per infundibulum, quem maximè prodesse certum est, ex eo quòd vapor ex decocto calente eleuatus, penitissimas auris partes facilè penetrat.

Fomenti loco adhiberi potest panis cum semine cæri subactus, & calens è furno per medium sectus.

Vel panis ordinarius ex clibano sumptus, & inferiori crustâ ablata in spiritu vini immergatur, & calidè quantùm

quantum æger ferre poterit, ad aurem applicetur, ut vapor intromittatur.

Efficacior erit panis ex farina vulgari factus, & cum semine carui, baccis lauri, iuniperi, & nuce moschata subactus antequam coquatur; deinde post leuem cocturam, dum adhuc calet, disruptus, & auri laboranti impositus.

Si decoctum pro fomento & suffitu præscriptum fortius desideres, pulpa colocynthidis & radis hellebori albi ad ʒ. i. vel ij. addi poterunt. Idem decoctum in vino albo solo, vel in vino & aceto parari poterit, ut magis penetret, & potentiùs discutiat.

Pro suffitu etiam vtiliter excipi poterit in auris meatum per infundibulum fumus caryophyllorum, caput muniendo linteo calidissimo, dum fumus excipitur.

Post fotum & suffumigium, liquor aliquis in aurem iniiciendus est, eaque postmodum cotone moschato obturanda.

℞. Olei amygdal. amar. & rutacei, ana ʒ. j. M. infundantur calidè in aurem. Vel

℞. Olei de castoreo & lilior. albor. ana ʒ. j. olei anethini ʒ. β. hellebori albi ʒ. β. aquæ vitæ ʒ. j. Bulliant in B. M. ad aquæ vitæ consumptionem. Colentur ad usum dictum. Vel

℞. Radic. cyperi, baccar lauri, semin. anisi & cumini puluerator. ana ʒ. j. castorei puluerati ʒ. β. olei rutæ quantum satis. Misceantur, iisque impleatur cepe magnum excauatum quod postea coquatur super prunas, & exprimatur succus in aurem instillandus.

Olea chymica efficacissimè operantur, qualia sunt oleum rosmarini, maioranæ, saluiæ, fœniculi, de spica, cariophyll. Quæ tamen propter nimiam vehementiam sola non sunt vsurpanda; sed cum prædictis in parua

quantitate admisceri possunt in hunc, aut similem modum.

℥. Oleorum prædictorum ʒ. ij. olei de spica, fœniculi, aut caryophyllorum, aut alterius cuiusvis ʒ. β. vel ʒ. j. Misce.

Aquæ etiã nonnullæ in aurem instillantur, quæ ad surditatem maximè conferte existimantur. Sic plurimum laudatur ab auctoribus aqua fraxini, quæ elicitur, ramos virides fraxini vnâ extremitate igni adiouendo, & ex altera extremitate aqua stillans vsui asservanda. Præcipuè confert quando surditas à causa calida oriunda est, & remedia valdè calefacientia suspecta sunt. Si caliditas non timeatur, pari aquæ vitæ portione admista efficacior euadet. Marthiolus hanc aquam cum succis quibusdam permiscet, eamque sic compositam valdè prædicat his verbis. *Fraxini spumam, quæ à viridi ligno igni exposito manat, additis succis cyclaminis, scilla, ruta: aequalibus partibus, omnibus simul parumper feruifacitis, plurimum valere ad surditatem scimus; si in aurem sanam hic liquor calidus infundatur, cum se cubitum receperit ager: atque cum super affecta aure iacere oportet. Vbi verò utramque aurem surditas occupauerit, in eam fundatur qua minùs affecta fuerit, & super alteram iaceat.*

Spiritus vini in quo helleborus albus infusus fuerit, in aurem affectam instillatus, magnæ est efficaciz.

Alij multùm commendant succum hederæ depuratum, cum vino albo potenti permixtum.

Fella animalium, vt leporis, capræ, perdicis, maximè laudantur, si recentia vsurpentur, cum pari mellis portione misceantur, & in cepæ pellicula incalescant.

Pinguedo anguillæ maximo in vsu est. Ea autem colligitur dum anguilla magna in veru assatur, & suppositis lauri foliis excipitur, eaque tepidè in aurem instillatur.

Zechius oua formicarum prædicat his verbis, *oua formicarum contrita & cum succo cepa in aurem infusa, quam vetustissimam surditatem persanant.*

Sanguis lupi iunioris calens in aurem instillatus surditatem curare creditur.

Denique, si affectus contumacissimus propositis remediis non cedat, non esset abs re extremum tentare remedium, quod à Fonsæca proponitur *consult. 58. tom. 2.* inunctionem nempe factam ex hydrargyro: quia surditas ex lue venerea contracta ita curari solet; quare etiam hæc, licet talis non sit, fortè curari poterit. Et ratio huic sententiæ videtur suffragari, quia hydrargyrum tumores duros emollit & discutit, ac humores concretos & partibus impactos potentissimè dissolvit: atque ita pituitam in auris particulis concretam, & reliquis remediis non cedentem fortè poterit dissolvere. Hoc tamen remedium, non nisi in desperato casu tentandum est; anceps enim & dubius admodum est illius eventus. Siquidem ab inunctione hydrargyri cerebrum valdè labefactatur, & variæ fluxiones concitantur; ita ut nonnullis ex lue venerea per hydrargyrum curatis, ipsa surditas aut grauis auditus interdum contingat: quamvis, ut antea dictum est, ex ipsa lue venerea contingens surditas interdum curetur. Et debite administrata hydrargyrosis, post sufficientes purgationes, nullam in cerebro noxam ut plurimum relinquat.

In topicorum remediorum administratione hoc perpetuò obseruandum, ut non frigida, sed semper tepida, aut calidiuscula in aurem immitantur. Præterea nunquam medicamenta instillanda sunt, quin priora abstergantur. Instillato verò medicamento, auris perpetuò cotone moschato obturanda, ille enim solus per se surditati maximè conducit: quod confirmatur à Fo-

recto obseru. 15. lib. 12. his verbis. *Mulier Delphensis, cum ex diuturno morbo conualuisset, incidit in surditatem satis diuturnam, qua cum satis purgata esset, & deinde à medicamentis abstineret, & longo tempore adhuc surditate laboraret; vetula quadam ei consuluit, vt granum vnum; vel alterum moschi optimi in bombace misceret, & auri perpetuo imponeret. Hoc remedio, prater omnem spem, ab omni surditate liberata est. Ego multos quidem, quibus auris sanie longo tempore maderet curari solà imposità bombyce, vel cotone, in quo moschus reservatur, quod & aurem exsiccaret, & simul surditatem tolleret.*

## C A P V T II.

### *De sonitu aurium.*

**A**uditionis sensus deprauatur in sonitu aurium; quemadmodum enim oculus debet esse omnis coloris expertus, vt colores omnes obiectorum ritè percipiat; & si aliquo colore præternaturaliter afficiatur, vt in ictero, tunc deprauari visionem necesse est: ita auris nullum in se debet habere sonum vt omnes sonos extrinsecus aduenientes percipere valeat, & si in ea sonus aliquis præternaturaliter efficiatur, auditus deprauatur. Hæc autem deprauata auditio *παράκοις* Græcis, Latinis Obauditio nominatur; vulgò etiam tinnitus aurium appellari consuevit, quamuis tinnitus propriè vnicam tantum deprauati auditus differentiam constituat, vt in sequentibus patebit.

Fit autem sonitus in aure, ex commotione præternaturali aëris vernaculi, seu congeniti in auris cavitatè contenti. Quamuis enim aër ille congenitus naturaliter in aure moueatur, vt docuit Aristoteles, sonu

tamen ex eo motu non exauditur, nisi quando aurem manu concavâ, aut alia re simili obturamus: tunc enim melius fit auditio in aure interna, cum aëris externi ad aurem ingressus impeditur, ut docetur vulgari experimento: si nimirum testudinis, aut alterius instrumenti musici manubrium dentibus apprehendamus aures obturando; tunc enim sonus quadruplo maior percipitur, quam si apertis auribus excipiat; quia sonus testudinis per continuitatem manubrij in os ingreditur, & ad auris cavitatem sese insinuat per patentem canalem, qui ab aure ad fauces exporrigitur. Motus autem ille naturalis aëris implantati, fit à spiritu ἀκουστικῷ, seu auditorio, qui continuò in aurem influit, & aërem illum tenuem & mobilem leuiter exagitat. Si verò aërem ille implanatus solito vehementius moueatur, tunc sonus intra aurem percipitur, qui præternaturalis est, & auditum vitiat.

Causæ verò aërem vernaculum præternaturaliter commouentes quamplurimæ sunt. Præcipua tamen & frequentissima est vapor, flatus, aut spiritus in aurem ab aliis partibus transmissus, vel in ipsa aure genitus. Si ab aliis partibus feratur, vel à toto corpore, vel ab aliqua parte peculiari ducit originem. A toto corpore promanat in febribus, unde Hipp. *Coacis. Bombus in acutis, & sonitus aurium lethalis.* Et ille aurium sonitus fit à spiritu flatuoso, per arterias à toto corpore ad aures transmissio. Frequentius tamen accidere consuevit in principio paroxysmorum, & instante crisi per hæmorrhagiam. A parte peculiari flatus elentati ad aures transferuntur, nempe à ventriculo, hepate, liene, mesenterio, utero, aliisque partibus. Unde in vomitu vehementi, melancholia hypochondriaca, & hysterica suffocatione aurium tinnitus frequenter solent contingere. A capite etiam frequentius spiritus flatu-

sus, ex frigidis & pituitosis humoribus excitatus à calore debili, in aures defertur per venas, arterias, & quintam neruorum coniugationem; per quas etiam via vapores & flatus ab inferioribus partibus transmittuntur.

In autem ipsa generatur flatus ex materia pituitosa in auribus contenta; unde fit, ut grauis auditus cum tinnitu aurium saepissime coniunctus sit. Ab humore enim fit obstructio, à qua surditas, aut grauis auditus, dum in minori copia redundat: à flatibus verò ex eodem humore eleuatis aurium tinnitus generatur.

Aliæ verò causæ sonitum aurium excitantes sunt, percussio capitis vehemens, sonus vehementior aurium, vlcera, calida intemperies, debilitas, & sensus exquisitior.

Percussio capitis vehemens, spiritus in capite contentos violenter commouendo, facit ut illi in autem confertim propellantur, & sonitum edant.

Sonus vehemens in aurem violenter impulsus, aërem implantatum maximè exagitat, ut commotio illius diutius perseverans sonitum diuturniorem efficiat.

Aurium vlcera, puris, aut saniei feruore, strepitum quendam in aure excitare solent; quod etiam fieri potest à spiritibus maiori copiâ in partem ulceratam transitis, & in auris cavitatem effusis, aëremque implantatum commouentibus.

Calida intemperies arteriam auris interiora subeuntem multo spiritu replet, unde contingit, ut pulsatio fiat vehementior, & sonus pulsans in aure excitetur. Vel copiosior spiritus per arteriam illam effusus in aurem, aërem vernaculum commouet, & sonitum producit. Et ab ista causa sonitus aurium diuturnus efficitur, per menses & annos interdum perseverans.

Auditus debilitas sonitum aurium efficere solet, ut



in conualeſcentibus ; quia omnis ſenſus debilitatus ab obiecto non ſolùm vehementiori , ſed etiam mediocri offenditur ; ſic illi qui debilem habent viſum, à lumine etiam moderato læduntur.

Ac denique ſenſus exquisitior : ex Gal. lib. 3. de comp. med. ſec. loc. cap. 1. tinnitum aurium efficit eàdem ratione ; quia ſcilicet obiecta etiam moderata illum nimium afficiunt. Ille autem ſenſus exquisitior præternaturalis eſſe debet, vt affectum præternaturalem efficiat, nam ſenſuum perſpicacitas per ſe actionem deprauatam non poteſt producere : quin potiùs, quò exquisitior eſt ſenſus, eò minùs aberrare debet. Præternaturalis autem efficitur à calida intemperie , vlcere, aut alio conſimili affectu : quemadmodum partes inflammatae contractus moderatos deprauatè ſentiunt, nempè dolorificè. Vel ſi exquisitus ſenſu in ſtatu naturali conſiſtat ; exiſtimandum eſt cauſam tinnitum efficientem eſſe præternaturalem, & excedentem ratione illius exquisiti ſenſus : vapor enim v. g. ita exiguus , vt à ſenſu obtuſiori non percipiatur , ſicque actionum non lædat, ab eo qui exquisitiori ſenſu præditus eſt percipietur, & tinnitum efficiet ; atque ita in hoc præternaturalis erit , in alio verò ſanitatſis limites non excedet.

Variaè dari poſſunt aurium ſonitus differentiæ, quæ à vaporum multitudine, vel paucitate craſſitie, vel tenuitate ; motu celeri, aut lento oriuntur : ſi enim vapor, aut flatus multus ſit, craſſus, & celeriter moueatur ; ſenſorio exhibebit ſimilitudinem aquæ rapido curſu cum fragore fluentis , vel tympani , vel id genus instrumentorum muſicorum , vel venti reboantis , vel id genus ſimilia. Quòd ſi paucus ſit, craſſus, & celeriter moueatur, arboris contraſtæ , vel domus collabentis, ſubitæque ruinæ, vel catapultæ ſpeciem refert. Si multus ſit, tenuis, & celeriter moueatur ; ſibillum excitare ſolet , & torrentis

cuiusdam lenioris imaginem. Si paucus sit, tenuis, & celeriter moueatur; tinnitum excitat. Si multus sit, crassius, & lentè moueatur; murmura quædam excitare solet. Si paucus sit, crassius, & lentè moueantur; susurrum repræsentat. Si multus sit, tenuis, & lentè moueatur; sibilum remissiorem refert. Ac denique cùm gradus innumerari possint crassitiei & tenuitatis, multitudinis & paucitatis, motus celeris & tardi: pro eorum ratione, innumerari propemodùm sonorum modi in auribus produci poterunt; prout magis, vel minùs; ad hanc, vel ad illam accedere videbuntur.

Diagnosis prædictarum causarum certa haberi non potest, docente Gal. 3. *de comp. med. sec. loc. cap. 1.* artificialem tamen coniecturam ex causis progressis, aliisque circumstantiis elicere possumus.

A flatuoso spiritu fieri sonitum aurium, inde colligi potest; quòd interdum cesset, & interuallo postea reuertatur: tum etiam si præcesserint cibi flatibus generandis idonei.

Per consensum ab aliis partibus fieri ostendunt, si aliqua alia pars affectu peculiari laboret, & affectus per interualla repetat.

A cerebro præsertim fieri testatur dolor capitis præcedens, aut grauitas eiusdem; & ut plurimum nocumentum aliis sensibus communicatur.

In ipsis auribus vitium esse testatur sonitus continuus, & sine vlla intermissione infestans.

A materia frigida affectum produci cognoscimus; si æger à calidis medicamentis iuuetur, & si sanitatis tempore omnes strepitus faciliè præferat.

A vaporibus crassis, vel tenuibus; paucis, vel copiosis, affectum produci ostendunt sonorum differentia, quæ in aure percipiuntur, suprà propositæ.

A facultatis imbecillitate exoriri, facile patet ex iis

quæ præcesserunt; utpote morbis præcedentibus, ex quibus vix dum ægri comalescere incipiunt.

A calida intemperie, & exquisitori sensu inde oborto fieri coniicimus; dum æger percipit caliditatem in capite circa aures; causæ calefacientes præcesserunt, & flatus discutiencia medicamenta malum augent: tum etiam quod æger sanitatis tempore magnos strepitus, propter sensum exquisitum, perferre non potest.

Quod ad prognosim spectat, recens aurium tinnitus facile curatur, chronicus verò difficile, eoque magis, si à luë venerea ortum duxerit. Qui à causa calida ortum ducit, facilius curatur; qui à frigida, difficilius.

Diurnus aurium tinnitus, à materia pituitosa in aure contenta oriundus, in surditatem degenerat: aucta enim materiæ illius copiâ, meatus auditorius obstruitur, & spiritus influxus ad aurem inhibetur.

Curatio huius affectus pro varietate causarum variâ esse debet.

Ac primum curatio sonitus aurium, qui per consensum aliarum partium generatur, à curatione affectuum illarum partium dependet; & idè ex propriis cuiusque capitibus erit desumenda.

Qui verò ab aure primariò affecta exoritur, peculiarem curationem desiderat; & si à frigida intemperie, crassiorique flatu generetur, eandem curationem desiderat, quæ in gravi auditu descripta est, consimiles enim sunt affectus, qui sæpè simul complicantur, aut vnus in alium degenerat; tinnitus enim non rarò grauis auditus, & surditatis prodromus esse consuevit.

Omnia igitur remedia, tum vniuersalia, tum particularia, superiori capite ad surditatis, & grauis auditus curationem proposita, huc transferri poterunt.

Si ab aurium vlcere tinnitus prouenit, non aliam

postulat curationem, quam quæ vlceri debetur ; qualis capite sequenti proponetur.

Si à sensus debilitate procedat, vt in cõnualescentibus ab aliquo morbo grauiori ; instauratione ac refectione totius corpõris spontè affectus euanescit , poterunt tamen interim olea quædam temperata in aurem infundi, ad symptoma demulcendum ; vt chamæmelinum, anethinum, amygdalar. dulc.

Ac denique , si à calida intemperie , vel exquisitiori sensu ducat originem ; victus refrigerans & humectans præscribendus est , tum etiam refrigerantia in aurem immittenda , à mitioribus ad fortiora progrediendo. Ac primùm instillari poterit decoctum hordei , violarum , lactucæ , nymphææ , quibus ad penetrationem aliquid melissæ , aut chamæmeli addi poterit. Quibus non conferentibus, succi lactucæ, portulacæ , hyosciami vsurpandi sunt ; imò ad papaueris succum, & ipsum opium confugit Gal. quibus tamen parcè & summa cum cautione vtendum est , ne calore natium partis debilitando, auditum nimis haberent.

### C A P V T III.

#### *De dolore aurium.*

**A**urium dolor *ωραλγία* Græcis nominatur, estque grauissimus affectus , tum propter partem affectam, membranam putà interiorem auris cavitatem ambientem , tum propter cerebri vicinam , cuius ratione illud non rarò in consensum trahitur.

Cùm autem omnis dolor à solutione continui oriatur , quæcumque partium illarum sensibilibus auris cavitatem ambientium , continuitatem soluere possunt,

aurium dolorem excitare solent; quorum præcipua sunt intemperies, tum immaterialis, tum humoralis, seu cum materia coniuncta, vulnera, vlcera, & res externæ in auris ciuitatem illapsæ, vel immissæ.

Frigida intemperies sæpè aurium dolorem excitat, induciturque à ventis frigidioribus, balneo aquæ frigidæ, aliisque causis impensius refrigerantibus. Calida intemperies sine materia, rarò aut nunquam aurium dolorem producit, quemadmodum frigida, nam frigidum partibus hisce nervosis & membranosis inimicum est, calidum verò amicum: neque dolorem in auribus efficere potest, quin multum excedat, sicque humorum defluxum ad partem alliciat; vnde materialis intemperies producitur. Hac de causa nec Galenus, neque alius Græcorum, calidæ intemperiei mentionem fecerunt, quamuis Auicenna & Arabes ferè omnes eam proposuerint.

Materia verò frigida dolorem aurium efficiens, est pituitosa, vel serosa in aures à cerebro defluens: vel flatus ab eodem cerebro, aut partibus inferioribus transmissus.

Materia verò calida, vel biliosa est, ex venis & arteriis in prædictas partes illapsa: vel sanguinea, per dictas etiam vias effusa, à qua inflammatio generatur.

Prædictæ causæ solutionem continui occultam producant, à qua dolor excitatur. Solutiones verò manifestæ, vt vulnera & vlcera, non est dubium, quin dolorem etiam inferre possint. Vulnera fiunt à causis externis pungentibus, incidentibus, & contundentibus, ita vt contusio ad hanc classem referatur. Vltera verò fiunt, vel post inflammationem abscessu rupto, vel ab humoribus acris partem erodentibus.

Denique res externæ in aurem immiffæ, fi duræ, acutæ, aut alio quouis modo mordentes, aut vellicantes funt, dolorem procul dubio efficere confueuerunt.

Diagnofis harum omnium caufarum ita instituenda eft. Si intemperies immaterialis fit, nulla fentitur grauitas in aure, neque vlla tensio, & nullus tumor apparebit. Frigidam autem effe intemperiem cognofces ex eo, quod caufæ refrigerantes præcefferunt, vt peregrinatio tempore hyberno, à frigore externo dolor intenditur, & admotis calefacientibus lenitur. Calidam verò intemperiem indicabunt externæ calefacientes; vt, infolatio, vel aër calidior, & noxa à remediis calidis in aurem iniectis; leuamen verò à refrigerantibus.

Si ab humore pituitofò dolor exciteretur, grauitas quædam in aure & ipfo capite percipitur; tum fluxio pituitofa interdum aliquam aliam partem infestabit. Prætereà caufæ refrigerantes præcefferunt, vt aër frigidus & aquilonius, alimenta frigidiora: adestque tempeftas hyemalis, ætas fenilis, & fimilia.

Si à flatu oriatur, dolor erit vehemens fine pondere aut grauitate; interpolatus, non continuus, & cum tinnitu coniunctus.

A ferofo humore fieri oftendunt, alij affectus ab eodem producti, & fimul ægrum infestantes; vt fluxiones acres & tenues in dentes, oculos, aures, pectus, aliasque partes; & ferofo humoris per vomitum, aluum, vrinas, aut fudores exacuatio.

Si ab humore biliofo duca originem, dolor erit pungens & acutus, cum caloris fenfu adiuncto; à refrigerantibus iuuabitur, & biliofæ quædam humiditates interdum è capite manabunt: quibus accedunt calidum & biliofum temperamentum, ætas iuuenilis, tempus

æstium, victus ratio calidior, aliæque causæ calefacientes, à quibus lædi æger consuevit.

Inflammatiō cognoscitur ex dolore intenso & pulsatili, cum calore insigni, & rubore, interdum ad malas, & tempora sese extendente: quibus febris adiuncta est continua & intensa, necnon aliquando delirium, conuulsio, syncope, & frigiditas extremorum.

Vulnus ex sanguine ab aure profluente cognoscitur: vlcus verò à pure vel sanie. Sed quia puris effluxus interdum à cerebro fit per aures, distinctione opus est. Si enim procedat à cerebro, dolor capitis aliæque apostematis cerebri signa præcellerunt; & primò sanies magnâ copiâ effunditur; deinde sensim minuitur, donec ex toto consumpta sit. Potest quidem magnâ copiâ effundi ex abscessu auris; sed inflammationis in aure conceptæ signa præcellerunt. Huic postea vlcus succedit, quod postmodum, siue ab abscessu, siue à fluxione humoris acris duxerit originem, sequentibus signis innotescit. Pauca puris, aut saniei quantitas sensim & continuò profluit; dolor, ardor & punctiōis sensus in ipsa aure percipitur, præcipuè dum auriscalpium immittitur. Imò verò vlceris differentias coniecturâ quâdam allèqui poterimus. Si enim vlcus sit in ossè, cognoscitur ex sanie tenui ad citrinum colorem vergente, & ex affectus longitudine. Si sit profundum, ex puris multitudine: si mundum sit, ex pure laudabili: si sordidum, ex crassitie & copia eiusdem: si virulentum, ex sanie tenui: si putridum, ex fœtore puris: si corrosiuum, ex eo quòd post saniem sanguis egreditur: fistulosum, ex vetustate vlceris, sanie virulenta, & carne callosa ac duriori. Denique extrinsecus in aurem immissa, vel illapsa, aut sensibus percipiuntur in auris cavitare contenta, aut ex relatu ægrorum addiscuntur.

Prognosis doloris aurium varia est pro varietate causarum. Qui à nuda intemperie ducit originem ; facile curabilis est. Qui à materia frigida, pituitosa, serosa, vel flatuosa producitur, non est quidem valde periculosus, sed chronicus ut plurimum esse consuevit. Qui verò à calidis humoribus, & præsertim inflammationem efficientibus exoritur admodum periculosus est ; cerebrum enim propter viciniam trahitur in consensum, unde delirium, & convulsio subsequi consuevit. Iuvenes in hoc morbo magis periclitantur. Cum enim calidiori temperie præditi sint, & sanguini calidiori, intensior fit inflammatio, quæ calorem nativum cerebri dissolvit, prorsusque hominem extinguit ; unde fit, ut ægri plerumque intra septimum diem intereant. Senes verò, cum humores habeant frigidiores, minore inflammatione afficiuntur, sicque minùs periclitantur.

Ulcera in auribus difficilè curantur, quia cerebrum vicinum ad eas partes excrementa deponit, ea tamen quæ abscessus consecutaria sunt, faciliùs curantur, tum etiam ea, quæ plus laudabile generant. Vbi verò sanies virulenta, foetida, aut alia prauâ qualitate prædita fuerit, difficillimam curationem arguit ; idque magis, si ulcus fistulosum, aut cum ossis carie copulatum fuerit.

Curatio, non secus ac diagnosi & prognosis, iuxta varietatem causarum varianda est.

Si enim à frigida intemperie nuda producat, calefacientia remedia auri adnota ad illius curationem sufficiunt, qualia in surditatis curatione fuere proposita, ac præcipuè fofus & suffitus, tum etiam olea calefacientia ibidem descripta. Calida verò intemperies, si aliquando sine materia contingat, topicis refrigerantibus, quæ paulò inferiùs proponuntur ; edomari poterit ; ac



præcipue oui candido cum lacte muliebri subacto, & in aurem instillato.

Si à frigida intemperie cum materia coniuncta, pituita scilicet, aut flatu, aut serosa materia; eadem curatio erit administranda, quæ ad surditatis curationem fuit proposita. Ut primùm totum corpus euacuetur, cerebri intemperies corrigatur, & topica remedia calefacientia, ac discutientia auri admoveantur, à curatione prædicta desumenda.

Si à calida intemperie, cum biliosi humoris affluxu, aurium dolor producat, qui chronicus sit, aut per intervalla recurat. Primùm humor ad partem affluens reuellendus erit phlebotomiâ, quâ etiam calida intemperies totius corporis, nedum ipsius hepatis, in quo humor biliosus generatur, emendari poterit. Deinde humoris peccantis euacuatio fiet purgationibus idoneis. Dicta hepatis intemperies calidior emendabitur iulepis, aut iusculis refrigerantibus, sero lactis caprino, aquis mineralibus & acidulis & vitriolatis, balneis aquæ tepidæ, & similibus. Ac denique ea omnia convenient, quæ in doloris capitis à calida intemperie oriundi curatione fuere proposita. Dolor verò ipse demulcetur topicis refrigerantibus & anodynis, pro inflammatione infra describendis.

Inflammatio auris curabitur, missio priùs sanguine, eâ quantitate, quæ tum plenitudini satisfaciatur, tum humorem ad aurem affectam confluentem reuellere possit, idque præmissio clystere emolliente, refrigerante & laxante. Debet autem sanguis detrahi magnâ copiâ, iteratis saltem vicibus, id enim postulat morbi magnitudo & acuties. Secunda est autem vena cephalica è directo auris affecta. Si à suppressione mensum, aut hæmorrhoidum affectus originem duxisse videatur, venæ inferiores aperiendæ

sunt, demptâ prius plenitudine per venam brachij. Imò & abscentibus huiusmodi cautis, venarum inferiorum apertio optimam reuulsionem præstabit ad opposita distantissima, cui etiam vsui conferant hirudines ano affixæ.

Reuulsionem etiam commodè fient per frictiones, & ligaturas brachiorum & crurum; cucurbitulas scapulis & dorso admotas, tum siccas, tum scarificatas.

Interdum etiam ad deriuandum, cucurbitula scarificata ponè aures apposita, multum iuuat; vt docetur historiâ luculentâ à Zacuto Lusitano propositâ, *observ. 64. lib. 1. praxis admiranda* his verbis. *Diui-nus senex lib. 2. epidem. sect. 6. post medium sic præfatur. Ad auris dolorem, cucurbitam affigito. Hac memoranda sententia summam attulit opem misero cuidam, qui ex dolore auris atroci malè habens, omnibus præsiidiis desitutus, vigiliis debilis, & amens factus, continuo febriens, in horas moriturus sperabatur. Hic cum ex vena sectione, cucurbitulis costis, humoris, collo affixis; reuellentibus clysteribus, expurgatibus, cæterisque reuulsoriis auxiliis, sicut & anodynis intra aurem inditis nullam sentiret utilitatem, cucurbitulâ sacrificatâ, iuxta aurium glandulas applicatâ, leuatus est; extracto enim copioso sanguine inflammatio neque resoluta, huius auxilij beneficio omnino sanus permansit.*

Idem Zacutus Lusitanus, in *praxis ad historias*, laudat hirudines ponè aures admotas quaternarios numero, quas maximum leuamen attulisse refert iuveni cuidam, sæuissimâ auris inflammatione laboranti.

Mirandum etiam interdum effectum profert arte-riotomyia in temporibus celebratâ, ad aurium dolorem atrocissi-

atrocissimum compescendum, sanguinem feruidum & spirituosum educendo, qui symptoma illud grauissimum producebat. Operandi modus à nobis expositus est; in curatione doloris capitis à materia calida oriundi.

Purgatio etiam in hoc affectu vtilissima est, ex cholagogis composita; humores enim biliosi sanguini permixti, eique fluxibilitatem, & anthirropiam concilians, ad inferiora retrahuntur, & foras educuntur.

Postmodum verò iulepis refrigerantibus, tota humorum massa temperanda est; qui sunt ex decocto lactucæ, portulacæ, plantaginis, acetosæ, & similia, cum syr. limon granat. aut papaueris rhœados.

Interim verò, dum prædicta remedia vsurpantur, topica continuò administranda sunt, quæ perpetuò anodyna esse debent propter doloris vehementiam, cuius mitigatio reliquas indicationes superat; quarum tamen ratio haberi poterit, si prædictis anodynis, in principio & augmento, leniter repellentia admisceantur; in statu verò & declinatione resoluentia; quorum exempla talia esse poterunt.

℞. Lactis muliebris recenter mulcti ℥. ij. album. oui agitati, vt in liquorem abeat ℥. ss. M. instillantur tepidè in aurem.

Vel lac solum ab vbere in aurem instillatum, valdè dolorem lenit.

℞. Fol. plantag. & solani, ana. M. j. flor. chamomil. & melil. ana P. j. Fiat decoctio, cuius fumum æger excipiat in aurem per infundibulum.

℞. Ol. viol. nymphææ & rosac. ana ℥. j. M. instillantur in aurem tepidè suffumigium.

Aselli in prædictis oleis infusi & expressi, præstantius

faciunt anodynum ; hæc enim animalia eximiam habent vim dolorum sedandi , eaque ratione in doloribus dentium , hæmorrhoidum aliisque usurpantur. Vel dicti aselli viui capiuntur, & in oleis cum aqua decoquuntur ad aquæ consumptionem.

Si ardor sit valdè intensius , succi refrigerantes oleis prædictis admisceri poterunt , in hunc modum.

℞. Ol. nymph. & rosac. ana ℥. j. succi solani & plantag. ana ℥. ss. M. instillentur in aurem.

Oxyrrhodinum à Practicis non paucis usurpatur, ex olei rosacei partibus duabus, & aceti parte vna compositum , quod tamen suspectum esse debet , quemadmodum omnia quæ potenter repellunt. Periculum enim est , ne humor defluens in cerebrum vicinum retrocedat. Estque præceptum generale perpetuò obseruandum, ne inflammationibus , quæ partibus nobilibus proximè sunt , repellentia moueantur. Admisceri tamen possunt leuiora repellentia cum anodynis & relaxantibus. Sic enim fluxionem moderatè reprimunt, nec tamen eam longiùs propellunt , cuiusmodi sunt antea proposita ; quibus etiam sequens commodè addi poterit.

℞. Ol. rosac. & nymph. ana ℥. j. ss. aquæ rosar. & plantag. ana ℥. ss. lactis muliebris ℥. j. mucilag. semin. psyllij & cydon. extractæ cum aqua rosar. ana ℥. vj. M. iniice in aures guttulas aliquot huius liquoris tepentis , & circum aures, lintea in eo liquore macerata, appone.

In dolore vehementissimo ad narcotica interdum confugere cogimur ; sed rarò ea usurpanda sunt, & maximâ cautione adhibitâ, quia cerebro infensa sunt. *Noni quendam* ( inquit Gal. 3. de comp. med. sec. loc. ) *solo usum opio, & vocem & sensum agro ademisse ; ut ne opobalsamo quidam , aut aliis iniectis calefacientibus , homo*

*amplius restitui potuerit.* Si igitur magna urgeat necessitas, in hunc modum præscribenda sunt.

℞. Ol. de semin. papaueris ℥. j. β. camphoræ, opij, an. gr. ij. M. instillantur in aurem.

℞. Ol. amygdal. dulc. ℥. ij. succi maluæ ℥. β. myrrhæ ℥. β. croci ℥. δ. opij. gr. iij. vel iiij. M. vtatur vt supra.

In topicorum administratione diligenter obseruandum est Galeni præceptum, quod habetur *lib. 3. de compos. medic. sec. loc. cap. 1.* vt scilicet auris inflammatione affecta non attingatur, sed medicamenta in eam instillantur per auricularium specillum lanâ mollissimâ obuolutum, & in iis intinctum; tum æger interrogetur, num medicamentum tepidum ei videatur; & num calidius ipsum ferre possit, & ad tantam caliditatem procedatur, vt ipsum non offendant. Tinctum itaque pharmaco specillum ad principium meatus auditorij moderatè imponendum est, vt ex eo in altum medicamentum defluat: idque toties iterandum, donec meatus impleatur; mox lana eodem medicamento imbuta, tum meatus osculo, tum auri vniuersæ imponenda est.

In statu morbi olea leniter resoluentia cum anodynis permiscenda sunt in hunc modum.

℞. Ol. chamæmel. amygdal. dulc. & violac. an. ℥. j. ol. lilior. ℥. β. M.

Sed fomenta & suffumigia potentiùs resoluunt, quæ ex decocto sequenti parari poterunt.

℞. Rad. alth. ℥. j. fol. maluæ, solani, hyperici; ana M. j. semin. lini ℥. β. semin. maluæ, alth. & papau. albi, an. ℥. ij. flor. chamom. aneth. & rosar. an. P. j. Fiat decoctio in aqua, vel lacte, pro fotu vel suffitu. Aqua è stipitibus fraxim educta, in aurem instillata mirificè dolorem sedat, eiusque causam resoluit. Stipites fraxim virides

igni adimouendi, & aqua ab eorum extremitatibus stillans vsui referuanda.

Si tumor resolui non possit, sed ad suppurationem tendere videatur; quod ex doloris incremento, pulsatione maiore, & febre intensiore dignoscitur: naturæ motus adiuuandus erit, & cataplasma sequens admoueri poterit.

℞. Residentiam prædicti decocti, pro fotu & suffitu descripti, cui adde adipis anseris, gallinæ, medullæ vituli, mucilagin. semin. psyllij & fœnugr. ana ʒ. j. olei chamom. violac. an. ʒ. j. butyri recentis ʒ. j. ʒ. ʒ. croci ʒ. ʒ. Fiat cataplasma.

Cataplasma de mica panis hic etiam erit conuenientissimum, dolorem enim sedat, & suppurationem leniter sine calefactione iuuat, eaque ratione in omni phlegmone feliciter vsurpatur. Illius compositio talis est.

℞. Medullæ panis albissimi lb. j. Coquatur in lacte caprino ad pulvis consistentiam; deinde adde vitellos ouor. num. ij. ol. rosac. ʒ. ij. croci ʒ. j. Fiat cataplasma.

Maximè etiam commendatur cataplasma ex cæpa Victorij Fauentini, quod in hunc modum componitur.

℞. Cæpam num. j. butyri recentis ʒ. ij. ol. chamom. & rosac. an. ʒ. j. croci ʒ. j. Fiat cataplasma, quod moderate calidum parti applicetur.

Factâ suppuratione abscessus rumpitur, & pus egreditur per auris membranam rarefactam, aut erosam. Tumque æger in aurem affectam decumbere debet, ut pus commodè effluat; & in aurem infundenda, quæ pus eluere, & abstergere valent.

℞. Decocti hordei ʒ. iij. mellis rosac. ʒ. j. M. instillentur tepidè in aurem.

Si à puris acrimonia vlcus generetur, peculiaris cura illi adhibenda est, quæ etiam conueniat vlceri ab humorum influxu oriundo.

Ac primùm, quia ex sententia Gal.4. de compos.med. secund. loc. topica alicui membro adhibere non debent nisi priùs toto corpore repurgato : Euacuationes solennes instituendæ sunt per phlebotomiam, & catharsim, ægrotantis naturæ, & temperamento appropriatam; cæque per curationis decursum repetendæ, quoties opus videbitur. Mox topica abstergentia & exsiccantia vsurpanda, à mitioribus ad validiora progrediendo. Quorum exempla talia esse poterunt.

℞. Melius optimi, & vini albi antiqui an. ʒ. iij. Bulliant ad despumationem, & instillentur in aurem, cotone postmodum eodem liquore imbuto obturandam.

Deinde, vt medicamentum potentius efficiatur, succum marrubij; apij, absinthij, centaurij minoris, aut cyclaminis cum melle admisce, leuiter decoque, & in aurem instilla. Vel

℞. Succu betæ ʒ. j. marrubij ʒ. β. mellis opt. ʒ. vj. Coque parum, postea adde syrupi absynthij ʒ. ij. M.

Fortius medicamentum ita parabitur.

℞. Succu cyclaminis ʒ. j. myrrhæ ʒ. j. croci ʒ. β. thuris ʒ. j. viridis æris ʒ. β. vini antiqui ʒ. j. β. Bulliant leuiter ad vini consumptionem; liquor bis, aut ter in die infundatur.

Nota, ante quamlibet liquoris infusionem aurem esse abluendam hydromelyte tepido, probeque abstergendam penicillis, ex mundis linteis confectis, vel specillo auriculario cotone obuoluto.

Deterfum vlcus sufficienter, ad cicatricem perducendum est medicamentis epuloticis, in hunc modum vsurpatis.

℞. Aristolochiæ rotundæ , cortic. granat. & gallar. an. ʒ. ʒ. Coquantur in æquis partibus vini & aquæ ferratæ ad lb. ʒ. Colat. adde succi plantag. & polygوني, an. ʒ. j. mellis rosat. ʒ. ij. M. instillentur in aurem Vel.

℞. Thuris , myrrhæ, ana ʒ. j. gummi iuniperi ʒ. ʒ. sarcocollæ , ladani , an. ʒ. j. Fiat pulvis, qui excipiat terebinthina, & fiant pastilli, supra carbones iniiciendi, quorum fumum recipiat æger in aurem per infundibulum.

Vel pulvis iste misceatur cum aliquo sex succis prædictis , & auri instilletur. Vel alumen vstum cum vino mixtum in aurem infundatur; potentissimam enim exsiccandi vim obtinet.

Si vlcus contumax fuerit , & vetustam contraxerit ; à fluxione foueri necesse est , cuius remotioni incumbendum est purgationibus vsualibus , diætâ ex guaiaco , & salsa parilla , errhinis , matricariis , cauteriis , aliisque remediis fluxionem auertentibus. Mox vlceris exsiccationi incumbendum est remediis fortioribus , quale est antea præscriptum , ex succo cyclaminis , myrrha, viridi æris, aliisque compositum. Vel sequens Valesci , quo se aurium vlcere laborantem Presbyterum ab octo annis, curasse refert.

℞. Mellis ʒ. x. aceti ʒ. viij. Coque ad ignem, & despuma , deinde adde viris æris ʒ. j. M.

Hæc remedia manè & serò in aurem infundenda sunt , & antequam instillentur , auris abluenda est sequenti decocto.

℞. Folior absinth. althææ , & ægrimoni. an. M j. Fiat decoctio in æquis partibus aquæ fontis , & vini albi sub finem additi ad lb. ʒ. In colatura dissolue oxymel. simpl. ʒ. j. ʒ. alum. puluerat. ʒ. j. M. abluatur au-



ris calidè , & postea exsiccetur specillo cotone obuoluto.

Si dolor excitetur à remediorum acrimonia , immitatur ol. amygdal. dulc. vel amara. cum myrrha, aloë, & croco ; & si maior sit dolor, misceatur parum opij ; vel instilletur oleum ex vitellis ouorum in mortario plurimbeo subactum.

Si vlcus valdè sordidum appareat , vnguentum Ægyptiacum in succis prædictis dissolutum , vsurpandum erit.

Denique plurimùm commendatur à Galen. Aëtio, aliisque , tum Græcis , tum Arabibus, tum neoreticis, scoria ferri , ad vlcus aurium potenter exsiccandum. Galen. 3. *de comp. med. sec. loc.* scoriam ferri cum aceto acerrimo tritam , vel decoctam vsurpat. Hollerius in *commentario illius capitis*, Arabum præparatione magis probat , qui scoriam cum aceto terunt, & postea exsiccant ; idque septies repetunt , postea in pollinem redigunt, & cum aceto acerrimo coquunt longâ coctione, dum mellis crassitudinem acquisierit ; atque ita siccant, & in vsum reuocant, cum melle aliisque liquoribus dissolutam.

Si auris dolor excitetur ab aliquo corpusculo in aurem immisso , vt lapillo , nucle cerasi, aut aliis huiusmodi, quæ intensum dolorem parere consueuerunt, & interdum inflammationem, conuulsiones, ac mortem accersere , vt refert Matthæus de Gradi , puero quidam decem annorum , nucleum cerasi in aurem immissum, & malè à chirurgo tractatum , insignem dolorem , ac mortem intulisse. Eorum corpusculorum extractio sic molienda est.

Primum aduertendum est , an auriculario specillo corpuscula illa extrahi possint ; quod cautè admodum agendum est , ne ab eodem specillo penitus immit-

rantur, quod non raro solet contingere. Ideò si res in aurem immissa totum foramen impleat, satius est ab usu specilli omninò abstinere, & reliqua auxilia tentare; quæ in hunc modum administranda sunt.

Paulus specillum lana inuolutum in resinam, seu terebinthinam, aut gummi, aut aliud quoddam glucinans medicamentum demittendum esse scribit; ibique vertendum, donec sensim res in aure contenta extrahatur.

Si hoc modo nihil efficitur, oleum calens meatui continuò instillato, ut pars illa relaxetur, & res in aure contenta lubrica fiat; sic enim faciliùs excidere, aut extrahi poterit.

Adhibeantur sternutamenta naribus, naresque claudantur, & os comprimatur; ita enim à vehementi spiritus explosione, id quod in aure continetur, expellitur.

Hæc auxilia indefinenter usurpanda sunt, donec æger liberetur. Si enim res in aurem immissa diutiùs perstiterit, inflammatio orietur, & postmodum multò difficilior erit corpusculi extractio, & graue impendebit periculum.

Arculanus in nonum Rhasis affert, caput lacertæ auri admotum, corpuscula illa extrahere, & propriâ experientiâ confirmat his verbis. *De expertis per me in extractione rerum infixarum in aurem est, ut lacerta viva, aut noniter mortua applicetur cum capite suo auri, & ligetur, si per tres horas retenta, & cum eam amouebis, inuenies rem infixam adhaerentem capiti lacertæ. Et hoc valet in extractione cuiuscumque rei ubi-cumque fixa.*

Denique, si prædicta remedia non sufficiant, ad extractionem veniendum est, quæ fit per instrumenta à chirurgica; quæ fusè & eleganter docetur Fabriciò

Hildano cent. 1. obseru. 4. 5. 6. & ab Aquapendente in operationibus chirurgicis, capite de aurium chirurgia.

Pulices aliquando in aurem sese insinuant, & in illius cavitatem sese commouentes magnam molestim pariunt. Ad illarum extractionem globulus ex pilis caninis compositus in aurem demittatur, & pullex sese in eum inferet, ob sympathiam quam habent pulices cum canibus. Vel ex lana molli compressa pessulum composito, & in aurem frequenter dimittito. Vel dictum pessulum terebinthinâ illinito, & altius in aurem demittito.

Aqua in aurem introducta natando, aut caput irrigando, sæpissimè molesta esse consuevit, & dolorem efficere. Illa ut plurimum facillè excutitur, si quis alteri pedi innixus eiusdem lateris cum aure affecta, capite parumper declinè saliat. Si hoc non sufficiat, extractio molienda est exsuctione factâ per fistulam, aut arundinem peritissimè in aurem immissam; aut folle paruo in eandem introducto, & postea dilatato. Extremitas autem fistule quæ in aurem dimittitur, cotone obuoluitur, ut foramini auris arctius uniatur, nevé aër externus ingrediatur, qui attractionem impediret.

Galenus, & Aëtius assidue oleum infundunt, & aurem irrigant, mollique lana fouent; deinde molli etiam lanâ extergunt; rursusque infundunt, idem sæpius repetendo.

Ac denique spongiæ molliissimæ, & siccissimæ frustula in aurem demittantur, donec sicca, nec amplius humida extrahantur.

## CAPUT IV.

*De excurrentibus præter naturam ab aurium  
canitantes.*

**E**X auribus multa præter naturam egrediuntur, quæ sigillatim commemoranda sunt: illque propria remedia sigillatim adscribenda.

Primo igitur rupto abscessu, post inflammationem genito, aut ex ulcere ab humorum acrimonia, pus aut sanies solet effluere; cuius curatio à prædictorum affectuum curatione dependet, quæ superiori capite fuit propoſita.

Sanguis etiam aliquando ex auribus profluit, ut in vulneribus capitis, ac percussionibus, in quibus venæ aurium rumpi, aut lacerari possunt. Si autem modicus sit ille fluxus, cohibendus non est, quia intus retentus inflammationem efficeret. Si verò immoderatus sit aut diuturnior, cohibendus est venæ sectione in brachio celebrata, & cucurbitulis scapulis affixis cum scarificatione. Deinde astringentia & refrigerantia in aurem instillantur, qualia sunt succus plantaginis, polygoni vel decoctum rubi, rosar. rub. mastiches, acaciæ, hypocistidis, balauſtiorum, sumach. & simil. in vino & aceto, aut aqua ferrata.

Aquosus humor per aures è cerebro nonnunquam effluit, idque pueris plerumque solet contingere; qui humor cohibendus non est: nam importunè suppressus epilepsiam, aut grauem alium cerebri affectum parit; natura enim per hanc viam licet minus idoneam, excrementa deponit; nimiaque humiditas in capitibus puerorum luxurians, non solum per vias ordi-

narias, huic vsui à natura destinatas, nares scilicet, & palatum; sed etiam per aures, oculos, & totam capitis superficiem, ( vnde vlcerà & achores capitis ) expurgatur. Cùm tamen ista euacuatio symptomatica sit, & humor ad aures profluens, eas tandem exulcerare, & auditum lædere valeat; illius curationi conuenienti methodo incumbendum est.

Ac primùm humores superflui in cerebro redundes, educendi sunt blandis, & frequenter repetitis purgationibus; tum etiam deriuationibus, per vesicatoria posteriori parti ceruicis admota, causticum occipiti inustum.

Posteà meatus aurium detergendus, & exsiccandus est tali medicamento.

℞. Succi agrim. & absinth. an. ℥. iiij. vini albi & mel. rosac. an. ℥. j. Bulliant parùm, & in aurem instillantur, sordibus priùs absterfis; posteà verò aures cotone obturentur eodem liquore imbuto. Vel

℞. Vini albi ℥. iiij. succor. agrimon. absinth. & centaur. minor. an. ℥. j. Bulliant simul, & in aurem instillantur.

In adultoribus verò, si aquosus humor per aures effluat, & diu perseueret, totum corpus, & ipsum cerebrum euacuandum & apozema cephalico & purgante. Postmodùm humiditas superflua absumentia diætâ sudorificâ; deriuanda vesicatoriis, cauteriis, & cucurbitulis; cæteraque remedia administranda, quæ in frigida cerebri intemperiei curatione propòsita sunt.

Vermes denique in auribus aliquando generantur, ex putridis vlceribus, & ex iis emanare solent; qui curatis quidem vlceribus cessant. Quia tamen vlceris sanatio non ita breui tempore obtineri potest, vermium extinctio interim molienda est remedijs con-

uenientibus. Hoc vnicum exempli loco haberi poterit.

℞. Ol. amygdal. amar. succi apij, centaurij minor. an. ʒ. ij. aceti ʒ. ij. Bulliant parum, deinde adde myrrhæ, aloës, an. ʒ. j. M. instillentur in aurem. Si fortius desideres, colocynthidis ʒ. ʒ. addi poterit.



PRAXEOS



PRAXEOS  
MEDICÆ,  
LIBER QVARTVS.

---

*De Narium affectibus.*

PRÆFATIO.

**N**ARES varios affectus præter naturam pati consueuerunt, qui ad morborum, vel symptomatum seriem referuntur. Ad morbos referuntur vlcus & ozæna, sarcoma, & polypus. Ad symptomata verò reducuntur, olfactus læsio, fætor narium, coryza, sternutatio, hæmorrhagia. Ideo quartus hic liber septem absoluetur capitibus. Primum erit de Narium ulcere, & ozæna. Secundum, de sarcomate, & polypo. Tertium, de læso olfactum. Quartum, de narium fæto. Quintum, de coryza. Sextum de

*sternutatione. Septimum denique, de hamorrhagia narium.*

## CAPVT PRIMVM.

### *De narium vlcere & Ozæna.*

**V**Lcus narium, aut recens, & simplex est, aut vetustum, & putridum, quod Ozæna nominatur.

Recens & simplex fit, vel à causis externis, vt vulnere, at contusione; vel ab internis, humorum quippe acrimoniâ, ad illas partes decurrentium, ac præcipuè pituitæ salsæ à cerebro profluentis.

Ozæna verò fit ab vlcere simplici, si negligantur, aut propter causæ malitiam, & maiorem acrimoniam magis penetret, putridumque & sordidum efficiatur.

Diagnosim vtriusque petitur ex eo, quòd vlcus simplex nullum, aut exiguum dolorem infert: sed tantum aliquid sanguinis frequenter emittit, præsertim cum attingitur, aut irritatur, alioqui crustulâ siccâ eaque nigrâ obducitur, quæ emunctionis impetu nonnunquam excutitur. Ozæna verò maiorem dolorem infligit, crusta illius sordidior est, tum graueolens mucus ex ea profluit. Æger ipse tum sibi graueolet, tum astantibus retrî odoris expiratione molestus est, & à foedo illo odore ozæna Græcis nominata. Sæpè vlcus illud serpit, & vel narium pinna, vel earum interstitium, vel interdum tenella illius loci ossa exedit ac putrefacit, exesumque palatum aliquando perforat, idque maxime, si ad canceri naturam accedat, vel ex lue venerea (quod frequenter contingit,) aut elephantiâsi originem duxerit.

Quod ad prognosim attinet, vlcera recentia, & ab



humore benigno , minorisque acrimoniæ particeps genita , satis faciliè curantur. Verusta verò , sordida , putrida , difficillimè & si in cancrum degenerent , prorsus insanabilia sunt. Si à lue venerea , aut elephantiasi oriantur , curari non possunt , nisi affectus illi prius auferantur.

Ad curationem , primùm victus ratio conueniens instituenda , quæ humorum acrimoniam contemperet , eorumque generationem prohibeat. Mox totum corpus euacuandum est phlebotomiâ , & purgatione conuenienti , tum cucurbitulæ affigendæ cum scarificatione. Et si fluxio humorum acrim in nares sit valde contumax , vesicatoriis & cauteriis , posterioribus partibus admotis , erit deriuanda ; tum caput roborantia administranda.

Præmissis vniuersalibus remediis , ad topica veniendum est. Ac primùm aduertendum , num vlcera crustosa sint , & antequam vlteriùs progrediaris , crusta auferenda est eam emolliendo foru aquæ tepidæ , butyro iussulso , adipe anseris , aut gallinæ recenti , oleo amygdalarum dulcium & similibus. Emollita crusta , vi excutienda non est , ne irriterur vlcus , & fluxio exasperetur , sed expectandum est , dum sponte decidat , nares emungendo , aut saltem leniter & blandè summitate digiti , oleo amygdalarum dulcium inuncta , detrahenda.

Ablatâ crustâ , astringentia & exsiccantia remedia vsurpanda sunt. In simplici vlcere sufficit aqua hordei cum melle rosaceo vlcus abluere , deinde vnguento de tuthia , vel albo Rhasis , vel oleo ex vitellis ouorum illinire , quod erit efficacius , si in mortario plumbeo prius agretur.

Ad ozænam verò sequentia parabuntur.

℞. Hordei integri P. j. fol. agrimon. plantag. absin-

thij & centaurij min. ana M. j. rosar. rubr. P. β. Coquantur in aqua ferrata. In colat. dissolue mellis ros. ʒ. iv. Fiat errhinum naribus frequenter attrahendum.

Post aliquam deterfionem, sequens decoctum vsurpandum est.

℞. Balauftiorum & cortic. granat. ana ʒ. ij. fol. plantag. caudæ equinæ, pilosellæ & herniariæ, ana M. j. radic biftortæ ʒ. j. aluminis crudi ʒ. j. β. Fiat decoctio.

Aqua aluminosa ad idem etiam est efficax; tum ea remedia, quæ ad polypum astringendum & exsiccandum capite sequenti proponuntur, erunt efficacia.

Ad idem facit vnguentum Ægyptiacum in aqua hordei dissolutum.

Deinde fiant vnguenta, quæ astringant, detergant, & summè exsiccent; vt vnguentum pompholigos, addito alumine, chalcitide, & cortice mali granati. Vel sequens vnguentum præscribatur.

℞. Omphatij ʒ. β. cortic. mali granati, balauftiorum, ana ʒ. iij. myrrhæ, aluminis, ladani, ana ʒ. ij. chalcitidis, aloës, cortic. thuris, ana ʒ. j. olei rosac. & myrtin. ana ʒ. ij. ceræ rubræ quantum satis. Fiat vnguentum, quod applicetur vlceri, vel dissoluatur in vino, aquâ plantag. peculi rosar. aut myrtillor, & frequenter naribus attrahatur ore aquâ pleno.

Si hæc non sufficiant, abluatur vlcus aquâ sublimatâ, bis ter, quaterue in die; siccat enim egregie, & citra vllum morfum detergit. Illius præparatio talis est.

℞. Aquæ plantag. ʒ. iij. sublimati crudi pulueris. gr. xij. Bulliant in phiala vitrea ad mediæ partis consumptionem. Potest augeri vel minui sublimati quantitas prout fortius, aut debilius medicamentum efficere volueris.

Vlcere probe deterfo, ad illius exsiccationem veniendum est, cui rei conferet puluis rosarum rubrarum  
exsufflatus

exufflatus; & ſi efficacius id præſtare velis, pulueres vnguenti prædicti addi poterunt.

Rondeletius ad vlcera exſiccanda, poſt ſufficientem deterſionem, nihil efficacius eſſe teſtatur ſuffumigio, quod partes illas profundas attingit & ſiccet; idque parandum eſſe docet ex potentiffimè reſiccantibus, vt auripigmento & cinnabari, quibus addenda ſunt aliqua oderata, ex quibus fuligo excitatur, & vlcera ſiccantur, vt myrrha, thus, maſtiche, benioinum, &c. quæ in hanc formam reduci poſſunt.

℞. Ladani puri, hypociftidos, maſtich. myrrhæ, an. ʒ. iij. ſtyracis rubræ, & calamitæ, cortic. thuris, ſandara-cæ, auripigmenti, ana ʒ. ij. Excipiantur omnia terebinthinâ, & fiant trochiſci, quibus ſufficiatur æger ſerò & nè in cubiculo.

Optimum etiam eſt parare candelas ex cera rubra; nam fuligo talis candelæ narium vlcera potenter exſiccet; maximè ſi æger contineatur in cubiculo benè clauſo & anguſto. Quòd autem fuligo recipiatur, idem experimur ( inquit Rondeletius ) cùm diutiùs in ſtudioſo moram trahimus noctu: nam poſteà ſputum & excrementa narium fuligine illâ denigrata redduntur. Deindo hæc addit. *Hac ratione nos vlcus curauimus, quod neque ab Italis, neque à Gallis Medicis curari potuerat.*

## C A P V T II.

*De Sarcomate, & Polypo.*

**N**arium vlceribus excreſcentiæ carneæ interdum ſuperueniunt, quæ aliud morbi genus, nempe tumorem præter naturam conſtituunt. Earum autem du-

plex est differentia, quarum vna Sarcoma nominatur, altera verò Polypus.

Sarcoma est excreſcentia carnea in naribus genita, certâ figurâ carens, & vlcerum, quæ partibus externis adueniunt, hyperſarcoſi quàm ſimillima.

Polypus verò est excreſcentia carnea, radicibus exilibus adhærens, in latum ſeſe porrigens, & ad inferiores narium partes propendens, ita vt polypi piſcis ſpeciem referat, vnde nomen ſortitus eſt. Rhafis narium hæmorrhoidas appellat; quoniam hæmorrhoidibus, quæ in ano ſuccreſcunt, quodammodo ſimiles ſunt. Hæc autem caruncula mollis eſt, modo alba, modo rubra, ac interdum liuida, & ſi multum excreſcat, aliquando extra nares propendet; ſi verò in ſummis narium partibus adnaſcatur, aliquando ad palatum propendet, & communes oris meatus obſtruit, & poſt vnam facilè conſpici poteſt, in aſtrina conſtitutione maximè inflatur, tum etiam in plenilunio. Tempore verò aquilonio & ſicciorre exiſtente, tum etiam in nouilunio plurimum imminuitur. In hoc etiam à ſarcomate differt, quod ſarcoma magis in imis narium partibus, quæ carnoſiores ſunt, ſolet ſuccreſcere; polypus verò in ſummis ac ſuperioribus, iuxta naſi radicem.

Vtriuſque tumoris cauſa eſt humor craſſus, viſcidus ac pituitoſus è cerebro defluens, cum aliqua ſanguinis portione admixtus. Aliquando humoris melancholici portio quædam admixta eſt, tuncque metus eſt ne in cancrum degeneret. Ex ſuperfluo tamen narium nutrimento, in carnem luxuriantem commutato, ſarcoma ſæpè generatur: idèd curatu facilis eſt.

Horum affectuum diagnoſis, ex his quæ dicta ſunt, facilè intelligitur, tum ipſis oculis per ſe patent.

Prognofis verò ita inſtituenda eſt, vt ſarcoma plerumque facilem curationem recipiat; polypus verò ad-

modum difficilem. Ille tamen qui mollis est, albus, vel ruber, vel colore ex albo & rubro composito præditus, facilius curatur; durus verò ac liuidus, difficillimè, & periculum est, ne in cancrum degeneret. Item qui in ima aut media narium parte residet, facilius curatur, qui verò in summa parte radicatur, difficilem curationem suscipit, quoniam remedia ad eam partem vix possunt pertingere.

Uterque affectus iisdem remediis curatur, quæ ad hunc scopum redigenda sunt, ut caro superflua auferatur, sed prius causa antecedens tollenda est, humor scilicet pituitosus à capite defluens, quod fiat victus ratione attenuante & exsiccante, vacuatione vniuersali, reuulsione, deriuatione, & capitis exsiccatione. Quæ omnia perficiuntur remediis in frigida cerebri intemperiei curatione propositis, cum Medici curantis prudentia usurpandis. Quamuis enim multi authores testentur decoctum guaiaci, cum victu exsiccante in hoc affectu plurimum sæpè contulisse, cauendum tamen est, ne calidi humores pituitæ admixti sint, eorum enim efferatione polypus in cancrum conuerti tandem posset.

Postmodum verò caro superflua absumenda est causticis medicamentis, vel ferramenti idoneis abscindenda, & vlcus relictum cicatrice obducendum. In principio tamen, dum adhuc morbus recens, solis astringentibus & validè exsiccantibus interdum curatio obtineri potest, & perpetuò mitiora illa remedia prius tentanda sunt, antequam ad vehementiora deueniatur.

Primo igitur tentandum est medicamentum, compositum ex tribus generibus malorum granatorum, à Galeno propositum *lib. 3. de comp. med. sec. loc. cap. 3.* quod sic habet. Accipantur tria mala granata, ex tribus generibus eorum, acidis scilicet, dulcibus, & mediis, eaque matura, ac recentia terantur simul in mor-

tario. Deinde succus exprimatur, & coquatur in lini-  
menti formam. Specillum ex lana, vel linteo confectum  
ex succo imbuatur, & frequenter in narem demittatur.  
Hoc remedium siccat & astringit sine morfu, & excre-  
mentitium humorem absorbit.

Sequens verò aqua eundem effectum præstat efficaciter.

℞. Vuarum immaturarum lb. ii. cortic. mali granati,  
balauſtorum, ſumach, ana lb. ij. Macerentur in aceto &  
deſtillentur, deinde adde aluminis lb. j. vitrioli ꝑ. ii. De-  
ſtillentur iterum omnia ſimul, & aqua illa tangantur  
partes internæ narium frequenter.

Si hæc non ſufficiant, ad potentiora veniendum eſt,  
& aquæ prædictæ ſandaracha & auripigmentum adii-  
cienda ſunt.

Vel ſpiritus vitrioli, aut aqua ſeparationis auri, quæ  
ſecunda vulgò nominatur, aqua plantaginis temperan-  
da eſt, iſſque polypus frequenter attingendus.

Vel illinatur aqua mercuriali in vlceris narium cura-  
tione deſcripta.

Vel immittatur turunda ſucco radicis ari imbuta, &  
ſi ſuccus acrior fuerit, aqua plantaginis etiam tempera-  
ri poterit.

Inter præcipua annumerari debet mercurius præcipi-  
tatus rubeus, qui ſi plurimis lotionibus dulcoretur, hy-  
perſarcoſim egregie absorbit, ſine vllo, aut exiguo dolo-  
re. Ille puluis cum melle roſaceo permiscendus eſt, eo-  
que intincta turunda in nares demittenda.

Emplaſtra etiam in hunc uſum reuocantur, quæ ſine  
inſigni dolore polypum abſumere valent, quorum for-  
mula talis eſſe poterit.

℞. Maſſæ emplaſtri de mucilaginibus ꝑ. ſ. pulueris  
fabinæ ꝑ. ij. Malaxentur, & incorporentur ſimul. Ex hac  
maſſa fiant cereoli debitæ magnitudinis, in nares im-  
mittendi. Vel

℞. Viridis aris, auripigmenti, vitrioli, aluminis crudiana ℥. j. β. antimonij ℥. vj. Macerentur in aceto; deinde exquisitè terantur, post siccentur, eadem triturâ, & maceratione oëties repetita; dein in aqua plantaginis denuò macerata siccentur. Postea recipe olei rosacei ℥. iiij. lithargyri ℥. ij. Nutriantur & coquantur; addendò sub finem coctionis, prædicti pulueris ℥. ij. Coque in emplastrum satis glutinosum, ex quo formentur cereoli, vt suprà.

In usu medicamentorum causticorum primò notandum est, ante eorum admotionem nares esse munien- das vnguento refrigerante Galeni, vel nutrito, vel po- puleo, vel oui albumine agitato cum oleo rosacco & similibus.

Secundò observandum est medicamenta caustica, nè nares lædant, per fistulam argenteam immitti posse, i a vt fistulæ extremitas polypum ambiat, atque ita medi- camenta ad eum conferri possint naribus intactis.

Tertiò notandum est dicta medicamenta descrescente luna esse usurpanda; tunc enim tumor admodum immi- nitur, & ita remedia facilius ad radicem vsque immitti possunt, cum tumor eorum introitum non impediat.

Denique si medicamentis polypus auferri nequeat, ad operationem chirurgicam veniendum est, quæ descri- bitur à Paulo Ægineta, Cornelio Celso, Hieronymo Fabricio ab Aquapendente, aliisque recentioribus.

### C A P V T III.

#### *De læsò olfactu.*

**O**lfactus, quænamadmodum & reliquæ omnes cor- poris actiones, tribus modis læditur; inanimatè,

abolitè, & deprauatè.

Imminuti & aboliti olfactus eadem sunt causæ, secundum magis & minus tantum differentes, intemperies scilicet, obstructio, & adstrictio.

Intemperies frigida & humida cum materia pituitosa coniuncta, ut quemlibet sensum obtundere nata est, sic olfactum in primis imminuit, aut abolet, unde in catarrho & coryza frequens esse solet huiusmodi olfactus læsio; frigiditas enim sensum imminuit, aut abolet, quatenus calorem natium, partis, actionum omnium opificem obtundit, ac debilitat.

Obstructio ab eodem humore pituitoso producitur, qui meatus tum sensiles, seu narium ductus, tum insensiles, seu poros ipsius cerebri, & processuum mamillarum replet, ut odores ad eas partes peruenire nequeant, potest etiam fieri à sarcomate, polypo & aliâ quâvis causâ, narium meatus replente & obturante.

Abstrictio etiam interdum potest contingere ab humore pituitoso in anteriore cerebri parte collecto, & processus mamillares comprimente, ut de visus immutatione à neruorum opticorum astrictione, à nobis dictum est. A natia etiam narium conformatione eadem astrictio potest contingere, si nimirum illæ ita depressæ & angustæ fuerint, ut liber odoribus aditus non pateat.

Deprauati olfactus causa est odor prauus nares continuo feriens, qui quidem, aut ex ulcere narium exhalat; aut putridâ pituitâ circa nares, vel os ethmoides contenta: nam quæ in ipso olfaciendi sensu, aut prope hunc intra meninges putrescunt, sensum ipsum haudquaquam feriunt, nec ea laborans, sed quiuis assidens apprehendit. Ut enim quippiam odoratum feriat, oportet aliunde ad ipsum sensum deferri. Potest etiam teter ac fœtidus vapor ab aliis partibus, ut ventriculo, gin-



giuis, & cerebro ipso ad processus mamillares exhalare; eosque ita inficere, vt omnes odores eò delati simili fœtore infecti appareant; quemadmodum linguâ bile amarâ infectâ existente, omnia quæ gustantur, sapore amaro prædita esse videntur.

Harum causarum quælibet satis facillè dignoscitur. Frigidam intemperiem, & pituitæ redundantiam ostendunt frigida & humida cerebri intemperies, & mucosâ pituita e cerebro stillans.

Obstructio verò, si à pituita originem duxerit, iisdem signis indicabitur. Si à sarcomate, vel polypo, ex propriis capitibus diagnosis erit desumenda.

Locus verò, in quo materia residet, obstructionem efficiens, dignoscitur ex eo, quòd si in narium meatibus hæserit, vocis oblæsiō contingit; quia nares ad vocem efformandam plurimum conferunt. Si verò anteriori cerebri parti, aut processibus mammillaribus dicta materia hæserit, vox integra permanet.

Odor prauus olfactus sensorium feriens, à qua parte ducat originem, ex proprio cuiusque vicio erit dignoscendum.

Quod ad prognosim attinet; olfactus læsiō recens, & à simplici coryza genita, facillè curatur; inueterata verò, & à confirmata intemperie proueniens, difficilè: quæ ex mala narium conformatione procedit, incurabilis est.

Curatio pro diuersitate causarum diuerso modo instituenda est. Si à frigida intemperie oriatur, ea remedia illi adhibenda sunt, quæ pro frigido catarrho proposita sunt.

Ad obstructionem verò ab eadem pituita, ductibus narium, aut processibus mammillaribus impacta, auferendam: partes illas expurgantia remedia usurpanda sunt, errhina nimirum, sternutatoria, & apophlegma.

tissimi; quæ etiam in frigida cerebri intemperiei curatione à nobis proposita sunt.

Si denique à sarcomate, aut polypo nares obstruantur, à præcedente capite eorum curatio erit desumenda.

## CAPVT IV.

### *De fœtore Narium.*

**N**arium fœtor, & fœtor anhelitus valdè differunt inter se; ille enim ex naribus tantum prodit, hic verò ex variis partibus, ventriculo nimirum pulmone, gingivis, aut faucibus ulceratis, quæ vel sensu ipso, vel propriis signis discerni possunt.

At narium fœtor ex putridis vaporibus, vel in naribus ipsis genitis, ut in ozena, sarcomate, aut polypo putrefactis; vel ad nares transmissis, ex humoribus putridis in ipso cerebro, & parte illius anteriore, vel circa processus mammillares, aut os cribrosum contentis. Putrescunt autem humores pituitosi in dictis partibus, quando in iis præter modum retinentur, præsertim si calida & humida cerebri temperies accesserit. Retinentur verò propter obstructionem earum partium, aut constrictionem nimiam, ut in simis & depressioribus contingit.

Narium affectus talem fœtorem producentes propriis signis supra propositis dignoscantur, quorum si nullus adfuerit, ab humore putrido in ipso cerebro, aut processibus mammillaribus, aut osse cribroso, contento, gravem illum odorem provenire coniiciendum erit.

Prognosis fœtoris narium, qui ab ulcere, polypo, aut sarcomate promanat, ex eorum prognosi dependet.

Qui verò à corruptis humoribus in cerebri anteriori parte contentis exoritur ; si recens fuerit, facile curatur ; si inueteratus , incurabilis est, maximè si à mala narium conformatione , nempè simitate , & depreffione nimia contingat.

Curatio perficitur caufarum ablatione, & symptomaticis lenitione.

Vlceris, sarcomatis, & polypi curatio suprà posita est. Humor verò putridus incerebro, processibus mammillaribus, aut ossè ethmoide contentus, vacuantibus, & abstergentibus auferendus erit.

Ac primùm euacuationes vniuersales instituendæ sunt, quæ totum corpus, & ipsum cerebrum ab excrementis pituitosis liberent, per apozemata, pilulas, & alia id genus ; quibus, si magna humorum saburra redundare videatur, diætâ sudorifica addi poterit. Mox errhina abstergentia , & materiam coniunctam educentia erunt administranda.

Ac primùm manè & vesperi, è vola manus vinum album attrahatur, in quo centaurium minus, & calamentum incoctum fuerit.

Deinde betæ succus cum aqua maioranæ extractus, loco prædicti attrahatur. Vel

℞. Rad. cyper & calami aromat. ana ℥. ss. rosar. rubr. P. j. myrrhæ ℥. ij. Coquantur cum vino albo pro errhino.

Ad potentiùs pituitam ex alto eliciendam, sequens componi poterit.

℞. Rad. ireos Flor. ℥. ss. ellebori albi, piperis longi, an. ʒ. ss. sem. anisi & maioranæ siccæ puluer. ana ʒ. j. euphorbij ʒ. j. ol. nardini, cheirini & violac. ana quantum fatis. Fiat vnguentum molle, ex quo intincta minimi digiti extremitate fricentur nares internæ, vel turundâ, aut alio linamento lentis magnitudine in nares immittatur.

Denique ad foetidum odorem fallendum, suaucolentia naribus sæpè attrahenda sunt, vt gallia moschata in vino odore dissoluta; aqua angelica, & alia huiusmodi.

## C A P V T V.

### *De Coryza.*

**C**Oryza, quæ & grauedo à Latinis nominatur, est catarrhi species, in qua fluxio è cerebro in nares defluit. Illa autem defluxio est humoris crudi in anterioribus cerebri ventriculis contenti, qui à causa plerumque externa concitatur, æstu Solis, nimirum, vini potu largiori, balneo calidiori, & similibus: quæ pituitam in cerebro collectam funderè, ac liquare possunt. Fit etiam à causis externis cerebrum refrigerantibus: comprimitur enim tunc temporis spongiæ instar, & humorem in se contentum ad partes subiectas amandat. Tum etiam cerebri refrigeratione nouus fit pituitæ prouentus: illud enim caloris penuria malè concoquit alimentum, vnde plurimi excrementi prouentus, quod à facultate expultrice per vias patentes excluditur.

Affectus iste per se patet: in eo enim plurimus humor per nares excernitur.

Inter reliquas catarrhi species, quæ in nares fit leuissima & tutissima est, ac citò curatur, si recens fuerit, & à causa externa concitata. Quæ verò diuturna est, à contumaci cerebri intemperie oriunda, difficilè curatur. Tum etiam, si à calida hepatis intemperie producat, quæ non rarò catarrhos calidos & acres inuehit, à quibus nares sæpè exulcerantur; aliosque affectus graues patiuntur.

Curatio huius affectus à catarrhi curatione desumenda est. Eisdem enim euacuationes, reuulsiones, & derivationes postulat. Nisi quod errhina hîc vsurpanda non sunt, ne nimium ad partem affectam attrahat, sed apoplegmatisimi, & masticatoria post vniuersalia maximè conuenient.

Ac præter dicta remedia, authores nonnulla commendât, quæ coryzæ compescendæ peculiariter conueniunt, vt vapor decocti maioranæ naribus exceptus, vel aqua maioranæ naribus excepta. Vapor aceti in ferream laminam candentem infusi ad idem confert, idque efficaciùs, si in aceto rosæ rubræ priùs infundantur.

Si fluxio valdè frigida fuerit, suffitus sicci ex nigella, thure, aliisque in prunas coniectis erunt vtilissimi: his enim frigida cerebri intemperies corrigitur, & superflua humiditas absorbitur.

---

## C A P V T VI.

### *De Sternutatione.*

**L**icet Sternutatio in statu sano sæpius contingat, & ita levis affectio vt plurimum esse soleat, vt symptomaticis nomen non mereatur. Aliquando tamen ita molesta efficitur, vt Medici curantis opem desideret, quemadmodum apud Forestum videre est, qui *observatione* 127. lib. 10. historiam proponit cuiusdam ancillæ, quæ ita grauem & molestantem ex catarrho acri & salso sternutationem patiebatur, vt ad plurimum Medicorum opem confugiendum fuerit. Idem confirmat vetus consuetudo sternutantibus benè peccandi, quam nonnulli inde ortam existimant, quod Gregorij Magni temporibus morbus epidemicus læuierit, in quo ægro-

tantes sternuando moriebantur; quamvis alij antiquiorem esse illam consuetudinem asseuerent.

Est igitur sternutatio cerebri motus velox, quo per nares confertim actō spiritu, molesta excernere conatur. Per cerebrum autem non solum cerebri substantiam, sed totum aggregatum ex eo, & eius membranis intelligimus, præcipue anterioribus, quæ in primis in hoc affectu contrahuntur. Quod ex eo licet colligere, quòd dum caput attollimus, facilius sternuimus: tunc enim materia irritans, quæ vtplurimum vaporosa est, & sursum sua natura fertur, facilius ad illam partem derfertur.

Ille autem motus qui in sternutatione contingit, ad cerebri & membranarum facultatem expultricem naturalem spectat, iuxta Galeni doctrinam 2. *de sympt. caus.* cap. 1. ubi distinguens sternutamentum à tremore & palpitatione, dicit palpitationem à solo morbo fieri, tremorem verò à natura & morbo; sternutationem verò à sola natura.

Sibi tamen prima fronte contradicere videtur Galenus, qui cap. 4. *eiusdem libri*, tussim & sternutationem voluntariæ facultatis symptomata esse dicit. Nulla tamen contradictio est, seque ab ea diserte liberat Galenus, innuens facultatem animalem in sternutamento concurrere tantum secundariò, quòd videlicet in sternutamento è capite, & à pulmone spiritus emittatur; attramen caput pectori principium motus tradere.

Cùm enim quæ in naso offendunt, persequi prope-  
rat, vtrisque emittendi spiritus viis simul vtitur, altera quidem, quam ipsum per se facit, altera quam per nervos, veluti per quædam longa brachia, quæ in pectus descendant: vnde idem Galenus *comm. Aph.* § 1. *sect.* 7. docet antecedente inspiratione sternutamentum fieri, natura aggregante aëtis copiam ad sternutatio-

nem. Tunc enim aër, qui è pectore egreditur, coniunctus ei qui per nares ad cerebrum attrahitur, quidquid narium membrani exquisito sensu donatis, molestum est, cum impetu & sono explodit.

Ex hoc etiam Galeni loco colligitur, irritationem sternutationem excitantem, in naso potissimum fieri; quod etiam confirmatur aliâ sententiâ, quæ habetur in *comment. Aph. § 1. lib. 7. vbi, soli, inquit, ex his ita affectis illi sternutant, quibus mordax est ea quæ à capite fluit humiditas; seu & si quid mordax naribus imponas. Sicut enim tussis motus quidem naturalis est, ad expurgandas eas quæ sunt in pulmone, aspersas arterias; sic & sternutamentum manifestè videtur expurgare narium meatus.*

Verum obiici potest, quò multi caput nudantes, aut alio quouis modo aëri frigido exponentes, sternutamentum illicò patiuntur, ut videatur tunc temporis cerebrum immediatè irritari. Respondendum est, aërem frigidum esse causam sternutationis, non dum in cerebrum immediatè agit, sed quia cerebrum eiusque membranas exprimendo, in causa est, ut acris materia ad nares descendat. Quamvis igitur in hoc symptomate, cerebri membranae possint etiam irritari; non priùs tamen sternutatio promouetur, quàm noxa ad narium membranam, quæ exquisitissimo sensu prædita est, peruenit.

Causæ sternutamenti ex dictis colligi possunt, quæcumque nimirum tunicam narium internam irritare possunt; quales sunt humores, aut vapores acres, vel à cerebro delabentes, vel à partibus inferioribus transmissi; unde, in febribus interdum sternutationes contingunt, ut ait Auicenna, quia vapores acres à toto in caput transferuntur; vel exterius in nares acris immituntur, quemadmodum medicamenti acrimoniâ præ-

*ficæ vacuatio.* Ad pituitam verò in bronchiis pulmonum contentam, potenter expellendam, quæ tussi reiici non potuerat, sternutamentum conferre docet Gal. 2. de *symp. caus. cap. 5. & 6.*

Curatio, quando necessaria est, dum scilicet sternutatio alia infert incommoda, perficitur; primò causarum externarum amotione, si ab iis excitetur. Si verò fiat à causa interna, illa etiam auferenda est, euacuantibus, reuellentibus, deriuantibus & discutientibus remediis.

Si itaque calida cerebri, aut alterius partis intemperies, vapores acres ad nares & interiores cerebri meninges transmittat, venæ sectio celebranda est, mox purgatio idonea instituenda. Deinde vapores illi reuellantur frictionibus & ligaturis extremorum cucurbitulis scapulis admotis; tum reliqua reuellentia, deriuantia, & discutientia vsurpentur, caput pectinetur, aures vellentur, oculi confricentur, nares emungantur, spiritus cohibeatur.

Ad acrimoniam denique demulcendam, & narium irritationem compescendam, vtile erit aquæ tepidæ vaporem naribus excipere, vel easdem oleo violaceo, rosaceo, amygdal. dulcium, aut butyro recenti illinire, vel lac tepens naribus attrahere; quo solo remedio Forestus ancillam à graui sternutatione, in principio huius capitis propositâ, confestim liberauit.



## CAPVT VII.

*De Hamorrhagia narium.*

**H**æmorrhagiæ nomen quemlibet sanguinis fluxum à quacumque parte profluentis vulgò significat. Peculiariter tamen, quando simpliciter abique vlla partis affectæ mentione enunciatum ab Hippocrate, id tantum profluuium significat, quod è naribus fit, tanquam speciem primariam, & euentissimam; vt annotauit Galenus *com. 1. in Epid.*

Est autem hæmorrhagia narium, symptoma in excretis eorum quæ sunt toto genere præter naturam. Sanguis autem per nares effluens, aut à venis & arteriis cerebri basim perreptantibus effunditur, aut à vasis è palato ad nares descendantibus, quæ sunt instar venarum hæmorrhoidalium in ano & vtero.

Cùm verò omne symptoma pendeat à morbo; tanquam à causa proxima & immediatà, huius causa erit morbus organicus, vel communis. Organicus duplex est, vasorum apertio, quæ αἰσώμωσις Græcis dicitur, & rarefactio διαπῆδνωσις appellatà. Communis etiam duplex, eorundem vasorum ruptio, quæ ρήξις nominatur; & erosio, διαβρωσις appellatà.

Causæ istos morbos immediatè producentes sunt, sanguinis quantitas, vel qualitas excedens. Sanguis quantitate peccans, venas rumpere, aut orificia illarum aperire potis est. Idem verò qualitate peccans; si nimirum calidior tenuiorque sit, per anastomosim effluere potest, quia calor orificia dilatat, & tenuitas efficit, vt facilius effluere possit. Eadem qualitates diapedesim etiam efficiunt: Calor enim rarefacit tunicas vasorum,

forum, & sanguinis tenuitas efficit, vt per poros earum tunicarum transfluere possit. Sanguinis denique acrimonia venarum tunicas erodit & exulcerat, & diabrosim parit.

Causæ etiam externæ ad horum morborum productionem concurrunt, mediâtè, vel immediâtè. Immediâtè id præstant casus, ictus, vulnus, & alia id genus, quæ venas rumpere, aut diuidere valent. Mediâtè verò operantur, quæcumque sanguinem multiplicare, calefacere, aut attenuare possunt; vt victus plenior, & crapula, otium, aut exercitia nimia, magnus clamor, æstus, longa in sole mora, & alia quamplurima.

Hæmorrhagiæ differentiæ ex eo desumuntur, quòd alia critica est, alia symptomatica, critica fit in febribus acutis, vi naturæ causam morbificam per has vias expellere conantis: præsertim in iis, quæ visceris alicuius inflammationi coniunctæ sunt, ac in primis hepatis & lienis, quæ per has vias sæpissimè solvuntur. Fit etiam interdum sine febre, naturâ sese à superfluo sanguine exonerante; vnde vidimus quamplurimos ætate iuuenili periodicam hæmorrhagiam pati, alios etiam per alias vias sanguinem vtiliter effundere.

Symptomatica verò in morbis chronicis præcipuè contingit, in quibus sanguis vitiosus ab hepate debili, & insigni aliqua intemperie laborante producitur; qui vel ob retentricis facultatis imbecillitatem, per venas illas effluit; vel ab expultrice reiicitur, tanquam onus inutile, cum sanguis impurus & vitiosus corpori alendo idoneus non sit.

Cognoscitur per se ipsa hæmorrhagia. Causæ verò illius hoc modo distinguuntur. Ea quidem quæ fit per ἀνατόμωσιν, hoc habet commune cum ea, quæ per πνέξιν, quòd in vtraque sanguis copiosè fluat; sed in eo distinguuntur, quòd si præcesserit ictus, vel casus, πνέξιν po-

tiùs adesse coniiciendum est. Cùm tamen à plethora & sanguinis multitudine ruptio & apertio vasorum possit contingere, ita distingui possunt; quòd rupto vase sanguis continuò effluat, aperto verò tantùm per interualla: quia vasorum orificia constringi solent, quando humoris copia dilataans ad ea minùs confluit; vasa autem rupta, semper aperta manent; & idèò sanguis continuò effluit, donec solutio continui in iis facta iterùm vniatur. Præterea distinguitur apertio vasorum à ruptione, ex ipsius sanguinis substantia. Si enim tenuis sit, ab apertis vasis potius; si crassus, à disruptis emanat. Hinc fit, vt hæmorrhagia plerumque in inuenibus à vasorum apertione fiat, quia sanguinem habent tenuiorem; in senibus verò à ruptione, quia crassiorem obtinuerunt.

Si à venarum erosione fiat hæmorrhagia; adsunt signa cacochymia, vlcerisve, & pus aut sanies interdum egreditur, aut saltem catharrhus falsus præcessit. Si per *διανήδου* effluat sanguis, ille tenuis est, & admodum paucus.

Causæ verò antecedentes & externæ faciliè distinguuntur. Si enim à copia sanguinis hæmorrhagia contingat, adest rubor in facie, & tensio venarum: tum etiam præcessit victus largior & calidior, aut causa aliqua externa fundens & attenuans sanguinem: hæc autem præcipuè contingunt iis, qui calidiori hepate prædicti sunt.

Si à cacochymia affectus proueniat, illa propriis signis distinguetur, quæ bilem, aut melancholiam redundantem ostendunt; propterea sanguis effluens, aut per venam brachij detractus, corruptus, aut prauâ qualitate infectus apparebit.

Si à retentricis facultatis imbecillitate hæmorrhagia contingat, pallidus faciei color, & totius corporis debilitas apparet; tum etiam affectus aliquis præcessit, à quo

hepar in primis debilitatum est; ac denique sanguis paucus & per intervalla effluit.

Si sanguis è venis narium immediatè effluat, astringentibus remediis naribus admotis, faciliè sedatur, & nullibi capitis dolor percipitur. Contra verò, si à cerebro profluat, in aliqua capitis parte determinata dolor percipitur, fluxus difficile sedatur, & in naso posita nihil conferunt. Ab aliis etiam partibus sanguis interdum profluit, vt hepate, liene, vtero; quarum indicia dabunt dolores & tensiones circa eas sem partes.

Si sanguis fluat ab arteria, cum impetu egreditur, calidus est, purus floridus & rutilans; ex vena verò rubens in fuscum tendens, crassus interdum impurus, & cum paruo impetu egreditur.

Prognosis imminentis hæmorrhagiæ, præcipuè critica, ab actionibus læsis, excrementis & qualitatibus mutatis desumitur; sicque futuram hæmorrhagiam indicant insomnia, & imagines rerum rubrarum; capitis & cervicis dolor subinde ortus, temporum granitas, & pulsatio magna in arteriis illorum; tinnitus, vel sonitus aurium, oculorum hebetudo, & matmaryges illis obseruantes, rubor eorundem, ac totius ferè faciei; lucis auersio, lacrymæ inuoluntariæ, pruritus nasi sanguinis stilla die indice, spirandi difficultas, tensio hypochondriorum sine dolore.

Quorum signorum ratio talis est. Quando sanguis ad caput deferri incipit, patit in cerebro phantasmata rerum rubrarum, tum per insomnia, tum etiam inter vigilandum; vt iuueni Romano contingit, cuius mentionem facit Gal. *lib. de presagitione ad Posthumum cap. 12.* Is enim morbo acuto laborans, rubrum serpentem, ad cubiculi laquaria oberrantem videre visus est, quo perterritus, è lecto subinde exiliis. Vnde Gal. aduentantè hæmorrhagiam prædixit, & sanguinis missionem im-

pediuit, quam alij Medici præscripserant. Dolor capitis, & ceruicis ex eadem sanguinis translatione ad partes superiores exoritur, qui membranas diuellens distendensque, doloris sensum parit. Pulsant autem arteriæ temporum extraotdinario motu, propter earum compressionem, quæ à venarum repletionem fit. Aurium tinnitus fit ex vaporibus, ad cerebrum magnâ copiâ tendentibus. Visus hebetudo fit, quia copiosi & crassi vapores ad superiora elati, meatus obstruunt, vnde fit, vt denegato aditu spiritui animali, hebescat visus. Marmariges oculis obseruantes, nihil aliud sunt, quàm tenuia quædam, & diuulsa corpuscula variorum colorum, intra corneam tunicam, & crystalloidem contenta, ex vaporibus sursum elatis producta; quælicet interiorius sint, exteriorius tamen posita, deceptione visus apparent; quandoquidem oculus externæ assuetus visioni, quæcumque intus sunt, extrâ esse iudicat. Rubor faciei & oculorum, sanguine fit, qui maiori copia ad illas partes cumulat. Lucis auersio ex eo proficiscitur, quòd distenti oculi humorum copiâ, ex nimia luce magis distenduntur; quia lux disgregat spiritus, vnde oculi dilatatio, ex qua dolor consequitur, quem vt euitent agrotantes, lucem fugiunt. Lachrymæ inuoluntariæ fiunt ex repletionem oculorum, & partium adiacentium, quæ præter modum distentæ comprimunt glandulas illas humorem continentes, ex quo lachrymæ generantur. Pruritus narium fit ex vaporibus sursum ascendentibus, & nares vellicantibus. Sanguinis stilla die indice apparens, v. g. quarto, vel vndecimo ostendit futuram hæmorrhagia die iudicatorio, nempe septimo, vel decimoquarto, quia diebus iudicibus natura incipit transfere humores ad eas partes. Difficilis redditur respiratio, quia dum sanguis ad superiora transfertur, diaphragma comprimit. Ten-

sio denique hypochondriorum fit, quia sanguis in suo fonte, & radicibus venarum moueri incipit; sed fugax est ea distensio, & sine dolore, quemadmodum & difficilis respiratio; si enim diutius & contumaciter perseuerarent, signa essent potius hepatis inflammati.

Præsentis verò hæmorrhagiæ prognosis ita instituenda est.

Sanguis è naribus die critico moderatâ quantitate fluens, salutaris. Quamuis hæc sententia à Galeno sæpius inculcata sit, illi tamen Fernelius reluctatur *lib. 2. de sanguinis missione cap. 1.* dicens nullum sanguinis profluuium, licet criticum; salubre esse. Quoniam licet deliria, vigilias, capitis dolorem, & reliqua symptomata demulceat, vix tamen morbum penitus euellit, quia sanguinis portio purior emittitur, impuriori remanente. Idque ex eo probatur, quod sanguis ex nare profluens colore & substantiâ laudabilis apparet; cum sanguis eodem tempore è vena detractus, impurus & corruptus appareat.

Speciosa quidem est hæc Fernelij doctrina, non tamen absolute recipienda. Verum quidem est in plurimis morbis acutis, præcipue verò in febribus malignis, hæmorrhagiam sæpè morbum penitus non soluere, quemadmodum nec sudores in iisdem febribus perpetuò salutares sunt; quia tales euacuationes à natura irritata ante tempus, materiæ morbificæ malitia plerumque fiunt. Attamen non rarò morbi acuti hæmorrhagia soluuntur, vt docuit Gal. *lib. 3. de crisi cap. ultimo*, & passim alibi. Quod autem sanguis per nares excretus, purus semper appareat, ratio inde desumitur; quod nimirum ille guttatim effluat, sicque statim refrigeretur, vt partes impuræ separari nequeant, & illæ puriores partes reliquis permixtæ rubrum colorem toti massæ concilient. Sanguis verò è brachio detractus, quia affa-

tim effluit, calorem in vasculo diu retinet, à quo partes impuræ separantur; itavt crassa & fœculenta fundum petat; biliosa verò & pituitosa, quæ magis alterata, & impurior est, supernatet, & ita sanguis impurus, ac sordidus appareat. Contrà verò, si sanguis è brachio guttatim effluat, purus apparebit, quia citò concrefcit, antequam partes heterogeneæ à calore secerni potuerint. Imò verò sanguis copiosè effluens, si in pelui latiore recipiatur, purus etiam apparet, quia citò refrigeratur.

Hæmorrhagiæ nimis copiosæ & vehementes pessimæ: nam ad consuersionem deferunt. Fit enim aliquando, vt natura copia sanguinis grauata; & ad excretionem concitata, modum tenere nequeat, & supercrisim efficiat, quam Medici sæpè cohibere coguntur.

Hæmorrhagia in principio morbi, mala, quia symptomatrica est, & fit natura antetempus irritata ad excretionem, à materiæ morbificæ malitia.

Hæmorrhagia quæ è directò partis affectæ accidit, bona, contra verò, mala: sic in hepatis inflammatione, sanguine effluens è nare dextra, bonus, è sinistra verò, malus. Contrà, liene inflammato, è sinistra bonus, è dextra verò malus; quia omnis bona euacuatio *nar'* *iz* debet fieri.

Stillæ sanguinis paucae per nares effluentes, malæ: Significant enim naturæ imbecillitatem & malignitatem morbi. Omnis siquidem excretio in morbis acutis, quæ inchoatur tantum, & non perficitur, maximè damnatur ab Hippocr. quia maior est securitas in febribus, in quibus natura nihil excernit, quam in quibus pauca & inutilia, siquidem coctioni esse intentam tunc temporis arguitur. Quòd si stilla appareat, signum est antetempus naturam irritari Stilla tamen die indice prodiens, signis concoctionis vtcumque apparenti-

bus, futuram crîsim per hæmorrhagiam die critico significat.

Hæmorrhagiæ longo tempore perdurantes, hepatis imbecillitatem, & refrigerationem, & inde cachexiam atque hydropem portendunt.

Quibus in febribus quartanis sanguis è naribus fluxerit, prauum, Hip. *Aph.* 87. *sect.* 7. quia, vt docet Auic. sanguinis fluxus in melancholicis & pituitosis, noxius, ab eo enim magis refrigerantur.

Quibus febricantibus sanguinis fluxerit multitudo, quacumque ex parte, cum reficiuntur, alui iis humectantur, Hipp. *Aph.* 27. *sect.* 4. quia, vt docet Gal. in com. calore nativo debilitato ex profluuiò sanguinis, neque cibi benè concoqui, neque in sanguinem transmutari, neque distribui possunt per corpus; & propterea aluos fieri humidiores par est, donec processu temporis vires suas natura recuperarit.

In hæmorrhagiæ curatione, primùm aduertendum est, an illa critica sit, vel symptomatica. Critica enim cohibenda non est, sed ad sanguinem quantitatem sanguis fluere permittendus. Ait enim Auicenna, sanguinem è naribus interdum criticâ expulsiõe ad libras quatuor sine virium insigni lapsu profluxisse. Idque videtur desumptum à Gal. qui *lib. de præcogn. ad Posth. c.* 13. iuueni Romano hæmorrhagiâ correpto sanguinem fluere permisit ad libras quatuor cum dimidia, priusquam remedia fluxum cohibentia vsurparet.

Quod quidem, vt in valdè plethoricis corporibus aliquando vtiliter contingere, ita in aliis vitæ periculum inferre potest; & certum est criticam hæmorrhagiam, quantumvis operâ naturæ fiat modum non tarò excedere. Natura siquidem sanguinis multitudine grauata, & ad illius expulsionem excitata modum aliquando tenere non potest, niniàmque euacuationem facit; vnde



maximam virium deiectionem , & mortem metuere oportet : & tunc cohibenda est, quoties nimirum ex ea notabilis virium infirmitas prodierit.

Sic etiam sanguis , qui sine febre , ex consuetudine fluit , cohibendus non est , sed naturæ arbitrio relinquendus , nisi immoderatio fuerit ; multi enim per huiusmodi hæmorrhagias periodicas , à grauissimis morbis immunes fiunt , in quos earum suppressione incidere consueverunt.

Symptomatica verò hæmorrhagia cohibenda est. Quod fiet sanguinem ad nares confluentem reuellendo , ab iisdem , & vicinis partibus repellendo , venas apertas occludendo , sanguinis modum præposterum inhibendo , & humores aciores , aut tenuiores , sanguini permixtos , hæmorrhagiæ causas præcipuas , euacuando , corrigendo , eorumque generationem prohibendo , & facultatem retentricem hepatis & venarum roborando. Quæ omnia sequentibus Præsidii præstari poterunt.

Ac primum sanguinis missio inter reuulsoria remedia principem locum obtinet ; quæ maturè celebranda est , antequam vires admodum debiles euaserint , idque è vena brachij è directo partis , à qua sanguis profluit , dextri nimirum , si è nare dextra ; vel sinistri , si è sinistra sanguis emanauerit. Et Galen. *lib. de sang. miss. cap. 11.* huius remedij efficaciam confirmat , asserens se validas sanguinis è naribus fluxiones repente venæ sectione sedasse. Debet autem detrahi sanguis & satis largâ manu , si vires ferant , & amplo foramine : Quamuis maxima Medicorum tum antiquorum , tum neotericorum pars aliter censeat ; qui angusto foramine , & exiguâ quantitate sæpius repetita , sanguinem detrahendum esse censent , sicque reuulsionem melius fieri. Nam vt sanguini motus contrarius concilietur , vehementiori motu agitandus est , siquidem motus vehe-

mentior debiliorem rapit ; ideò quò ampliori foramine , & magis confertim sanguis effluit per venam sectam , cò promptius è naribus profluentem sanguinem abducit ; ita vt non rarò hæmorrhagia vehemens, phlebotomiâ hoc modo celebratâ , sine phletora in instanti fuerit cohibita. Attamen si unicâ phlebotomiâ , aliisque remediis inferiùs describendis hæmorrhagia cohibita non sit , illa reiterari poterit pro virium modulo. Tum etiam vena pedis secari poterit , vt reuulsio fiat ad distantissima, quæ etiam sæpè plurimùm confert , vt testatur Auicenna, Paulus & Trallianus.

Post venæ sectionem, vel etiam ante ipsam, fient frictions & ligaturæ partium extremarum ; & cucurbitula satis magna hypochondrio admouenda, dextro, si à nare dextra ; sinistro verò , si à sinistra sanguis profluxerit. Galenus enim hæmorrhagiam cohibuit in iuvene Romano, cucurbitulâ hypochondrio admotâ , sine venæ sectione , vt ipse refert *lib. de præcognitione ad Posthumum cap. 13.*

Non est tamen vsquequaque tuta cucurbitularum applicatio hypochondriorum regioni. Sanguis enim tunc temporis effervescebat, ad hepar , aut lienem nimiam copiam attrahi potest , & inflammationem in iis partibus efficere. Cuius rei exemplum habetur apud Fabricium Hildanum *obs. 47. cent. 2.* de quodam aulico maximâ hæmorrhagiâ narium laborante , cui præter alia remedia, cucurbitulæ magnæ ad regionem hepatis admotæ sunt. Sanguis quidem substitit , sed inflammatio hepatis sequuta fuit. Cautè igitur agendum est in cucurbitularum admotione regioni hypochondriorum, & ad eam confugiendam non est , nisi reliquis remediis non conferentibus , & post iteratas phlebotomias. Copia enim sanguinis in venis imminuta, minus est periculum, ne sanguis nimia copia ad hepar attra-

hatur, ut inflammationem excitare valeat. Attamen quocumque modo applicentur cucurbitulae hypochondriorum regioni, sanguinem, & spiritus attrahunt ad illas partes, & sic calorem earum augent; quod aduersari videtur sententiae Hippocratis *Aph. 13. sect. 5.* Vbi in his vnde sanguis fluit, aut fluxurus est, frigidis vtendum esse praecipit. Interpretes autem volunt ad ea loca frigida esse admouenda, vnde motus sanguinis incipit, qualia sunt hepar & lien.

Forestus commendat cucurbitulas supra pedes, insigni experimento, quod habetur *obs. 14. lib. 13.* his verbis. *Vis generosus sanguinis narium profluuium cum extreme laboraret, neque remedia commodè adhibita iuuarent, circiter duodecim libra sanguinis ex utraque nare per vires effluxere. Cum ad eum accitus essem, & per integrum diem sanguis effluxisset, ut duas ventosas absque scarificatione, unam supra hepatis regionem, alteram supra lienis locum ponere, mandavi quibus parum videbatur fluxus subsistere. Verum post meum discessum, uxor cum videret sanguinem iterum ex utraque nare cum impetu erumpere, & quod ventosa hypochondriis adhibita nullo modo iuuarent; alias duas, unam supra pedem dextrum, alteram supra sinistrum affigi iussit, & dictu mirum, sanguis praeter spem subito restrictus est. Verum cum aliquanto tempore ventosa cui adhererent, ager in animi deliquium incidit, quare iisdem ventosis detractis, aqua in faciem conspersa excitatus est; mox odore vini recreatus ad se rediit, & à fluxu sanguinis narium, miraculi aut incantamenti instar, praeter omnium spem, pristina sanitati restitutus est.*

Cucurbitulae etiam scapulis admotae, tum siccae, tum humidae fluentem sanguinem è naribus retrahunt. Attamen non est usquequaque tutum remedium. Possunt enim à partibus inferioribus ad superiores sanguinem

attrahere, & nouo fluxui occasionem præbere.

Quidam præctici cucurbitulas brachiis admovent supra musculum bicipitem quibus etiam sanguis ad nares profluens reuellitur.

Crato in consilijs, inter reuulsoria remedia proponit incuruationem digiti minimi, in dextra manu, si ex dextra nare fluit; vel in sinistra, si è sinistra. Cum enim vehemens illa compressio intensum dolorem pariat, ab illo dolore sanguinis retractio fieri potest.

Sed multò potentiùs sanguis & spiritus ad interiora retrahuntur per animi deliquium, cuius interuentu contumacissimam hæmorrhagiam curatam vidimus in Illustrissimo Episcopo Lodouensi, anno 1629. qui febre maligna laborans, cum renis dextri inflammatione, quæ postmodum in abscessum abiit die 27. morbi, tam vehementi correptus est hæmorrhagia, vt intra quatuor horas sanguinis libras duas excreuerit, & cum adhuc sanguis affatim flueret, viresque collaberentur, de hæmorrhagia cohibenda cogitandum fuit, & in hunc finem multa remedia vsurpata. Quibus nihil proficientibus, æger se aluum deponere velle dixit, nec potuit cogi, vt in lecto deiceret. Præmonuimus, si electo surgeret cum tanta virium exolutione, fore vt in syncopem rueret, eam tamen syncopem cohibendæ hæmorrhagiæ futuram esse perutilem. Ita ferè successit, nam postquam surrexisset, animi deliquium passus, à quo statim excitatus est vino exhibito, & aqua frigida in faciem proiecta, postea copiosè deiecit, & postquam in lectum delatus fuisset, sanguis multo minori impetu fluebat, & exhibito sale prunellæ ad ʒ. j. ß. in aqua frigida dissoluto, statim sanguinis fluxus omnino fuit cohibitus, cum tamen antea idem remedium & quamplurima alia frustra in vsum reuocata fuissent.

Quamuis autem animi deliquium à vulgaribus practicis inter hæmorrhagiæ remedia non proponatur; habetur tamen apud Hipp. lib. 3. Epid. sect. 7. his verbis: *Sanguinis venarum suprefiones faciunt, animi deliquium, figura alterata, interceptio, linamentum intortum, appositio, deligatio.* Idem quoque docuit Gal. 5. meth. cap. 5. his verbis. Porro sanguis confluere prohibetur, & propter animi deliquium, & cum ad contraria reuelltur, & cum ad vicina deriuatur, & per refrigerationem tum corporis totius, tum verò præcipuè ipsius partis afflicta. Notandum tamen est, animi deliquium tantum conuenire, quando sanguis effluit è venis quæ ad corporis superficiem definunt, quod innuit Hippocr. dum eidem linamenta, deligatiqnes, & alia eiusmodi præscribit. Quando enim sanguis à partibus interioribus profluit, vt in hymoptoë, mensium fluxu immodico, aut vulneribus partium interiorum, tunc animi deliquium fluxum augere potest, retracto calore ad interiora, & ad eas partes, à quibus sanguis profluit.

Zacutus Lusitanus lib. 1. praxis admiranda obseru. 66. refert se desperatam hæmorrhagiam, & nullis aliis remediis cedentem, appposito cauterio actuali in vtraque planta pedum cohibuisse. Quod remedium similem successum habuisse refert in magna sanguinis excretionem per os, ex venæ raninæ apertione producta, quæ ab acri catarrho erosa fuerat, & cum per biduum sanguis ab libras viginti effluxisset, multaque emplastica, & astringentia parti admota fuissent, reuellentia & incrassantia remedia, tum etiam narcotica vsurpata, cauterio in eadem pedis parte indito, fluxus omnino cessauit.

Reuulsionibus prædictis aliquandiu vsurpatis, si fluxus nihilominus perseueret, ad ea remedia veniendum, quæ fluentem sanguinem repellunt, qualia sunt ea quæ

anacollemata vulgò nominantur, fronti & temporibus applicanda, quæ in hunc modum componi poterunt.

℥. Boli armenæ, terræ sigill sanguinis dracon. thuris, mastiches, & aloës, ana ʒ. j. farinæ volatilis, & pilori leporis minutim incis ana ʒ. ʒ. albumen oui num. j. succi plantag. & solani ana q. s. Fiat cataplasma fronti & temporibus applicandum.

In casu urgente, promptissime parari potest cataplasma ex bolo armena solo, cum albumine oui & aceto subacta, fronti ac temporibus appositum.

Efficacissimum etiam paratur cataplasma ex gypso cum aceto subacto, & ad crassitiem duorum digitorum fronti & temporibus admoto. Et si prima applicatio non succedat, iterabitur; & certò curare creditur.

Amatus Lusitanus laudat pileum ex dictis astringentibus cum oxycrato subactis, capitis raso appositum; quod in summa necessitate tentari poterit.

Fotus etiam fieri potest ex aqua valdè frigida, vel oxycrato fronti & temporibus, cum linteis frequenter immutatis, quamprimum scilicet calefacere incipiunt. Vel idem fotus fieri potest ex succo plantag. polygoni, equiseti, bursæ pastoris, & similium, addito aceto ad penetrationem.

Vbi notandum, caput non esse aqua frigida perfundendum, neque repellentia fronti adinouenda, donec reuulsiones sufficientes præcesserint; alioqui sanguis per refrigerantia intrò compulsus, venas quæ in alto sunt replebit, vt docet Gal. 5, meth. cap. 6. atque ita fluxus sanguinis augebitur, calore aucto per antiperistasm, à quo sanguinis motus & impetus adiuuatur; aut si sanguis retineatur, conuulsio, apoplexia, dyspnœa, aut alius quispiam grauis affectus excitari poterit.

Solum etiam acetum sanguinem fluentem cohibere

potest, si eo frons cum spongia foueatur.

Eadem spongia aceto imbuta, & in nares immissa ad idem est efficax.

Conspersio faciei aquâ frigidâ, non solum repellit sanguinem fluentem, sed etiam eundem retrahit ad interiora interuentu timoris, qui ex aqua frigida in faciem ex improviso injecta, exoritur. Quemadmodum enim syncope, vt antea dictum est, fluxum sanguinis cohibet, propter caloris retractionem ad interiora; eadem ratione timor, à quo similis retractio potest conducere. Atque ita, quocumque modo exciterur, conferre potest. Aqua autem frigida, satis magna copia, in faciem conijci debet, nempe ad duos, vel tres cyathos per breuia nterualla proiectos.

Vulgò etiam vsurpatur, ad sanguinis impetum ad superiora retundendum, illiusq; ascensum prohibendum fatus ceruicis, ex linteo aceto frigido imbuto, quod collo circumduci debet, & frequenter immutari, antequam incalêscat.

Idem oxycratum in ore detentum, & sæpè immutatum, sanguinem etiam ad partes superiores confluentem repellit; tum etiam impedit, ne sanguis è naribus ad gulam defluat, quod sæpè contingit.

Ad idem valet acetum instillatum in aurem, quæ nari fluenti vicina est, sic enim vena per quam fluit sanguis, restringitur.

Faba, aut numisma argentum radici narium inter cilia admotum, & fascia arctè alligatum, vt fortiter partem complimat, eundem fluxum cohibet. Tum etiam animaduertendum est, an in temporibus, aut fronte venæ aut arteriæ tumeant: tum enim eas numismate aliquo, aut faba sicca per medium in longitudinem secta comprimere, fascia interueniente, optimum & supremum remedium est. Ad maiorem compres-

sionem supra fabam aut numisma, albumen oui concussum, adiecto gypso & stupâ exceptum, admouendum est.

Vapor aceto, in laminam candentem affusi, naribus exceptus venas apertas constringit.

Ad idem confert oxycratum naribus frequenter attractum.

Præter repellentia dicta, in usum reuocanda sunt, quæ ipsas venas apertas occludere & conglutinare solent. In quem finem multa remedia in nares immitti consueuerunt.

Galemi lib. de paratu facilibus, cap. 13. thus & aloë in puluerem redacta albumine oui excipit, & cum lintecolo, aspersis prius pilis leporinis, in nares immittit.

Vel turunda in hunc modum parari potest.

℞. Thuris, aloës, sang. dracon. farinæ volatilis; telæ aranearum, & pilorum leporinorum minutim incisorum, ana ʒ. ʒ. Excipiantur succo plant. & gossipio, fiantque turundæ in nares frequenter immitteendæ.

Idem pulueres in nares insufflari poterunt. Cui etiam vsui maximè conferre testantur practici magni nominis cinerem testarum, ouorum, & chartarum. Verum, circa horum puluerum usum, obseruandum est, dum illi administrantur, os aqua frigida plenum esse debere, ne medicamentum ad os per palatum transferatur.

Potenter etiam sanguinem fluentem cohibet gossipium atramento infectum, quod in thecis scriptoriis asseruari solet, si aliquantulum expressum, & in turundæ figuram efformatum in nares immitatur.

Idem gossipium atramento imbutum, & fronti



admotum cum fasciâ, fluentem sanguinem potenter sistit.

Tandem hæmorrhagiâ prædictis remediis, tum etiam infra proponendis pertinaciter obistente, ad escharotica veniendum est, quæ venarum extremitates apertas comburendo crustam inducunt, & sanguinem inhibent. In iis tamen magna cautio adhibenda est, quia dum eschara decidit, vasorum apertio plerumque renouatur, & sic fluxus redintegrari solet.

Inter escharotica autem principem locum obtinet vitriolum vstum, quod præterquam quod escharam inducit, ad quemvis sanguinis fluxum cohibendum est efficacissimum.

Si initius remedium habere desideres, vitriolum aliis permiscendum est in hunc modum.

℞. Gallarum lb. β. aluminis quartarium j. Comburentur & calcinentur, fiatque pulvis in naris profundum demittendus. Vel

℞. Boli Armenæ, sang. dracon. thuris, aloës, gypsi, vitrioli vsti, sarcocollæ, mastiches, ana ʒ. j. Fiat pulvis subtilissimus.

Vitriolum album mitius operatur, quàm vitriolum vstum, neque valde escharoticum est: hæmorrhagiam tamen potenter cohibet, orificia venarum constringendo, si in nares cum turenda ex gossipio confecta, immitatur.

Remedia verò, quæ sanguinis motum cohibendo, refrigerando, incrassando, & veluti coagulando, hæmorrhagiam cohibent, in hunc modum præscribi possunt.

℞. Salis prunellæ ʒ. j. trochiscorum de carabe ʒ. β. lapidis hæmatitis, coralli rubri præparati, ana ʒ. j. syrupi de rosis siccis ʒ. j. aquæ plantag. ʒ. iiij. Fiat iulep. qui detur bis, aut ter in die.

℞. Con

℞. Conferuæ rosarum & miuæ cydoniorum, ana ʒ. j. trochiscor. de spodio & de terra sigillata, ana ʒ. j. coralli præparati & cornu cerui vsti, ana ʒ. j. Fiar opiatâ, de qua capiat ac magnitudinem castanæ bis, aut ter in die.

Oxycratam satis copiosè sumptum hæmorrhagiam efficaciter sedat.

Exterius verò, ad sanguinem refrigerandum, illiusque motum cohibendum, aqua frigida, vel oxycratum variis partibus applicanda sunt: sicque aqua frigida brachiis affundenda, pedes in aquam frigidam immergendi, testes oxycrato frigido fouendi, tum etiam dorsum, propterea quòd vena cava eam regionem occupat, & ita sanguis in ea feruens refrigeratur.

In maximo autem feruore sanguinis, qui prædictis cohiberi nequit, quidam practici totum corpus oxycrato irrigant, vel in balneum frigidum demittunt, quod tamen, iam debili ægro existente, periculo non vacat.

Optimum etiam est hepar & lienem epithemate refrigerante, vel etiam oxycrato tepido fouere, ad sanguinis ebullientis feruorem temperandum.

Denique in contumacissimo affectu, & aliis remediis non cedente, ad narcotica veniendum est, quæ omnem tum fluxionem, tum euacuationem, & quemcumque humoris motum citissimè cohibent, & inter cætera laudanum ad gr. iij. vel iiij. exhibitum, principem locum obtinet.

Cauendum tamen est, ne ægro valdè debili exhibeatur, periculum enim est, ne calor natiuus admodum debilis, narcoticâ vi omnino suffocetur.

Syrupus de papauere idem præstare poterit ad ʒ. j. in iulepo astringente, horâ somni exhibitus.

Tandem specifica remedia, quæ scilicet propriè tate occulta sanguinem fluentem cohibent, multa ab auto-

ribus proponuntur; quorum præcipua & frequente vſu comprobata ſunt, quæ ſequuntur.

Succus vrticæ miris laudibus effertur ad quemlibet ſanguinis fluxum ex quacumque parte prodeuntem, maximâ efficaciâ cohibendum; & ideò tum per os exhibetur ad ʒ.iiij. ſemel atque iterum; tum per nares attrahitur; tum fronti & temporibus admouetur, in formam cataplaſmatis cum farina ſubactus, vel tota vrtica contruſa dictis partibus admouetur. Nonnulli aſſerunt radicem vrticæ in ore detentam ſanguinis fluxum ſtatim conſtringere.

Fimus porcinus inter præſtantiffima ſpecifica etiam recenſetur, ſi adhuc calens fronti & temporibus admouetur; vel olfaciendus præbeatur; vel ſiccus in nares immittatur. Poſterioris formula talis eſſe poterit.

ʒ℥. Stercoris porcini exſiccati ʒ. iiij. pulueris roſar. ad foetorem auferendum ʒ. β. Excipiat ſucco plantag. in eoque intingatur bombax in nares immittendus.

Laudatur etiam ab authoribus ſtercus aſininum eodem modo uſurpatum, vt de porcino diximus. Ex narra Rodericus à Caſtro lib. 1. de morbis mulierum cap. 5. Medicum quendam ſeptuagenarium, hæmorrhagiæ maximè obnoxium, ſtercus aſininum modicè exſiccatum in capſula ſemper geſtare ſolitum; cui medicamento nulum aliud ſimile ſe reperiffè referebat, præſertim, ſi ſucco vrticæ commixtum, ſi ſiccum; aut recens per ſe nari- bus adhiberetur.

Zacutus Luſitanus lib. vlt. praxis Hiſtoriarum cap. 2. ſtupendam narium hæmorrhagiam, in ſeptuagenario excarni & debili, ſe hoc remedio curaſſè refert, qui reliqua remedia fruſtrà adminiſtrata fuerant, & ſeptemdecim ſanguinis libræ effluerant. Stercus itaque aſini-

num in exactissimum læuorem redactum omni iuri potuique permiscebat; eodem tabellas cum saccharo efformabat, ægróque edendas præbebat cum aqua chalybeata; quo auxilio solo, septem dierum spatio, æger à fluxu saluus euasit.

Sanguis per nares effluens non solum apud vulgus commendatur, sed etiam à quibusdam Medicis præstantissimis probatur, tanquam specifica vi hæmorrhagiam cohibens; cumque frigunt in sarragine, ægróque inscio edendum exhibent. Tum etiam ollâ figulinâ exustum, & in puluerem redactum, cataplasmatibus adstringentibus supra propositis admiscent.

Alij laudant puluerem limacum cum crusta combustorum; alij puluerem ranarum etiam combustarum, in nares immisum.

Refert Pereda vetulam quandam Monspessulanam, solâ menthâ naribus impositâ, sanguis profluuium è naribus trium dierum curauisse.

Inter cætera autem remedia præstantissimum est, & à nobis frequenti vsu expertum, spica nardi in tenuissimum puluerem redacta, & ad ʒ. j. cum iusculo, aqua plantaginis, aut alio liquore exhibita; non solum enim specifica vi, sed etiam hepar roborando, sanguinis fluxum cohibet.

Finkius testatur bufonem exsiccatum, & puluerisatum in sindone rubea, axillis suppositum, vel manibus retentum, ut incalescat, sanguinem statim figere, eumque velut Gorgonis conspecto capite statim rigescere. Alij bufonem sub dio suspendunt, donec caro vniuersa absumpta sit, os femoris denudatum seruant, idque nari inditum, hæmorrhagiam in instanti cohibere asserunt.

Dum remedia prædicta in vsum reuocantur, de omnimoda causæ oblatione cogitandum est; quæ utpluri-

mum esse solet, humor tenuis, serosus, aut biliosus in sanguine redundans, eique motum præposterum concilians, naturamque ad illius excretionem irritans; unde sit ut humore illo euacuato, & sanguine repurgato, natura eum tanquam amicissimum, & familiarissimum, ac vitæ thesaurum retineat, neque amplius excernat. Ided purgatio instituenda est, bis terve iterata, si opus fuerit, & purgantibus adstrictione præditis, & refrigerantibus composita, in hunc, aut similem modum.

℥. Tamarindor. ʒ. β. fol. plantag. M. j. Coquantur ad ʒ. iij. In colat. infunder habarbari electi ʒ. j. myrobalan. citrin. ʒ. β. spicæ nardi ʒ. vij. In express. diss. syrupi rosacei ʒ. j. rhabarb. pulu. ʒ. j. Fiat potio.

In affectu inueterato & frequenter recurrente, talis purgatio semel in septimana repetita erit efficacissima, & interim iulepi adstringentes post singulas purgationes, vel opiatæ per aliquot dies exhiberi poterunt. Opiata suprâ descripta hic vsui inferuiet. Iulepi verò in hunc modum concinnari poterunt.

℥. Radicum histortæ & consolidæ maioris, ana ʒ. j. fol. plantag. centinodæ, herniariæ, fumariæ, ana M. j. sem. 4. frigid. maior. ana ʒ. j. Coquantur ad lb. j. In colat. diss. sacchari albi ʒ. iij. Fiat. iulep. pro iij. dosibus matutinis.

Loco iuleporum vel opiatæ, aut post eorum vsum per aliquot dies continuatum, syrupus vsurpari poterit ex succo vrticæ cum saccharo partibus æqualibus compositus, & ad cochlearia duo, singulis diebus manè, exhibitus.

Neque sufficit causam hæmorrhagiæ præsentem auferre, scilicet peccantem humorem euacuare; sed etiam noua illius generatio impedienda est, viscera roboranda, eorumque intemperies corrigenda, præcipuè hepa-

tis, in quo humores illi generari consueverunt. Atque ita iulepi refrigerantes supra præscripti, huic vsui intertuent; tum etiam tinctura rosarum, ad hepar refrigerandum, & maxime roborandum efficacissima est. Exteriùs verò epithemata eidem parti admoueri possunt, in hunc modum composita.

℞. Aquæ rosar. plantag. portulacæ, acetosæ, cichor. ana ℥.iiij. sem. portulacæ, acetosæ, cichor. ana ʒ.j. trochiscor. de caphura & santali citrini, ana ʒ.ij. aceti ʒ.ij. Fiat epithema.

His etiam addi poterunt omnia remedia, quæ pro calida hepatis intemperie curanda, descripta sunt.

Interdum etiam calida lienis, aut renum intemperies, huic affectui præbet originem, & tunc refrigerantia medicamenta, his etiam partibus admouenda sunt.

His omnibus accedere debet idonea victus ratio, quæ ab ipso curationis principio sedulò instituenda; atque ita primùm aer in quo decumbit æger, frigidus sit, & si tempus sit æstiuum, alteretur, irrorando pavimentum aceto & aquâ rosaceâ, tum sternendo folia vitis, salicis, nymphææ, & similia.

Cibi sint incrassantes & pauci nutrimenti, ut pedes vituli, arietis, hædi, & aliorum animalium, oryza, caseus recens & pinguis, ova indurata, & similia. Fructus acerbiores, astringentes, aut aciduli ex vsu esse poterunt, ut pyra, cydonia, mespila, sorba, & condimenta ex succis granatorum, limonum, arantiorum, acetosæ. Quidam laudant vsum lentium in aceto decoctarum, quia astringendi & incrassandi sanguinis, eiusque acrimoniam retundendi viam obtinent. Abstineat æger, saltem in principio morbi, dum vires adhuc non sunt debiles, à vino carnis, & ovis sorbilibus & tremulis, quæ copiosorem & liquidiorum sanguinem generant.

Alimenta autem liquida præfente sanguinis fluxu, & forbilia, quantum fieri poteft, exhibenda funt; vt iufcula refrigerantia, hordeata, auenata, & oryzata, cum aqua, non iufculo parata. Masticatio enim hæmorrhagiam promouet. Si vires fint debiles, iufcula carniū, & panatellas exhibere oportet, in quibus amyllum fine calce paratum, aut gummi arabicum diffoluantur.

Potus fit aqua chalybeata, & omnes cibi in ea decoquantur; quæ quidem vtilior erit, fi radices vrticæ prius in ea incoctæ fuerint.

Quies totius corporis imperetur, ita vt æger nec ambulet, nec tuffiat, nec vociferetur, nec loquatur; motus enim linguæ, & maxillarum, sanguinis fluxum commouent.

Teneat caput detectum, & oculos claufos, ne sanguinem fluentem videat, quoniam illius confpectus, mota imaginatione, sanguinem commouet.

Vigiliæ immodicæ maximè vitentur, quia sanguinem acriorem, biliofiorem, ac fluidiorem efficiunt. Somnus contra humores contemperat, eorumque motum cohibet.

Denique animi pathemata vitentur, quæ sanguinem furfum impellunt, vt ira, rifus, & gaudium.



PRAXEOS  
MEDICÆ,  
LIBER QUINTVS.

---

*De Affectibus linguae.*

P R Æ F A T I O.

**L**INGVA tum gustus, tum loquētia in-  
strumentum est. Vtraque actio ladi-  
tur per tumores varios, qui lingua  
adnasci consueuerunt. Speciatim verò  
unaquaque actio à peculiaribus causis immi-  
nuitur, aboletur & deprauatur. Quae omnia ut  
sigillatim describantur, quintus hic liber in qua-  
tuor capita distinguendus est, quorum primū erit  
de inflammatione, aliisque linguae tumoribus.  
Secundum erit de ranula sub lingua; quae licet  
ad tumorum genus pertineat, seorsim tamen tra-  
ctanda est, quod diuersissimam à reliquis tumori-



*bus curationem desideret. Tertium erit de gustu laeso. Quartum denique de paralyfi linguae, aliisque motus illius laesionibus.*

## CAPVT PRIMVM.

*De lingua inflammatione, aliisque eiusdem tumoribus.*

**Q**uemadmodum omnes corporis partes, præcipuè carnosæ, inflammatione affici consueuerunt; sic etiam lingua eadem aliquando tentatur, ex sanguinis in eam affluxu; qui prout vel purus ac syncerus, biliosus, pituitosus, ac melancholicus est, phlegmonem veram, aut eandem erysipelatofam, cedematofam, aut scirrhofam producit; quæ interdum etiam ad suppurationem definit. Cuius rei exemplum habetur apud Forestum *obs. 24. l. 14.* cuiusdam cereuisiarij, qui ingentem linguae inflammationem patiebatur, quæ in suppurationum abiit.

Patitur etiam lingua, idque multò frequentius, tumorem mollem & laxum, ac purè cedematofum, ex pituitæ à cerebro in eam affluxu. Cuius exemplum proponit Gal. *lib. 14. meth. cap. 8.* in quodam homine, cui lingua ita tumefacta erat, vt ore contineri non posset.

Interdum etiam lingua in magnitudinem excedentem excrescit, quæ tamen neque sub cedematis, aut scirrho, aut alterius cuiusuis tumoris genere collocari potest; vt docet Gal. *lib. de diff. morb. cap. 9.* se cuiusdam linguam vidiſſe, quæ in ingentem molem excreuerat

absque ullo doloris sensu: neque enim prementi manui cedebat, neque dolore infestabatur, sed nudum linguae incrementum erat, ipsius substantia nullo modo vitata; quod ex nimia copia utilis alimenti eius in substantiam conuersi acciderat. Eiusque rei exemplum proponit Claudinus *consult.* 9. puellae 12. annos natæ, cuius lingua in tumorem excreuerat, qui neque ad œdema, neque ad scirrhum referri poterat, quoniam indolens erat, nec prementi manui cedebat, ut fouea remaneret, nec sensu naturali carebat; cuius prima origo fuerat ex violenta frænuli linguae disruptione, cuius dolore sanguis ad partem attractus fuit, & continuâ postmodum eiusdem transmissione tale incrementum productum. In hoc autem casu peculiariter notat Claudinus, tumorem illum in vespera decrescere, manè verò augeri, & semper liuescere. Quorum euentuum rationem reddit, quoniam in coctione & assimilatione sanguinis illius, alioquin pituitosi (qualis in pueris ob ætatem humidissimam & ingluuiem generatur) multi flatus, potissimum autem per noctem, retracto & coacto calore concitantur, qui linguae tumorem augent. Per diem verò ob motum linguae, & ambientis calorem dissipantur, unde tumor parum decrescit. Liuiditatem refert ad aërem ambientem, in quo lingua continuò versatur: ab illius enim frigiditate sanguis ad superficiem linguae affluxus, antequam assimiletur, con- crescit aliquo modo; & sic liuiditatem contrahit; à frigore enim sanguinem nigrescere scribit Gal. 3. *de sympt. causis cap. 2.* quod tamen in aliis corporis partibus non contingit, quoniam ad illas ea sanguinis tantum portio; quæ pro nutritione sufficit, sed non superfluit, amandatur.

Horum tumorem diagnosis difficilis non est; quandoquidem magnitudo aucta præter naturam, visui sub-

iicitur. Tumorum autem differentia ita distinguuntur, Si fuerit inflammatio, adest dolor & caliditas in lingua, tum etiam rubedo, qua etiam facies aliquantulum inficitur. Si verò à pituita tumor duxerit originem, lingua albicat, multumque pituitæ effluit, cuius sapor dulcis, aut insipidus est. Si nudum sit linguæ incrementum, aliorum tumorum, ac vitiosorum humorum signa non ad sunt.

Quod ad prognosim attinet, tumores linguæ ut plurimum vitæ periculum non asserunt, nisi in tantam molem excreuerint, ut inde suffocatio metuanda sit, aut ex humore quodam maligno atque atrabilario ortum duxerint; unde cancrusus tumor generari potest; quod duritie, liuiditate ac dolore pungitiuo internoscitur.

Curatio inflammationis linguæ reuellentibus ac repellentibus remediis inchoanda est; atque ita primum præmissis clystere laxante, venæ sectio celebranda est, & sanguis satis magna quantitate detrahendus, pro virium modulo.

Mox cucurbitulæ cum scarificatione scapulis admo- uendæ.

Postmodum gargarismata refrigerantia ac repellentia usurpanda; & inter cætera commendatur à Gal. 14. *meth. cap. 8.* succus lactuæ, quæ lingua frequenter abluenda est. Vel magis compositum gargarisma parari poterit ex decocto plantaginis, solani, lentis decorricatæ, & cortic. granatorum, addendo syrupum de rosis siccis, vel diamorum.

Post venæ sectionem, purgatio etiam instituenda est medicamento ex cholagogis & phlegmagogis composito, quandoquidem pituita è capite defluens, ad horum tumorum productionem particulariter saltem concurrat.

Sedatâ fluxione euacuantibus, reuellentibus, ac re-

pellentibus remediis, humoris parti impacti deriuatio molienda est, & in hunc finem venæ sub lingua aperiendæ, quod si fieri non possit, propter linguæ magnitudinem, cucurbitula sub mento cum scarificatione erit admonenda.

Si tumor ad suppurationem desinat, promouenda erit ficu per medium sectâ, frequenter admotâ, vel gargarismate ex decocto hordei, maluæ, violar. ficuum, passulorum, seminum cydoniorum, & fœnugræci composito, addendo syrupum violaceum & iuiubinum.

Factâ suppuratione, si abscessus sponte non aperiatur, scalpello aperiendus est. Mox vlcus detergendum decocto, hordei, agrimonij, plantag. cum melle rosaceo.

Tumor verò mollis & latus à pituitæ influxu oriundus, curatur primùm reuulsione facta per phlebotomiam, si æger sanguine abundet: deinde purgans medicamentum satis vehemens est exhibendum, quales sunt pilulæ cochiæ minores ex aloë, scammonio, & colocynthide paratæ, quæ à Gal. fœlicitates usurpatæ sunt in quodam sexagenario 14. *meth. supra citato.* Quod si æger pilulas deglutire nequeat, medicamentum componi poterit ex senna, agarico, diaphœnicone, & similibus.

Post huiusmodi euacuationes, refrigerantia & repellentia in principio admouenda sunt, quemadmodum in inflammatione dictum est. Et Galenus *loco citato*, dictum sexagenarium oris collutione ex solo lactucæ succo post purgationem usurpata sanauit.

Potest etiam vtiliter linguæ collutio fieri ex succo limonum, granatorum, acetosæ, & plantaginis: quandoquidem prædicti succi non solum frigiditate sua repellunt, sed etiam acetositatem humiditatem linguæ impactam educunt.

Vtiliter etiam lingua illinetur oxymelite simplici, cui

in augmento addi poterit parum zinziberis, salis gummei, aut ammoniaci.

Collui etiam os poterit decocto origani, pyrethri, cum hydromelite.

Zacutus Lusitanus *lib. 1. historia Medicorum principum obs. 47.* in casu valdè præcipiti, vbi linguæ tumor in molem ingentem excreuerat, vt inde suffocatio metuenda videretur, vacuantibus ac reuullenribus remediis frustra tentatis, hirudines quatuor linguæ affixit, & breui tempore copiosa sanguinis vacuatione sequuta, ipsa exilis tenuisque facta est, & sic æger à periculo euasit.

Idem Zacutus *obs. 48. eiusdem libri*, decem annorum puero ex catarrhosa fluxione linguæ tumore ingenti laboranti, vt ipsius ore contineri non posset, post reuulsiones per venæ sectionem, cucurbitulas scarificatas, & aceres clysteres: cùm linguæ tumor mollis, laxusque esset, profundis linguæ scarificationibus vsus est, moxque aqua salita linguam ablui iussit, vnde tanta aquosi humoris vacuatio facta est, vt illico sanitatem æger recuperauerit. Quam obseruationem à Ioachimo Camerario desumpsit, qui libro obseruationum suarum narrat, quemdam tumente lingua suffocatum, ipsam sibi acuto cultello decussatim, incidisse, multoque sanguine effluente fuisse personatum.

Denique tumor linguæ carnosus, seu linguæ incrementum nimium, ex superflua ipsius carne proueniens, licèt curationem suscipere non posse videatur. Illa tamen à Claudino proponitur, loco citato, per operationem chirurgicam; vt scilicet quidquid linguæ superfluum est, cultello abscindatur, adhibitis prius præparationibus necessariis, quæ omnia dicto loco fuse ab eo describuntur.

## CAPUT II.

*De Ranula sub lingua.*

**Q**Uamuis superiori capite varij linguæ tumores à nobis expositi sint; vnus tamen adhuc explicandus superest, qui *βαράξ* Græcis, Ranula Latinis nominatur. Cùm enim ille naturam à prædictis maximè diuersam obtineat, ac diuersum planè curandi modum requirat, satius esse duximus peculiari capite illius descriptionem exponere.

Est autem Ranula, tumor qui sub lingua colligitur, in ea parte, quâ illa vinculo alligatur; & tantus vt plurimum apparet tumor, vt dentes inferiores superet; rimâ autem mediâ, dextram tumoris partem à sinistra dirimente, ranæ posteriorem partem refert, vnde affectui nomen. Alij verò *Batrachum* inde dictum existimant, quod eo affecti, loquelæ impedimentum patiantur, & non nisi coaxando loqui possint, ranarum instar. Ad œdematis, aut meliceridis naturam accedit, è quo apertio materia profluit oui candido, aut melli persimilis. Et cùm dicta materia in folliculo contineatur, idè inter Melicerides à nonnullis reponitur. In iis folliculis interdum calculus inuentus est, vt plurimorum authorum observationibus constat, quas collegit Schenckius *obs.* 88. *lib.* 10.

Diagnos huius affectus difficilis non est, dum enim subleuatur lingua, quædam veluti carnositas laxa & mollis sub ea continetur, & ab vtrâque parte ligamenti quædam prominentia spherica, ciceris, vel fabæ, vel interdum castaneæ magnitudinem æquans conspicitur.

Periculo vacat ut plurimum hic affectus. In pueris, tamen aliquando suffocationis periculum intentat, propter asperæ arteriæ & laryngis viciniam. In adultis etiam si dolor & febris adsit, vitæ periculum affert, quandoquidem in anginam degenerare potest. Periculosa etiam est Ranula, quæ nigra, aut fusca, & dura est, ad canceri naturam accidens, & illa non est attingenda.

Ad curationem huius affectus, primum causa antecedens auferenda est venæ sectione, & purgatione ægrotantis naturæ, & ætati accomodata. Et si affectus sit inueteratus, ad cauteria & decocta sudorifica veniendum est.

Postmodum topicis medicamentis resolutio tumoris tentanda est in hunc modum.

℞. Cortic. granat. hyssopi sicci, salis commun. ana ʒ. ij. Fiat pulvis sub lingua detinendus, & frequenter iterandus. Refert Forestus puellam 12. annorum, intra biduum fuisse curatam hoc solo remedio, cuius auctor est Nicolaus Florentinus, qui in adultis loco salis communis utitur sale ammoniaco, quod magis penetrat & potentiùs dissolvit. Forestus verò in studioso quodam prædictum pulverem cum sale communi paratum usurpavit; tum etiam decoctum ex balauistiis, alumine, & gallis, æquis partibus, paratum; ac denique partem sale tosto & gemmæ fricari iussit, & æger curatus est sine operatione chirurgica, quod rarissimè solet contingere; quia tumores isti ad naturam abscessuum accedunt, & in quodam veluti folliculo continentur, ita ut discussa quadantenus materia contenta, iterum repleatur.

Si discutientibus remediis tumor curari nequeat, ad illius apertionem veniendum est; quod ut plurimum faciendum, rarissimè enim per resolutionem curatur.

Apertio autem exiguo foramine facienda non est, quia materia in folliculo contenta, iterum colligitur, & folliculus impletur; (cui rei maxime conducit summa partis laxitas, & mollities recipiendis excrementis maxime idonea:) Sed per summam tumorem, longissima sectio facienda est in utraque eminentia, ut tota materia simul effluat. Postea vlcus abluendum est, primum lenientibus, ut decocto malua; postea vero detergentibus, ut vino albo cum melle rosaceo, aut diamorone; ac demum oxymelite, donec purum appareat vlcus, & folliculo liberum. Ac denique ad cicatricem inducendam, vino nigro, in quo alumen dissolutum sit, os frequenter colluendum.

Forestus similem abscessum curauit in quadam muliere rustica, sectione utrinque facta, & postmodum ore frequenter colluto posca, cui exiguum salis admixtum fuerat.

Si affectus sit inueteratus, & vlcus praedictis remediis exsiccare nequeat, tangatur oleo sulphuris bis in die, temperato tamen cum aqua rosacea, ita ut ad vnam guttam olei quinque vel sex guttae aquae rosaceae misceantur: ita enim intemperies corrigetur, & exsiccabitur pars, quae ad roborationem, vino nigro, admixto alumine saepe abluenda est. Si post haec remedia debite vsurpata morbus redeat, ad cauterium actuale veniendum est, cuius administrationem docet Paræus lib. 7.

cap. 5.



## CAPVT III.

*De Gustatu laeso.*

**G**ustus quemadmodum reliqui sensus, omnesque corporis actiones, tripliciter læditur; imminutè abolitè, & deprauatè. Imminuitur cum sapores remissos vix percipit, intensos verò remisse. Aboletur, cum prædictos sapores, siue intensi sint, siue remissi, nullo modo sentit. Deprauatur denique, cum obiectum alieno sapore infectum iudicat.

Imminutionis & abolitionis gustus causæ eadem sunt, magnitudine tantum differentes; si enim leviores sint gustum imminuunt; si grauiores, abolent. Et illæ causæ sunt, vel defectus spiritus animalis in ipsa parte, vel nerui à tertio pari in linguam translati intemperies, vel lingua ipsa aliquo affectu præternaturali afflicta.

Spiritus deficiunt, vel propter ipsorum penuriam, ut in moribundis; vel propter obstructions neruorum tertij paris, per quod deferuntur; vel propter tumorem in ea cerebri parte genitum, à qua nerui oriuntur.

Lingua vel humidâ & pituitosâ materiâ obducitur, vel tumoribus, pustulis, aut vlceribus afficitur, & in propria illius actio, seu gustatus imminui, vel aboleri potest.

Gustus deprauatur, quando lingua vitioso aliquo humore inficitur; ut in febribus sæpè contingit, cum bile infecta lingua, omnia quæ gustantur, amara esse iudicat. Aliàs pituita falsa, vel humore melancholico imbuta, omnia falsa, vel acida ei videntur, obiecta enim externa lingue admotâ, vitiosum ipsius succum commo-

commouent qui tunc temporis linguam magis feriens, saporem suum in eam fortius imprimit : & ita , quæ gustantur , tali sapore infecta videntur. Contingit tamen non rarò, linguam succorum in se contentorum sapes percipere , etiamsi nullum obiectum externum ipsi ad-moueat, vt docet Gal. 1. *de sympt.causis cap. 4.* Et quo-tidiana confirmatur experienciâ in febricitantibus, quo-rum lingua bile perfunditur ; quæ si valdè amara sit, continuum amarorem in lingua persentiunt , licèt nihil extrinsecum degustetur.

Causarum prædictarum diuersitas ex saporum varie-tate , & linguæ ipsius dispositione cognoscitur ; dulcis enim sapor, & linguæ rubedo sanguinem significat; ama-ror, & color flauus, bilem; albedo cum dulcedine , pitui-tam; color fuscus & aciditas, melancholiam. Sapor abo-minabilis, prauos humores in ventriculo contineri osten-dit. Pustulæ, tumores, & vlcera oculis patent. Ac denique, si nulla in lingua permutatio appareat , & gustus immi-nuatur, aut aboleatur, in cerebro, vel neruis causam late-re censendum est.

Curatio admodum varia est; pro varietate causarum. Et idè, si in cerebro, vel neruis affectus lateat, illi reme-dia aptanda sunt , præsertim ea , quæ ad paralysis cura-tionem præscribi solent. Cùm verò à prauis humori-bus gustus deprauatur , illud symptoma vt plurimùm ab aliis morbis dependet , præcipuè verò febribus, quibus curatis illa etiam symptomata tolluntur.

Si à tumoribus lædatur gustus, illius curatio ex dicto-rũ tumorũ curatione dependet , quæ supra proposita est.

Si denique à pustulis , aut vlceribus linguæ , affectus oriatur, curatio horum affectuum instituenda est per ve-næ sectionem, & purgationem humorum acrim; quibus accedent topica refrigerantia, astringentia, & exsiccantia, ad gargarismatis formam redacta ; & si vlcera for-

didā sint, abstergantur melle rosaceo, addito oleo sulphuris, aut vitrioli, eā quantitate, quā linguam moderatē feriat: vel etiā ad potentiū exsiccandum, oleis prædictis, puris & impermixtis, pars affecta, semel atque iterū tangenda est. Sic enim aphthæ, omniaque oris & linguæ vlcera citissimē sanantur.

## C A P V T I V.

### *De Paralyſi lingua, eiusque motu laſo.*

**A**ctio linguæ præcipua, loquela est, eaque aboletur, imminuitur & deprauatur à variis causis, quæ ad morbos similes, organicos, vel communes referuntur. Quod ad similes attinet, humida intemperies cum materia coniuncta, linguam molliorem & laxiorem efficit, ut motus suos liberè exercere nequeat. Siccitas etiā nimia loquelam vitiat, ut in febribus contingit. Morbi verò organici sunt, magnitudo aucta, ut de tumoribus antea dictum est, qui liberum linguæ motum impediunt, figura vitata, ut, si lingua breuior ex nativa conformatione, aut præcisione apicis illius, aut si fræno, seu vinculo suo arctius alligetur, & obstructio neruorum septimi paris, qui ad mûculos linguam mouentes deferuntur. Morbi denique communes sunt solutiones continui, seu vulnera eiusdem partis.

Nimia linguæ humiditas balbutiem efficit, quā affecti literam R, pronunciare nequeunt; eaque vel natia est, ut in pueris, qui ob nimiam humiditatem hoc affectu laborant, ab eoque liberantur ætatis progressu, quo superflua illa humiditas absimitur. In quibusdam verò intemperies humina totā vitā perseverat, & illi perpetuò balbi remanent, de quibus agit Hipp. *Aph. 32. sect. 6.* his

verbis : Balbi ab alui profluuiio diuturno maximè capiuntur. Galenus in comm. dicit eos qui naturâ balbi ſunt aut cerebrum habere humidum , aut linguam , aut vtrumque, & à cerebro humido multas profluere humiditates quas in ventrem delabi par eſt, vnde alui profluuia. Lingua verò admodum humidâ naturâ exiſtente, & ventriculum talem eſſe par eſt, (vt qui alteram tunicam communem habeat cum lingua,) imbecillemque ex humiditate. Ventriculi autem humidi propria paſſio eſt diuturnum profluuium.

Attamen Auicenna propoſitæ doctrinæ aduerſari videtur, dicens *Fen. 1. lib. 3. tract. 4. c. 18.* balbos eſſe maximè diſpoſitos ad melancholiam, cum tamen melancholia à ſicciori cerebri intemperie procedat. Conciliatur tamen illa contrarietas, dicendo , per balbos , ſeu traulos Auicennam intelligere, non balbos propriè dictos, qui litteram R, pronunciare nequeunt; ſed eos qui linguæ hæſitantia laborant , quique eandem ſyllabam multoties repetunt, antequam dictionem proferant; hæc enim linguæ hæſitantia, ex calido & ſicco cerebri temperamento oritur, in quo adeò promptæ ſunt cogitationes; vt linguam præcurrant, eiſque motum, præcipitent, vnde conturbatio ipſius atque hæſitantia exoritur. Prædicta autem balbuties à natiuitate contracta curabilis eſt.

In quibuſdam verò balbuties accidentaria contingit à catarrho , & copioſo humoris pituitofi deſluxu in fauces & linguam , quæ euacuatione , reuulſione , & deriuatione humoris influentis , tum etiam capitis roboratione & exſiccatione curatur. Cum autem remedia propoſitas indicationes adimplentia, paralyſi linguæ iam deſcribendæ conueniant , ex illius curatione erunt repetenda.

Ad linguam deferuntur duo neruorum paria, tertium videlicet ad guſtandi & ſentiendi actionem exercen-

dam ; & septimum ad loquelam, & linguam variis modis mouendam. Ex horum igitur neruorum, qui à septimo pari oriuntur, obstructione, & relaxatione paralyſis linguæ procedit, quæ eſt priuatio, aut imminutio motus illius partis. Eaquæ ſuccedere conſueuit frequenter apoplexiæ, cerebro ipſo ſecundùm poſtერიorem partem humore pituitoſo imbibito ; & tunc aliæ quoque partes, & plerumque dimidia corporis pars, paralyſi tentantur. Interdum tamen ſolitaria eſt, neruis tantùm, aut muſculis linguam mouentibus, humore pituitoſo imbibitis & repletis. Ex præciſione etiam eorum neruorum linguæ paralyſis generari poteſt, cuius rei exemplum habetur apud Auic. *Fen. 6. lib. 3. cap. 12.* his verbis: *Quidam homo iam ventofatus fuit, & percuffus eſt cum ſcalpello villus nerui in ſubſtantia panniculi coniuncti cum lingua, quare mollificata eſt lingua.* Has autem cucurbitulas, in ceruice & iuxtà occiput admotas fuiſſe coniiciendum eſt; cùm enim nerui linguam mouentes à principio ſpinalis medullæ oriantur, quæ eſt in occipitio, ex profundiori ſcarificatione cuiuſpiam illius rami præciſionem contigiffè certiffimum eſt.

Quamuis autem materia hunc affectum produçens pituitoſa ſit; interdum tamen cräſſior & frigidiior, interdum tenuior & calidiior eſſe conſueuit ; pro ratione humorum in corpore prædominantium, quorum diagnoſis proponitur ab Auicenna *Fen. 6. lib. 3. tract. 1. cap. 6.* his verbis : *Eo quandoque ſignificat quod materia ſit ſanguinea, rubedo lingua, & caliditas eius. Et quandoque ſignificat quod materia ſit ſubtilis, & aquoſa, multitudo curſus ſalivæ aquoſa, & paucitas inuamenti ex reſolutiuis, & inuamentum ab eo, in quo eſt ſtypticitas.*

Affectus iſte, ſi à cerebri vitio dependeat, & apoplexiæ ſit conſectarius, ita vt aliæ quoque partes afficiantur, rarò curationem recipit, præſertim ſi æger ætate

prouectior fuerit ; ſi verò ſimplex & ſolitariuſ fuerit, curationem recipit , idque multò faciliùs, ſi æger in ætate florente conſtitutus fuerit.

Curatio Paralyſis linguæ perficitur ſublatione cauſæ antecedentis , humoris ſcilicet in cerebro redundantis; & diſcuſſione ac reſolutione cauſæ coniunctæ , humoris ſcilicet neruis linguam mouentibus impacti & imbibiti.

Cauſa antecedens eliminabitur iis remediis, quæ in frigidæ cerebri intemperiei curatione propoſita ſunt.

Ac primùm purgatio inſtituetur potione , aut pilulis dicto loco propoſitis. Mox ſi ſanguis redundare , & affectus cauſa principalis, vel adiuuans eſſe videatur, detrahendus eſt eâ quantitate , quæ viribus & ætati conueniat. Poſtmodum apozema cephalicum exhibendum. Et ſi affectus contumax eſſe videatur , ad diætam ſudorificam tranſeundum eſt; quorum omnium formulæ dicto loco propoſitæ ſunt.

Poſt vniuerſales euacuationes, ad materiæ morbificæ deriuationem deueniendum eſt , per cucurbitulas & veſicatoria poſteriori parti admota ; tum etiam cauterium occipiti inuſtum. Auicenna cucurbitulam ſub mento affigit, quod etiam à recentioribus probatur.

Vena etiam ſub lingua vtiliter aperitur , præmiſſis euacuationibus vniuerſalibus ad deriuatione humoris muſculis linguæ imbibiti.

Ad diſcutiendum verò & extrahendum eundem humorem, gargarisma ſequens frequenter uſurpabitur.

℞. Rad. ireos Flor. ʒ.ß. fol. origani, ſaluia, ſtoechad. roriſmar. ana M.ß. cubearum ʒ. iij. liquiritiæ ʒ. j. Coquantur in æquis partibus aquæ & vini albi ſub finem additi ad lb. j. In colatura diſſolue oxymelitis ſcillitici ʒ. ij. Fiat gargarisma, quod ſi non ſatis efficaciter operetur, addi poterit decocto radix pyrethri ad ʒ. ij. vel iij.

vel etiam semen sinapi pari quantitate. Addi etiam potest castoreum, nisi ægro nimium ingratum videatur.

Ad eundem usum potest frequenter lingua confricari oxymelite scillitico solo, cui etiam semen sinapi addi poterit.

Succus saluix ad linguæ paralysem multum commendatur, si eo lingua frequenter confricetur; cui etiam, sicut in præcedenti, sinapi addi poterit.

Pilulæ etiam sequentes supra linguam frequenter detineri poterunt in eundem finem.

℞. Succu betonicæ & liquiritiæ, ana ʒ. j. β. castorei & assæ foetidæ, ana ʒ. β. nucis moschatæ, & spicæ nardi ana ʒ. j. Incorporentur cum melle, & fiant formulæ instar lupinorum.

Hic etiam conferre poterunt gargarismata, masticatoria, & errhina in frigidæ cerebri intemperiei curatione propoſita.

Ad cerebrum verò robotandum, & humoris pituitosi in eo contenti reliquias discutiendas, conuenient suffitus, puluis capillis inspergendus, & cucupha dicto loco propoſita.

Ac denique, ad nouum pituitæ prouentum, quem cerebri intemperies, etiam post vniuersales & particulares euacuationes solet efficere, vsualia remedia præscribenda; nempe syrupus magistralis, aut pilulæ vsuales, quibus opiata roborans adiungenda est eorumque remediorum descriptio à prædicta curatione desumi poterit.



PRAXEOS  
MEDICÆ,  
LIBER SEXTVS.

---

*De affectibus dentium , gingiuarum ,  
faucium , vuula , & laryngis.*

PRÆFATIO.



ARTES in ore & faucibus contenta varios affectus patiuntur; quorum precipuos tantum describere animus est, & reliquos minoris momenti quive à solis Chirurgis ut plurimum curari consueverunt, consultò pratermittere. Hic igitur liber septem concludetur capitibus. Primum erit de dolore dentium. Secundum de dentium nigredine, & erosione. Tertium de gingiuarum erosione, & exulceratione. Quartum de fluxu sanguinis ex gingivis. Quintum de oris & faucium ulceribus.



## CAPVT PRIMVM.

## De dolore dentium.

**D**ENTES non solùm secundùm neruos eorum radicibus insertos, & membranulam, dentis cavitatem intùs succingentem; sed etiam in propria substantia sentire docuit Galenus 5. de compositione medicamentorum secundum locos, cap. 8. & 16. de usu partium cap. 2. ubi dicit, dentes & cæteras oris patticulas, vnà cum lingua, sapores percipere. Tum etiam lib. de ossibus, cap. 5. in-  
 quiens, ex ossibus dentes tantummodo mollium cerebri neruorum esse participes, ob idque solos manifestè sentire. Dolor igitur non solùm neruulis & membranulæ interiori, sed etiam ipsi dentium substantiæ contigit.

Fit autem dolor dentium ab humorum influxu, qui vel frigidi & pituitosi sunt, vel calidi & serosi, falsi & acres, vnde particularum dictarum distensio aut velli-  
 catio contingit. Illi autem humores, vel in maxillarum, & dentium alueolorum membranas confluunt, vel in neruulum radici dentis insertum, vel in ipsam dentis substantiam. Quamuis enim multi existiment, dentes humorum affluxum ac distensionem in propria sub-  
 stantia recipere non posse, cum sint corpora densissima. & durissima; id tamen docetur ab Auicenna Fen. 1. lib. 1. doctrina 1. cap. 5. & Fen. 7. lib. 4. tract. 1. cap. 4. Et quan-  
 doque, inquit, est materia apostemans dentem ipsum. Quam sententiã confirmat, ac perspicuè disputat Fen. 1. lib. 3. tract. 3. cap. 1. his verbis. Non enim est, quemadmo-

lum quidam existimant medicorum, quòd cerebrum ipsum non apostematur, sic ratiocinantes. Nam quod leue est, sicut cerebrum, & durum, sicut ossa, non extenditur, & quod non extenditur, non apostematur. Hic autem sermo est erroneus, & illud ideo, quoniam leue viscosum extenditur, & ossa etiam apostemantur, & Galenus illud confessus est, & nos monstrabimus sermonem in capitulo dentium. Imò dicimus quod omne quod nutritur, extenditur, & augmentatur cum nutrimento; & similiter est possibile, quod extendatur & augmentetur cum superfluitate, & illud est apostema. Hoc verò docet Auicenna ex Galeni sententia, qui lib. 5. de compositione med. sec. loc. cap. Cùm, inquit, impossibile sit dentes incrementum accipere circa nutrimentum, omninò duabus affectionibus, & his contrariis obnoxij erunt, inopia videlicet, & redundantia alimenti, quod eis suppeditatur. Inopia igitur aridiores & macriores, alimentumque non sentientes, & ob id tenuiores eos reddet: redundantia verò consimilem in iis affectionem excitare potest, qualis est circa carnosus partes inflammatio. Hæc Galenus. Verisimile tamen est dolorem frequentius fieri ( si modò ille valdè intensus fuerit ) in partibus illis exquisito sensu donatis, neruulo nimirum, & membranula alueolum succingente, dentiumque radices proximè ambiente: Quæ ab humoribus influentibus, non solum distensionem ac vellicationem, sed etiam interdum inflammationem patiuntur; si nempe sanguis cum aliis humoribus admisceatur: tunc enim dolor à duplici causa exoritur, distensione videlicet. & compressione, quæ fit à dentis duritie, quam ferre non potest sine dolore, membranula inflammata. Hanc autem membranulæ inflammationem comitatur vt plurimum gingivæ inflammatio, quæ idèd à Gal. & Auic. inter causas doloris dentium recensetur.

Fluunt autem humores in dentes & partes adinstitas ut plurimum à capite : interdum tamen à partibus inferioribus promanant. Cum enim vitiosi aliqui humores , præcipue serosi in parte aliqua geniti , in venis cumulantur , natura illorum onus excutere tentans , ad partes debiliores eos præcipitat. Et si dentes propter intemperiem, cariem, aut erosionem tales extiterint , ad eos præsertim fluxio decumbit. Huius rei experimentum proponit Carolus Piso ( qui etiam existimat dolorem dentium à seroso humore ut plurimum fieri ) *lib. de morbis ab illuvie serosa, obs. 7.* ubi refert se ipsum dolore dentium per multos dies afflictum , ab assumpto medicamento purgante , post sesqui horam , sinceram aquam ad lb.j. & amplius euomuisse, tanto successu, ut postea vel decem annis ab huiusmodi dolore immunis prorsus fuerit. Quo edoctus experimento simili affectu laborantibus , medicamenta serosos humores educuntia præscripsit felici successu. Præterea hunc affectum à tali causa ut plurimum dependere, hoc signo probare nititur, quod assidua saluatio doloris dentium comes ferè perpetua esse soleat.

Præter causas enumeratas, vermes in dentibus cariosis geniti, doloris dentium causa esse possunt : iique producuntur ex qualibet materia in illis cavitatibus retenta & putrefacta, siue excrementitia sit , siue ex alimentis putredini obnoxiiis, carnibus præsertim & dulciariis, quæ propter lentorem cavitatibus dentium adhærescunt.

Nonnulli etiam existimant , dolorem dentium interdum fieri à spiritu flatulento intra dentis cavitatem, & neruulum incluso, ac membranulam interiorem violenter diuellente ; unde dolor atrocissimus, ac penè intolerabilis excitari solet.

Causæ externæ & procatacricæ dolorem dentium

producentes, sunt illæ omnes, quæ humorum fluxiones promouere solent; quarum præcipuæ sunt, ær frigidus, vel austrinus, mora in sole ardente, aut in aëre nocturno, crapula; omnes denique errores in victus ratione commissi. His adde eas, quæ partem debilitare, & fluxioni recipienda magis idoneam reddere valent, qualis est præsertim caries & perforatio dentis, quæ pertinaces non raro dentium dolores efficere consuevit.

Causarum diuersitas variis signis dignoscitur. A calidis enim humoribus dolor oriundus, intensior multò est, temperamentum calidius, ætas florens, tempus æstiuum, caliditatis sensus in parte percipitur, & sæpè gingiuarum inflammatio contingit, à frigidis remediis iuuantur, læduntur autem à calidis. Si verò à frigido humore dolor oriatur, signa prædictis contraria apparere solent.

Si vermis causa doloris extiterit, dolor erit interpositus, exiguis intervallis desinens ac rediens; tum molus vermis in parte aliquando percipitur.

A spiritu flatuoso dolorem produci testatur illius atrocitas, & diuulsionis sensus, qui in parte percipitur, quive exiguo tempore desinit, ac discutientibus remediis parti admotis faciliè curatur.

Prognosis varia est pro causarum varietate. Dolor enim qui ab humore calido, tenui, & sero acri & falso producitur, vehementior quidem est, sed citiùs desinit, ob humoris illius subitas mutationes. Qui verò ab humore frigido & pituitoso excitatur, mitior est, sed multò diuturnior.

Tumor in gingiuis aut maxillis obortus, doloris dentium solutionem affert, translatà fluxione ad partes exteriores: ita vt, non ampliùs ad internam dentis cauitatem decumbat.

Curatio ad doloris causam auferendam, & ipsum dolorem mitigandum, dirigenda est. Licet enim anodyna parum profint, nisi fluxio auferatur: Ita tamen non raro vrget, vt non solum anodynis propriè dictis, sed etiam interdum narcoticis ante causæ ablationem demulcendus sit. Humor igitur qui ad dentes confluit, reuellendus, euacuandus & repellendus est: qui verò iam influxit, deriuandus & discutiendus.

Primò igitur, si dolor ab humoribus calidis oriatur, venæsectio celebranda est è brachio eiusdem lateris, quâ fluens humor plurimum reuellitur. Si verò dolor à frigidis humoribus excitetur, minus venæsectio conuenit ratione tamen fluxionis etiam vsurpari poterit, cum inter reuellentia remedia principem locum teneat. Sed minori copia tunc temporis sanguis detrahendus, nisi pletoræ signa appareant; cuius ratione, etiam si ea pituitosa sit, liberalis venæsectio instituenda, iuxta præceptum Galeni, qui largam sanguinis detractionem plenitudini respondentem, omnium dolorum promptissimum esse remedium asseruit; quod nos frequentissimâ experientiâ, tum in aliis doloribus, tum præcipue in dolore tentium, verissimum esse comperimus.

Sequenti die purgans medicamentum exhibeatur, humori peccanti accommodatum, in forma vel positionis, si humor peccans calidus extiterit; vel pilularum, si frigidus & pituitosus humor doloris causa fuerit.

Postmodum, perseverante dolore, cucurbitulæ scapulis cum scarificatione applicentur; vel cucurbitula magna inter scapulas sine scarificatione affigatur. Vescicatorium posteriori parti cervicis, vel pone aures admotum, humores fluentes potentissimè retrahit ad posteriora.

Ad fluxionem etiam inhibendam, astringentia tem-

poribus vtiliter applicantur; qualia sunt emplastra ex gummi elemi, vel mastiche sola, supra pannum fericum liquata, cum pistillo æneo calefacto, emplastrum de mastiche officinarum, vel contra rupturam; vel tale in rem præsentem præscribatur.

℞. Thuris, hypocist. ladani, ana ʒ. j. β. picis, mastiches, ana ʒ. j. opij. ʒ. β. olei lentisci q. s. Fiat massa emplastri.

Radix consolidæ maioris recens, contusa & admota tempori in formam emplastri, fluxionem efficaciter intercipit.

Fit etiam emplastrum ex puluere aluminis & gallarum cum pice subacto, efficacissimum.

Riuerius Henrici magni Archiater emplastrum sequens pro secreto habebat.

℞. Nucum cupressi, rosar. rubr. seminis nasturtij torrefacti, mastiches, terræ sigillatæ, an. ʒ. j. β. Macerentur in aceto rosaceo per horas 24. postea siccentur, & adde opij in aqua vitæ dissoluti ʒ. iij. picis naualis, colophonix, ana ʒ. j. ceræ flauæ in oleis expressis, seminum hyoscyami, & papaueris albi liquæ q. s. Fiat emplastrum, quod applicetur arteriis, vel etiam loco dolenti.

In aures quoque immittuntur medicamenta ad dolores dentium; quia venulæ, per quas fertur alimentum ad dentes, per illas partes excurrunt. Ideò infunditur oleum amygdalar. amar. in aurem vicinam denti dolenti, aut excipitur fumus aceti in quo pulegium aut origanum cocta sint.

Alij acetum in aurem infundunt, quo fluxio cohibetur efficacissimè, & in fluxione calida præcipue confert.

In frigida verò fluxione, succus allij cum theriaca mixtus, & in aurem tepidè instillatus, mirum in modum

dolorem compescit. Idem præstat allij bulbus detracto cortice in formam suppositorij scissus, & in aurem intrusus.

Adstringentia etiam ipsi parti dolenti admoventur in fluxionis principio, eaque refrigerantia, si materia calida sit; frigida verò existente, calida cum repellentibus sunt permiscenda. In qualibet autem causa, si dolor vehemens fuerit, anodyna repellentibus erunt admiscenda. Materia verò hisce vñibus idonea talis esse poterit.

℞. Rad. bistortæ, pentaphylli, tormentillæ, ana ʒ. j. fol. verbenæ, plantag. & rapsi barbat, ana M. j. nucum cupressi, gallarum & calycum glandium, an. ʒ. ij. fantali rubri, & crystallorum ana ʒ. j. β. rosatum rubr. & balaustiorum ana P. j. Fiat decoctio in vino styptico, & aceto, qua abluatur pars dolens tepidè frequenter. Hæc in fluxione calida vsurpari poterit ab initio, in frigida verò addi poterunt radix cyperi, cortex buxi, folia hederæ, & similia.

Simplicius medicamentum componitur ex aqua plantag. & rosar. cum aceti tantillo ad formam oxy-crati.

Vel gallæ decoquantur in aceto, quo abluantur dentes. Vel

℞. Rad. pentaphylli ʒ. β. fol. salicis M. β. gallarum ʒ. ij. Fiat decoctio in vino styptico, qua coluatur os. Hæc decoctio sistit fluxionem, & dolorem sedat.

Postmodum ea vsurpanda erunt remedia, quæ dolorem sedant, eiusque causam discutunt, quorum maximus apud authores, imò & apud vulgus, numerus habetur. Nos efficaciora hîc proponemus; ex quibus eo iudicio delectus habendus est, ut quæ non solum resoluunt & discutunt, sed etiam fluxionem cohibent,

astringentium admixtione, in principio & augmento magis vsurpentur; quæ verò tantum discutiunt, in statu & declinatione.

℞. Succī semperuiui & solani, ana ℥. ij. lactis vaccini, aut ouilli ℥. viij. olei rosacei omphacini ℥. j. β. opij, croci, ana gr. iij. Misceantur, & linteo exceptus liquor maxillæ dentis dolentis tepidè applicetur frequenter.

℞. Medullæ pomorum dulcium coctorum ℥. ij. furfuris aceto macerati ℥. iij. olei rosacei omphacini ℥. j. croci ℥. β. opij. gr. ij. Misce fiat cataplasma parti dolenti applicandum. Vel

℞. Farinæ hordei & fabarum, ana ℥. iij. olei rosati completi & amygdalar. dulc. an. ℥. β. succi semperuiui maioris ℥. j. β. lactis. q. s. Fiat cataplasma parti dolenti applicandum tepidè frequenter. Vel

℞. Albumina ouor. num. ij. Agitentur cum aqua rosacea, & excipiantur stupis canabinis, quæ aspergantur piperis puluerati ℥. ij. & parti dolenti applicentur, vt totam genæ sedem comprehendant.

Hic tamen sedulo aduertendum, ne astringentia maxillis applicentur, si tumor eas occupet; periculum enim est, ne humor ad fauces repellatur, ægtumque suffocet. Cuius rei exemplum proponit Valescus de Taranta, cuiusdam medici, dolore dentium laborantis, cum maxillæ inflammatione, qui oleum rosaceum cum aceto admouit, vnde incidit in anginam; & mortuus est.

Aliæ oris collutiones in morbi decursu parari poterunt in hunc modum.

℞. Vini albi generosi ℥. iij. radice hyoscyami albi ℥. ij. Bulliant ad consumptionem tertiæ partis. Colaturæ adde aceti ℥. j. vernicis ℥. j. iterumque bulliant vnicâ ebulatione. Colaturâ abluatur os frequenter.



Decoctum verbenæ simplex ad eundem vsum à quamplurimis emendatur.

Laudatur etiam decoctum guaiaci in aqua, vel vino paratum, cui sal interdum petmisceri poterit. Vel

℥. Fol. persicariæ feræ & cortic. rad. hyosciam. ana partes æquales. Coquantur in aceto rosaceo, & hoc decocto colluatur os. Et si à causa calida dolor producat, radix hyoscyami sola in aceto decoqui poterit.

Si persicariæ acrimonia offendar, illius quantitas minuenda est. Imo penitus omitti potest in fluxione à causa calida, & in illius locum subrogari persicaria maculata; quæ refrigerandi & astringendi facultate prædita est, cuiusque succus, aut decoctum ad omnes fluxiones acres & biliosas coercendas, per os tutò exhiberi potest. Folia etiam hyoscyami loco radicis usurpari possunt.

Quidam foliis hyoscyami, & persicariæ maculatæ pro remedio magnetico vtuntur, eaque decoquant in aceto, cocta comburunt igne luculento, dentes aceto abluunt, & dolorem evanescere aiunt, quamprimum folia combusta sunt. Ego verò affectum aceto tribuere malim quo dentes abluuntur.

In præditis decoctis, si aceti acrimonia tanta sit, vt eam æger difficilè ferre valeat, ex æquis partibus vini & aceti parari poterunt; imò verò in causa frigida vinum solum usurpabitur.

Amatus Lusitanus sandaracham valdè laudat in aceto & vino decoctam, hoc modo.

℥. Sandarachæ ℥. j. vini & aceti ana lb. β. Coquantur, & colatura calida teneatur diutore.

Decoctum radicis vriticæ maioris, cum pauxillo nucis moschatæ & croci, in æquis partibus vini & aceti paratum, & calidè in ore detentum, humores illapsos mirabiliter extrahit. Ab initio quidem videtur dolor augeri, sed

sed paulò post mitigatur & desinit.

Radix lapathi acuti, vere, ante germinationem collecta & exsiccata, denti dolenti admota, specificâ proprietate dolorem dentium tollit; quod confirmatur Foresti experimento, quod habetur *obs. 6. lib. 14.* vbi etiam dictam radicem recentem in taleolas concisam denti dolenti feliciter applicauit in puella quadam; quo etiam remedio in aliis quamplurimis, præcedentibus vniuersalibus remediis, se feliciter vsum testatur.

Si corpus ritè purgatum fuerit, caput pituitâ non sit admodum repletum, masticatoria ad humores à parte affecta extrahendos, erunt efficacissima; quæ parantur, vel ex pyrethro solo dentibus diu præmanso, vel sequens componi poterit.

℞. Mastiches, pyrethri, & staphisagriæ ana. ʒ. j. β. hyoscyani ʒ. β. Puluerentur, & misceantur, ex iisque fiant globuli in panno lineo raro, quos diu masticet, frequenter expuendo.

In vulgari vsu habetur oleum caryophyllorum, quo rustulum gossipij intinctum denti admouetur; & si ferosus fuerit, cauo illius inseritur, sicque humor partii adhærens extrahitur, & illa roboratur.

Oleum camphoræ ad eundem vsum mirè est efficax.

Vel in olei caryophyllorum ʒ. j. solue camphoræ gr. viij. iisque eodem modo vttere.

Verùm præ cæteris commendatur, & miris laudibus effertur oleum buxi, quod si gossipio per stilum excipiat, & in foramen dentis gutta vnâ, vel altera iniiciatur, illicò dolorem tollit. Fit autem hoc oleum, conciso ligno buxi in multas particulas, deinde destillatur per descensum, duobus vasis, altero infra terram, alterò supra posito, & circa hoc apponitur ignis ex carbonibus validior, & oleum extillat in vas inferius.

Præter olea prædicta, Chymici etiam laudant oleum

A a ligni,

igni, quod vocant, Heraclei, seu corylini, eodem modo vsurpatum.

Si dolor ita vehemens sit, vt prædictis remediis cedere non valeat, ad narcotica veniendum est, quæ sub variis formulis à practicis proponuntur, & denti dolenti admoventur, quorum tamen effectus, non minùs quàm cæterorum topicorum, admodum incertus est. Verùm eadem assumpta dolorem certò cõfopiant. Inter cætera laudanum opiatum principem locum obtinet, quòd non solùm dolorem sedat, sed etiam fluxionem cohibet, & tutò exhiberi potest post remedia vniuersalia ad gr. iij. , vel iiij. modo à perito artifice præparatum sit.

Topica verò remedia ex narcoticis parata multa circumferuntur. Sequentia duo nobis sint instar omnium.

℞. Opij, myrrhæ, & ladani, an. ʒ. j. Puluerentur, & cum vino albo decoquantur in formam linimenti, quod pauco gossipio exceptum denti applicetur.

Alterum est emplastrum Riuerij, Henrici magni Archiatri, suprà descriptum.

Si vermes in dente fuerint, amaris enecandi sunt, & inter alia sequens conferre poterit.

℞. Aloës ʒ. j. camphoræ ʒ. ʒ. aquæ vitæ ʒ. ʒ. Misceantur & cum bombace denti admoueantur.

Norandum est rarò dentes dolere, nisi perforati fuerint, & erosio vsque ad cauitatem internam penetret, ac neruum tangat, idè vt doloris sensus auferratur, neruus adurendus est cauterio actuali, vel aqua forti, aul oleo vitrioli in cauum dentis immisso, quòd si frequenter iteretur, & dens valde corrosus fuerit, in fragmenta sensim rumpitur, & extrahitur.

Si hisce omnibus dolor dentium non cedit, & dens valde exesus fuerit, ferro extrahendus est, eoque extirpato

pato dolor statim cessat, non amplius reuersurus. Cauendum tamen est, ne dens euellatur eo tempore, quo fluxio impetu ruit, aut caput dolet, aut tumet gingiua, aut dolor atrox sentitur. Et monendus est Chirurgus, ne violenter & affatim, vno scilicet ictu dentem euellat, ne violentam extractionem consequatur maxima cerebri concussio, & ossis maxillæ disruptio, quem sæpè magna hæmorrhagia, febris, & interdum mors consequitur. Euulso dente, ea pars à qua extractus est, digitis vndiquaque comprimatur, vt ad naturalem statim redeat; postmodum æger os colluat oxycrato tepido, caueatque ab aëre frigido, ne noua fluxio in alios dentes delabatur. Si verò sanguis in tanta copia effluat, vt vix cohiberi possit; (quod interdum contingit: etiam sine maxillæ rptione, ex vena, vel arteria discissa; & refert Valeriola historiam cuiusdam, qui dente, sine vlla vi & sine ferro, sed solis digitis extracto, sanguinis lb. j. vno impetu eiecit, & altero die ferè tantumdem ex arteria gingiux supposita:) Sistitur vt plurimum ille sanguinis fluxus, appposito globulo solidiori ex linteo confecto, & digitis per horam vnam, aut alteram compresso. Quòd si non succedat, vitriolum vstum admouendum est, & linteum in aceto maceratum superimponendum, idque digito comprimendum, donec crusta inducta fuerit. Postremum remedium est cauterium ignitum, quo sanguis erumpens statim cohibetur.

Si quis meticulosus Chirurgi manum refugiat, & alijs remedijs sibi dentem extrahi cupiat, ea tentanda sunt, quæ ab authoribus passim proponuntur, & dentis casum promouere censentur; qualia sunt, pasta ex lacte tithymali, & thuris puluere simul incorporatis cum pauco amylo in cauum dentis immissa; radix ranunculi, cortex radiceis mori, cinis vermium terre-

strium, pyrethrum in aceto infusum, radix cucumeris  
agrestis in aceto infusa, & similia. Sed præ cæteris ef-  
ficacissimam vim obtinet ad dentium casum promò-  
uendum elleboraster, si eius folio contrito dens con-  
fricetur; sed diligenter cauendum est, ne alij dentes  
hoc remedio tangantur, eorum enim casum etiam  
promoueret. Quidam rusticus cùm dolore dentium  
acerbissimo premeretur, suaserit alter vt elleborastro  
dentem confricaret; ille incautè hoc vtens remedio,  
maiores partem dentium maxillæ afflicte confricuit,  
& intra paucas horas omnes propemodùm deciderunt.  
Si quis igitur tam vehemens remedium experiri cu-  
pierit, suaserim vt reliquos dentes cerà diligenter ob-  
ducatur, ita vt ille qui euellendus est, nudus relinqua-  
tur & actioni medicamenti pateat.

Quamuis tumor in maxillis obortus, vt plurimum doloris solutionem afferat, translata materia ad partes exteriores, vt tamē ille citō resoluatur, quādam remedia vsurpāta sunt, cui rei conferet sequens linimentum,

℞. Butyri recentis , & axungie gallinæ , ana. ʒ. j.  
pulveris iros Florent. ʒ. j. troci ꝑ. β. ol. chamæmel.  
& amygdal. dulc. an. ʒ. 6. Fiat linimentum.

Promptius operatur cataplasma ex ficibus , pane  
& aceto.

**Urtica contusa** maxillæ admota citò dolorem soluit.

Hæc est doloris dentium præsentis curatio. Si autem ille frequenter recurrere consueverit, ut in multis, huic affectui obnoxiiis cōtingit; prophylaxis adhibenda est, quæ in eo consistit, ut humorum ad partes istas fluentium generatio impediatur, & dentes ipsi roborentur, ne tam faciliè fluxionem excipiant. Si igitur ab humoribus calidis affectus producat, eadem curatio adhibenda est, quæ in calida hepatis intemperie & catarrho calido fuit proposita. Si verò à frigidis, & pituitosis

pituitosis humoribus ducat originem, frigidae cerebri intemperiei, & catarrhi frigidi curatio vsurpanda est, dentium verò roboratio ex sequenti capite erit desumenda.

---

## C A P V T I I.

### *De dentium nigredine & erosione.*

**D**entes non rarò nigrum, liuidum, aut flauum colorem contrahunt, ab humoribus vitiosis, illorum superficiei adhærentibus, qui longa mora eos tandem corroduunt, & carie afficiunt: Producuntur etiã iidem affectus à vaporibus terris sursum exhalantibus, qui ex prauis alimentis ingestis, aut à ventriculi intemperie cibos corrumpente exoriuntur. Plurimum ad dentes denigrandos confert hydrargyrum, siue toti corpori admotum, vt in lue venerea contingit; siue facies tantum eo illinatur. Vnde mulieres, quæ fucis ex mercurio vtuntur, dentes nigros, aut fædo colore infectos habere consueverunt.

Ad curationem, causa antecedens prius auferenda est, & si humores prauis in ventriculo redundantes huic malo originem dederint, euacuandi sunt, & partium eos producentium intemperies corrigenda, optimaque victus ratio instituenda, eaque alimenta eliminanda, quæ dentes corrumpere nata sunt, præcipuè verò dulcia.

Infinita propemodum ad dentes dealbandos proponuntur remedia apud authores, quæ vnusquisque experiri poterit. Nobis vnicum saltem sufficere poterit, quod in instanti dentes dealbat, ab omni sorditie liberat, & à carie præseruat, nempe spiritus sulphuris, aut

vitrioli , in quo exiguus bacillus demergendus est, eiusque extremo dentes confricandi , moxque linteo detergendi. In magna dentium sorditie purum & purum oleum vsurpari poterit ; aliàs verò cum melle rosaceo permiscendum, aut aquâ simplici temperandum erit, ne vsu frequenti gingivas erodat. Montanus *consil.* 113. refert se id didicisse Romæ ex quadam muliere, quam Mariam Græcam appellabant : ad quam cum venisset admodum iuuenis , atque illa esset annorum 20. postea quinquagenariam in eodem ferè statu eam reperit; quæ formæ atque vitium integritatem oleo vitrioli acceptâ tulisset, atque significasset, se ex eius vsu dentes , quos in iuventute pessimos habuerat, pulcherrimos habere & firmissimos, gingivas etiam firmas; & addidisset , quod videretur sibi ob eius vsum tardiùs senescere. Vsa erat autem singulis diebus vnâ aut alterâ guttulâ , gingivas & dentes leuiter fricando.

Cinis tabaci ad dentes abstergendos & dealbandos est etiam mirè efficax.

Ad præcautionem verò, & dentes conseruandos, primum ij à sordibus , & cibis quotidie mundandi sunt dentiscalpio ex ligno lentiscino , aut alia materia idonea; mox vino os colluendum, dentes verò confricandi puluere sequenti.

℞. Rad. bistortæ, aluminis , & corali albi ana ʒ. j. Fiat puluis tenuissimus, quo dentes confricentur. Vcl aqua sequenti abluantur.

℞. Aluminis vsti subtilissimè puluerati ʒ. ij. cinamomi integri ʒ. ss. aquæ fontis & rosarum , ana ʒ. iv. Bulliant in phiala vitrea supra cineres calidos , ad tertiæ partis consumptionem. Hoc liquore dentes confricentur manè , cum linteo in eo madefacto.

## CAPVT III

De gingivarum erosione &  
exulceratione.

**E**Roduntur gingiuae, & exulcerantur ab humoribus acribus & erodentibus ad eas confluētibus. Partes autem mandantes sunt cerebrū, ventriculus, lien; aliaeque partes. Lienosi praesertim vlceribus gingivarum maximè obnoxij sunt, vnde in scorbuto, magna earum partium exulceratio, & corruptio contingit. Interdum etiam ex lumbricis, aut corruptis humoribus ex quibus illi generantur, gingivarum erosiones solent cōtingere, ita vt illae diu perseuerantes, lumbricorum intus latentium indicia esse soleant. Sic refert Fabricius Hildanus *obs. 59. centur. 1.* cuiusdam ciuis Dusseldorpenfis puerum erosione gingivarum à longo tempore grauissimè vexatum, cum varia multaue remedia tam interna, quam topica adhibita fuisset, tandem vitā cum morte cōmutasse. Et aperto corpore tantam inuentam esse vermium copiam, vt aliquibus in locis intestina eroderent, multique in vacuo ventris reperti fuerint.

Curatio primū ad causam antecedentem dirigenda est, & humores vitiosi vacuandi per venae sectionem & purgationem, acres & calidi temperandi per apozemata, iulepos, iuscula medicata, & alia huiusmodi. Eorundem humorum fluxio auertenda per cucurbitulas & cauteria partibus idoneis admota. Ac denique partis praecipue affectae vitia corrigenda.

Postmodum verò ad topica veniendum est, quae pro magnitudine affectus varianda sunt: ita vt simplici erosioni ea tantum ad mouenda sint, quae astringendi &



exsiccandi vi prædita sunt, atque ita lotio sequens primum vsurpari poterit.

℞. Gallarum immaturarum, calycum glandium, & balauſtiorum, ana ℥. j. roſar. rubr. P. j. aluminis crudi ℥. iij. Coquantur in aquæ ferratæ partibus duabus, & vna vini rubri austeri; hoc decocto sæpè gingiuarum abluantur.

Si hoc decocto non tollatur eroſio, opiata ſequens adiungenda eſt.

℞. Sang. drac. ℥. iij. ligni aloës roſar. rubr. ſpodij, cornu cerui ad albedinem uſti & nucum cupreſſi, ana ℥. j. myrrhæ & cineris tabaci, ana ℥. iij. aluminis ℥. j. Fiat omnium puluis, qui excipiatuſ melle, additiſ ſpiritus vitrioli aut ſulphuris guttiſ aliquot. Fiat opiata, quæ extendatur ſupra linteola inſtar lamellarum, gingiuis applicanda hora ſomni.

Spiritus ſulphuris aut vitrioli, quemadmodum dentes mundificat & dealbat; ſic etiam gingiuarum putredinem arcet ſolus vel cum aqua, aut melle roſaceo permixtuſ, vt ſuperiori capite dictuſ eſt.

Si vlcuſ profunduſ fuerit, aut ſordiduſ, ſequenti balſamo illinatur.

℞. Myrrhæ electæ, & ſacchari candi, ana partes æquales. Puluerentur, iſſque impleatur album oui ad duritiem coctum, & per medium ſectum, poſtea filo probè alligetur, & ſuſpendatur in cella vinaria, ſuppōnendo vaſ vitreuſ, inſtillabit liquor, ſeu balſamuſ, quo pars ſæpiuſ in die illinatur.

Quod ſi prædictiſ remediis ex parte adminiſtratiſ, affectuſ non tollatur, & denſ vlceri vicinuſ carie affectuſ ſit, ad illiuſ auulſionem venienduſ eſt, & vlcuſ citò curabitur, alioqui incurabile proriuſ remanebit.

C A P V T I V.

De fluxu sanguinis ex gingiuis.

**S**anguis magnâ copiâ interdum è gingiuis fluere conlueuit , idque vel criticè vel lymptomaticè. Quamuis autem hæmorrhagia critica rariffimè per gingiuas fieri conlueuerit; id tamen interdum accidere docet experientia & authorum obleruationes. Sic refert Dodonæus *obf.* 14. cuidam Lato mo ecchymatis laboranti fanguinem è gingiuis erupiffè , eumque repressû ad vrinarios meatus translatum fuiffè , vnde cruenta vrina subsequuta est ; quæ cùm astringentibus cohibita fuiffet , iterum ad gingiuas se contulit, nec fluxus cessauit , donec æger à morbo liberatus est. Amatus Lusitanus *curatione 5. centur. 5.* refert quibusdam sanguinem è gingiuis vtiliter effluxisse , eoque cohibito nonnulla sanitatis incommoda prodiisse. Zacutus etiâ Lusitanus *obf.* 86. *lib. 1. praxis admiranda* , refert aurifabrum quemdam , cùm ex multo labore iuxta fornacem in ardentem febrem incidisset , & esset firmus ac fortis copiosam celebrasse phlebotomiam, cuius vi ita lenatus est, vt in 7. die præcedente gingiuarum pruritu , & labij inferioris ingenti dolore , ex venula gingiuar inferioris riuuli sanguinei profluerent per tres continuos dies , in tanta quantitate, vt libras ampliùs quinque excederent , & quantò plus sanguinis effluebat , tantò magis remittebatur febris , qua omninò extincta , sanguis sponte suâ cessauit omninò.

Symptomaticè verò sanguis è gingiuis profluit, ob suam acrimoniam, & vitiolam hepatis, aut lienis constitutionem. Sic in scorbuto familiaris est huiusmodi sanguinis è gingiuis effluxus.

Interdum etiam sanguis copiosè profluit ex dente euulso, lacerata scilicet arteriola, quæ radici dentis inseritur, unde tanta interdum sanguinis copia emergit, ut inde quibusdam mors contigerit,

Fluxus symptomatici curatio perficitur sanguinis detractione & purgatione, aliisque remediis viscerum affectorum vitia corrigentibus. Quibus succedent topica remedia, astringendi vi prædita, in gargarismatum, seu collutionum, puluerum, & linimentorum, aut opiatarum formam redacta.

Si euulso dente copiosa accidat hæmorrhagia, reuulsio primùm instituenda est per venæ sectionem & cucurbitulas, parti astringentia admouenda, quale est cataplasma ex bolo armena, terra sigillata, sang. dracon. aliisque astringentibus, albumine oui exceptis paratū: tum gypsum solum albumine oui exceptum, sanguinē fluentem potentissimè cohibet. Quæ si non sufficiant, patientis digitus loco imponendus est, ex quo sanguis erumpit, & tamdiu detinendus, donec sanguis supra orificium arteriæ coagulatus, non ampliùs effluat.

Si leuioribus hisce sanguis cohiberi nequeat, quod sæpè contingit, ad potentiora veniendum est. Valeriol. *obs. 3. lib. 5.* refert, in vetula ex dente putrido, sine vlla vi, ac sine ferro euulso, sed solo digito apprehenso, & lenissimo concussu educto, ingentem sequutam fuisse hæmorrhagiam ex arteria gingivæ subdita. Quem sanguinis fluxum cohibuit, cum leuiora sistere non potuissent, chalcitide vsta imposita, quæ in sistendo sanguine mirificam vim obtinet; nam & vehementer astringit, & caustica virtute instar ignis fluorem omnem reprimat. Zacutus Lusitanus *obs. 84. lib. 1. Praxeos Medica admiranda*, refert historiam cuiusdam, qui cum dentis dolore premeretur immaniter, illum violento concussu, ferri ope eduxit. Extracto eo, ex la-

cerata

cerata arteria gingivæ subdita, copiosa sequuta est hæ-  
morrhagia; quæ cum venæ sectione, cucurbitulis, &  
astringentibus apposis cohiberi non potuisset, neque  
digito vulnere imposito, neque chalcitide vstâ admo-  
tâ, tandem illius consilio, locus pulvere gummi Arabici  
impletus est, quod auxilium ita profuit, vt post tres  
horas sanguis fuerit omninò restrictus, hoc enim  
gummi obstruendi, refrigerandi, glutinandi & exsic-  
candi vim habet. Idem Zacutus *obs. 85. eiusdem libri*,  
refert militem quendam strenuum, dentem, cuius sæ-  
uissimo cruciabatur dolore, ferro cum extraxisset vio-  
lentiâ summâ, vehementem passum esse sanguinis flu-  
xum ex arteria, cui dens innitebatur. Sanguine biduo  
vbertim fluente, peritissimi Medici, omnis generis ob-  
struentia extrâ apponunt, reuellentia consulunt, arte-  
riam candenti ferro inurunt: At incassum omnia:  
nam sanguis maiori impetu prosiliens, cum in statum  
morti valdè propinquum, viribus penè exhaustis dedu-  
xerat. Vocatus Zacutus Galenicum emplastrum ex  
aloë, thure, & pilis leporini exactissimè trituras, &  
mixtis cum candido oui imposuit, quo intra pau-  
cas horas sanguis fuit omninò suppressus, & æger à  
mortis faucibus ereptus. Hoc pretiosissimo auxilio à se  
primùm inuento gloriatur Gal. *lib. 5. meth. cap. 7. in-*  
*cisam in gibbero arteriam, fuisse conglutinatam, &*  
*cap. 4. eiusdem libri*, tum etiam *libro de curandi ratione*  
*per sang. miss. cap. ultimo*, huius remedij præstantiam  
confirmat, & quibusdâ historiis illustrat.

## CAPUT V.

## De oris &amp; faucium ulceribus.

**L**euia & superficialia oris vlcera, vulgò Aphthæ nominari solent, quamuis apud Hipp. & Galenum, interdum hoc nomen pro aliarum partium vlceribus vsurpatum reperiatur; quæ verò profundius se demittunt, oris, vel faucium vlcera absolutè nominantur; qualia sunt ea, quæ lue venerea affectis contingere solent.

Hæc autem vlcera generari solent ab acris humoribus, aut vaporibus à variis partibus in fauces translatis. Sic in febribus malignis huiusmodi vlcera sæpissimè contingunt, & in iis qui calidiori hepatis, aut aliarum partium intemperie laborant, aut corruptorum humorum illuue scatent; vnde puerulis aphthæ sæpissimè contingunt, ex Hipp. *Aph. 24. sect. 3.* tum ob lactis acrimoniam, quæ in transitu partes illas molliissimas exulcerat, vt docet Gal. in *comment. illius Aphorismi*, tum quia lac in ventriculis puerulorum sæpè corrumpitur, & acres vapores ad os transmittit, vt idem Gal. *asserit. 9. de compos. med. sec. loc. cap. ultimo.*

Variæ autem sunt huiusmodi vlcerum differentia, non solum quòd alia leuiora, alia deteriora sint; alia pueros, alia adultiore infestent; sed etiam quòd alia cum inflammatione coniuncta sint, alia verò minimè. Hi varij gradus reperiuntur; pro varietate humorum à quibus generantur. Velenim fiunt à sanguine, vel à bile, vel pituita, vel melancholia, seu potius attrita bile, quæ non solum exurentem, sed etiam plerumque malignam qualitatem obtinet, & vlcerum *ακαήθην* generare solet.

Hæ autem differentiæ propriis signis distinguuntur, siquidem vlcera rubicundiora à sanguine oriuntur; flauiora à bile, albescentia à pituita; & liuida ab atra bile, fetida putredinem adesse significant.

Quod ad prognosim attinet, aphthæ propriè dictæ facillimè curantur: vlcera verò profundiora, aut putredinem adepta, *vulnus* à Græcis appellata, difficilior curantur. Et in pueris illa periculosiora sunt, tum propter carnis mollitiem, quam huiusmodi vlcera magis depascuntur; tum quòd remedia potentiora, ob eandem carnis mollitiem ferre nequeunt. Vnde fit vt pueri interdum ex hoc affectu intereant, si malignitatem & putredinem comitem habuerit.

Ratione causæ, etiã minùs periculosa sunt vlcera, quæ à pituita; magis, quæ à sanguine vel bile; maximè, quæ ab atra bile generantur.

Vlcera nigra & crustosa, pessima & lethalia sunt, præcipuè in pueris.

Fauces exulceratæ cum febre, difficiles sunt, vt docet Hipp. 3. *prog.* quia vt Gal explicat, humoris erodentis malitiã indicant.

Curatio instituitur primùm idonea victus ratione, quæ refrigeret & exsiccet; ac causæ antecedentis generationem impediat. Pueris itaque, si à lactis vitio malum contraxerint, nutricis mutatio præcipiatur, aut propriæ nutricis lac corrigatur cibo & potu laudabili; tum etiã venæ sectione & purgatione, si opus fuerit. Præsertim verò nutricibus præscribantur edulia refrigerantia & astringentia, qualia sunt cydonia, pyra, mespila, sorba, lactuca, & portulaca. In adultis eadem præscribantur, & vitentur acrida, salsa & piperata.

Deinde causæ antecedenti prospiciendum est vniuersalibus euacuationibus, pro ætatis ratione vsurpatis. Ac primùm phlebotomia humores ad partem fluentes  
potenter

potenter reuellit , eorumque acrimoniam temperat , totum corpus refrigerando.

Huic succedere debent cucurbitulæ scarificatæ , hiru-  
dines penè aures , & sub mento affixæ , vesicatorium  
posteriori ceruici admotum.

Posteriâ die à venæ sectione purgatio præscribenda  
est humori peccanti , & ætati congrua.

Eodem tempore , nempe ab ipso curationis princi-  
pio , topica administrentur , stomatica à Galeno appel-  
lata ; eaque ab initio mitiora sint , qualia sunt gargarif-  
mata , vel oris collutiones ex aquis plantaginis , matri-  
sylvæ , peculi rosarum , syrupo de rosis siccis , & de mo-  
ris paratæ . Vel decocta ex foliis plantaginis , rubi , cen-  
tinodiæ , balaustiis , santalo rubro , & similibus , cum sy-  
rupis prædictis . Et si inflammatio adfuerit , vtiliter  
addi poterunt succi solani , semperuiui , portulacæ , &  
sal prunellæ , in ea quantitate , quæ acrimoniâ non fe-  
riat ; vel illius loco alumen crudum in parua dosi ad-  
misceri poterit.

Si non sit inflammatio , vnicum ac summum re-  
medium est spiritus vitrioli , aut sulphuris , qui in  
adultis purus ac putus vsurpari poterit , intincto in  
eum gossipio bacili apici alligato , eoque vlceri admo-  
to , leuissimo contactu ; sic enim aphthæ simplices  
momento ferè curantur . In pueris verò permiscetur di-  
ctus spiritus cum melle rosaceo , eâ proportionem , vt  
aciditas linguam leuiter feriat , & cum penicillo ex lin-  
teo , baculo alligato , aphthæ illinuntur frequenter , &  
citò curantur.

Si admodum dolorifica sint vlcera , cum inflamma-  
tione coniuncta , lacte frequenter gargarifato demul-  
centur , vel lactis defectu , emulsionibus sem. frigid. vel  
mucilag. sem. psyllij & cydon. cum aquis rosar. plantag.  
solani extractis.

Si

Si denique dolor pertinax reuulsionibus propositis, & topicis non sedetur ; sed ab illius vehementia copiosi humores acres continuò attrahantur , unde vigilia continuæ exoriuntur , & corporis consumptio sequitur , que vitæ summum periculum minatur ; extremum remedium est ad narcotica confugere , quæ dolorem sedant, & humorum influxum inhihent, eorumque dosis metienda est pro ætate & viribus.

Ego aliquando puerum quatuor annorum ab orci faucibus , Dei beneficio , liberaui , exhibito laudani gr. j. cum eius fauces & lingua profundis vlceribus lacerent , cum tanta inflammatione , vt ne iuscula, nec topica remedia ferre posset , & tanto humorum acrium affluxu , vt illi continuò ex ore , riuuli instar emanarent , & puer dies noctesque insomnes eiulando transigeret.

Si vlcus sordidum ac putridum euaserit , abluatur primùm decocto hordei & melle rosaceo , & in pueris lacte chalybeato , cum conserua rosarum agitato: mox ad fortiora transeundum est , & in primis mel rosaceum suprâ laudatum , & guttis aliquot spiritus vitrioli acidum redditum , multum confert.

Si hæc non sufficiant , aquis ; vel decoctis suprâ descriptis addi poterunt alumen vstum , collyrium Lanfranci, vel vnguentum ægyptiacum , maiori vel minori dosi , prout affectus vehementia postulare videbitur. Si denique à lue venerea faucium vlcus procedat , non nisi lue sublatâ curari potest.



## CAPUT VI.

*De Vulvæ relaxatione.*

**V**ulvæ relaxatio contingit ab humore pituitoso à capite in eam delabente, cui non raro sanguinis quædam portio admiscetur, & tunc cum relaxatione inflammatio coniuncta est, quæ etiam tonsillis frequenter euenire solet; quarum tamen inflammationum curationem omittimus, cum iisdem remediis perfici valeat, quæ ad linguæ inflammationem, & oris vlcera cum inflammatione coniuncta proposita sunt.

Humor igitur pituitosus in columellam defluens, eam humectat, emollit & relaxat, vt longior facta partem superiorem œsophagi tangat, & nauseam pariat. Tum etiam laborantes bolum quendam in summo œsophago habere videntur, quem frustra deuorare conantur, vt hoc solo signo sine inspectione, vulvæ relaxatio dignosci valeat.

Illius curatio primum ad causam antecedentem dirigenda est, sicque humores à capite fluentes euacuandi, reuelliendi ac deriuandi iis remediis, quæ in catarrhi curatione fuere proposita.

Topica verò in principio sint astringentia & repellentia, qualia in gingivarum & faucium vlceribus fuere proposita, & in curatione Anginæ capite sequenti proponentur, quibus postmodum resoluentia & exsiccantia erunt admiscenda. Et licet gargarismata dictis locis proposita, hîc vtilia sint, tamen vbi nulla est inflammatio, puluerum vsus efficacior est, iis enim vuluæ relaxata potentiùs constringitur, & exsiccatur. Atque  
ita

ta primùm admouebitur cortex granatorum subtilissimè pulueratus , cui in progressu tantillum piperis admisceri poterit. Vel

℞. Rosar rubr. balaust. corticis granat. ana ʒ. ʒ. rad bistortæ, tormentillæ, gallarum immatur. ireos Florent. ana ʒ. j aluminis vsti ʒ. ij Fiat puluis. Vulgus Chirurgorum piper longum pulueratum ad mouent , quod non vacat periculo ; siquidem metuedum est , ne humores affatim à cerebro ad partem affectam attrahantur , & graue aliquod damnum afferant.

Modus autem huiusmodi pulueres adhibendi talis est. Linguâ speculo oris depressâ , mox spatulâ chirurgicâ, aut cochleari perexiguo ad id concinnato, puluis vuulæ admoueatur : quod pluries in die repetendum est , donec humor columellæ imbibitus prorsus absumptus sit. Vt autem puluis vuulæ vndique aspergi atque insufflari possit , vtile est instrumentum à Fabricio Hildano inuentum , & descriptum *obs. 21. centuria secunda* , quod inde mutuari curiosus quisque poterit.

Denique si relaxata columella prædictis remediis ad pristinum statum reduci non valeat , sed elongata permanens grauem continuò molestiam inferat ; vltimum erit summitatem eius præscindere. In qua operatione quædam cautione exhibendæ sunt. Prima desumitur ex Hipp. 3. *prog. text. 21.* vbi, *gurguliones* , inquit , *cum periculo secantur , & scarificantur , & adurantur , quoad rubidi magnique fuerint ; inflammatio enim supervenit & sanguinis fluor. Sed hos oportet aliis moliminibus extenuare eniti per illud tempus. Vbi vero pensile fuerit omne id , quod vnâ appellant , sitque pars gurgulionis summa maior ac orbiculata , superior verò tenuior , per illud tempus admoliri manus tutum est. Sed*

B b præstat

præstat ubi aluum subduxeris , uti chirurgiâ , si liceat per tempus , nec ager stranguletur. Galenus in comm. huius loci verba Hipp. explicans , dicit gurgulionem inflammatione laborantem non esse præscindendum , aut scarifcandum , sed eâ tantum sedatâ ita ut pars superior saltem gurgulionis extenuata sit.

Alterâ cautio desumitur ex Paulo Ægineta lib. 6. cap. 31. ut scilicet columella ferro non attingatur , quando liuida aut subnigra est , nempe malignitatis cuiusdam particeps , vel ad canceri naturam accedens. Sed ex eodem Paulo , in iis operatio tuto perfici potest , quæ tenues sunt , oblongæ , albicantes , & ut ait Hipp. in suprema parte imminutæ. Huius operationis foeliciter peractæ exemplum habemus apud Amatum Lusit. obs. 65. cent. 3. in quodam studioso , qui gurgulionem habebat lori modo oblongum , & exanguem : cui cum nulla remedia profuissent , portio eius superflua forcipibus præcisa est , & illicò oleo vitrioli contacta , sicque æger ab eo incommodo liberatus est.

Tertia denique cautio in hac operatione adhibenda est , ne nimia gurgulionis quantitas abscindatur : inde enim vocis & respirationis læsionem exoriri docuit Galenus 11. de usu part. cap. 11. & ex integra illius consumptione , ut in lue venerea aliquando contingit , tabes , & mors non raro subsequuta est.

## CAPVT VII.

## De Angina.

**A** Nginae nomen in genere sumptum, omnem faucium & gutturis affectionem significat, quâ respiratio, & deglutitio impeditur, nullo existente in pulmone aut thorace vitio. Eaque duplex est, legitima, & spuria.

Legitima fit ab inflammatione, quâ muscoli faucium & laryngis tumefacti, respirationis & deglutitionis vias coarctant & angustiores reddunt. Illa autem inflammatio vel larynginem occupat, vel fauces, quæ pharyngis nomine enunciari consueuerunt. Vtraque pars musculos habet internos & externos. Ac licet ut plurimum pharynx & larynx propter viciniam & continuitatem in Angina patiantur, modò tamen hic, modò ille magis afficitur; vnde non exigua symptomatum differentia emergit, quorum ratione quatuor à Gal. 4. de loc. affect. cap. 5. propositæ sunt anginae differentiae, quas recentiores Græci, qui paulò ante Galeni sæculum vixerunt, propriis nominibus, nimis curioso, (ut idem Galenus censet,) verborum aucupio, designarunt, vnam vocantes *σωάγλη*, alteram *κρυάγλη*, tertiam *ἡδερωάγλη*, quartam, *ἡδερωάγλη*. Si inflammatio interiores propriosque laryngis musculos occupet, *σωάγλη*; si ynteriores pharyngis musculos, *κρυάγλη*; si exteriores laryngis musculos, *ἡδερωάγλη*, ac denique si exteriores faucium musculos innadat, *ἡδερωάγλη* appellatur.

Non solum autem plerumque faucium & laryngis musculi simul inflammantur, ut antea dictum est; sed

etiam interdum ad vicinas partes & ceruicem ipsam exteriorem inflammatio protenditur; vt in diagnosi & prognosi huius affectus dicitur.

In hisce omnibus speciebus, cum periculosior est morbus deglutitione impedita, solent assumpta ad nares resilire præcipuè liquidiora, quorum deglutitio difficilior est; propterea quoddam liuida, cum sese latius diffundant, non possunt ita faciliè à musculis comprehendi, vt ad œsophagum detrudantur, eorumque maiori contractione indigent, quæ ob inflammationem sufficienter non fit; solida verò alimenta cum magis corpulenta sint, superficiali tantum musculorum actione indigent, & leui eorum contractione deglutiantur. Contingit tamen aliquando vt solida difficilius, liquida verò facilius deglutiantur, quod ex partium affectarum diuersitate dependet. Siquidem musculus larynginis non solum ad vocem efformandam, sed etiam cibum deuorandum destinati sunt; dum enim cibus in œsophagum impellitur, larynx cum lingua sursum effertur. Ad potum verò hauriendum magis linguam vtimur, quæ dum intus retrahitur, ex labiis liquorem ducit ad fauces. Si igitur musculus linguam mouentes magis afficiantur; potus deglutitio difficilior est: si verò laryngis musculus magis lædantur, cibus difficilius ingeritur.

Hic obiter annotandum, Hippocratem aliquando nomine Anginæ, laryngis tantum inflammationem intelligere, & sic magis strictè hoc nomen usurpare, cuius rei exemplum habetur 6. *Epid. sect. 8. text. 1.* vbi sic loquitur. *Quibusdam verò faucium inflammationes aderant, aliis angina*: vbi nomine anginæ, musculorum laryngis inflammationem intelligit, & à faucium inflammatione distinguit.

Spuria angina febris est expers, & duplex iterum statuitur.

statuitur. Prima & communissima est, quæ ab humore pituitoso producitur, in fauces & partes laryngi vicinas delabente. Altera verò fit à luxatione vertebrarum ceruicis; quâ gulæ gutturisque introitus premitur & coangustatur.

Veræ anginæ causa, vt & aliarum inflammationum est sanguis vel sincerus vel biliosus, pituitosus aut melancholicus, qui è venarum iugularium ramis in dictas partes effunditur, isque vel attractus à calore aut dolore illarum partium; vel transmissus aliunde, si partes illæ debiles, aut laxæ, ad suspiciendam fluxionem idoneæ fuerint: tum si humorum copia adfuerit in toto corpore, vel in capite, vel in partibus faucibus vicinis. Sanguis enim in toto corpore redundans, vel prauâ qualitate affectus, dum ad caput transfertur, cerebrum verò robustum est, ab eo non recipitur, sed per easdem venas ad subiectas partes retruditur; vnde in iis variæ inflammationes fiunt, parotides, ophthalmiæ, anginæ, & similes.

Iuuenes anginæ magis obnoxij sunt, quàm senes, quia multo biliosoque sanguine abundant; tum etiam qui habitu corporis sunt crasso, ac multo sanguine abundant, præsertim in capite.

A nonnullis authoribus annotatum est, viros magis esse obnoxios anginæ, quàm fœminas: quod videtur Hipp. obseruasse 6. *Epid. sect. 7.* vbi epidemicam constitutionem describens, in qua anginæ, tusses, peripneumoniæ vagabantur, paucissimas fœminas aegrotasse affirmat. Cuius rei non aliam causam refert, nisi quod minùs in publicum prodibant, quàm viri, & ita aëris externi iniuriis sese non obiciebant. Quæ ratio propositioni vniuersali non conuenit, quod fœminæ minùs anginæ sint obnoxie, quam viri. Vera autem ratio talis esse potest, quod fœminæ sanguinem frigidiorē, la-

ryngem minorem, & gutturis venas angustiores exilio-  
resque habeant. Quorum ratione partes illæ fluxionem  
tam facile non recipiunt.

Ad causas internas reuocari possunt morbi præce-  
dentes, vt febres continuæ, putridæ, ardentes & in pri-  
mis epidemicæ: qualis fuit illa, quæ recensetur à Fore-  
sto *ab. 2. lib. 6.* quæ contigit anno 1517. In qua omnes  
laborantes grauissimâ faucium inflammatione corri-  
piebantur, & intra sexdecim, aut viginti horas mori-  
iebantur, nisi ante sex horas ab inuasionē sanguis de-  
traheretur. In hac autem angina febris symptomatice  
non est, sed potius essentialis, & angina illius veluti  
symptoma, quando materiæ morbificæ pars ad hunc  
locum propellitur. Fiunt autem in febribus epidemicis  
aliquando angina, alias pleuritides, peripneumonia,  
dysenteria, & similes affectus, ab occulta quadam vi,  
& astrorum influxu, quo nunc hæ, nunc illæ partes ma-  
gis afficiuntur.

Quidquid autem fluxiones humorum ad istas par-  
tes exercitare potest, inter causas huius affectus exter-  
nas recenseri debet: qualis est austrina constitutio diu-  
turna, iuxta *Aphor. Hipp. 16. sect. 3.* *Morbi in pluuiarum  
multitudine magnâ ex parte fiunt, febres longæ, alui pro-  
fluvia, putredines, morbi comitiales, apoplexia & angina.*

Ad hunc etiam affectum producendum maximè fa-  
cit temporum inæqualitas, quando à calore laxantur  
partes, & à frigore subito superueniente humores ad  
eas propelluntur. Idem præstat subita refrigeratio ab  
incalescentia, frigida potus post eandem: tum etiam  
si caput pluribus tegumentis incalescat, vel nudum æ-  
ri frigido exponatur.

Primæ spuria angina speciei causa proponitur ab  
*Hipp. 4. de vi&lt;. rat. in morb. acut. text. 39.* vbi sic loqui-  
tur. *Synanchus fit, cum hyeme verèque multa fluxio &  
viscosa*

*viscosa à capite ad venas iugulares descendit ; cum autem frigida & glutinosa fuerit , spiritus obstruit permeationes.*

Alterius denique spuriae anginae speciei causa proponitur ab Hipp. 2. *Epidem. sect. 2.* tumor nempe, seu tuberculum iuxta vertebrae cervicis obortum, ac praecipue illam, quae dens seu dentiformis ab eodem Hipp. nominatur, à quo tumore vertebrae ad interiora trahuntur, & consequenter cavitas in parte exteriori apparet. Hic autem tumor, vel ab humore pituitoso fit, copiâ suâ vertebrae à propria sede dimouente; vel à sanguine in musculos effuso, unde inflammatio fit, à qua muscoli contracti vertebrae ad anteriora trahunt; & tunc vera est angina, ab inflammatione scilicet dictorum musculorum oriunda. Potest etiam fieri luxatio vertebrarum ab humore pituitoso earum vincula laxante, & internodia lubrica reddente. Ac denique potest fieri à causis externis, casu scilicet vel percussione, quemadmodum reliquae omnium totius corporis articularum luxationes.

Angina primò in genere dignoscitur ex illius signis pathognomonicis, respirandi nempe, & deglutiendi difficultate, absque aliquo thoracis, aut pulmonum vitio; dolor praeterea circa fauces & guttur percipitur; tum etiam in legitima angina, rubor, calor & febris.

Differentiae verò propriis etiam signis distingui possunt. In synanche enim minor est respirandi difficultas, deglutiendi verò maxima, ut liquida vix transire possint, sed potus ferè per nares reiciatur.

In Parasynanche minor est respirationis difficultas, imò perexigua, cum musculorum faucium externorum inflammatio parùm respirationi officiat; dolor etiam & rubor foris in ceruice percipitur, cum inflammatio partes externas occupet.



In cynanche maxima est respirationis læsio, ita ut ægri strangulari videantur, & paucis etiam horis aliquando strangulentur; ac non nisi erectâ ceruice, & aperto ore spirare valeant. Fauces vehementer dolent, nullus tamē rubor aut tumor, neque in faucibus intus, neq; extrâ in ceruice apparet. Lingua liuida est, nigra, inflexa, vel retorta, ob summam venarum circa linguam repletionem. Acutissima etiam febris adesse consuevit. Huius speciei descriptionem accuratam videre est apud Hipp. 3. *de morbis*. Hoc autem notatu dignissimum est, quod tamen à paucis animaduersum, nō tantum in hac specie musculos laryngis interiores affici, sed ipsum etiam pulmonem, vnde tanta respirationis difficultas & suffocatio exoritur; quod à Dodonæo luculēter obseruatum est *obs. medicinalium cap. 18*. Vbi refert historiam cuiusdam lanionis, qui cum meridie circa laryngem & fauces dolorem sensisset, & quandam in deglutiendo cibo ac potu difficultatem, nocte strangulatus interiit: huius corpore aperto inuenta est pulmonis substantia in pus conuersa. Alia exempla annotauit anno 1565. in quo multi angina correpti, apparente circa laryngem dolore, & tandem desinente, in peripneumoniam inciderūt, iisque defunctis pulmones, vel purulenti fuere, vel abscessum habuere; iuxta verò laryngem, aut eius musculos nihil occurrit, quod vel adesse, vel adfuisse inflammationem ostenderet. Et in his casibus censet laryngem non primariò, sed per consensum laborasse; & verisimile esse, destillante humore à capite, asperam arteriam, eiusque ramos impleri, atque distendi; deinde eodem ad alia vasa transmissio, asperam arteriam & laryngem à dolore liberari, pulmones verò affici, & hoc modo ex angina in peripneumoniam permutationem fieri. In hac autem angina pulmonem non rarò affici colligere possumus ex dictis Hippocr.

Hippocr. quæ habentur 4. acut. text. 30. & 31. ubi duas anginae species proponit pro humoris diuersitate: vnâ, in qua fluxio pituitosa, hyeme & vere, ad venas iugulares fertur: alterâ, in qua humores biliosi infestant, quod æstate & autumnò contingit. De hac autem posteriori sic loquitur. *Cum ex capite fluxerit calida & nitrosa fluxio, vipote acris, mordet, ulcerat, spiritum implet, orthopnoeam parit, siccitatemque multam. Præterea quæ intuenti apparent, haudquaquam tumentia videntur; tendines quoque cervicis posteriores contenduntur, apparentque tetani modo intendi; vox abrupta, spiritus paruus, spiritusque reuulso frequens & violenta accedit, talibus arteria ulceratur, incenditurque pulmo, neque externum aërem admittere intrò queant.* Hæc Hippocrates. Dicit autem calidam & acrem fluxionem orthopnoeam parere, quia mordet, ulcerat & spiritu implet; feruntur enim spiritus ad locum demorsum, hinc pulmonis repletio, vnde orthopnoea, cum non sit locus in quem externus aër admittatur, quantumcunque thorax dilatetur. Eandem sententiam confirmare videtur Hippocr. 3. de morbis, ubi in curatione Anginae dicit, venam secandam esse sub mamma, nam hac parte comitatur ex pulmone spiritus calidus. Et paulò post inquit, faciendum ut quàm citissimè spuat, & pulmo gracilis fiat; quasi intumuerit pulmo ex spiritu calido replente. Notissimum autem est, cum spiritus ad partem aliquam defertur magnâ copiâ, cum eo etiam sanguinem transferri, qui si tantâ copiâ affluat, ut à natura commodè regi nequeat, inflammationes & abscessus efficere solet, vnde non mirum est, si in tali angina pulmones purulenti euadant.

In paracynanche respiratio minùs difficilis est, quàm in cynanche: difficilior autem quam in synanche; rubor ac tumor aliquis in faucibusprehenditur.

Angina spuria ex pituita dignoscitur ex febris earentia, & humore pituitoso ad os magnâ copia confluente.

Spuria verò angina ex luxatione genita cognoscitur ex motu capitis ac ceruicis læso, & cauitate quæ in ceruice præternaturaliter apparet, ob vertebam intus depressam.

Causarum dignotio ex vniuersalibus humoris in toto corpore dominâti signis elicitur, tum etiam particulâribus. Quando angina fit à sanguine, in facie calor & rubor apparet, & maior distensio in parte affecta. Quando fit à bile, dolor & calor maior est, cum siti, oris amaritudine, & acrimoniæ sensu. Et si à pituitoso sanguine fiat, dolor & rubor minor est, & febris exigua.

A parte affecta quædam etiam humoris peccantis diagnosis haberi potest. Sanguis enim biliosus plerumque in laryngi musculis potius inflammationem facit pituitosus fauces magis aggreditur. Cum enim exiles sint laryngis venæ, non nisi sanguis tenuis ad eas penetrat: Fauces verò quæ laxæ & spongiosæ sunt, pituitosos humores facilius recipiunt.

Denique ex anni tempore humoris peccantis diagnosis desumi potest. Anginæ enim biliosæ maximè æstate, & autumnô proueniunt; quod in æstate bilis generatur, & in autumnô retinetur. Pituitosæ verò hyeme & vere fiunt, propterea quod hyeme maximus fit pituitæ prouentus, tum etiam vere; quia collecti humores in hyeme, tunc temporis liquantur, & à capite in partes subiectas decumbunt.

Quod ad prognosim attinet, angina vera morbus est acutissimus, & valdè periculôsus, propter respirationem impeditam, & strangulationem, quæ non raro contingit à constrictione meatus per quem fit respiratio. Ided quod maior fit constructio, eò maius periculum; & sic  
prima

prima species anginae omnium periculosissima est, quia inflammatio musculorum internorum laryngis meatum magis præcludit. Vnde Hipp. Aph. 34. sect. 4. sic loquitur. *Si febrem habenti suffocatio repente superveniat, nullo tumore in faucibus existente, lethale est.* Quam sententiam confirmat in Coac & progn. dicitque huiusmodi anginas eadem die & 2. & 3. & 4. strangulare.

Secunda species anginae, licet admodum periculosa sit, paulò minùs tamen lethalis est, quàm prima; quia inflammatio musculorum externorum laryngis, tantam tamque subitam constrictionem non facit. De hac loquutus est Hipp. 3. progn. text. 17. his verbis. *Quæcumque verò (id est, anginae) dolorem alioquin alteri similem inferunt, in faucibus verò tumorem & ruborem excitant, vnde quidem lethales sunt, præcedentibus verò diuturniores, si rubor fuerit magnus.*

Tertia species minùs periculosa est, quia in ea minùs læditur respiratio, quàm deglutitio ab inflammatione musculorum faucium internorum. Læsa autem deglutitio non ita periculosa est. De hac etiam loquitur Hipp. lib. antica citato, textu 18. his verbis. *Si quibus verò fauces rubent, & cervice, hæc diuturniores sunt: maxime verò eis servantur, si servix ac pectus traxerit ruborem, nec facer ignis intrò recurrat.*

Quarta denique angina species, omnium leuissima est, & securissima; quia inflammatio longiùs à gutture abest; hinc Hipp. Aph. 37. sect. 4. sic loquitur. *Angina correpto si tumor in collo appareat, bonum; extracervicem vertitur morbus.* Idem confirmat 3. progn. text. 20. his verbis; *Securissima verò si tumor, aut rubor quam maxime foras vertatur.*

Has omnes differentias unicâ sententiâ complexus esse visus est Hipp. 6. Epid. sect. 7. ubi de lignis anginae Epidemicæ loquens, hæc habet. *Id sunt, qui scilicet*  
digniter

deglutire non poterat , his valdè mites & tolerati faciles erant ; pessima verò his , quibus unà spiritus sublimis erat.

Si anginae materia in pulmonem transferatur , vel moriuntur ægri , vel in desipientiam aguntur , vel emyici fiunt , vt docet Hipp. *Aph. 10 sect. 5. & 3. progn.*

In angina valdè vrgente , si spuma circa os appareat , lethale est , ex *Aph. 42. sect. 2.* summam enim cordis angustiam significat , feruoremque intensissimum à quo propria pulmonis humiditas exprimitur , & ad spumæ formam in os transfertur.

Angina laborantes , nisi celeriter cocta expuant , sed pauca , viscida , crassa sputa reddant ; malè & lethaliter habent : Hipp. *in Coacis.*

Tumores faucium in angina , sine vlla ratione repente euanescentes , lethales sunt , Hipp. *in Coacis.* Sine vlla ratione , id est , sine præcedente euacuatione per artem , vel crism facta : significant enim materiæ ad interiora recessus , vnde periculosior morbus in partibus internis excitari potest , vel quod interdum accidit , materiâ ad eandem partem iterum delatâ , subito suffocationem inducit.

Anginae curatio iisdem indicationibus perficitur , quæ in omnium inflammationum curationibus observari consueverunt. Sicque humor ad partem confluens reuellendus & repellendus est ; qui iam fluxit , derivandus & resoluendus : quod si resolui nequeat , concoquendus & suppurandus : quæ omnia sequentibus præsiidiis perfici poterunt.

Primò victus ratio instituetur tenuissima , refrigerans & humectans ex cremore hordei , iusculis pullorum , aut caponum , herbis refrigerantibus alteratis , & aliis huiusmodi. Si ob œsophagi angustiam ab inflammatione contractam æger deglutire nequeat , vt inde virium

virium defectio & interitus metuatur : ab eo periculo liberari poterit , immisso in œsophagum cathetere, cui syringa aptabitur , per quam iusculum in ventriculum immiti poterit. Practici clysteres nutrientes vsurpant , quibus aliquid nutrimenti ad hepar per venas mesaraicas transferri potest. Potus sit aqua hordei , & reliqua in febribus acutis obseruari solita. Aer sit temperatus , & omnis illius excessus arceatur ; frigidior namque meatus constringit , calidior verò fluxionem & inflammationem auget. Ager capite sublimi & erectâ ceruice decóbat, vt facilius respiret; somnus , vt in omnibus internis inflammationibus , maximè arcendus est ; nam vt docet Hipp. sanguis in somno ad interiora recurrit , sicque humorum confluxus ad partem affectam augetur.

Cùm autem angina sit morbus acutissimus , & vno interdum die hominem de medio tollat, magna remedia summâ curâ & diligentia vsurpanda sunt. Idèò quacunque diei horâ vocetur Medicus , sanguinem statim detrahat, è directo partis magis affectæ, è vena cephalica, aut si ea satis conspicua non sit, è mediana, ad lb. j. lb. j. s. lb. ij. quantum vires ferre poterunt. In hoc enim remedio præcipua salutis spes constituenda est; non tamen vnâ vice magna illa sanguinis copia detrahenda est , ne æger in animi deliquium incidat , ex quo non exiguum vitæ periculum emergeret ; sed partitè, & per aliqua interualla, tertiâ nimirum, aut quartâ quâq; horâ. Hæc autem sanguinis missio tantopere est necessaria in hoc affectu, vt à nullo contraindicante retardari debeat. Sic fluentibus mensibus aut lochiis, & in quocunque grauiditatis tempore , sanguis magnâ copiâ detrahendus est. Cuius rei exemplum habemus apud Zacutum Lusitanum *lib. praxis admir. cap. 135.* de quadam muliere , quæ grauida septimestris , anginâ sæuâ correpta

repta, septis in vna die phlebotomiâ celebratâ, liberata est.

Si morbus nō vehemēter vrgeat, venæ sectioni præmittatur clyster laxās; sin minùs, à venæ sectione iniiciatur.

Dum iteratur phlebotomia eadem die, aliæ reuulſiones ſiant per cucurbitulas, tum ſiccas, tum ſcarificatas ſcapalis & lumbis admotas, frictiones partium extremarum, & ligaturas dolorificas.

Detraçto ſufficienter ſanguine, ad purgationem veniendum eſt, quæ ſequenti die uſurpanda, non expectatâ humorum coctione, quia morbus non dat inducias; idque potione purgante, humori peccanti accommodatâ. Imò verò, ſi morbus admodum vrgeat, venæ ſectio & purgatio eadem die celebranda eſt, vt ſe feciſſe refert Trallianus lib. 4. cap. 1. his verbis. *Ego ſane memini me, cum uſus valdè vrgeret, venam manè aperuiſſe, diluculo venas lingua ſubiectas ſecuiſſe, & vesp̃eri ex cremore priſana extractum ſcammonij exhibuiſſe, atque ita laqueum ex inflammatione abortum, vix potuiſſe diſſolvere. Imò alium quendam noni, me poſtquam brachiorum duorum venas in cubito ſecuiſſem, repurgatâ ſequenti die non expectato. Potio autem purgans ex blandioribus eſſe debet, ſi à bile morbus originem duxerit, ne vehementiùs commoti humores ad partem affectam irruant. Tum etiam, ſi à ſanguine ſyncero producatuſ inflammatio, ſatiùs eſt à purgatione priùs abſtinere. Si verò pituitola cacochymia concurrat, ad fortiora confugiendum; & cum ſennâ agariçus & diaphœnicum præſcribi poteſt. Imò verò ad ea medicamenta, quæ vomitum excitant, etiam ſatis vehementia, transcendere licet in angina pituitola; & inter reliqua palmam obtinet in hoc caſu aqua benediçta, quæ ad ʒ. ij. exhibita, miranda præſtat, & morbum vtplurimum intra duas horas diſſoluit. Ad-*  
de

de quèd nullo ingrato sapore prædita, facile pitissando ingeri potest, quod in aliis medicamentis fieri non potest, quæ propter saporis ingratitudinem non possunt, nisi vno haustu ab ægrotis sorberi ; idèò ut plurimum anginosi purgari nequeunt , donec meatum angustia maiori parte sublata sit. Sed frequentibus clysteribus, purgandi indicationi aliquo modo satisfit. Atque ita quibus aqua benedicta non conuenit , propter inflammationis naturam, vel ægri imbecillitatem (vires siquidem robustæ in huius remedij usu necessariæ sunt ) neque alia medicamenta exhiberi possunt ; frequentibus clysteribus aluus subducenda est , iisque satis acris, ut reuulsio humorum ad inferiora fiat.

Ad eandem reuulsionem cucurbitulæ scarificatæ ceruici & scapulis admotæ , frictiones & ligaturæ partium inferiorum , & lotiones pedum ex aqua calida plurimum conferre solent.

At potentiùs reuellit humores à capite defluentes vesicatorium posteriori parti ceruicis admotum , quod statim ab initio post sanguinis missionem admoendum est.

Reuulsionibus sufficienter ac diligenter administratis , ad deriuantia veniendum est , quæ humorem partim impactum euacuant : ac primùm ranularum , seu venarum sub lingua apertio, ab Hipp. Gal. & recentioribus commendatur , quæ sanguis inflammationem immediate efficiens educitur.

Antiqui in angina desperata venas iugulares aperiebant ; quod remedium , licet à recentiorum plurimis etiam cōprobatum, nostris ferè temporibus obsoleuit, quod periculosum censeatur, ob sanguinis fluxum, qui difficilè cohiberi potest , propter venarum amplitudinem. Verùm experientia docuit , non ita periculosam esse hanc operationem , si debite administretur. Primò enim



enim caput ægrotantis ad latus intorqueri debet, quantum fieri potest, ut mentum humerum ferè attingat; mox vena aperienda sine ligatura, angusto foramine, secundum illius longitudinem (sic enim facilius coalescit:) & extracta sanguinis quantitate sufficiente, caput reducendo ad situm naturalem, sanguis plerumque sponte cohibetur. Attamen vulneri statim admouendum est emplastrum à Gal. descriptum *5. meth. cap. 4* ex pilis leporinis, aloë, thure, & albumine oui confectum, sicque fluxus sanguinis certò cohibetur. Refert Trallianus *lib. 4. cap. 1.* plures anginofos venarum iugularium apertione à se curatos esse; & Zacutus Lusitanus *obser. 89. lib. 1. Prax. admir.* refert historiam cuiusdam Hispani, qui huius auxilij beneficio, ab acutissima angina liberatus est.

Ad deriuationem etiam plurimum confert cucurbitula sub mento scarificata, cuius ope curatam fuisse mulierem angina canina laborantem, refert Zacutus Lusitanus *obs. 88. lib. 1. Praxis admirande.*

Non minoris efficacix sunt scarificationes sub maxillis, & supra collum, altioribus plagis inflictæ, quarum beneficio scribit Beniuenius *lib. de abditis morb. caus. cap. 38.* Nicolaum Rotam à deplorata angina liberatum fuisse; cuius integram historiam transcripsit Sennertus *Pract. Med. lib. 2. part. 1. cap. 24.*

Dum prædicta remedia vsurpantur, topicis remediis inflammatio gutturis & faucium oppugnanda est, eaque varianda iuxta varietatem temporum, ut in aliis inflammationibus; sicque in principio conueniunt repellentia, ad gargarismatis formam redacta, ut partem inflammataam immediatè attingere valeant.

℞. Aquar. plantag. solani & caprifolij, an. ʒ. iiij. succi granator. ʒ. ij. diamori ʒ. iiij. salis prunellæ ʒ. j. s. Fiat gargarisma. Vel ex decocto in hunc modum.

℞. Fol.

℞. Fol. plantag. acetosæ, & summit. rubi, ana M. j. granorum sumach ʒ. ʒ. malum granatum cum cortice & granis contusum num. i. rosar. rubr. P. j. Fiat decoctio ad lb. j. In colatura dissolue diamor. & dianunc. ana ʒ. j. ʒ. salis prunellæ ʒ. ij. Fiat gargarisma.

De gargarismatis hoc notandum, ea suspecta esse posse, quia gargarizando partes inflammata commoventur, quæ quiete indigent. Sed hoc incommodum vitari potest, si gargarismata in ore detineantur resupino corpore, citra ullam agitationem, ut partem affectam contingant.

Sine gargarizatione usurpari possunt spiritus acidi salis, sulphuris, aut vitrioli, qui aqua temperati ut eorum aciditas ferri valeat, paulatim sorbendi sunt. Transeundo enim per partem affectam, illius inflammationem temperant, & à ventriculo ad hepar & venas translati, sanguinis feruorem coercunt. Quod remedium in faucium & tonsillarum inflammationibus est etiam efficax.

Dum gargarismata repellentia usurpantur, laxantia & resoluentia linimenta exterius ceruici admouenda sunt, ut materia morbifica exterius euocetur, cæque in hunc modum parari poterunt.

℞. Olei chamomil. lilior. & amygdalar. dulc. ana ʒ. j. axungię gallinæ, & butyri recentis, ana ʒ. j. ʒ. croci ʒ. j. Fiat linimentum ceruici admouendum cum lana succida.

Hoc linimentum dolori leniendo etiam conferre poterit, qui si vehementer urgeat, demulceri ulterius poterit gargarismate ex lacte parato, vel emulsione quatuor sem. frigidior. maior. vel mucilaginis liquidis ex sem. psyllij & cydonior. cum aqua rosarum extractis, addito syrupo violaceo, vel diluto cassiæ cum sero lactis, aut decocto radicis althææ parato.

Ec Transacto

Transacto morbi principio, eoque ad augmentum & statum progrediente, in gargarismatis digerentia & resoluentia repellentibus admiscenda sunt; quod secundo statim die faciendum, quia morbus acutissimus est.

℞. Fol. hyssopi & plantag. ana M. j. liquiritiæ rasæ & passulær. mundat. an. ʒ. j. caricarum ping. num. xij. rosar. rubr. & hordei integri, an. P. j. Fiat decoctio ad lb. j. In colatura dissolue mellis rosac. & syrupi violac. an. ʒ. j. Fiat gargarisma.

Nota, quamdiu viget inflammatio, resoluentibus & adstringentibus aliquid repellentium semper esse admiscendum, ne pars suâ naturâ mollis & laxa magis relaxetur, & fluxioni recipiendæ magis idonea reddatur.

Exterius verò magis resoluentia admouenda sunt, addito etiam nido hirundinum, quem specificâ proprietate huic affectui conferre, omnium practitorum consensu sancitum est.

℞. Pulueris nidi hirundinum, & stercoris canis ieiunio macerati, ana ʒ. j. rad. ireos Florent. & flor. chamom. puluerat. ana ʒ. ʒ. axungia gallinæ, & olei lilior. ana ʒ. j. ceræ flauæ parum. Fiat linimentum.

Vel formâ cataplasmatidis in hunc modum componi poterit.

℞. Nidum hirund. num. i. fol. maluæ, violar. ana M. j. rad. althææ & lilior. ana ʒ. ʒ. ficuum ping par. iij. flor. chamom. & meliloti, ana P. j. Coquantur, & contundantur; deinde adde farinæ hordei, sem. lini & fœnugr. ana ʒ. iij. croci ʒ. j. butyri recentis ʒ. j. olei chamomil. & amygdal. dulc. ana q. s. Fiat cataplasma anteriori colli parti admouendum.

Interim etiam eclegmata per interualla vsurpanda, vt materia quæ à parte affecta exudat, vel à capite defluens ipsi adhærescit, sensum abstergetur.

℞. Pulv.

℞. Pulu. elect. diatragacanth. frig. ʒ. ij. diaireos simpl. ʒ. sachari candi & penidati, ana ʒ. ʒ. diamor. ʒ. j. syrupi iuiub. q. s. Fiat looch.

Si tumor discuti nequeat, & ad suppurationem vergat; quod plerumque quarto, vel quinto die solet accidere, ea adiuuabitur cataplasmate prædicto, aliisque emollientibus & suppurantibus. Simulque in ore frequenter erunt detinenda, quæ dolori leniendo supra proposuimus. Vel

℞. Liquirit. ras. & passul. mund. ana ʒ. j. caricarum ping. num vj sem. althææ & cydonio. ana ʒ. ij. flor. chamom. P. j. Coquantur in hydromelite. In colatura dissolue sapæ ʒ. ij. Fiat gargarisma.

Vtile etiam est medullam cassiæ recentem extractam ore detinere, ut paulatim liquefscens in gulam descendat, lenit enim, resoluit & maturat.

Si tumor tandem suppuratus fuerit, quod ex symptomatum remissione cognoscitur, nec tamen is sponte rumpatur; æger, aut aliquis, ministrorum, digitis in fauces immixtis abscessum rumpere conetur: quod si fieri non possit, ægri os per speculum oris valde aperiatur, & ubi apparuerit tumor scalpello incuruo, quod bistoriô vocant, incidatur. Ruptâ vomica æger caput inclinet, ne pus in pulmones irrumpat; postmodum vlcus decocto hordei cum melle rosaceo, hydromelite, aut œnomelite, detergendum; detersum aqua aluminosa exsicccandum, & ad cicatricem perducendum.

Alij candelam ceream oleo amygdal. dulc. illitam in œsophagum immittunt, ut rumpatur abscessus, quod si obtineri non possit, cultro ligneo acuto, vel tandem scalpello aperiunt.

Alij oleo vitrioli abscessum attingunt, & mox plerumque rumpitur abscessus. Arculanus cuspidem ferream ligno infixâ apertionem abscessus molitur, ne alia oris

partes attingat. Idem remedium probat Fauentinus his verbis ; *Accipiat unum lignum subule rotundum , in cuius extremitate apponat ferrum acutum , cuius longitudo sit tanta quantitas , quanta est medietas digiti , deinde ore aperto ponendo lignum intra dentes agrotari , ac si esset frangnum ; deinde ponat cannulam illam cum ferro ad locum apostematis , ac scandat : aperto apostemate , prorsus declinet caput inferius , ore aperto , ut exeat sanies.*

Schenckius ex Douyneto, decocto agarici abscessum rumpi asseuerat , & sequenti historia confirmat , ab eodem Douyneto relata, *apologia lib. 3. cap. 1. Illustris mulier Gabriela Goufier Domina à Saulono , cum angina Autumuali , omnium periculosissima detineretur , venit in mentem legisse me apud Aetium lib. 15. cap. 6. agaricum oculos abscessus absorbere , vel foras materiam euocare ; statim agaricum in talleolas concisum in decocto radicis , alibae , ficuum , cum momento gingiberis , & quarta parte vini albi maceraui , addidi syrupum de alibae , portionem agrotæ dedi , monuique ne illam statim deglutiret , sed aliquod tempus in imis faucibus contineret , si hac portione vitam sibi redimere vellet. Obsequitur agrotæ. Interim dum cum illa sermonem confero , ecce magna puris albi copia , tam putridi & graueolentis ore reiiicitur , ut filia quæ ad matrem cum pelui adstabat , excipiendi puris ergo , nec opinato , prægravi illius puris fœtore , conciderit animo ; reliqui custodes magnâ corporis contentione foras proruperint ; accurrant alia , purulenta detrahunt ; detergent ; festinant alia , ut intolerabilem grauis odoris fœditatem suffragari quodam depellerent ; quâ sublata ad agrotam redij , quam planè & vocis vitio , & respiratione difficili , & graui deglutione , & febre leuatam reperi , & ab omni vitæ periculo tutam , quâ nunc fruitor incolumis.*

Si pus ad partes externas quodammodo vergere videatur, apertio exterius molienda est; quod se feliciter præstitisse refert Lanfrancus, *Chirurgia maioris doctrinæ* 2. tract. 3. cap. 5. his verbis: *Quoniam bona casuum variatio multum corroborat operantem, ponam in hoc loco quid mihi accidit in ciuitate Mediolani, de quadam Domina quinquagenaria quinta, qua squinantiam phlegmaticam patiebatur, qua totam occupauit gulam, intus & extra, ita quod extra tumor maximus apparebat, & cum his non loquebatur, nec poterat transglutire. Cum essem vocatus, tangens pulsum, in vltima inneni debilitate: tangens locum corruptum, sensi materiam in profundo, & cognoui quod potius suffocaretur, quam exterius apostema, vel interius rumperetur. Tunc mihi preparavi rasorium, & locum palrans cum digitis, inueni maturam materiam inter mentum & epiglottum, plusquam in alio loco congregatam, & vulnus ibi feci profundum, per quod de corrupta & male fœtente materia magnam partem extraxi, magnamque partem dimisi, quam tunc euacuare poteram, secundum rationem nolui, quam sciisti. Tunc agra leniorem habuit anhelitum, pulsusque fuit fortificatus. Tunc administrans ei brodium, per vulnus magna ipsius quantitas exibat, tunc ingeniaui, ut cum argentea cannula, qua posita in ore totum vulnus transibat, suâ curâ reciperet ad ipsius necessaria nutrimenta: gulam totam, & collum cum medicinis mundificantibus, & residuum materie maturantibus, circumdabam, donec extraxi de vulnere frustum magnum viscosa materia, & fœtens, qua fuerat sicut quoddam intestinum, longum vnus maioris digiti quantitate: qua quidem materia calore fuerat extraneo condensata. Qua remota, remansit locus sine fœtore, & agra incepit maximè confortari. Tamen in ea continuauimus mundificatiua, & incarnatiua, & cicatrizatiua vulnus*

*optimè sigillari , & agra fuit faluti priſtina reſtituta.*

Hûc referri poteſt hiſtoria Beniuenij , cuius ſuprà mentionem fecimus , de quodam anginoſo , qui cum ab aliis Medicis pro deplorato relictus fuiſſet ; ab eo liberatus eſt profundis ſcarificationibus ſub maxillis & ipſa ceruicè celebratis , à quibus multa ſanies eſſluxit.

Si abſceſſus intus in ore rumpatur , decocto hordei , aut hydromelite , vt dictum eſt , detergitur. Verùm aliquando vlcus ſordidum redditur , & tunc ad potentiora remedia confugiendum eſt , in hunc modum.

℞. Fol. ſcabioſæ & agrimon. ana M. j. nucum cupreſſi ʒ. j. rad. ireos Florent. & ariſtol. rotund. ana ʒ. ſ. myrrhæ ʒ. ſ. roſar. rubr. P. ij. Coquantur in hydromel. ad lb. j. Colaturâ colluantur frequenter ulceratæ partes.

Hoc decoctum vlceri ſordido abſtergendo plurimùm conferet ; attamen ſi non ſufficiat , ad collyrium Lanfranci confugiendum eſt , quod mirabilis eſt efficacitæ.

Vlcere probè deterſo , illius conſolidatio molienda eſt bolo armena , cum melle roſaceo permixto ad formam eclegmatis , cui etiam thus & myrrhâ vtiliter addi poterunt.

Fit autem interdum , vt deferuente inflammatione , tumor neque reſoluatur , nec ſuppuretur , ſed duritiem contrahat ; quo in caſu cataplaſmatis emollientibus & reſoluentibus curatio perficienda eſt , eâque in hunc modum componi poterunt.

℞. Rad. althææ , bryoniæ , & cucumeris agreſt. ana. ʒ. j. fol. maluæ , parietariæ , origani , & centaurei min. ana M. j. caricarum ping. par vj ſem. lini & fœnugr. ana. ʒ. j. Coquantur

Coquantur, pistentur, & per setaceum trahantur; deinde adde pulueris hirundinum combustarum, & stercoreis canis ossa rodentis, ana ʒ. iij sulphuris viui ʒ. j butyri recentis, & axungiae anatis, ana ʒ. j. olei anethini ʒ. ij. Fiat cataplasma.

Pro coronide aliquid dicendum est de Laryngotomia, quæ ab antiquis proponitur, & à neotericis non paucis proponitur, & propriis experimentis confirmatur. Cum nempe in angina desperata, quæ agris suffocatio omnimoda præ foribusest, incisio fit in aspera arteria, per quam aëri ingressus datur in pulmonem, & fuliginum ab eodem expirantium egressus. Hanc probat Auicenna *Fen. 9. lib. 3. cap. 11.* Paulus *lib. 6. cap. 33.* Rhasis *3. continentis.* Alsaharaius, Auenzoar, Albucasis, & Halyabbas *capitibus propriis.* Eandem potuit Galenus ex Asclepiade *in introductorio, cap. 13.* Ex recentioribus Brassauolus *comment. in lib. 4. Hipp. de victus ratione in morbis acuis, sect. 35.* se propriis manibus hanc operationem fecisse testatur cum felici successu. Rarissime tamen in usum reuocatur hæc operatio, propter metum infamiae, quæ Medicis & Chirurgicis impendit, dum æger post operationem occumbit; quod ut plurimum contingit, & mors operationi potius, quàm morbo tribuitur, quantumuis Medicus præmissis prognostico sese aduersum calumniam munierit. Adde quòd in angina valdè periculosa pulmones plerumque affecti sunt, & multis humoribus repleti, vnde plerumque suffocatio contingit; & tunc incisio asperæ arteriæ nihil conferre potest. Quæ aduertens pericula Hieronymus Fabricius ab Aquapendente, Chirurgus expertissimus, se hanc operationem numquam molitum esse, nequæ eam à sui temporis Chirurgicis administratam



niſtratam fuiſſe teſtatur. Eam tamen poſſe in uſum re-  
uocari fatetur , modò pulmo & aſpera arteria  
colluuiæ non ſit repleta ; & operandi mo-  
dum exactè deſcribit in operationibus  
Chirurgicis, capite proprio, quem  
inde deſumere quis  
poterit.





PRÆEOS  
 MEDICÆ  
 LIBER VII.

---

*De morbis thoracis.*

PRÆFATIO.

**H**ORACIS nomine comprehendimus eas tantum partes, quæ respirationi inserviunt. Licet enim cor in thorace contineatur; illius tamen affectus peculiari libro, qui hunc sequuturus est, exponendi sunt. In hoc verò eos tantum exponemus qui respirationem ladunt & partes respirationi inservientes frequentius infestant, quales sunt asthma, pleuritis, peripneumonia, empyema, hydrops pectoris, hamoptoë, & phthisis: quorum unicuique propria capita destinavimus.

Cc 5

CAPVT

## CAPUT I.

*De Asthmate.*

**R**ESPIRATIO læditur à variis causis tùm sympathicè, tùm idiopathicè.

Idiopathica respirationis læsio fit ex vitiato pulmone, atque adedò omnes pulmonis morbi actionem illius lædunt; qui quidem morbi vel in ipsa partis substantia, vel in vasis illius resident.

In pulmonis substantia contingunt inflammationes, tubercula, abscessus, vlcera, tùm etiam interdùm ipsius partis exsiccatio & atrophia; interdùm & humor serosus ac pituitosus spongiosæ pulmonis substantiæ imbibitur, & liberam ipsius dilatationem impedit. Rarius scirrhi, & calculi, & grandines in eadem parte generantur.

In pulmonis vasis frequentissimè fiunt obstructiones, quæ liberum aeris com meatum impediētes difficilem faciunt respirationem.

Sympathicè læditur respiratio ex consensu aliarum partium, non solum vicinarum, sed etiam remotiorum. Sic inflammata membranâ costas succingentē, vel diaphragmate, vel mediastino, respiratio læditur. Sic corde intemperie calida laborante, vt in febribus, aucto respirationis vsu, magna & frequens respiratio euadit; contrâ verò eodē frigidâ intemperie laborante, vt in moribundis, imminuitur & tandē omninò cessat; idem contingit in syncope cessante actione cordis, & consequenter cessante respirationis vsu. Sic in empyemate aut hydrope thoracis, pus aut aqua in capacitate thoracis collecta pulmonis dilatationem

tionem impedit & respirationem lædit. Sic musculorum respirationi inferuentium læsio eandem actionē vitiat, vt in vulneribus ac tumoribus eorum contingit: tum præcipuè in apoplexia, denegato influxu spiritus animalis ad eos musculos. Musculorum etiam laryngis inflammatio spirandi difficultatem efficit in angina.

Affectus etiam hypochondriorum sympathicè respirationem lædunt, vt tumores hepatis, lienis, pancreatis, pondere suo diaphragma, cui annectuntur, ad inferiora retrahunt, eiusque motum liberum impediunt. Sic etiam vapores & flatus ab illis partibus eleuati diaphragma comprimunt eiusque actionem lædunt, vnde asthma flatulentum exoritur. Idem contingit à flatuum vel ferofi humoris copia in hydropicorum abdomine contenta & diaphragma comprimente. Ab vtero denique vapores eleuati respirationem vitiant, vnde hic affectus suffocatio hysterica nominatur.

Inter prædictas respirationis læsiones asthma ab autoribus seorsim tractatur, quia reliquæ ab aliis morbis dependent, suis locis explicandæ.

Licet autem asthma interdum genericè & latè significatione vsurpatum, omnem spirandi difficultatem complectatur: in specie tamen eam imprimis significat, quæ à pulmonum infarctu & bronchiorum illius obstructione exoritur; quæ ex se & ratione propriæ essentiæ febre carere solet, licet interdum febris ei adiungi valeat. Et iterum in tres alias species subdividitur, quarum vna Dyspnœa nominatur, secunda idem Asthmatis nomen retinet, tertia verò Orthopnœa nuncupatur.

Dyspnœa est difficilis respiratio, in qua crebrior densiorque fit spiritus tractio ex infarctu pulmonum oriunda. Hæc Asthmate & Orthopnœa minor est, &

à minori materiæ obstruentis copia oriunda, & magis ipsam pulmonis substantiam obstruit, quàm bronchia, vnde stertoris carentia, quæ fit ab humoris in bronchiis pulmonis contenti commotione, & allisione cum aëre per ea continuò oberrante.

Asthma est magna & frequens respiratio, in qua diaphragma, musculi intercostales, tum etiam abdominis violenter mouentur, cum stertore & sibilo coniuncta. In vero enim & propriè dicto asthmate bronchia pulmonis humore pituitoso opplentur, qui (vt dictum est) ab aëre commotus talem strepitum edit.

Orthopnoea verò est maxima spirandi difficultas, in qua ægrotantes non nisi sedentes & erectâ ceruice respirare possunt; & non solum musculi prædicti, sed etiâ superiores pectoris & scapularû, vehementer exagitantur.

Dyspnoea etiam & Orthopnoea nomen, quemadmodum de asthmate diximus, communiter non raro in omni difficultate spirandi usurpatur, quæ in pleuritide, peripneumonia, aliisque affectibus contingit. Idem dicendum est de apnoea, quæ non deprauatam, vt prædictæ, sed imminutam vel abolitam respirationem significat, eaque contingere solet in syncope, hysterico affectu, & apoplexia fortissima.

Humor asthma efficiens est vt plurimum pituita à capite in pulmonem defluens, eiusque bronchia obstruens. Interdum tamen fit ab humoribus crudis & serosis à venoso genere per arteriam venosam in pulmonem translatis, & si ad bronchiorum canales profluant, verum asthma cum stertore producant; si verò in pulmonum substantia, vel in læuibus arteriis subsistant, asthma spurium generant sine stertore.

Hæc asthmatis species, quæ vulgaribus Medicis ignota est, (nullam enim aliam causam præter fluxionem à capite agnoscunt,) confirmatur, non solum

ex stertoris carentia, sed etiam ex eo, quod in eo vrinæ ægrotantium crassæ & turbidæ esse solent, præsertim in paroxysmo, quia humorum crassorum & crudorum in venis agitatorum portio ad renes & vesicam transmittitur. Et nonnulli asthmatici vrinæ difficultati obnoxij sunt, eaque vigente ab asthmate liberi sunt; asthmatis verò paroxysmo præsentente cessat vrinæ difficultas, ob materiæ morbificæ in venis contentæ ad hanc, vel illam partem decubitum. Vidimus etiam quosdam asthmaticos alui fluxui obnoxios, ita ut præsentente alui fluxu ab asthmate liberi essent; eo verò cessante asthmatis paroxysmo redirent. Adde quæ hæc asthmatis species, quæ sine stertore fit, venæ sectione ita efficaciter oppugnatur, ut eâ in paroxysmo celebratâ, quamprimum sanguis fluere incipit, ægri statim melius spirare incipiant, & in fine illius aut post exiguum saltem interuallum à paroxysmo penitus liberati appareant. Ac denique huiusmodi asthmatici plerumque cachexia & pedum tumore œdematoso laborant. Quod ostendit causam asthmatis tunc temporis ab hepate proficisci, & in venis contineri, ita ut tandem in ple-risque hydrops consequatur. Inde Aretæus inter signa asthmatis imminientis flatus in præcordiis & eructationes præter rationem enumerat, quæ procul dubio à materia cruda in præcordiis exagitata proueniunt.

Illa tamen flatulenta materia primò, & per se aliam asthmatis speciem interdum producit, quæ asthma flatulentum, seu hypochondriacum nominatur; quando scilicet flatus crassi & copiosi ab hypochondriis eleuati diaphragma comprimunt, eiusque motum impediunt, unde summa respirandi difficultas sine stertore procedit.

Diagnosıs huius affectus, & specierum illius, ex propositis innotescit.

In dyspnœa enim spiritus est densus citra sonum & anhelationem, cum minori molestia.

In asthmate grauitas pectoris est maior, spiritus crebrior & densior, cum anhelatione, stertore, ac sibilo.

Orthopnœa verò non nisi erectâ ceruice respirare permittit, decumbentibus suffocationem minatur.

Signa causarum in hunc modum se habent.

Si à crassis humoribus in pulmone collectis asthma generetur, difficultas spirandi sensim & paulatim accrescit, eaque continua est & indefinens.

Si verò humores aliunde in pulmones per interualla affluant, difficilis respiratio continua non est, sed per interualla recurrit. Licet enim asthma quod à materia in pulmone contenta excitatur, exacerbari plerumque soleat à causis externis, ita nimirum, aëre austriño, & similibus. In asthmate tamen quod à materia aliunde affluente producit, exacerbatio illa longè manifestior est. Si asthmatis materia à cerebro defluat, catarrhi signa adsunt. Sin verò nulla catarrhi indicia appareant, per venas materiam affluere coniiciendum est. Hepatis affecti & partis mandantis rationem habentis indicium est tumor pedum & cachexia.

Si humor crassus in bronchiis pulmonum contineatur, respiratio fit cum sonitu & tussi, tum pituitâ per tussim excretâ, cessat vel imminuitur affectus.

Si humor in venis aut substantia pulmonis hæreat, nullus adest sonitus & raro aliquid per tussim excernitur.

Quod ad prognosim attinet, asthma chronicus est affectus, & curatu difficillimus, sæpeque in cachexiam & hydropem degenerat. Iuuenes aliquando liberantur  
sed

sed & non sine magno labore : senes verò nunquam. Infantes , nisi maturè curentur , superueniente catarrho suffocante , intereunt.

Qui ex asthmate , vel tussi gibbi euadunt , ante pubertatem moriuntur , quia gibbositas conueniens pectoris incrementum impedit ; pulmo nihilominus , debitam magnitudinem acquirens , non habet sufficiens spatium , in quo dilatarì commodè possit ad liberam respirationem ; vnde calor cordis non sufficienter ventilatus marcescit , & hominem ad interitum perducit.

Asthmati pleuritis aut peripneumonia superueniens lethalis. Quia pulmo à longo morbo debilitatus non potest grauissimo modo superuenienti resistere , & materiam morbificam expellere.

Asthmatis curatio duplex instituitur , vna in paroxysmo , altera extra paroxysmum.

In paroxysmo statim vena secanda est , præmisso clystere , si sanguis mediocriter abundare videatur : nam depletis sanguine venis liberior erit respiratio. Quòd si affectus sit antiquior , pluriúsque sanguis fuerit detractus , satius est à phlebotomia abstinere , quia calorem nativum imminuendo , maiorem promouet pituitæ copiam.

Seçtio malleoli præstans est , præcipuè in affectu sympathico.

Post venæ sectionem , vel etiam cā omisâ , si non videatur idonea , purgans phlegmagogum erit exhibendum , ex iis quæ in frigida cerebri intemperiei curatione descripta sunt , adiectis perpetuò quibusdam thoracis , quantum remedij forma permittere poterit.

Vomitoria verò , licet à nonnullis improbentur in hoc affectu , tamen conuenientissima sunt , vt frequens experientia



experientia docuit, & non raro hoc solo remedio paroxysmus solutus est.

Inter alia autem vomitoria principem locū obtinet aqua nicotianæ, exhibita ad  $\mathfrak{z} . j$ . reduci potest in syrupū cū saccharo. Dosis cochlearia  $ij$ . In cuius penuria vsurpari potest sal vitrioli, vel aqua benedicta. Ratio autem cur vomitoria in hoc affectu tantoperè profint, elegantissima est. Quia dum pituita tenuior à capite defluens, in asperam arteriam, & pulmonis bronchia sese insinuat, crassior illius portio in ventriculum delabitur, illiusque parietibus ita affigitur, ut ægerrimè auelli possit. Interim verò dum calor illius debilis materiam illam exagitat, fletus crassiores producuntur, qui ventriculum inflantes diaphragma comprimunt, & difficilem respirationem efficiunt. Vnde fit ut vacuato ventriculo cesset paroxysmus, aut mirum in modum remittatur. Adde quod asthma interdum (imò frequentissimè, iuxta Sennerti sententiam,) ab humoribus crudis generatur citra hepar, & in venis collectis, qui per venam arteriosam ad pulmones feruntur, & bronchia cōprimētes asthmatis causa sunt. Hisce autem humoribus purgandis, & à pulmone reuellendis maxime conferunt vomitoria. Quamuis etiam huius causæ ratione remedia, quæ per inferiora humores expurgant, conuenientissima sint.

Vomitum etiam in hoc affectu leniter mouet, simulque per inferiora purgat succus ireos nostratis ad  $\mathfrak{z} . \beta$ . & vini hippocrati  $\mathfrak{z} . j$ . quem se felicissimo cum successu. vsurpassè refert Platerus in obseruationibus.

Potest augeri dosis succi ireos nostratis ad  $\mathfrak{z} . ij$ . si minori exhibitus sufficienter operatus non fuerit.

Clysteres etiam acriores frequenter iniici poterunt reuulsionis gratiā. Eorū tamen quantitas sit exigua, ne intestina admodum replendo diaphragma comprimāt.

Tum

Tum etiam frictions in partibus inferioribus celebranda; iisdemque cucurbitulæ plures affigendæ, tum etiam ceruici. Postmodum humores crassi liquandi & attenuandi; flatus ab iisdem humoribus excitati resoluendi atque discutiendi. In quem usum vtiliter exhibetur aqua cinamomi ex cochleari, per se, vel cum syr. violac. mixta; vt

℞ Aquæ cinamo. ℥. ij. syrup violac. ℥. j. Misce. Loco syrup. violac. oxymel admisceri poterit, ad lentos humores potentiùs discutiendos.

Vtile etiam est ol. saluiæ, rorisina vel anisi arte chymicâ extractum, ad guttulas iij. iiij. vel v. cum vino exhibitum. Vel his aspergantur tabellæ diatragac. frig. quas æger deglutiat.

Alij commendant croci ℥. j. cum vini cochleari exhibitum. Vtilis etiam est aqua clareta, in hunc modum composita.

℞. Aquæ vitæ ℥. iiij. aquæ tussilag. & scabios. ana ℥. iij. sacchari ℥. ij. cinam. ℥. vj. Traiciantur per manicam Hippocratis. Capiat æger ℥. ij. vel iij.

Fumus nicotianæ per tubulum haustus paroxysmum cohibet. Idem præstat eadem nicotiana linguæ tantum admota; idem quoque præstat fumus caryophyllorum per tubulum haustus.

Interim expectorantia vsurpanda sunt, quæ crassiorem materiam per anacatharsim educant.

℞. Syrup. de prassio, de liquirit. & de tussilag. ana ℥. ij. oxymel simp. ℥. j. Misce, vtatur ex cochleari sensim lambendo.

℞. terebinth. claræ ℥. j. ammoniaci ℥. ij. florum sulphuris ℥. j. Misce, fiant pilulæ molles, quarum vna singulis duabus horis deglutiatur cū syrup. de hisso. ℥. β.

℞. Ol. amygd. dulc. recenter sine igne expressi ℥. vj. sacchari candi ℥. ij. Misce, capiat sensim lambendo.

D d ℞. Rad.

℞. Rad. enulæ camp. saccharo condit. ʒ. iij. sacchari candi ʒ. ʒ. syrup. de hyssopo, & de prassio, ana ʒ. j. gummi ammoniac. aquâ vitæ dissoluti ʒ. ʒ. Misce, fiat looch. Vel

℞. Confer. violar & rad. enulæ camp ana ʒ. vj pulu. elect. diatragacanthi frig. & diaireos Salomonis, ana ʒ. j. syrup violac. & cappill. ven ana q. s. Fiat loo. h.

℞. Radic. althææ ʒ. j. rad. enulæ camp. ʒ. iij. cydoniorum, vel eorum loco carnis cydonior. condit. ʒ. xvi. Bulliant in aqua ad exsiccationem. Contundantur, traiciantur per setaceum, addendo mellis ʒ. ii. Coquantur leuiter; extrahe ab igne, & adde cinam. ʒ. i. flor. sulphuris ʒ. ʒ. liquirit. cum moscho, & aqua rosac. aromatizat. ʒ. ii. Fiat electuarium molle, de quo teneat in ore ad magnitudinem auellanae per interualla Vtilissimum etiam extra paroxysmum, si de eo sumatur. ʒ. ʒ. manè & serò.

Exteriùs etiam pectori admouenda vnguenta & linimenta laxantia & discutientia, in hunc modum composita.

℞. Ol chamæmel irini, & amygdal dulc ana ʒ. ʒ. axungia gallinae recent. ʒ. i. pulu. rad. althææ, ireos Florent. ana ʒ. i. farina sem. lini, & fœnugr. ana ʒ. ii. gummi ammoniaci, cum vino dissoluti ʒ. i. ʒ. ceræ q. s. Fiat linimentum. Vel.

℞. Mucilag sem. cydonior lini & fœnugr extractæ cum aqua tussilag. vel scabiosæ, ana ʒ. vi. pulu. radicis ireos, hyssopi, ana ʒ. ʒ. croci ʒ. i. ol. lilior. & amygdal. dulc ana ʒ. ii. ceræ q. s. Fiat linimentum.

Si paroxysmus protrahatur, vesicatorium applicetur posteriori partis ceruicis.

Extra paroxysmum humoris fluxio impedienda est; tum qui iam influxit, & in pulmone continetur, incidendus, detergendus, & expectorandus est.

Ad

Ad fluxionis impetum cohibendum ea omnia conueniunt remedia, quæ in frigidi catharri curatione supra propofita funt.

Attamen circa nonnulla remedia, eo loci propofita, cautiones quædam adhibendæ funt.

Primò, in apozematis, aut fyrupis, aliisque remediis, ne calida nimium & exsiccantia præfcribantur, quæ partes tenuiores abfumendo, reliquum incrassare poffunt, & ita affectum contumaciorem reddere. Sed potiùs humectantia permisceantur, qualia funt passulæ, ficus, liquiritia, iuiubæ.

Secundò, in prædictis remediis loco cephalicorum, thoracica supra enumerata vſurpentur.

Tertiò, ad deriuationem humoris in capite redundantis, proponuntur errhina, ſternutatoria, & apophlegmatismi Verùm in hoc caſu non conueniunt apophlegmatismi, ob vicinitatem partium, per quas decurrit humor ad pulmonem. Sed errhina, & ſternutatoria vtiliter vſurpari poterunt.

Quartò, ad caput roborandum, & exsiccandum, inter alia remedia commendantur ſuffitus; qui tamen in hoc affectu nõ cõueniunt, ſaltem ore & naribus excepti: propterea quod difficiliorem anhelitum efficiunt, & asthmatis paroxyſmum excitant At verò iis operimenta capitis extra ægri cubiculum tutò perfundi poterunt.

Ad deterſionem & expectorationem humorum crassorum, pulmonum bronchiis impactorum, expectorantia supra deſcripta vſurpari poterunt, tum etiam ſequentia.

℞. Rad. enulæ camp & polypodi querc. ana ʒ. ſ. folior. origani, calament. hyſſopi, ſatureiæ, capill. ven. ſcabiol. & ruſſilag. an. M j. ſem. althææ, bombacis, & carthami, ana. ʒ. iij liquirit. raſæ & paſſul. mundat. ana ʒ. vj. iuiubar. ſebeſten, & ficuum pinguium, ana n. v. Fiat decoctio ad quartariay in hydromelite. In colat. diſſol-

ve sacchari albi quartaria v. Fiat syrup. perfecte coctus, quo vtatur ex cochleari frequenter, sensim labendo.

Maiores efficaciaz, & paratu facilior syrupus componi poterit in hunc modum.

℞. Rad. enulæ camp. ʒ. iij. tabaci indici ʒ. j. Infunde per noctem in ʒ. vi. aquæ vitæ vulgaris. Manè fiat colatura, cui adde sacchari crystallini ʒ. iij. Incendatur continuò agitandò; adde syrupi de erysimo aut tussilagine ʒ. ij. ol. sulph. q. s. ad gratiam aciditatem. Vtatur ex cochleari, vel bacillo glycyrrhizæ contuso, sensim lambendo & deglutiendo.

Sequentia verò remedia pulmonibus ab infarctu liberandis specifica sunt & efficacissima.

℞ Gummi ammoniaci & bdellij in aceto scillitico dissolut, ana ʒ. ʒ. flor. sulphuris ʒ. iij. fol. tussilag. & fatureiz siccor. & puluerat. & diaireos simpl. ana ʒ. ʒ. Cum syrupo de hyssopo, vel oxymelite scillit. fiat massa pilul. de cuius ʒ. j. formentur pilulæ vi. Sumat num iij. quibus horis ante cœnam, bis in hebdomada. Vel

℞. Aloës foccatrinæ ʒ. ʒ. myrrhæ, ammoniaci, ana ʒ. ʒ. croci ʒ. ʒ. flor. sulphuris ʒ. ʒ. Cum syrup. de tussilag. fiat massa pilul. cuius ʒ. j. capiat duabus horis ante prandium per aliquot dies.

Aqua quæ educitur ex rad. bryoniæ excavata distilletur in B. M. Huius ʒ. viij. misce spirit. vitrioli vel sulph. ʒ. ʒ. Capiat singulis diebus cochlear j. ieiuno stomacho.

℞. Fol. peti. hyssopi, pressij albi, capill. ven. ana M. ij. rad. iices florent. & liquirit. ras. ana ʒ. ʒ. Conquantur ad lb. j. ʒ. In colat. dissolue sacchar. albi lb. j. mellis albi lb. ʒ. Fiat syrup. perfecte coctus, clarif. & aromatizat. mullis croci & cinam. Capiat cochlear j. vel ij. horis matutinis.

Eiusdem virtutis est oximel, & syrupus de peto  
Quercetani

Quercetani in Pharmacopœa descriptus. Tinctura peti sicci extrahitur cum aqua vitæ, melle excipitur paucâ illius quantitas, & ad pisi vel fabæ magnitudinem in ore detinetur, sensim deglutiendo; pituitam copiose trahit à ventriculo & à pulmone.

Mille-pedes seu aselli n. xij. pannò lineo inuoluti, in vino albo macerantur; hinc facta expressio potui datur, quæ breui saburratos pulmônes deplet.

Oleum sacchari crassos & glutinosos humôres in pulmone contentos potenter dissoluit, & expectorati. Sed multò potentiùs atque excellentiùs id præstat oleû sacchari compositum, cuius formula talis est.

℞. Rad. iros Florent. & enulæ camp puluerat. ana ʒi. ß. pulpæ daetyl. & passul purgat. ana ʒ. iij. cortic. citrior. & arantior. ana ʒ. ß. benjoini ʒ. ij. croci ʒ. j. Infunde bi-  
dui spatio in spiritu vini sæpissimè rectificato. Mox se-  
paretur liquor per inclinationem. Admisce liquori sac-  
chari candi puluer. quantum in eo dissolui poterit; &  
accende spiritum vini, spatulâ continuò agitando, do-  
nec in spissum, olei æmulû liquorem flammâ extincta  
abierint. Cui admisce olei sulph. q. s. ad grâtâ aciditatē.

Decoctum caulium rubrorum cum paucò saccharo per plures dies sumptum, asthmaticos multùm iuuat.

Efficacior multò est succûs caulium rubrorum cum saccharo rosac. vel syrupo ruffilaginîs exhibitus ad in-  
tepi formam, per plures dies.

Spiritus sulphuris viscidam pituitam dissoluit, & bronchia aperit, si illius guttæ iv. aut v. fumantur cum inseculo, aut syrupo cõuenienti.

Terebinthina ad hunc etiam vsum valdè commen-  
datur ad ʒ. ij. vel iij. frequenter exhibita, cum ol. amygdal. dulc. aut conserua violat. Vel in opiata formam reduci poterit, in sequentem modum.

℞. Terebinth. aqua ruffilag. diligenter lotæ lb. j. fi.

D d 3 cum

cum pinguium lb. s. penid. ℥. iij. ol amygdal. dulc. ℥. j. Misce, fiat opiata.

Crocus in condimentis pectori utilis est. Tum etiam bellarium sinapis cum melle paratum egregiè expectorationem iuuat.

Oxymel cum agarico vtilissimum etiam est ad pulmones expurgandos, cuius cochlear ij. manè exhiberi poterunt.

Flores sulphuris cum butyto recenti ad pilularum formam redacti, per triduum exhibiti manè, ad ℥. j. asthmaticis multum opitulantur. Lac sulphuris idem præstat maiori efficacia & minori dosi, quæ gr. viij. transcendere non debet.

Tabellæ etiam sequentes præstantissimæ sunt.

℞. pulpæ rad. althææ, & rad. symphyti maioris, ana ℥. ij. flor. sulphuris ℥. ij. flor. benioni ℥. s. sacchari in aqua lilior. alborum dissoluti ℥. viij. Fiant tabellæ, quas teneat æger in ore frequenter.

Decoctum galli veteris commendatur etiam non parùm ad hunc affectum expugnandum, cuiusque formula talis est.

℞. Rad. enulæ campanæ, & ireos Florentiæ, ana ℥. s. folior. hyssopi, & prassij ficcorum, ana ℥. vj. sem. carthami ℥. j. sem. anisi, & anethi, an ℥. ij. liquirit. ras. & passul. mundat. ana ℥. iij. pulmonis vulpis præparati ℥. ij. Contundantur, iisque impleatur venter galli veteris, qui decoquantur in aquæ lb. xv. donec caro ab ossibus separetur. Colatura post fortem exspressionem ponatur in loco frigido, ut quod crassum est subsideat, pars verò clara separetur. Cuius capiat æger ℥. vj. cum oxymel simpl. ℥. j.

Si purgans efficere volueris, addi poterunt folia senæ ad ℥. ii. vel iij. pro singulis dosibus. Imò & dissolui poterit alicui dosi mannæ ℥. s. vel (si fortius purgandum)

dum ) electarium aliquod phlegmagogum per interualla. Platerus sequentem galli præparationem reliquis anteponit.

℥ Gallum aliquot annorum iugulatum, deplumatum, & euisceratum. Infarciatur sequentibus; pulmonis vulpis frusto recenti, vel præpar. & siccati ℥. j. passular. enuclear. & ficuum, ana ℥. ij. rad. enulæ ℥. j. herbarum hyssopi, satureiæ, marrubij, thymi, calamanti, pulegij, siccat. ana. ℥. j. sem. fœniculi, anisi, ana ℥. j. sem. carthami contusi, rad. polypod. ana ℥. ℞. tartari albi ℥. j. salis ℥. ℞. vitellos ouor n. ij. butyri recentis ℥. ℞. Incidantur, & contundantur, vt artis est, & insuantur gallo; decoquantur donec caro ab ossibus secedat, in multa aqua, vase amplo, ne opus sit nouam affundere. Dein eam colato, & in lb. x. adde mellis despumati lb. j. ne citò corumpatur. Capiat scutellam vnā manè, in qua dissolue mannæ, & cassiæ recentis, ana ℥. ℞. continuando ad multos dies, vt mensem, & ampliùs. Quod eo meliùs iuuabit, si mox etiam terebinth. ℥. j. cum penidiis in forma boli, aut aliter assumat.

Ludouicus Septalius, in animaduersionibus practicis, hæc iura galli veteris damnat, tanquam inutilia, vel potius noxia. Ratione illius sunt, quòd experientiæ non respondeant, & irritò successu à se, & aliis Medicis Mediolanensibus fuerint vsurpata. Quòd ex lōga ebullitione nitrosæ illæ partes, quibus maximè prodesse iura illa creduntur subsideant, atque in percolatione reiciantur: viscidæ autem, glutinosæ, crassæ, tum & perpingues ex cute, pedibus, alarum extremis, musciosis & neruosis partibus promanantes, maximè remaneant. Vnde crassior reddatur materia morbifica, & expectorationi minùs idonea. Purgantia verò, & alterantia longa ebullitione vires suas amittant.

Verùm non debet Septalij experientia, tot tanto-



tumque celebrium Medicorum, tum antiquorum, tum recentiorum, à quibus hoc genus remedij maximè commendatur, experiētia præferri. Si enim quibusdam ægrotantibus à se, aliisque curatis non contulerit, multa alia obstare poterunt; nempe vel praua ægrotantiū dispositio; morbi que contumacia, vel cætera ad curationem spectantia non benè administrata, vel ipsum remedium malè præparatū. Quod verò dicit nitrosas partes longā ebullitione subsidere, & in percolatione reici, ridiculum est; subsident enim tantum partes tergestriores. Nitrosa verò substantia in liquore simul recepta nunquàm separatur. Vnde fit vt iuscula, quo diutius coquuntur, eò falsiora euadant. Salsedo autem illa incidit, attenuat, deobstruit; tantum abest, vt iusculū salsedine illa præditum incrassare possit materiā morbificam. Neque habent carnes, aliæque partes gallorum, substantiam ita glutinosam, vt ille fingit, qualis fortè in vitulorum pedibus, aliorumque animalium reperitur; sed potius attenuantem, cum nitrosa substantia maximè refertæ sint. Ac denique purgantia, & alterantia, si iuxta Pharmaciæ præcepta, & secundum artem decoquantur, vires suas integras in decocto relinquunt; cum quotidiana apud nos experientia constet, huiusmodi iuscula gallis veteris perbellè purgare. Et si experientiam nostram Septalij experientia opponere liceat, bona fide testari possumus, nos ex huiusmodi decoctis mirabiles effectus in asthmaticis affectibus, & doloris colicis diuturnis ac cõtumacissimis percepisse. Hoc tamen in horum iusculorum præparatione immutare solemus, quòd nimirum pro vna tantum dosi singulis diebus iteranda præscribimus; metuentes scilicet, ne ad plures dies asseruata corrumpantur, aut saltem deteriora fiant. Formulæ autem à nobis præscribi solitæ in asthmatis curatione exemplum tale erit.

℞. Rad.

℞. Rad enulæ camp. & ircos Florent. ana ʒ. j. ʒ. fol. hyssopi, & tussilaginis, ana M. j. liquirit. raf. & passul. mundat. ana ʒ. ij. sicuum pinguium n. iiij. sennæ mundat. ʒ. iiij. polypod. querc. & sem. carthami contus. ana ʒ. ʒ. sem. anisi ʒ. j. ʒ. Coquantur cum tertia, vel quarta partē galli veteris secundum artem, & fiat iusculum, quod capiat æger per xij. vel xv. dies.

Vino purgante infra describendo Platerus mulierem curauit dyspnœa laborantem, & ad hydrôpem inclinantem.

℞. Rad. iridis ʒ. j. rad. enulæ, scillæ præparat. ana ʒ. ʒ. ʒ. marrubij M. j. cortic sambuci, ebuli, ana ʒ. j. sennæ ʒ. j. ʒ. agaric. ʒ. ij. zinzib. ʒ. j. Conquassentur omnia, & adde vini lb. iiij. Coquantur parum in duplici vase. Bibit cubitum itura haustum per dies sex, cessauitque dyspnœa, & tumor euauit, pulchreque curata fuit.

Notandum autem est, purgantia in hoc affectu esse iteranda, idque sub variis formulis, ne vni eidemque remedio natura assuescat Sic etiam remedia detergentia, incidentia, expectorantia, aliâque per vices imranda sunt, propter eandem causam.

## C A P V T II.

### De Pleuritide.

**P**leuritis alia vera & legitima est, alia notha seu spuria.

Vera pleuritis est inflammatio membranæ costarum succingentis vel musculorum intercostalium internorum.

D d 5 Notha

Notha verò est inflammatio musculorum intercostalium externorum.

Dantur etiam alij lateris alarumque thoracis partium dolores, qui ad nothā pleuritidem κατ' ἀρχήν referuntur, quando nimirum mediastinum inflammatur, pulmo costis agglutinatur, humores serosi vel pituitosi à capite in thoracis musculos defluunt, flatus eisdem musculos aut thoracis membranas diuellunt, & vapores à ventre inferiori eleuati easdem partes vellicant aut distendunt, vt in lumbricis sæpè contingit.

Diximus in vera pleuritide non solum pleuram, sed etiam musculos mesopleurios internos inflammari, quia impossibile est quin inflammatio membranae musculis contiguis communicetur. Nonnulli præterea pulmonem etiam in omni pleuritide inflammari contendunt, & sententiam suam autoritate, ratione, & experientia confirmant. Autoritas est Hippocratis *lib. de locis in homine*, vbi dicit, vtrâque pulmonis parte inflammata fieri peripneumoniam: si verò altera tantum pulmonis pars inflammetur, esse pleuritidem. Idipsum ratio conuincere videtur. Siquidem signa pleuritidis sunt etiam signa peripneumoniarum, tussis nimirum, febris continua, respirandi difficultas, & sputum cruentum. Prognosis etiam & curatio eadem est in vtroque affectu. Afferunt denique sibi experientia compertum esse, in apertis pleuriticorum cadaueribus pulmonem inflammatum semper apparuisse. Verum concedendum quidem est in plurimis pleuriticis pulmonem cum pleura simul affectum esse, facile enim fluxio in vtramque partem decumbit, cum pulmo pleurae superiori parte alligetur. Afferendum tamen, solam pleuram sæpissime inflammatione affici, illa solo pulmone, aut saltem ita leuiter affecto

affecto, vt morbus, illius partis affectus dici nequeat. Auctoritas verò Hippocratis à nonnullis reicitur tanquam spuria & alius quamplurimis contraria, in quibus Hippocr. solam pleuram tanquam partem affectam agnoscit, præsertim *lib. 1. de morbis*, vbi pluries repetit, bilem & pituitam ad latus affigi & dolorem vehementem excitare.

Martianus verò eam ita conciliat, dicens, Hippocr. eo in loco agere de peripneumonia quæ sit à defluxione à capite, cuius portio decidit in pleuram, & eâ ratione, vt distinguat eam quæ vnâ tantum pulmonis partem afficit, ab ea quæ vtramque, pleuritidis nomine eam afficere Similitudinem verò symptomatum in pleuritide & peripneumonia facit morbi vtriusque natura eadem, quæ in inflammatione consistit, & partium affectarum vicinia.

Quòd verò in plurimis ex pleuritide sublati pulmo affectus inueniatur, inde concludendum non est, semper ita contingere; nam pleuritides vehementiores, quæ mortem inducere consueuerunt, in peripneumoniam vt plurimum degenerant. Sed plurimi testantur, & nobis etiam experientiâ compertum est, in multis & pleuriticorum cadaueribus solam pleuram corruptam, & putrefactam inueniri.

Dubitare licet cur pleura frequentius quam aliæ membranæ, inflammatione afficiantur; Responso verò desumitur ab Hippocr. *1. de morb. text. 124.* iuxta Salij diuisionem, vbi dicit, latus esse partem maximè debilem, quia carne nudum est præ reliquis corporis partibus, & non habet aliquid quo renitatur, idè commotis humoribus ab aliqua causa procatarctica, iisque excalefactis, eorum defluxus in illam partem facile concitantur.

Materia pleuritidem efficiens est vt plurimum sanguis

guis biliosus, qui facilius densam membranam penetrat; & Auicenna de pleuritide loquens, *in membranam*, inquit, *non penetrat, nisi humor tenuis & cholericus*. Alij tamen humores hunc affectum producere valēt, modò humorem serosum aut biliosum pro vehiculo secum admixtum habeant; alios humores dico, non excrementitios, sed naturales, qui sub forma sanguinis continentur, & vel sanguis propriè dictus, vel sanguis pituitosus aut melancholicus nominatur. Obseruandum tamen est, humores tenuiores veram pleuritidem magis efficere, crassiores verò notham.

Ille autem sanguis per vasa thoracem nuttientia, venam præsertim axillarem & azygon defertur, & si quantitate, vel qualitate, vel motu peccet, in membranam & musculos vicinos effunditur.

Pleuritidis differentiæ à loco affecto, & causis desumuntur.

Ratione loci, vel situs doloris, diuiditur ab Hipp. 2. *acutor*. in ascendentem, cum dolor ad iugulum magis tendit, & descendentem, cum versùs hypochondria vergit. Nonnunquam etià versùs dorsum magis extenditur, cuius mentionem facit Hipp. 3. *de morbis*; interdum etiam magis versùs anteriora deflectit.

Ratione causæ seu humoris peccantis, alia dicitur sanguinea, alia biliosa, alia pituitosa, alia melancholica.

Insignis alia differentiæ proponitur ab Hippocrate 1. *acutor*. quæ pleuritis diuiditur in siccam & humidam. Sicca dicitur in ea in qua nihil vel perexiguum expuitur, non solum in morbi principio, sed etiam in progressu illius. Cuius rei variæ possunt esse causæ, nempe materiæ morbificæ cruditas, crassities & visciditas, vel facultatis imbecillitas, vel bronchiorum obstructio, vel doloris vehementia. Humida  
verò

verò est in qua sputum ab ipso morbi initio satis copiosum apparere incipit.

Diagnosìs huius morbi per signa pathognomonica stabilitur à Gal. 5. *de loc. aff. cap. 8. & aliis in locis.* quæ numero quinario comprehenduntur, nempe 1. Dolor lateris punctorius. 2. Febris acuta continua. 3. Difficilis respiratio. 4. Pulsus durus & serratilis. 5. Tussis frequens & molesta.

Dolor punctorius est membranis proprius, præcipuè à materia biliosa proueniens. Ille autem dolor latus occupans ad vicinas partes se extendit, & nunc ad iugulum, nunc ad hyponchondria exporrigitur per continuitatem membranæ, quæ totam thoracis cavitatem inuestit. Hoc signo pleuritidis à peripneumonia distinguitur, in qua nullus aut perexiguus lateris dolor apparet, nisi cum pleuritide complicata sit.

Febris acuta continua ex phlegmone in parte cordi vicina ducit originem, atque adedò symptomatica est; quamuis interdum febris essentialis pleuritidi coniuncta sit; imò verò illi primam originem dederit. Contingit enim sæpè in principio febrium continuarum, ut sanguis in venis ebulliens expellatur à natura in partem receptioni illius magis idoneam, quales sunt partes laterales, & inflammationem pariat. Huius rei indicium est, quod febris primùm agrotantem inuadat, mox secundo tantum, vel tertio die lateris dolor appareat. Quando verò febris est symptomatica, tunc dolor lateris ab initio agrotantem corripit, febris verò paulò post aut eodem tempore apparet.

Respiratio difficilis in hoc affectu necessario coniungit, cum partes inflammatae distendi sufficien-

ter non valeant ad magnam aëris copiam attrahendam, quæ ad cordis æstuantis refrigerium necessaria est.

Pulsus durus fit ob membranam affectam illiusque tensionem, quæ arterias etiam distendit, & illæ propter eandem tensionem, eam pulsus differentiam efficiunt, quæ serratilis nominatur, quando scilicet, dum plures digiti arteriæ admoventur, vna illius pars magis attolli, quàm alia videtur, vt serram hoc modo aliquatenus repræsentet.

Tussis molesta in pleuritide contingit, quia natura continuè rem molestam è parte affecta expellere nititur: tum etiam ex illa aliquid in pulmones refudat, quod eius facultatem expultricem commouet, vnde tussis exoritur.

Propositis signis adiungitur sputum cruentum quod quidem neque in omnibus pleuriticis, neque in omnibus morbi temporibus apparet; ideò inter signa pathognomonica non recensetur. Qui pulmonem perpetuò affici in pleuritide affirmant, sputum cruentum à pulmone efferri asserunt, idque à membrana costas succingente ad pulmonem transire posse negant, cum membrana densissima sit, tum etiam membrana pulmonem inuestiens sit eiusdem naturæ, quæ à sanguine illo extrauaso penetrari non possit.

Verùm hos Gælenus manifestè redarguit *5. de loc. aff. cap. 3.* vbi primùm ostendit, materiam in thoracis cauitate contentam transsumi in pulmonem, & per anacatharsin expurgari, duobus exemplis luculentis: Vnū est eorum, qui vulnus in thorace acceperunt, in cauitatem illius penetrans Si enim mulsæ in cauitatem pectoris iniiciatur & vulnus confestim occludatur, paruo interiecto tempore mulsæ per os cum tussi eiicietur, &

ager

ager mulsæ saporem in ore percipiet. Alterum exemplum desumitur ex ossiū fractura. quæ fit illæsa cute. In ea enim dum callus cōficitur & ossa fracta conglutinari incipiunt portio sanguinis qui ad partem affectam confluit, ad cutem defertur, eamque peruat, ita ut vittas fasciasque membro obductas irriget, & conspurcet. Docet etiam modum Galenus, quo sanguis, pus aut alia quævis materia in cavitate thoracis contenta à pulmone transsumi soleat, nimirum per orificia extrema bronchiorum siue ramorum asperæ arteriæ, qui per pulmonem disperguntur & ad illius superficiem desinunt. Quamvis enim venæ arteriosæ & arteriæ venosæ orificia ad pulmonis superficiem etiam deferantur, bronchiorum tamen orificia reliquis ampliora & potentiora sunt. Quotò enim aspera arteria ratione caudicis maior est caudice venæ arteriosæ aut arteriæ venosæ, quotò rami maiores sunt ramis & orificia orificiis, cum omnia hæc vasa æquali quâdam diuisione scindantur, quò in vniuersum pulmonis corpus distribuuntur. Deinde asperæ & arteriæ bronchiorum eius substantia cartilaginosa est, vnde fit, ut non ita conuiere ac concidere valeant, ut reliqua vasa, eorumque orificia magis aperta maneant, sicque materiam in thoracis cavitate contentam facilius excipere.

Ista autem transsumptio materiæ in thorace cōtenta fit, docente Galeno, in constrictione thoracis, dum exspiratio perficitur: tum enim thorax quæ in sua cavitate continentur, premit verus pulmonem, & in ipsum impellit; ut portio saltem eorum in bronchiorum orificio exprimatur. Neque obstat pulmonis mollietates quæ compressioni cedit, atque ita materiam ad eum impulsam recipere non cogitur. Hæc enim mollietates



lities facit quidem , vt tota materia impulsa non recipiatur : non impedit tamen , quin portio quædam illius in partis substantiam sese insinuare valeat, quamuis maxima pars in cavitæ remaneat ob molli-  
tatem prædictam.

Addamus & nos huic Galeni doctrinæ admirabilem naturæ providentiam , quæ passim inuenit vias non solum manifestas , sed etiam incognitas & sæpè incõ-  
prehensibiles , per quas res noxias & molestas expur-  
gare consuevit ; de sanie in fracturis dictum est , quæ  
per poros insensiles musculorum & ipsius cutis expur-  
gatur.

Spuria pleuritis à legitima distinguitur , quod in  
hac dolor exacerbatur dum æger decumbit in latus  
oppositum : tunc enim pars inflammata pondere suo  
diuellit maioremque patitur distensionem ; in illa verò  
musculi externi inflammati comprimuntur quando su-  
pra latus affectum æger decumbit.

Tempora huius morbi sequentibus finis indican-  
tur. In principio omnia symptomata pathognomonica  
debiliora sunt , dolor & febris exigua , tussis sicca vel  
certè sputum exiguum & crudum. In augmento febris  
& doloris incrementum adest , sputum copiosius. In  
istatu symptomata vehementiora , inquietudo , deli-  
rium , dolor capitis , & si morbus salutaris sit , sputum  
concoctum , liberum & copiosum. In declinatione  
sputum perfectè coctum libera anacatharsis omnium-  
que symptomatum remissio.

Signa causarum diagnostica generaliter desumun-  
tur ex temperamento ægrotantis , anni tempore , re-  
gione, victus ratione , aliisque communibus. Specia-  
liter verò à sanguine puro fieri pleuritidem ostendunt:  
Sputum rubrum & sanguinolentum , dolor tensius  
pegumiu tinuo mixtus; venarum plenitudo præsertim  
circa

circa tempora & frontem , rubor faciei totius, pulsus plenus , vrina rubea & crassa , cum corona interdum liuescente.

Biliofum sanguinem ostendunt sputum flauum, febris ardentior , sitis vehementior , pulsus durior & velocior , dolor pungens acutior, vigilie & inquietudines maiores , oris amaritudo , vrina tenuis & intense flaua.

Pituitosum sanguinem demonstrant, sputum album viscidum aut spumosum, dulce & tarde erumpens, febris remissa, sitis pauca, saliuua & excretio multa, dolor remissior & grauius, somnus maior , pulsus paruus & minus durus , vrina pallida & crassa.

Sanguinem melancholicum ostendunt sputum nigricans , tenax & tarde erumpens , febris & dolor remissior , vrina rubea , obscura, tussis siccior , lingua nigricans , & aspera , aluus adstricta.

Prognosis primum ex symptomatum remissione aut vehementia desumitur. Si enim dolor , spirandi difficultas & febris non multum molestauerint morbum remissorem significant ; si vero dolor vehemens fuerit & tussis magna , in qua nihil excernitur , febris item valida & anhelitus difficultas maxima, periculosam pleuritidem existimare oportet.

Pulsus in pleuritide paruus, frequens & valde durus mortem prænuntiat. Et ex eo nullum sanatum esse affirmat Gal. 4. de *presag. ex puls. cap. 5.*

Pleuritis exquisita, in qua nihil expuitur, aut in qua sputum postquam apparere incepit , iterum suppressum est , dolore lateris & pectoris grauitate superstita, periculosissima est. Crudissimum enim morbum significat, qui aut breui hominem iugulat, vel non nisi longo temporis spatio finitur.

Sputum initio & intra tertium diem apparens, bre-

E c uem

uem morbum significat ; fin verò posteriùs , longum.  
Hippocr. *Aph. 1. sect. 12.*

Flaua bilis pituitæ vel pauco sanguine valdè permixta , cum satis copioso sputo in principio morbi apparente, salutaris.

S; utum valdè sanguinolentum periculosum est; venarum enim aut carnis ruptionem significat , vnde suppuratio expectanda est. Paucus verò sanguis per resudationem effluere censetur.

Sputum album, ac glutinosum rotundum , malum est. Lentor enim & viciditas ab igneo calore materiam adurentem proficiscitur.

Sputum viride & æruginosum, malum; nigrum verò pessimum. Summam enim adustionem vel caloris natiui extinctionem significat.

Anacatharsis copiosa , quæ dolorem aliaque symptomata non sedat, mala. Magnam enim materiæ copiam arguit.

Pleuritis in senibus , mulieribus vtero gerentibus, asthmaticis , & iis qui bis terue hunc morbum passi sunt, perniciofa.

Quicumque laterali morbo laborantes in quatuordecim diebus non repurgantur , empyici fiunt. *Aph. 8. sect. 5.* Alij ad vigesimam diem expurgationem extendunt.

Diarrhœa pleuritidi aut peripneumonix superueniens, mala. *Aph. 16. sect. 6.* Quod intelligendum est de pleuritide, in qua tanta est inflammatio, vt hepar & ventriculus in consensum trahat, aut quando prostratis à morbo viribus retentrix facultas ferè abolita est. Si verò pleuritis adeò magna non sit , & in corpore contingat multa cacochymia laborante , alui fluxus interdum salutaris esse solet , præsertim si quædam concoctionis signa præcesserint.

Vomitus

Vomitus biliosus & copiosus in principio pleuritidis, salutem prænuntiat. Leuata enim natura ab illa euacuatione biliosæ cacochymix, morbum facilius superat.

Pleuritidi si peripneumonia superueniat, malum, ex *Aph. 11. sect. 7.* Fit enim translatio materiæ ad partem nobiliorem.

Si pleuriticus dolor cum sputis biliosis sine ratione euanuerit, ægri in delirium incidunt. *Hipp. 3. prorrhæ.* Humor enim biliosus sursum ad caput rapitur, & tunc etiam vrinæ tenues & albæ apparent.

Pleuritis quæ diuturno morbo succedit aut in corpore cachectico accidit periculosa.

Densa & exercitationi dedita corpora citius ex pleuritide & peripneumonia intereunt. *Hipp. in Coac.* Et quotidiana docet experientia, fiores pleuritide correptos, omnes propemodum interire. Quia robusta illa corpora non nisi ex grauissima causa in morbos incidunt, & propter densitatem non facile transpirant, vt morbi resolutio fieri non possit.

Quibus in morbo laterali plurimus ex sputo strepitus in pectore sonat, & vultus demissus est, oculusque aurigine suffusus, & caligine obductus, in his mors expectanda est. *Hipp. in Coac.*

Quibus pleuriticis lingua circa initia biliosa est, hi intra septimum iudicantur; quibus verò tertio aut quarto die, circa nonum.

Ad pleuritidis curationem primò humor illam committens, reuellendus, deriuandus & discutiendus est. Ac si totus discuti nequeat, concoquendus, maturandus & expectorandus. Tum febris, quæ non rarò essentialis in pleuritide, non semper symptomatica est, propriis remediis succutendum. Quæ omnia sequentibus auxiliis perfici poterunt.

Et quidem ab initio sanguis detrahendus est è basilica eiusdem lateris, præmisso clystere, si affectus non valdè urgeat; alioqui post phlebotomiam ille poterit iniici.

Mitti autem debet sanguis singulis diebus, donec dolor, & febris multò mitiores euaserint. Imò verò interdum bis in die, cum peracuta pleuritis est.

Hippoc. 2. *de rat. victus in cutis*, text. 10. insignem regulam, & in praxi vtilissimam posteritati tradidit; ut mittatur sanguis vsque ad coloris mutationem. Si nimirum primâ, aut secundâ phlebotomiâ sanguis apparet crudus, pituitosus, aut aquosus; continuanda singulis diebus, aut bis in die vacuatio, donec sanguis detractus appareat rubicundus, vel flauescens. Si verò in principio appareat ruber, iteranda toties phlebotomia, donec liuidus, aut niger appareat. Significatur enim sanguinem illum posteriorem à parte affectâ, aut venis ipsi vicinis effluere, qui quidem à calore partis inflammata alteratus est, & ex crudo ruber factus, vel ex rubro niger, aut liuidus per adustionem.

Licet autem huius præcepti observatio in praxi ut plurimum optimè succedat, aliquando tamen coloris illa mutatio pertinaciter expectanda non est, sed prius à sanguinis missione desistendum; cum videlicet, aut vires sunt debiles; aut æger habitu raro, aut valdè resolubili præditus, aut tempus anni calidissimum.

Quamuis autem sanguinis missio in principio morbi præcipuè conferat; si tamen ea fuerit omiſſa, aut insufficienter celebrata, etiam post septimum, nonum, aut undecimum, venam secare licet, exemplo Hippocratis, qui 3. *Epidem.* Anaxioni venam secuit octauâ die, vel quòd citiùs non fuerit vocatus; vel quòd in pleuritide crudissima, quæ undecimo die vix coqui cæpit, morbus inducias dedit.

Cum

Cùm verò anacatharsis libera, & liberalis fieri incipit, tunc temporis à phlebotomia abstinendum; quia anacatharsis supprimitur, & æger in vitæ discrimen coniicitur.

Adeò autem necessaria est venæ sectio in huius affectus principio, vt nūquàm omitti debeat, nedum in senibus, pueris, grauidis mulieribus, puerperis, & menstruas purgationes patientibus; quibus omnibus experientia docuit phlebotomiam, præsentē hoc affectu, fuisse vtilissimam. Cautiones autem in venæ sectione obseruandæ in mulieribus puerperis, aut menstruas purgationes patientibus, videantur infrà lib. 15. c. ultimo, in morborum acutorum puerperarum curatione.

Ab ipso etiam morbi initio, bis aut ter in die exhibendi sunt iulepi refrigerantes, humoris ardorem, & ebullitionem cohibentes, & fluxionem sistentes, in hunc modum compositi.

℞. Aquæ papau. rhæad. ℥. iiij. syrupi violac. vel eiusdem papaueris ℥. j. salis prunellæ ℥. j. Fiat iulep.

Post primam phlebotomiam inungatur latus dolēs sequenti linimento, partem postea tegendo lanâ succidâ linteo in utâ.

℞. Ol. lilior. chamæm. & amygdal. dulc. ana ℥. j. butyri recentis, & axungię gallinæ, ana ℥. j. β. Fiat linimentum.

Multi addunt cerâ huiusmodi linimentis, quæ tamen non conuenit, quia obstruit poros; vt neque mucilagines, quæ emplasticę sunt, quia refrigerant & astringūt.

In pleuritide maligna, & pestilenti, vtiliter additur huiusmodi linimentis olei scorpion. Matthioli, vel theriacæ modicum.

Post iteratam venæ sectionem fots admouendus est, in sequentem modum compositus.

℞. Radic. althææ, & lilior. ana ℥. ij. fol. maluæ, viol.  
E c 3 parietar.

parietar. ana M. j. sem.lini,& fœnugr. ana ʒ. j. florum chamæm.melilot. sambuci,violar. ana P. j. Fiat omniũ decoctio,quâ foueatur latus dolens,cum vesica fuilla.

Post fotum admouebitur linimentum prædictum; cui in progressu morbi addi poterũt olea magis resolu- uentia, vt anethinum,irinum,tum etiam puluis ireos, & crocus. Imo verò ipsi fomento addi poterunt herbę discutientes, vt origanum, calamentum, hyssopus,& semina valdè discutientia.

Multa alia topica,pleuritidis curationi valdè profi- cua, ab auctoribus vsurpantur,quorum præcipua hæc sunt.

Prius inungatur pars vnguento de althæa, postea cumini puluis inspergatur. Vel post inunctionem brassicæ folium ad ignem calefactum, & inunctum admoueatur.

Fauentinus miscet vnguentum de althæa cum ol. amygdal. Post inunctionem aspergit pulu. cumini, & superimponit folium caulis,& miris laudibus effert.

Item cataplasma sequens vtilissimum est.

℞. Residentiam decocti pro fotu supra descripti. Contundatur in mortario marmoreo, addendo ol. amygdal. dulc. lilior. & chamæmel. ana ʒ. ij. pingue- dinis gallinæ ʒ. j. farinæ hord. fabar.ana q. s. Fiat ca- taplasma.

Item gallina viua per spinam secta, puluere ireos Florent. conspersa, & admota multum prodest.

Omentum veruecis recenter ab animali extractum, vel in aqua calida calefactum, optimum est anodynum. At pulmo eiusdem animalis idem efficacius præstat.

Oleum ceræ arte chymicâ extractum,linimentis ad- mixtum dolorem lenit, & materiam morbificam po- tenter discutit.

Panis recens è furno extractus,per medium sectus,& in

in butyro recenti liquato madefactus, & admotus, materiam lateri impactam potenter resoluit.

Post tres aut quatuor doses iulepi prædicti, vsurpari poterūt iulepi pectorales, in hunc modum compositi.

℞. Hord. integri P. j. liquir. ras. & passul. mundat. ana ℥. j. iuiubar. par. xx. sem. quatuor frig. maj. an. ℥. iiij. flor. buglossi & violar ana P. j. Coquantur ad quartaria v. In colat. dissolue syrup. violac. & iuiubini, ana ℥. ij. Fiat iulep. pro quatuor dosibus, manè & serò sumendis.

Vel si febris valdè acuta sit, cum vigiliis coniuncta, emulsionem vsurpari poterunt in sequentem modum.

℞. Amygdal. dulc. excorticat. & in aqua frig. maccrat. ℥. j. quatuor sem. frig. maior. ana ℥. β. sem. lactuc. & papau. albi, ana ℥. ij. Contundantur in mortario marmoreo, sensim affundendo decocti hord. & liquirit. lb. j. β. In colatura dissolue syrup. violac. ℥. iiij. Fiat emulsio pro iij. dosibus manè & serò sumendis.

Quidam practici vrgentibus vigiliis audent exhibere narcotica, vt syrup. de papau. philonium roman. & laudanum opiatum. Quæ tamen in hoc affectu perniciofa sunt, sputum enim retinent, & pectus coarctât. Vnde non raro præceps exitium consequitur.

Quod tamen intelligendum est de integra narcoticorum dosi; nam in perexigua quantitate exhibita prodesse possunt in dolore vehementissimo, tussi molesta, & inani, à valdè tenui humore oriunda, & vigiliis assiduis. In quibus casibus sæpè laudani gr. j. fœlici cum successu exhibui, & pluries aliquando iteravi. Sed illius vsus præcipuè in principio morbi conuenit; tunc enim humor influens in partem cohiberi potest, & morbi incrementum impediri.

Quando tussis importuna est, & natura incipit per anacatharsim aliquid euacuare, teneat æger frequenter in ore saccharum rosaceum, candum, aut penidiatum,



vel tabellas diatragacanthi frigidi. Tum vtatur syrup. violac. vel iuiubino ex cochleari frequenter. Vel vtatur eclegmate sequenti.

℞. Sachari candi, & penidiat. an. ʒ. j. pulu. electar. diatragacant. frigidi ʒ. ij. syrup. violac & iuiubini, ana q. s. Fiat looch, quo vtatur frequenter cum baculo liquirit. sensim lambendo. Vel fiat eclegma ex butyri, mellis, & sacchari æqualibus portionibus.

Oleum sem. lini vel amygdal. dulc. recenter sine igne extractum, cum saccharo mixtum, & exhibitum, egregiè tussim lenit, & dolorè pleuriticum demulcet. Præsertim si cū iusculo, aut alio decocto affatim bibatur.

Si sputa crassiora sint, quædam incidentia, & attenuantia erunt permiscenda; vt syrup. de tussilag. de liquirit. oxymeli simplex, puluis diaireos, & alia huiusmodi.

Eclegmata, autem supino corpore sumenda, quia sic meliùs pulmonem subeunt.

Progrediente morbo, ad corroborationem virium conditum restaurans vsurpari potest.

℞. Conferuæ flor. violar. ʒ. j. conferuæ flor. borrag. & rad. buglossi, ana ʒ. s. confect. alchermes ʒ. ij. pulu. electarij diamarg. frig. & diatragacanth. frigidi, ana ʒ. j. sacchari rosati ad pondus omnium. Fiat conditum auro coopertum, quo vtatur frequenter ex cochleari.

Purgatio in pleuritide vera non conuenit, nisi omninò ad declinationem peruenerit: & tunc sequenti medicamento illa potest institui.

℞. Sennæ mundat. ʒ. s. sem. anisi ʒ. j. fol. buglossi & capill. ven. ana M. s. liquirit. ras. & passul. mundat. ana ʒ. iij. flor. bugloss. & violar. ana P. j. Coquantur ad ʒ. iij. In colat. dissolue rhab. in aqua scabiosæ cum fantalo citrino infusi ʒ. iij. mannæ granat. & syrup. rosac. an. ʒ. j. Fiat potio.

Toto morbi decursu vtatur æger pro potu ordinario decocto hordei, & liquiritiæ, vel decocto papau. rhœad cum syrup. capill. ven. Potus verò non sit actu frigidus, quia pectori noceret. Vinum in hoc affectu merum est venenum, quemadmodum acida omnia, quæ tussim excitant, & constringendo anacatharsim impediunt.

In declinatione post purgationem, & febrem valdè imminutam, si dolor perseveret, adiuvari poterit ipsi parti dolenti cucurbitula cum scarificatione. Imò & sequenti die iterùm applicari, ad sanguinem denuò extrahendum. Possunt etiam applicari ante declinationem, post iteratam phlebotomiam, bis aut ter. Et si dolor augeatur, vel redeat post aliquod tempus, iterùm secabitur vena, & post iterum cucurbitula applicabitur.

Zacutus Lusitanus locis scarificatis detractâ cucurbitulâ, hirudines sex adinovit sælici successu, vt ipse testatur *observ. 104. lib. 1. praxis admiranda.*

In eundem finem, ad reliquias materiæ morbificæ discutiendas, tentatis prius fomentis, & linimentis potenter discutientibus, vtiliter parti applicabitur emplastrum de sulphure, vel de baccis lauri.

Præter remedia vulgaria huic morbo valdè proficua alia quædam vsurpari possunt propria & specifica: nempe rasura dentis apri, cinis priapi, tauri vel cerui; flores papaueris rubri corallus præparatus.

Quercetanus in Pharmacopœa laudat pomum excavatum, & thuris masculi 3. j. repletum, & ad ignem coctum, quod æger deglutiât, superbibendo aquæ card. bened. 3. iij. postea verò benè contextus sudet. Hoc remedium post tertium morbi diem vsurpandum esse vult, eo quæ multos asserit fuisse restitutos.

Flores buxi ad eò sanguinem purgare feruntur, vt si

eorum pulueris  $\mathfrak{z}$ . j. cum aqua papaueris rhœad. exhibitâ, sanguis post horam mittatur, floridus is manet.

Stercus equinum in aqua cardui benedicti dissolutum, & colatum pleuriticum dolorem, & humorem illum producentem potenter discutit.

Idem præstat stercus album gallinæ, ad  $\mathfrak{z}$ . j. cum eadem aqua exhibitum.

Stercora illa multum habent salis volatilis, qui maximâ penetrandi ac discutiendi vi præditus est.

Ex duobus illis stercorebus potest fieri potio efficax in hunc modum.

$\mathcal{L}$ . sem. cannabis  $\mathfrak{z}$ . j. Contundantur in mortario, deinde adde stercoris albi gallinæ, & stercoris equini, ana.  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . Dissoluantur in aquæ card. bened.  $\mathfrak{z}$ . v. Colentur per linteum, & exhibeantur.

Sanguis hirci sylvestris ad gr. x. exhibitus cum aqua prædicta, potenter discutit pleuritidem. In illius defectu sanguis hirci domestici usurpari poterit. Sed cum vires illius sint infirmiores, ad  $\mathfrak{z}$ . j. exhibendus. Eius autem præparatio in hunc modum se habet.

Hircum suspende cornibus, & crura posteriora reflecte ad cornua, testes abscinde, & sanguinem fluentem excipe in vase amplo, & exicca in sole, si æstas sit, vel retrò furnum pistoris. Longissimè distat ab hircino sanguine officinarum.

Fuligo camini ad  $\mathfrak{z}$ . j. exhibita multum confert, sed multò magis spiritus fuliginis, ab Hartmanno descriptus in praxi medica.

In pleuritide epidemica sudorifica, aut diaphoretica medicamenta usurpanda sunt, qualia in febribus malignis præscribi solent, quæ tamen hunc morbum, quantum fieri potest, peculiariter debent respicere.

Diarrhœa pleuritidi superueniens periculosa est. Idèò temperari debet syrupo myrtino, qui eam sistit, & nihilominus

nihilominus expectorat : atque ita cum aliis syrupis permiscendus est. Venter & renes astringentibus inungantur , vt in omni diarrhœa fieri solet. Clysteres iniiciendi , ex decocto hor'ei excorticati , quod , vt Galen. docet, refrigerat & astringit , additis rosis rubris, & in eo dissoluendo ouorum vitellos.

---

## CAPVT III.

*De Peripneumonia.*

**P**eripneumonia eandem habet cum pleuritide essentiam , & parte affectâ tantum distinguitur , quod illa sit pulmonis inflammatio , hæc verò membranæ costas succingentis. Materiâ etiâ aliquatenus differunt. Siquidem pleuritis frequentius fit à bile; peripneumonia frequentius à pituita ; quamuis omnes humores, (vt de pleuritide dictum,) huc affectum producere valeant; humores, inquam massam sanguinis constituentes & sub forma sanguinis contenti. Quemadmodum enim humores crassi densam pleuræ membranam difficile penetrant, tenues verò & biliosi eam facile peruadunt. Sic contrâ pituitosi & crassi in mollem & raram pulmonis substantiam facile transferuntur, eique tenaciter adhærent ; biliosi verò & tenues facile præterlabuntur. Hoc tamen non impedit , quin sanguis biliosus interdum pulmonis inflammationem efficere valeat , quemadmodum Hippocr. 1. *de morbis*. Erysipelas pulmonis describit.

Fit autem inflammatio erysipelatosa ex sanguine bilioso à dextro cordis sinu per venam arteriosam in pulmonem delato. Oedematosa verò ex sanguine pituitoso per viâ fluxionis à capite in subiectas partes irruente

irruente. Sola tamen pituita excrementitia per viam catarrhi à cerebro defluens peripneumoniam efficere potis est, quatenus in pulmone putrescens sanguinem attrahit, ex cuius admixtione inflammatio oritur, & hæc sæpissimè in senibus contingit.

Mesuræus tamen peripneumoniam magis fieri à bile asseruit, quia pulmo sanguine bilioso nutritur, qui magna copia affluit per viam patentissimam, nempe venam arteriosam

Respondemus, sanguinem floridum, tenuem & vaporosum in dextro cordis sinu elaboratum ferri in pulmonem, qui propter puritatem facilè regitur à natura, & per arteriam venosam ad sinistrum cordis ventriculum transmittitur, ideoque rarè tantum subire à naturali statu recessum, qui peripneumoniam efficere natus sit. Contrà verò fluxionem à capite irruentem & per vias amplissimas ad bronchia delatam, si ibi putrescat, sanguinem accersere & peripneumoniam excitare.

Generatur verò peripneumonia interdum primariò, sine alterius morbi interuentu: interdum verò aliis morbis succedit vt anginæ & pleuritidi Gal. *in comm. II. sect. 7. Aphor.* docet, duobus modis peripneumoniam pleuritidi succedere; vel quando morbus lateralis in peripneumoniam transmutatur, vel quando morbo laterali pulmonis inflammatio superuenit. Hæc autem transmutatio fit, quando priore cessante morbo aduenit alter; superuenit autem quando altero manente, alter adiicitur.

Causa igitur interna & immediata peripneumoniæ sanguis est, frequenter pituitosus, rariùs biliosus, rarissimè melancholicus. Qui vel à toto fluit corpore plethorico vel cacochymico; vel ab aliqua parte similiter repleta aut præternaturam affecta.

Causæ

Causæ externæ peripneumoniæ & pleuritidis eadem omnino sunt, quæcunque videlicet fluxiones ad eas partes commouere possunt, quarum præcipuæ sunt Primò motus corporis & exercitium vehemens, præsertim post magnam quietem & multas epulas: tunc enim humores ex ciborum multitudine asseruati & præcedenti quiete intus detenti, superueniente exercitio funduntur, attenuantur, & incalescunt; ac postmodum ad partes debiliores & fluxioni eorum recipiendæ magis idoneas propelluntur: inter quas thorax & pulmo principem locum obtinent, quia valido exercitio anhelitus magnus & creber efficitur, sicque partes prædictæ maximè fatigantur & pulmonis substantia mollis & laxa humorem influentem facile recipere potest.

Secundò inter causas externas efficaciores ponitur aer frigidus & aquilonius, austrino & tepido subito succedens; à tepidiusculo siquidem aere pori laxantur & humores fluidiores euadunt, qui adueniente aëre frigido comprimuntur & ad partes debiles exprimuntur.

Denique ex Hipp. lib. de aëre, locis & aquis, usus aquarum lacustrium & stagnantium peripneumoniæ generandæ idoneus est; Dicit enim diuinus Senex in regionibus lacustribus & paludosis frequentes pulmonias obseruari.

Signa etiam peripneumoniæ cum signis pleuritidis maiori parte conueniunt. Duo propterea eadem, febris acuta, & tussis, quæ aliquando sicca, aliquando humida est, seu cum sputo magis pituitoso colorato ex bile aut sanguine: imò & in progressu sputa fiunt purulenta, materiâ morbificâ à calore coctâ & maturatâ, quod fit plerumque illæsa pulmonum substantiâ, alioqui enim, eâ exulceratâ, phthisis succederet. Sic

passim

passim videmus in oculis ophthalmia laborantibus & pure sordidis humores in pus conuerti, non suppuratâ neque vlceratâ partis substantia.

Reliqua signa differunt ratione partis affectæ. Difficultas spirandi maior est quàm in pleuritidè, ob angustiam instrumèti inflammati, vt ægri suffocari videantur, & non nisi erecti respirare valeant. Pars enim ob tersionem & repletionem comprimi nequit, neque amplius dilatari, quamuis magnâ adsit pulmonis dilatatio, paucum tamen aërem capit, ideo celer & frequens est respiratio cum stertore. Augetur necessitas ex febre, cum efflatione calidioris spiritus, & aëris frigidi desiderio.

Pulsus magnus, languidus, mollis, ob pituitam & pulmonis laxitatem; aliqua interdum durities ex bile & sanguine; inæqualis, ob compressionem arteriæ prope cor, in crassis humoribus magis; interdum verò intermittens, intercurrentes, vndosus, vermicularis, cum ex immodica humiditate pulmo computruit.

Dolor grauius & profundus ex imo ad pectus & spinam pertingens. Quandoque inter scapulas, quandoque sub vna tantum scapula dolor percipitur & iugulo ac mammæ communicatur; præsertim in tussi. Quandoque dolorem non sentiunt, nisi cum tussire inceperint. Quandoque etiam dolor apparet puncto-  
ris in latere, cum pleuritidi coniuncta est peripneumonia, quod sæpius contingit. Licet autem membrana pulmonem inuestiens sit eiusdem naturæ cum membranas costas succingente, vt docuit Gal. 4. de loc. aff. cap. 5. dolor tamen ita intensus non percipitur in peripneumonia, quemadmodum in pleuritide, propter duplicem differentiâ, quæ ab eodem Gal. proponitur loco citato. Prima est quod nerui, qui feruntur ad membranam

branam pulmonis, sunt pauci & exigui; qui verò ad pleuram, plures & insignes. Altera est quòd thorax constat ossibus & carne, quæ resistunt tensioni, vnde maior dolor; pulmo verò mollis cedit tensioni, vnde minor dolor.

Rubor genarum apparet ob vapores calidos ad caput exhalantes & tenuiorem sanguinem secum rapiētes, cuius color in malis præsertim efflorescit, quia earum cutis tenuior est.

Propôsitis signis accedunt anxietas impotentia, iactatio cum caloris ingentis sensu in toto corpore. Color linguæ flauus, deindè processu temporis rubescens, sitis ingens, oculorum extumescencia, & venarum temporum eleuatio. Delirium, quando peripneumonia fit ab humore bilioso; & coma, si ab humore pituitoso generetur.

Si à sanguine bilioso morbus oriatur, sputa erunt flaua æstus maior & sitis; maior respirationis angustia cum minori grauitate; expiratus aer calidior febris ardentissima, cum pulsu creberrimo, delirium ingens, vrina tenuis, citrina & pellucida Ætas, anni tempus, regio, victus præcedens bili attestantur.

Si pituita, (quod frequentius est,) morbum producat, sputum erit album, viscidum & spumans; febris, thoracis incendium, sitis, linguæ siccitas, minora: thoracis grauitas maior, pulsus rarior, & mollior, ætas ut plurimum senilis, habitudo, anni tempus, regio frigida & humida.

Si ex sanguine puro affectus ortum duxerit, sputum erit rubrū, vrinæ rubræ & crassæ, faciei rubor maior, venarum temporum euidentior eleuatio, cum totius corporis grauitate ac tensione, & reliquis quæ sanguinis abundantiam ostendunt.

Si denique melancholicus sanguis in causa fuerit:  
sputum



sputum apparebit nigrum aut subliuidum , linguæ à principio nigra , sicca & scabra : aderunt etiam tristitia & magna inter respirandum suspiria , ac reliqua melancholiæ in toto corpore dominantis signa apparebunt.

Prognosis huius affectus in hunc modum institueda est.

Peripneumonia pleuritide periculosior est, & ut plurimum lethalis ob respirationis necessitatem & cordis viciniam. Hoc sanè morbi genus, (inquit Celsus) plus periculi quàm doloris habet , & plerumque in calamitatem abire solet.

Spem tamen salutis ostendant virium robur, minor symptomatum vehementia, sputa subflava, non multo per mixta sanguine : circa initia excreta, sanguinis fluxus è naribus copiosè & die critico erumpens, vel alui fluxus biliosus & spumofus, vel mensium aut hæmorrhoidum conferta eruptio.

Abscessus circa aures vel partes infernas debitè suppurati & aperti , salutem ostendunt , ut docet Hipp. *in prognosticis*.

Si peripneumonia in pleuritidem transmutetur, bonum est Et quamvis id rarè contingat, ut docet Gal. *comment. Aphor. 11. sect. 7* quia ex morbo periculosiore ad minus periculosum fit transitus. Et cognoscitur huiusmodi transmutatio ex superueniente lateris dolore punctorio & imminuta spirandi difficultate.

Periculosam verò ac lethalem peripneumoniam portendunt morbi & symptomatum vehementia, sputi carentiæ, vigiliæ assiduæ , delirium vel coma, extremorum frigiditas , stertor cum maxima respirationis angustia , vnguium liuor & incuruatio.

Præterea pleuritidi peripneumonia succedens periculosissima est, ut docet Hipp. *Aph. 11. sect. 7*. quia humoris

moris translatio à parte ignobiliore ad nobiliorem mala est ; & vires à prægresso morbo fatigatæ noui & deterioris vim perferre non possunt.

Vrinæ circa initia crassæ & postmodum ante diem quartum tenues factæ, mortem portendunt. Hippocr. *in Coarctis.*

Peripneumoniæ curatio pleuritidi curatione similima est. Ac primùm in ea vtramque paginam implet phlebotomia , quantum vires ferre possunt , semel aut bis in die , donec morbus mitescat. Cùm enim pulmo multo sanguine abundet , & à corde æstuante magnam illius copiam attrahat ; minimè vrendum est, ter, quater, quinquies, & sexies sanguinem detrahare.

Si tamen peripneumonia anginae & pleuritidi succedat, maiori cum religione sanguis mittendus est, quia vires afflictæ sunt priori morbo.

Mitti verò debet sanguis è basilica vtraque, si totus pulmo æqualiter afficiatur; vel ab alterutra, quæ lateri affecto magis respondeat; in quo scilicet æger doloré, aut grauitatem maiorem percipiat , & ex quo sputum potius euchi sentiat.

Mulieribus peripneumonicis, quibus sanguis menstruus actu fluit, à talè primò, & mox intra sex horas à brachio sanguinem mittere oportet; nisi adèd vrgeat periculum , vt cogat primo accessu sanguinem è brachio fundere. Quo in casu, toto venæ sectionis tempore, & parùm ante illud, cucurbitulæ femoribus sunt affigendæ.

Posteaquàm verò non videntur vires vltiorem venæ sectionem ferre posse , cucurbitulæ admouendæ sunt scapulis, & dorso, tum siccæ, tum maximè scarificatæ, quantum vires ferre possunt.

Clysteres etiam emollientes, & lenientes reuulsorij

F f

quantum

sint; ne tamen in iis vehementiora cathartica misceantur, metu alui fluxus, qui in hoc morbo periculosus est.

Si humor crudus, & pituitosus à capite irruens morbum efficiat, vel foueat, vesicatorium posteriori ceruicis parti admotum summopere proderit.

Interim vsurpentur iulepi, & emulsiones, in cura pleuritidis descriptæ. Pectus illinatur oleo violaceo, amygdal, dulc, butyro recenti, & similibus, vel sequenti linimento.

℞. Olei violac. & nymphaeae, ana ℥. j. β. butyri recentis, & mucilag. sem. psyllij, ana ℥. j. ol. rosac. ℥. β. trochisc. de caphura ℥. j. Fiat linimentum. Vel

℞. Ol. violac. ℥. iij. ol. de sem. cucurbitae, & lactis muliebris, ana ℥. j. butyri recentis ℥. j. β. Misce, fiat linimentum.

Anacatharsis promouetur syrupo violac. iuiubino, aliisque in cura pleuritidis propositis. Quemadmodum eclegmata & condita ibidem descripta vsurpari poterunt, hac cautione adhibitâ, ut in materia tenuiori in crassantia, in crassiori attenuantia vsurpentur.

Potus ordinarius sit decoctum hordei & liquiritiae, quemadmodum in pleuritide.

Purgatio in hoc affectu non conuenit, nisi declinante morbo; illiusque materia seligenda, qualis in cura pleuritidis proposita est.

## CAPVT IV.

## De Empyemate.

**L**icet empyematis nomen omnem suppurationem significet, vsus tamen obtinuit, vt non nisi pro puris collectione in thoracis capacitate vsurpetur.

Hæc autem puris inter pulmonem & thoracē collectio triplicē agnoscit causam: Prima est inflammatio suppurata quæ in pleuritide aut peripneumonia contingit: & rupo abscessu, pus in thoracis cauitatē effunditur. Idem fieri potest in angina, vt docuit Hipp. *Aph. 10. sect. 5.* his verbis: *Quicumque ab angina liberantur, iis ad pulmonem vertitur, & in septem diebus pereunt; Si verò hos effugerint, suppurantur.* Secunda est sanguis in thoracem effusus, vbi moram trahens necessario suppuratur. Sic apud Hipp. *Aph. 20. sect. 6.* *Si in vētrem sanguis prater naturam effunditur necessario suppuratur.* Illa autem suppuratio (vt docet Gal. *in comm.*) non semper est vera & propriè dicta suppuratio, sed potiùs corruptio dicenda, ex qua materiā quædam puri analoga generatur. Effluere autem potest ille sanguis in thoracem ex vulnere aut vena quadam disrumpita. Tertia est pituita à capite vel aliis partibus in thoracem emissā & ibi putrefacta. Sic apud Hipp. *Aph. 38. sect. 7.* *Destillationes in ventrem superiorem suppurantur intra viginti dies.* Gal. *in comm.* per ventrem superiorem, thoracem intelligendum esse affirmat. Illa autem pituita putrescens non verum ac legitimum pus, sed quippiam ipsi analogum producit, quemadmodum videmus tumores pituitosos vt atheromata, steatomata & melicerides, quasdam abcessuum species constituere.

Signa diagnostica duorum sunt generum: Quædam recentem & incipientem affectum ostendunt alia verò diuturnum & confirmatum.

Incipientis suppurationis tria proponuntur signa ab Hippocr. 2. *Prognost.* Primum est, si pleuritide non peripneumoniâ non expurgatâ febris intensior, euadat, dum enim pus conficitur, febris intenditur, ex Hipp. *Aph.* 47. *sect.* 1. Secundum est rigor, qui fit, dum puris acrimonia partes vellicat membranofas. Tertium est pondus & sensus grauitatis in parte; humor enim in cauitate contentus magis grauat, quàm dum in partis substantiam effusus est. Addit Gal. 4. *de loc. affect.* cap. 9. fluctuationem. *Nam ubi quis* (inquit) *assatim à decubitu transmutatur, idque maximè si ab uno latere in aliud se conuertens defluere aliquid sentiat, puris multitudinem ibi contineri haud dubia coniectura est.* Quin etiam in his fluctuatio sæpenuerò haud obscure auditur, nisi puris crassities aut copia quæ totam thoracis cauitatem impleat, fluctuationem impediat. His etiam accedit respiratio difficilior. Quamuis enim rupto abscessu dolor lateris sedetur, & hinc diaphragma & thoracis muscoli liberiùs moueri possint, quia tamen pulmo à circumfuso pure grauatur, vt liberè moueri nõ possit, & præterea quædam puris portio spongiosa pulmonis substantia imbibitur, indè pulmo grauior redditur, bronchiaque à pure imbibito obstruuntur respiratio redditur difficilior. Ex illa etiam puris in pulmonem & bronchia transmissione sputum purulentum exoritur, quod etiam factum empyema significat, non sèper tamè puris excretio fit propter illius crassitiem; ob quâ ad bronchia peruenire nõ potest.

Diuturniorem verò ac confirmatum affectum significant febris lenta continuò infestans quæ partim putrida, partim hectica videtur, interdù  
mitior

mitior, noctu verò vehementior, sudores multi, noctu præsertim aduenientes, tussis frequens & molesta, temporis verò processu maxillæ ruborem contrahunt, oculi concaui redduntur, ungues incuruantur, pedes intumescunt, & pustulæ circa pectus erumpunt, acriore puris parte ad extremam usque cutem penetrante.

Latus affectum distinguitur ex iis quæ habentur apud Hippocr. 2. Prognost. text. 21. Si empyema (inquit) in altera tantum parte existat, hos conuertere ac discere oportet, doleantne in altero latere, & an alterum altero calidius sit atque cubantem supra sanum latus interrogare, an videatur sibi onus aliquod desuper suspendi. Si enim ita est, in quodcumque latus pondus sit, in altero suppuratio existit. Quemadmodum si utrinque calor & pondus sentiatur, in tota thoracis cavitate pus continetur. Addit Auicennas etiam coniecturam quam deprompsit ex Hipp. 3. de morbis. Applicetur (inquit) linteam thoraci madefactum secundum utramque partem, dextram & sinistram, citius enim exsiccabitur illud, quod supra partem pus continentem adpositum est. Aliud denique signum ab experientia nostra desumptum proponere liceat, quod ab authoribus non fuit animaduersum; quod nimirum in latere affecto tumor ut plurimum œdematosus apparet, ex tenuiore materiæ collectæ portione in thoracis musculos resudante. Et quando, in suspitione empyematis, huiusmodi tumor, aut cutis inflatio in alterutro latere apparet, certò pronuntiare licet, empyema intus latitare, & apertio lateris tutò fieri posse.

Signa prognostica præcipua proponuntur ab Hipp. insigni contextu, qui habetur 2. Progn. t. 63. his verbis, Suppuratorum in potissimum supersunt, quos febris eadem die dimiserit post ruptionem, ac cibum citius appetunt, &

siti liberati sunt, & venter exigua ac consistentia deiecit, & pus album, laue, concolorque est & vacans pituita & absque labore ac valida tussi expurgatur. Itaque optimè quidem sic ac celerrimè iudicantur, sin minùs, quibus ad hæc proximè accedunt. Moriuntur verò ij quos febris non deserit, aut cum videtur deserere, denuò recalescens innotescit, & sitiunt nec cibum appetunt, alvus humida est, pus viride, liuidum spumant, vel pituitosum spumosumque. Pereunt si hæc desint omnia. At quibus alia veniant, alia non horum quidem in multo tempore incolumes euadunt. His & nos sequentia Prognostica adiungamus.

Empyici, quibus ob magnam puris copiam totus thorax in respiratione attollitur, celerrimè suffocantur, ex Gal. 4. de loc. aff. c. 7.

Empyema si 40. dierum spatio per sputum non repurgetur, in tabem degenerat, quæ mortem accersit, ex Hipp. aph. 15. sect. 5.

Suppuratio quæ utramque thoracis partem occupat, periculosior est quàm quæ vnicam. Item quæ sinistram occupat periculosior est quàm quæ dextram, propter viciniam sinistri cordis ventriculi qui à pure, in illa parte collecto, grauius afficitur.

Quicumque suppurati vrantur vel secantur, si pus purum fluxerit & album, euadunt: si verò subcruentum, fæculentum ac foetidum pererunt. Aphor. 46. sect. 7.

Si pus Empyicorum per aluum & vrinam, validis viribus existentibus, satis copiosè expurgetur, salutem portendit. Licet rara sit puris hæc per aluum aut vrinam euacuatio: illa tamen à Galeno, Paulo & Aëtio proponitur; tum viæ, per quas fit,

À Galeno proponuntur 3. de loc. aff. cap. 4. & comm. Aph. 30. sect. 7. In priori sic loquitur: *Hac questio Erasistrati sectatores non parum urget, quippe qui putant solum spiritum in arteriis contineri. Nobis verò nihil difficultatis affert, utpotè intelligentibus quod laevis arteria pulmonis, quantum puris ex rupta vomica suscipit, id in sinistrum cordis sinum deferre potest, quod inde per arteriam magnam in renes fluit.* In posteriori loco dicit, materiam in pulmone contentam primùm ad ventriculos cordis peruenire, & inde vel ad arteriam magnam, vel per cauam venam ad gibba hepatis, deindè illinc ad caua, & ita per porras ad intestina. Ex quibus facile patent viæ per quas empyema per aluum & vrinas expurgari potest.

Empyici meliùs habentes, & qui ferè expurgati videntur, si sputum fœtidum excernant, cum recidiua intereunt. Hipp. in Coacis.

Quibus specillum à pure, velut ab igne coloratur, ij ferè moriuntur. Hipp. in Coacis.

Pro huius affectus curatione: Primùm si materiæ in thorace collectæ suppuratio prohiberi nequeat, adiuuanda est cataplamastis conuenientibus.

℞. Rad. althææ ʒ. iiij. ficuum pinguium n. x. passul. mundat. ʒ. j. florum chamæm. & melilot, ana P. j. Coquantur omnia perfectè, deinde contundantur, & per cribrum traiciantur. Postea adde farinæ sem. lini, fœnugr. & tritici, ana ʒ. j. ol. lilior. amygdal. butyri recentis & terebinth. ana. Vnc. j. Fiat cataplasma.

Ad concoctionem, & maturationem intùs etiam adiuuandam, apozema sequens in vsum vocari poterit.

℞. Rad. althææ, & symphyti maior. ana Vnc. j. foliorum agrimonix, tussilag. scabiosæ, capill. ven. ana M. j.

℞ 4 quatuor



quatuor sem. frig. maior. ana Vnc. j. sem. anisi 3. j. liquirit. raf. & passul. mundat. ana Vnc. j. flor. trium cord. & chamæm. ana P. j. Fiat decoctio ad lb. j. sem. In colat. dissolue syrup. de ruffilag. de liquirit. sacchari candi, ana Vnc. ij. Fiat apozema, aromatizat. pulu. rad. ireos Florent. 3. j. pro v. dosibus matutinis.

In eundem finem vtatur eclegmate sequenti.

℞. Pulpæ ficuum pinguium Vnc. j. butyri recentis Vnc. ij. ol. amygdal. dulc. recenter sine igne extracti Vnc. j. sacchari candi Vnc. ij. amyli 3. ij. Fiat looch, capiat lambendo.

Terebinthina veneta aquâ hordei lota, ad 3. iij. exhibita cum puluere liquiritiæ, multum prodest ad maturandum, discutiendum, detergendum.

Si denique per anacathar sim empyema solui non posse videatur (quemadmodum vt plurimum non fit) ad lateris apertionem veniendum est, quæ fit inter quartam, & quintam costam, ab inferioribus & nothis incipiendo, multis cautionibus adhibitis; quæ apud Chirurgiæ scriptores, & præsertim apud Hieronymum Fabricium ab Aquapendente, in libro de operationibus Chirurgicis eleganter descriptæ reperiuntur. At verò multò utilius est abscessum, qui pleuritidi succedi, aperire, antequàm disrumpatur, & pus in thoracis capacitatem effluat. Quod dignoscitur ex tumore, qui iuxta suppurationis locum eleuatur, aliisque signis empyemati omnî communibus. Tum verò apertio molienda est, non in parte thoracis inferiori, & inter quartam, & quintam costam, quia aperto foramine longè ab abscessu pus nullum exiret; sed in medio tumore, admoto prius caustico. Si verò nullus tumor appareat, difficillimum est apertionem tentare ante abscessus ruptionem.

Si tamen eam quis aggredi voluerit, eligere debet  
locum,

locum in quo æger dolorem & pondus percipit, & qui maiori calore pollet. Fieri autem debet apertio inter duas costas, supra partem costæ superiorem, quia inferiori adiacet vena & arteria. Quod in omni empyematis apertione obseruandum est. Dum pus, aperto thorace, per interualla educitur, vtatur æger bis in die portione vulnerariâ, quæ sanguinem expurget, vlcera detergat, & putredinem inhibeat.

℞. Saniculæ, buglæ, scabiosæ, betonicæ, hyperici, card. benedict. pilosellæ, pimpinellæ, vincæ peruinæ, agrimon. plantag. ana M. j. sem. hyperici, card. bened. ana ʒ. sem. flor. cord. ana P. j. Coquantur in hydromel. ad lb. j. sem. cuius capiat Vnc. vj. singulis vicibus.

Hoc eodem decocto poterunt fieri iniectiones in thoracis cauum.

Pro potu vtatur hydromel. vel aquâ hordei saccharatâ, vel saccharata simplici.

Si aperto thorace pus debitè non fluat, sequenti emplastro eliciendum est, quod ex omnibus abscessibus potentissime pus attrahit, & foras educit.

℞. Resinæ pini recentis claræ, & odoratæ lb. ss. ol. laurini, & terebinthinæ, ana ʒ. j. gummi elemi ʒ. ij. Primò resina & gummi in igne liquentur, donec simul misceantur. Postea adde terebinthinam & oleum, omniâque simul bulliant tantillum, & per linteum crassius transcolentur. Massæ istius portio extendatur super alutam, & fiat emplastrum, quod mutetur semel in die tantum hyemis tempore; bis autem in die in æstate. Perforetur in medio duabus aut tribus incisuris oblongis, vt pus attractum effluat.

## CAPVT V.

## De Hydrope pectoris.

**E**mpyemati simillimus est hydrops pectoris, qui fit à seroso humore in pectoris capacitate collecto. Practicorum vulgus hunc modum non describit, licet ab Hippocrate graphicè delineatus sit 2. de morbis sub nomine hydropis pulmonis, in hunc mundum. *Febris & tussis tenet, & acernatim respirat, & pedes tument, & ungues contrahuntur, & patiuntur talia. qualia is qui suppūratns est, sed debilius & diuturnius, Et si quis infundas, aut fotum aut fūssitum adhibeas, pus non sequitur. Atque ex hoc sanè cognoueris, non pus, sed aquam intus esse. Et si multò tempore, aurē ad latera adhibitā, audire tentaueris, ebullit intus velut acetum. Et hoc quidem aliquando patitur, postea erumpit ad aluum, & statim quidem sanus esse videtur ac morbo liberatus. Verum progressu temporis alius incenditur, eadēque illa patitur & adhuc amplius. Aliqui etiam intumescunt ventre, scroto & facie. Hæc Hippocrates.*

Hic morbus rarissimè contingit, frequentior tamen est, quàm vulgò creditur; sed plerumque non agnoscitur. Plures illius historiæ a Schenckio collectæ sunt, ex quibus patet, eum non, nisi post dissecta cadauera ex hoc morbo defunctorum, innotuisse. Idē exactè describendus est, vt Medici curantis peritiam non subterfugiat.

Serosus iste humor vel in ipso pulmone gigni potest, proprio ipsius vitio; dum scilicet proprium alimen-

turt

tum non benè concoquit, sed illud in serosum humorem conuertit, qui sensim ad thoracis cauitatem transmittitur; quod etiam fieri potest vesiculis hydatidibus in pulmone excitatis iisque disruptis, quæ ab Hippocrat. recensitæ sunt *lib. de internis affectionibus*, & à quibusdam autoribus obseruatæ. Vel aliundè in thoracem transmittitur, præsertim ab hypochondriis, quando scilicet hepar aut lien intemperie, scirrhus, aut alio graui morbo afficitur, vnde serosi humoris copia generatur. Serosus ille humor vel per venas ad pulmonem naturâ aut casu debilem transmittitur, vel à cauitate abdominis ad thoracem per cæca spiracula transfertur. Facilem autem esse illam serosi humoris ab vno ventre in alium transmissionem, docetur experientiâ, quandoquidem hydrops pectoris in hydropem abdominis tandem degenerat, & vice versâ, humor in Asciticorum abdomine contentus, in thoracem sæpissimè transfertur, vnde illi subitò & ex improviso suffocati pereunt.

Diagnosis huius affectus, (sicut antea dictum,) difficillima est & omnia ferè signa cum aliis thoracis morbis communia sunt. Hoc tamen illi & empyemati tantum peculiare, murmur scilicet aquæ fluctuantis, quod intra pectus exaudiri potest, si corpus sursùm ac deorsum transuersumque commoueatur, vel à valido homine scapulis apprehensum agitetur.

Omnia verò signa ex Hipp. suprâ recensita, collectiue sumpta diagnosis satis certam stabilire possunt. Quibus hoc vnicū addere licet tanquam pathognomonicum, & quo solo hydrops pectoris à cæteris difficultatis respirandi speciebus distinguitur. Quando nimirum spirandi difficultas primo quoque somni tempore inuadit, eumque intercepit, ac per noctem magis vrget, procedente

precedente vord die sensim lentescit.

His accedit interdum brachij alterius vel humeri dolor, vt paralyſis quæ fit ab humore à capite in pectus delabente, cuius portio in brachium vicinum defluit; vel è ſero in pectore contento, & ad brachia per venas axillares exundante; vel à refrigeratione musculorum intercostalium, à quibus ab brachia nerui deriuantur, vel aliâ quauis ſympathiâ viciniæ lege obortâ. Hanc enim pectoris & brachiorum ſympathiam notauit Hipp. in *Coacis*, his verbis: *Si vehementer inflammetur appendentes vtrique pulmonis partes, vt in latius incumbat, reſoluuntur ea parte corporis.*

Grauiſſimus eſt affectus & difficillimè curationem ſuſcipit. In iis enim qui eo laborant, calor natiuus admodum debilis eſt, viresque naturales languidæ ex graui aliquo viſcerum affectu: vndè fit, vt quamuis collectus humor in thorace remediis idoneis euacuetur, (quod tamen difficillimum eſt,) nouus ſubindè fiat nouæ materiæ affluxus; vndè morbus non ſolum fouetur, ſed etiam deterior in dies euadit; ita vt tandem in hydropem aſcitem incidant, multiplicatâ materiâ, & in abdominis cauitatem transfuſâ. In principio tamen, antequam viſcera inſignem læſionem ſuſceperint, curationem interdum admittere poteſt.

Ad curationem huius morbi duæ indicationes ante oculos proponendæ ſunt, vt ſcilicet materia in thorace contenta euacuetur, & noua illius generatio impediat.

Materiæ in thorace contentæ euacuatio difficillima eſt, quia non ſunt viæ patentes, per quas educi poſſit. Ideò Hippocr. lateris apertionē præcipit, quam tamen, quia in uſum reuocatam non vidimus, neque felicem

felicem illius successum apud vllum autorem legimus, probare absolutè non possumus. Et de ea idem dici potest, quod de paracentesi in hydrope ascite, capite proprio, diximus.

Satius ergo est hydragogis medicamentis humoris illius euacuationem tentare. Cui rei conferent ea omnia quæ in hydropis curatione à nobis proposita sunt. Vbi tamen diligenter obseruandum, quod si morbo iam confirmato, & multâ serosi humoris copiâ in thorace collecta, purgans validius exhibeatur, humores illi valdè exagitantur, vnde suffocatio ingens ægrotanti contingit, quæ illum subito de medio tollit. Ideò cautè agendum est, & in minori dosi, atque iteratis vicibus medicamenta exhibenda sunt, eaque cum potentioribus aperientibus ac diüreticis miscenda, vt simul viæ aperiantur, & serosæ materiæ portio ad vrinæ vias deducatur.

Inter hydragoga, ea quæ ex mineralibus desumunt, in hoc affectu maximè conueniunt, qualia sunt mercurius dulcis, & mercurius vitæ, ita correctus vt per inferiora tantùm euacuet.

Diuretica etiam sola frequenter vsurpata multum conferre possunt, quia materiam antecedentem ad thoracem confluentem auertunt, & per vrinas euacuant; tum etiam consequutione quadam ab ipso thorace educunt.

Sudorifica etiam ad serosam illam materiam educendam vtilissima sunt, & nos vidimus virum sexagenarium vsu decocti sudorifici ex guaiaco, & salsa parato per 15. dies sudores excitando cum vapore spiritus vini, fuisse liberatum.

Ad eandem serosi humoris à thorace auersionem plurimum

plurimum conferent cauteria cruribus aut tibiis ad-  
mota.

Generatio verò illius serosæ materiæ impediatur,  
vitia corrigendo earum partium, quæ hanc materiam  
suppeditant. Sic pulmone ipso laborante, illi remedia  
appropriata erunt vsurpanda. Si hepar aut lien intem-  
perie, obstructione, scirrho, aut alio quopiam vitio la-  
boret, illorum affectuum curationes ex propriis capi-  
tibus erunt repetendæ.

Vniuersaliter vero ea quæ partes vitales & naturales  
roborant, semper conuenire poterunt, qualia in virium  
imbecillitate, hydropis & fluxus hepatici curatione  
descripta sunt.

## C A P V T V I.

### *De Hæmoptysi, seu sanguinis spato.*

**L**icet vulgò hæmoptysis omnem sanguinis, per os  
excretionē significet, à quacumq; parte procedat,  
siue à thorace, pulmone, aspera arteria, siue à faucibus,  
gingiuis, palato, columella, cerebro, ventriculo, hepa-  
te, & liene; propriè tamen à Gal, 1. *de cris. cap. 5.* hæ-  
moptysis nomen pro ea sanguinis expuitione sumitur,  
quæ à partibus, vitalibus thorace nimirum, pulmone,  
& aspera arteria procedit.

Est symptoma in excretis eorum quæ sunt toto ge-  
nere præter naturam.

Cum autem omne symptoma pendeat à morbo  
tanquàm causa proxima, & immediata; huius  
causa erit morbus organicus, vel communis. Or-  
ganicus

ganicus duplex est, vasorum apertio, quæ ἀναστομωσις, Græcis dicitur, & rarefactio, διασπένδνσις appellata. Communis etiam duplex est, eorundem vasorum ruptio, quæ ρυξις nominatur, & erosio διαβρωσις appellata.

Causæ internæ istos morbos immediatè producentes sunt sanguinis quantitas, vel qualitas excedens.

Sanguis quantitate peccans venas rumpere aut orificia illarum aperire potis est; atque ita rhexim aut anastomosim efficere.

Idem verò qualitate peccans, si nimirum calidior tenuiorque sit, per anastomosim effluere potest, quia calor orificia dilatat, & tenuitas efficit ut facilius effluere possit. Eadem qualitates diapedesim etiā efficiunt; calor enim rarefacit tunicas vasorum, tenuitatem verò sanguinis efficit, ut per poros earum tunicarum facilius transfluere possit.

Sanguinis denique acrimoniæ venarum tunicas erodit & exulcerat, ac diabrosim parit. Id ipsum præstare possunt humores acres vel falsi à capite destillantes, vel aliundè ad pulmonem confluentes.

Causæ etiam externæ ad horum morborum productionem concurrunt mediatè, vel immediatè Immediatè id præstans, ictus, casus, vulnus, & alia id genus. Mediatè verò operantur, quæcumque sanguinem multiplicare calefacere, aut attenuare possunt, ut victus plenior aut calidior, mensium aut hæmorrhoidum suppressio, exercitatio nimia, clamor ingens, æstus longa in sole mora, & alia quamplurima.

Frigus etiam externum vasorum disruptionem potest adiuuare, eorum tunicas duriores, & ad extensionem difficiliiores reddens. Ad hoc tamen concurrere



re debet motus vehemens, aut humorum abundantia.

Diagnosis huius affectus satis difficilis est ratione partis mandantis, quam tamen Gal. paucis absolvit 4. *de locis affectis cap. 6.* quod nimirum sanguis è gula & ventriculo excernitur vomitione, ex spiritalibus partibus tussi, ex faucibus & gurgulione sreatu, ex ore simplici expuitione. Quæ quidem clariori explicatione indigent. Siquidem sanguis è capite ad gurgulionis partes internas, & ad fauces affatim irruens, tussiendo educitur; sicque ab eo qui ex partibus spiritalibus effertur, hoc saltem signo non distinguitur.

Præterea cum sanguis è pulmone & à thorace promanans tussi educatur, alia signa necessaria sunt, quibus hæ partes affectæ inuicem distinguantur.

Primo igitur à capite profluens sanguis, licet tussim interdum moueat, maior tamen illius portio sreatu excernitur, & titillatio percipitur in palato, qualis ex catarrho solet contingere; tum etiam palatum inspectum sordidatum apparet, & cruentum. Ac denique omnimodam certitudinem facit, si eodem tempore aliquid sanguinis stillat è naribus.

A pulmone prodiens sanguis, ab eo qui à thorace, distinguitur ex Gal. *loco citato*, ex eo quod à pulmone est spumofus, maiori copia, & sine dolore; à thorace verò nigricans, paucior, & cum dolore.

Obiici tamen potest, quod sanguis è thorace prodiens per pulmonem fertur, ac per consequens spumofus est, quia cum aëre inspirato permiscetur, quemadmodum

dum ille qui à pulmone immediatè defertur. Et Aui-  
cenna dixit ex thorace sanguinem spumescere. Re-  
spondendum est aliud esse nonnihil spumæ permix-  
tum educi, aliud ex toto spumescere, quod solius sub-  
stantiæ pulmonum proprium est. Ita tres spumæ gra-  
dus in concreto sanguine notari possunt. Aut enim ex  
toto spumans est è pulmonis carne, cuius induit simi-  
litudinem, est enim pulmō coagulata spuma: aut plu-  
rimūm spumans è pulmonis vasis; aut spumæ per-  
mixtus ex thorace.

Verū certissimum thoracis affecti indicium desu-  
mitur ex dolore, qui fixus est & perdurans iuxta illum  
locum in quo est solutio continui.

Aduertendum verò est sanguinem interdum ab  
hepate, liene, vtero aliisque partibus in pulmonem  
transmitti, & per sputum excerni; itavt pectus se-  
cundariò tantūm, non primariò afficiatur. Cuius rei  
diagnosim perquàm difficilis est. Illam tamen coniectu-  
rā assequi poterimus, si nimirū aliquo prædictarum  
partium dolore, inflammatione aut aliquo alio affectu  
laboret, & nullum aliud in pectore vitium adfuerit,  
aut præcesserit.

Signa causarum ex iis quæ superiùs dicta sunt elici  
possunt. Si enim per anastomosim venarum sanguis  
feratur, causæ vasorum orificia aperientes præcesse-  
runt, & sanguis egreditur mediocri quantitate, & sine  
dolore. Per Diapedesim verò effluens sanguis serosus  
est, paucus, & sine dolore.

Per rhexim erumpens, copiosus est, si plethora præ-  
cessit, vel causa aliqua externa ruptionem vasorum ef-  
ficere valens.

Si denique per διάβρωσιν seu venarum erosionē san-  
guis profluxerit, salæ vel acres à capite destillationes

præcesserunt, sanguis falsedinis, vel acrimoniæ participes percipitur, & malè coloratus apparet, & præcesserunt causæ humores acres generantes. In principio sanguis paucusexpuitur; in progressu verò, aucta erosionè, copiosior, tandemque puris sputum cōsequitur.

Prognosis huius affectus Hippocrates generatim instituit *Aph. 25. sect. 4. Sanguinem supernè quidem efferri, qualiscumque sit malum.* Omnis enim vasorum apertio, quæ sanguinem effluere sinit, periculosa est, præcipuè in pulmone, de qua in primis audiendus est aphorismus. Fit tamè interdum ut talis sanguinis excretio innoxie contingat, natura motu quodam critico sanguinè superfluum per illas vias expurgante, & obseruatū est, quasdam mulieres suppressione mensium laborantes, certis periodis sanguinem ex pulmone, per illius venarum anastomosis innoxie excreuisse.

Ratione causarum, diapedesis minùs periculosa est: anastomosis magis: rhexis adhuc periculosior; nisi enim intra tertium, vel quartum diem consolidetur, inflammatio succedit, quæ in suppurationem versa, vlcus producit, à quo phthisis consequitur; vndè Hipp. *Aphor. 15. & 16. sect. 7. A sanguinis sputo puris sputum, à puris sputo phthisis.* Diabrosis verò omnium periculosissima est & Galenus eam incurabilem pronunciat, propter vlcus insanabile quod illam consequitur.

Hæmoptoës curatio perficitur reuellendo sanguinè à pulmone, malam illius qualitatem corrigendo, & venā apertā obturando, astringendo & conglutinando.

Primò igitur instituenda est venæ sectio, ex brachio illius lateris, in quo grauitas, aut punctio percipitur in pauca quantitate, & per interualla repetita ad maiorem reuulsionem.

Post

Post sectionem venæ brachij, in pede etiam aperienda est: sicque fiet reuulsio ad distantissima. Adhuc multò magis cōducit, si affectus, ex suppressione mensium traxerit originem.

Si æger sit obnoxius hæmorrhoidibus, vtiliter etiam aperientur, admotis hirudinibus.

Cucurbitulæ etiam scarificatæ admouebūtur scapulis & dorso, vel cucurbitulæ sine ferro hypochondriis & inguinibus. Frictiones & ligaturæ partium extremarū celebrentur, ac præsertim cucurbitulæ hypochondriis, per intervalla repetantur toto curationis decursu.

Interim iulepus sequens ab initio ter in die repetendus.

℞. Aquar. plantag & papau. thœad. ana ʒ. ij. syrupi de rosīs siccis ʒ. j. salis prunellæ ʒ. j. Misce, Fiat iulep.

Denique humores serosi & biliosi, sanguiné tenuiorem & fluidiorem efficientes, repurgandi medicamentis astrigendi vi præditis, & eo nomine humores minimè commouentibus, in hunc modum.

℞. Rhab. elect. ʒ. j. myrob. citrin. ʒ. ʒ. tamarind. ʒ. ʒ. Infundantur in aqua plantag. Expressionē factā dissolue rhab. puluerat. ʒ. ʒ. syrup. de rosīs siccis Vnc. j. Fiat potio.

Demum exhibeantur medicamenta, quæ oscula refferata occludant vi emplasticâ, & astringente: ita tamen, ne nimia astrictione sanguinem in pectore retineant. Qui potius ea interdum permisceantur, quæ sanguinem extrauasatum, & concretum dissoluant, & expectorent.

Ex omnibus quæ ad hanc rem maximè faciunt, sequentia præstantissima sunt.

℞. Boli armenæ: terræ sigillatæ, coralli vtriusque, & lapid. hæmat. ana ʒ. ʒ. sacchari rosac. ʒ. ʒ. sem. album oui

cum aqua rosarum fortiter agitatum n. j. Fiat looch,  
quo vtatur ex cochleari frequenter.

Vel gustu gratius, & paratu facile in hunc modum  
componi poterit.

℞. Liqueoris albuminis oui fortiter agitati ℥. ij. sac-  
chari rosar. Vnc. j. amyli ℥. iij. Misce, fiat looch.

℞. Conseruæ rosar. & symphyti maior. ana ℥. j. boli  
armenæ, terræ sigillatæ, ana ℥. j. Cum syrup rosar.  
siccat. fiat opiata, teneat in ore frequenter & sensim  
deglutiat.

℞. Conseruæ rosar. siccat. trochisc. de carabe, & de  
terra sigillata, ana ℥. sem. margarit. præp. ℥. j. sacchari  
rosacei ad pondus omnium. Fiat conditum, capiat co-  
chlear. vnum, horâ vnâ ante pastum.

℞. Succu portulacæ ℥. xij. sacchari Vnc. viij. Co-  
quantur in syrupum, quo vtatur frequenter, sensim  
lambendo. Hic syrupus in hæmoptysi præ cæteris ex-  
cellit. In portulacæ defectu, ex succo plantag. com-  
poni poterit.

Ad idem summè est efficax syrupus ex symphyto  
Fernelij à Bauderonio descriptus.

℞. Millefolij flore albo, & flore luteo, ana M. ij  
radic. tormentillæ recentis, & cum foliis, si haberi pos-  
sit, sin minùs, siccat Vnc j. pimpinellæ maioris M. j con-  
seruæ rosar. rubr. lb. ℥. aquæ fontis lb. xvj. Ponantur in  
olla vitreata, quæ cum suo operculo diligenter luteur,  
vt vapores non expirent. Coquantur postea in B. M.  
bulliète per horas xvj. Colatura seruetur in vase vitreo,  
de qua capiat Vnc. vj. manè & meridiè & vesperi.

℞. Trochisc. de carabe ℥. j. aquæ plantag. & rosar.  
ana Vnc. j. sem. syrupi myrtini, & de rosis siccis, ana  
Vnc. sem. Misce, fiat iulep.

℞. Spirit. vitrioli ℥. sem aquæ plantag. Vnc. iv. Misce,  
fiat

eat potiuscula; subito sistit sanguinem tussis, vel vomitu reiectum.

Syrupus corallorum ad cochlearia ij. singulis diebus exhibitus, omni sanguinis fluxui conuenientissimus est. At tinctura eiusdem, cum succo limonum recentis extracta, potentius operatur.

Quercetanus in Pharmacopœa sequentem aquam describit ad hæmoptysin, quæ est magnatum virium.

℞. Rad. bistortæ, symphyti maior, tormentillæ, ana Vnc j. herbar. centinod. millefolij, veronicæ, pyrolæ, faniculæ, bursæ pastoris cum rad. ana M. j. summitat. rubi lentisci, ana M. sem gran. sumach. myrtill. sem plantag. berberis, papaueris albi, ana 3. vj. flor. nymphææ, cucurbitæ, cydon. rosar. rubr. ana P. ij. Contusis & commixtis omnibus, macerentur per quatrimum ad ignem balnei, in succor. depuratorum plantag. portulacæ, acetosæ, agrimonie, ana lb. ij. Dein fortiter exprimantur. His adde acaciæ, hypocistid. ana 3. ij. terræ sigillatæ, boliarmen. veri, ana Vnc 8. electarij diatrag. frig. 3. ij. Macerentur denuo per quatrimum, dein per cineres ad siccitatem destillentur. Huius aquæ capiat æger cochlearia duo vel tria; per se, aut cum syrupo conuenienti.

Oleum de carabe chymicè extractum potentissime penetrat, astringis, & siccat, si guttæ duæ in potu dentur cum aqua plantag. vt docet Cesalpinus in *Speculo artis Medice*.

Mercurialis in *consultationibus*, valde commendat semen papaueris albi, vel hyosciami albi singulo mane, si eius capiat æger 3. j. plus minus, cum saccharo rosac. & syrup. de portulacâ mixtum. Sic etiam diacodium album, in cura phrenitidis descriptum, vtiliter usurpari poterit.

Amatus Lusitanus succum urticæ mirè prædicat, his verbis. *Qui sanguinem ex pectore reiecerunt, & à Medicis tanquam deplorati sunt habiti, solo urtica succo conualuerunt. Post multa autem machinata remedia, nullum ita contulit ut sanguis cohiberetur, ac urtica succus, quem ad 5. vel 6. dies ebiberunt, singulis scilicet diebus quatuor uncias ieiuno stomacho. Imo & ipsam urticam incollam iure pulli aut veruecis sape comedebant.*

Sanguis draconis omnem venarum apertionem internam mirè conglutinat ad 3. ʒ. cum aqua plantag. aut alio liquore conuenienti exhibitus, vel cum aliis medicamentis permixtus.

Pilulæ sublinguales vſitatissimæ sunt, & in sequentem modum componi possunt.

℞. Muçag. gum. arab. & tragac. extract. cum aqua plantag. ʒ. ij. mumix, mastiches, ana ʒ. j. sacchari rosati q. s. Fiant pilulæ sublinguales, quarum vnā teneat in ore perpetuò.

In iusculis etiam puluis sequens permisceri poterit.

℞. Coralli rubri, margarit. præparat. ana ʒ. ʒ. gummi arabici, tragacanth. ana ʒ. ij. Fiat puluis.

Vel in iusculis semina papaueris albi, & sumach, in panno lineo ligata, decoquantur.

Narcotica in hoc affectu multum præstant, eaque in hunc modum vsurpanda sunt.

℞. Syrup. de papau. iuiub. & de rosis siccis, ana ʒ. j. Capiat cochlear j. horâ somni. Vel

℞. Syrup. de papau. & de portulaca, an. ʒ. iij. terræ sigillatæ ʒ. ʒ. aquæ portulacæ, & plantag. an. ʒ. j. ʒ. Fiat potio, detur horâ somni. Vel

℞. Syrup. myrtini, & de papau. an. ʒ. j. boli armonæ ʒ. ʒ. Misce, vtatur noctu ex cochleari.

Vel etiam interdum theriaca recens quatuor mensium, vt docet Gal. 5. *method. cap. 13.* philonium romanum,

manum, aut ladanum opiatum vsurpari poterunt.

Refert Platerus, se hæmoptoicum curasse solâ exhibitione trochiscorum alkekengi, cum opio in lacte caprino dissolut. per aliquot noctes. Idē mulierem simili affectu laborantem curauit purgatione, ex mannæ ʒ. j. β. cum iusculo, venæ sectione, & vsu sequentium tabellarum per multos dies manē, & serò continuato.

℞. Semin. hyoscyami albi subtilissimè puluerati ʒ. ij. coralli rubri ʒ. β. gummi arabici ʒ. j. violas recentes n. x. succi berberis ʒ. ij. sacchari in aqua rosar. & plantag. dissoluti ʒ. ij. Fiant tabellæ.

Trallianus lib. 7. cap. 1. mirum in modum commendat lapidem hæmatitem, quo dicit se multos hæmoptoicos curasse; exhibendo ad ʒ. iiij. cum succo mali punici aut polygoni, iis qui copiosum sanguinem spuebant. In quibus verò sanguis nō copiosè euacuabatur, cum aqua pura tepida. At læuigandum esse curiosè monet, vt sit aëreus & vento perlimilis; tum frequenter exhibendum, vt commodiùs distribuatur; & in vino etiam infusum exhibet ad præcautionem.

Antonius Valerius exercitat. ad cap. 27. lib. 1. Hollerij de morbis internis, refert, quendam hæmoptoicum, qui alternis temporibus multum sanguinis reiecerat, neque vllis remediis sanescere potuerat vsu sequentis pulueris à Iulio Scaligero sibi præscripti, breui conualluisse.

℞. Spodij, rosar. rubr. boli armenæ, terræ sigillatæ, lapid hæmat. ana. ʒ. β. coralli rubri, carabes, margarit. non perforat. ana ʒ. ij. β. gummi arabic. tragacanthi, ana ʒ. ij. seminis portulacæ, maluæ, arnoglossæ, sem. rosar. rubr. cornu cerui vsti, amyli torrefacti, ana ʒ. iiij. Fiat puluis tenuiss. Dosis ʒ. iiij. cum aqua pluuiali. Hunc puluerem Scaliger mutuatus fuerat à Serapione, qui eum tradit cap. de sputo sanguinis, tan-



quàm remedium expertum ; quem etiam valdè laudat Valescus. Ex eo etiam possunt fieri tabellæ ; cum saccharo in aqua plantag. & rosar. dissoluto.

Ad hunc puluerem quadamtenus accedit, sed paratu facilius electarium Halidei ad hæmoptysim , in Germania olim celeberrimum , & à Gesnero , Erasmo , & Cratone commendatum , quod sic habet.

℞. Semin. hyosciami & papau. albi an. ʒ. x. terræ sigillatæ , coralli rubri , an. ʒ. v. sacchari rosat. antiquissimi q. l. Fiat electarium , cuius dosis ʒ. j. manè & serò. præmissis vniuersalibus.

Quia verò astringentium vsu sputum supprimitur ; difficultas spirandi exoritur , per interualla recurrendum est ad ea quæ pectus leniunt , & nihilominus sanguinis sputum cohibent. Qualia sunt ea quæ componuntur ex gummi arabico , tragacantho , amylo , & syrupis de rosis siccis , cydonior. myrtill. iuiubino , de succo portulacæ , aut plantaginis.

Dum astringentia remedia in vsum reuocantur , si alius non procedat, clystere subducatur , vel purgante medicamento astrictionem aliquam relinquente.

In toto curationis decursu, si sanguinis concreti, in thorace contenti suspicio sit, dissoluendus erit oxycrato. Quod, vt Gal. docet 5. *method.* in hoc casu ita componendum erit, vt potu sit iucundum , nec ob acetum copiosius tussim excitet : ita enim sanguinem soluit, & leuiter astringit ; huius capiat æger ʒ. vj. tepidè bis, aut ter in die ; si tamen adhuc tussim moueat, saccharo dulcorandum erit. Est autem eo vtendum, cum iam aliquo modo fluere cessat sanguis. Huic etiam rei conferunt carabæ, & mumia , quæ cum astringentibus & glutinantibus permiscenda sunt , vt in formulis nonnullis suprâ præstitum est.

In eodem curationis decursu , ad feruorem hepatis remperan

temperandum , epithema refrigerans hypochondrio dextro admoveatur.

℞. Aquæ rasar. plantag. & cichorij, an. ʒ. iij. aceti rosac. ʒ. ij. puluer. electar. triasantal. ʒ. j. ʒ. camphoræ ʒ. j. Fiat epithema applicandum tepidè regioni hepatis.

Post vsum epithematis inungatur eadem pars unguento rosac. vel cerato santalino , addendo aceti rosac. parùm vñctionis tempore.

Lumbi etiam & spina dorsi illinantur oleo rosac. & nymphææ lotis in aceto , addendo parùm camphoræ, vt sanguinis in vena caua contenti feruor temperetur. Cauendum tamen est ab iis quæ vehementer astringunt , quia sanguinem à vena caua in pulmonem propellerent.

Plurimum etiam ad sanguinis feruorem temperandum , eiusque fluxum cõhibendum conducit oxycrato frigido testes fouere : maximus enim est consensus inter spiritalia & genitalia membra.

Balneum in hoc affectu conueniret , ad viscerum calorem temperandum. Sed quia relaxare, & vena magis referare potest, idè illius vñsus fugiendus est.

Pro potu vtatur æger syrupo myrtino, de portulaca, aut de rosis siccis ; aut saccharo rosaceo cum aqua hordei, aut cum aqua infusionis lapid. hæmatit. vel terræ sigillatæ; aut cõserua rosarum, cum ea aqua permixta, vel cum aqua infusionis coriandri præparata , & acidula reddita cum spiritu vitrioli; vel cum tinctura rosarum.

Leue decoctum millefolij pro potu ordinario vsurpatum ad quemcumque sanguinis fluxum cõhibendum efficacissimum est.

Si acris fluxio in pulmonem è capite irruens , causa sit huius symptomatis ; præter suprà dicta , conuenient ea remedia, quæ pro catarrhi calidi curatione suprà posita sunt.

Sedato sanguinis fluxu , ad impediendam recidivā , vitanda primum ea omnia , quæ humores exagitare solent; vt vehemens exercitium , ingens calor , incandescentia , vociferatio , vina generosa , cibi prædicti sale aut aromate conditi.

Conserua rosar. siccat. teneatur in ore frequenter, præsertim sub lecti ingressum.

℞. Conseruæ rosar. & rad. symphyti , ana ℥. j. trochisc. de carabe , & de terra sigillata , ana ℥. ℞. coralli rubri , & margarit. præparat. ana ℥. j. sacchari rosacci ad pondus omnium. Fiat conditum , de quo capiat cochlear. i. per interualla horâ vnâ ante pastum.

Purgetur quater in anno , vel etiam sæpius si opus videatur , potione ex rhab. & myrobalanis supra descriptâ , cui addatur loco syrupi , mannæ granatæ ℥. j.

Vtiliter etiam sumi potest per aliquod tempus à sedata hæmoptoë , rhab. torrefacti ℥. i. singulis diebus manè, horâ vnâ ante pastum. Imò verò si sanguis plurimum aqueus , & serosus sit, (vt plerumque in omni hæmorrhagia solet contingere) idem rhab. non torrefactum , sed tantum pulueratum dictâ dosi maxime conueniet; sic enim sanguis, expurgatis paulatim serosis illius humoribus , pristinam suam crassitiem recuperare poterit. Vel poterit idem rhab. sumi ad ℥. i. semel in septimana.

Poterit etiam in vsum reuocari syrupus magistralis ad sanguinem mundificandum à serosis & tenuibus ichoribus & humoribus.

℞. Fol. Buglos. vtriusque , fumariæ , lupul cichorij , endiuia , agrimon. plantag. polytrichi , ana M. j. summit. asparagi, verbenæ, euphrasie , ana M. ℞. sem. cucurbitulæ , & melonum, ana ℥. ℞. semin. endiuia ,  
cuscuta ,

eufcute, ana ʒ. ij. liquirit. raf. & pafful. mundat. ana ʒ. j. prunor. dulcium par. vj. fennæ mundat. ʒ. iiij. polypod. querni ʒ. ij. agarici in panno raro ligati ʒ. vj. macis ʒ. j. flor. iiij. cordial. & cicer. rubeor. ana P. j. Coquantur ad tb. j. ſ. In colat. diffolue fucci pomor. redolen. ʒ. iiij. facchari albi quartaria quinque. Fiat ſyrup. perfectè coctus, aromat. ſantalo citrino. Poſtea in ſyrupo infunde rab. electi contuſi, & in panno raro ligati ʒ. j. capiat ʒ. ſ. vel ʒ. ij. cum iuſculo bis in menſe.

Cauterium affigatur tibiæ dextræ, vel ſiniſtræ, pro vt hepatis aut lienis affectus huic ſymptomati occaſionem ſuppeditant.

Denique lactis aſinini chalybeati uſus per menſem integrum, ad huius affectus præcautionem erit uſiſſimus. Vel ad potentiùs hepar refrigerandum, ſerum caprillum chalybeatum; illius loco poterit ſubſtitui.

Pro potu vtatur aquâ leuiter coctâ cum ſemine coriandri præparato, vel decocto hordei & liquiritiæ.

## C A P V T VII.

### De Phthiſi.

**L** Icèt phthiſeos nomen generaliter omnem corporis conſumptionem ſignificet: propriè tamen & ſpecialiter pro ea corporis extenuatione uſurpatur, quæ vlcus pulmonum conſequitur.

Hæc autem corporis extenuatio prouenit à febre putrida & lenta, quæ in hecticam degenerat. Febris verò ab vlcere pulmonis exoritur, à quo propter viciniam,

niam, putridi vapores ad cor continuò exhalant, & in eo febrem accendunt. Postmodum verò calor ille febrilis à corde in totum corpus diffunditur: sicque partes omnes intemperie calida & sicca laborantes, & calorem influentem intemperatum ac putredinosum recipientes alimentum commodè non coquunt, & malè nutriuntur; vnde sensim propriæ substantiæ consumptio succedit.

Febris autem illa propter longitudinem, & causæ persëuerantiam in hecticam degenerat, cui tamen non rarò putrida coniuncta est; quod ex urinis dignoscitur, & exacerbationibus, quæ certis horis non rarò contingere solent. Imò verò interdum paroxysmi febrium intermittentium in phthisicis obseruantur.

Ulcæris pulmonis causa proxima & immediata est humor acer & erodens, qui vel aliundè in pulmonem influit, vel in ipso pulmone generatur.

Influit in primis à cerebro pituita acris & salsa catarrhum ferinum efficiens; qui pulmonem exulcerare facilè potis est. Interdum verò pituita effluens à cerebro etià salsedinis, & acrimoniæ expers; exulcerationem pulmonis efficere potest; si nimirum in eo diutiùs remoretur, & putredinem contrahat, à putredine autem acrimonia exoricens, partem corrodit & exulcerat.

Non semper tamen pituita putrescens in pulmone; illum exulcerat. Siquidem videmus sæpè in catarrhò, pituitam putridam excerni, cum tamen pulmo nullam læsionem conceperit. Sed ad ulcerationem efficiendam duæ requiruntur conditiones; vna ex parte materiæ fluxæ, altera ex parte pulmonis. Ex parte materiæ conditio necessaria est, vt illa talem habeat dispositionem ac temperiem, vt per putredinem acquirat insignem

insignem acrimoniam, quæ exulcerationem efficere valeat. Ex parte verò pulmonis concurrere solet mollis præter inodum, tenella, ac corruptioni parata illius substantia, quæ vno verbo vitiosa pulmonis constitutio vocatur; ab ortu & semine parentum ut plurimum contracta, de qua paulò inferiùs agetur.

A vicinis etiam partibus humores pulmones exulcerantes, & putrefaciētes solent influere, ut pleura, mediastino, diaphragmate, aspera arteria, & in primis ex earum partium inflammatione suppurata, quæ in empyema conuertitur; de quo Hipp. *Aph. 15. sect. 5. Qui ex pleuritide empyici sunt, si à ruptione empyematibus intra dies 40. repurgentur, liberantur, alioqui transeunt in tabem.*

In ipso pulmone generatur, quando è vase illius rupto vel eroso, aut ex vulnere aperto sanguis effusus putrescit, aut à variolis vlcus in eo relinquitur.

Interdum verò ex ipso pulmonis vitio prauis humores generantur, qui illius substantiam corrumpunt, & phthisim efficiunt. Tale autem vitium, plerumque seu vitiosa pulmonis constitutio, à primo ortu contrahitur, & à semine parentum simili labe infectorum. Unde phthisis inter morbos hæreditarios principem locum obtinet, ita ut multas familias viderimus inuitabili fatq., huius morbi ferocia è medio sublata.

Hæc autem vitiosa pulmonum constitutio, non in primis qualitatibus sita est, sed malignam quandam ac venenatam qualitatem agnoscit, cuius ratione contagiosa est.

Quamuis negandum non sit molliorem & laxiorē pulmonum substantiam, atque adeo corruptioni magis paratam, ad huius morbi generationem plurimum conferre.

Hæc autem pulmonum vitiosa constitutio efficit interdum, vt nulla præcedente destillatione, nullo præcedente inflammatorio affectu, aut alia causâ euidente, ægri in tabem incidant, ex solo partis vitio proprium alimentum corrumpente.

A tuberculo etiam in pulmone genito suppurato & disrupto phthisis interdum generari solet. Est autem tuberculum pulmonis, tumor exiguus in quadam illius particula collectus.

Duplex illius genus ab Hippocr. constituitur 1. *de morbis*, quorum vnum crudum tuberculum ab eo nominatur, quod nunquam ad suppurationem venit, sed sensim increscens spiritus vias præcludit, & tandem ægotantem interimit.

Alterum est quod ad suppurationem venit, & vomica pulmonis nominatur. Fiunt autem dupliciter per fluxionem, vel congestionem & materia collecta vel in cystide concluditur, vel sine vesicula in ipsa partis substantia. Vesiculæ illius densitas sæpè facit, vt huiusmodi vomica per multos annos in pulmone gestetur, nullis signis indicata, & nulla alia corpori noxa communicata, vndè Hippocr. *Aph. 41. sect. 6. Quibus suppuratio in corpore existens non innotescit, iis ob crassitudinem puris aut loci non innotescit.* Ita vt multi omnia corporis munia ritè exercentes, ruptâ derepentè vomicâ è medio sublata sint, quorum exempla aliquot proponuntur à Fernelio *lib. 5. de part. morb. & sympt. c. 10.* è quorum numero fuerunt duo medici qui nullis signis impendens periculum præuidere potuerunt.

Si pus è rupta vomica effluens in cordis ventriculos feratur, ægri subitò intereunt, si verò ad bronchia transmittatur, per anacatharsim expurgari potest,

potest, si corpus sit validum, & materiæ quantitas exigua, ut plurimum tamen relicto vlcere in pulmone phthisis inde exoritur.

Causæ etiam externæ ad huius affectu generationem concurrere possunt inter quas principem locum obtinet contagium; hic enim morbus est valdè contagiosus, ita ut videamus ut plurimum vxores maritis phthificis assiduò inseruièntes, eodem affectu corripì, & vice versa. Sic etiam liberi eiusdem familiæ ex eodem affectu sigillatim intereunt, non solùm propter impressam labem à femine parentum, sed etiam propter frequentationem illius qui primus hoc affectu actu laborauit.

Inter consanguineos enim faciliùs, & promptiùs communicatur huiusmodi contagium: ut tutum non sit fratribus, aut sororibus fratris, aut sororis phthisi laborantis, cubiculum ingredi. Siquidem *μιασματα* illa, quæ à phthificorum pulmonibus exhalant, & cubiculi totius aërem inficiunt, ab aliis, (præcipuè dispositionem aliquam ad hunc morbum habentibus,) in pulmonem attracta, similem in eo dispositionem generant.

Aliæ verò causæ externæ sunt primò aër impensè calidus, aut frigidus; calidus enim humores acres in capite contentos fundit, & liquat, & in pulmonem præcipitat. Frigus constringendo & comprimendo eiusdem humoris defluxum promouet. Sed maximè noxius est aër in primis autumnalis, qui inæqualitate frigoris & caloris acres & falsas destillationes concitat, vndè apud Hipp. *Aph. 10. sect. 3. Autumnus tabidis malus*. Secundò ad phthisim producendam maximè conferunt cibi potusque acres & falsi, & qui caput vaporibus huiusmodi replent, ac denique omnes aliæ causæ  
tum



tum internæ, tum externæ, quæ hæmoptoën inducere solent, cum ea plerumque in phthisim degeneret.

Inter causas antecedentes præcipuæ recensentur humores vitiosi in toto corpore collecti, qui vbi à causis externis commouentur, ad cerebrum transmittuntur, & inde in pulmonem confluunt. Huc pertinet mensium, hæmorrhoidum, aut alterius euacuationis consuetæ suppressio, quæ materiam catarrhis & fluxionibus suppeditat.

Prædictæ causæ hunc affectum inducunt, præcipuè in dispositis qui *σθινώδεις* & *πλευρωτώδεις* ab Hipp. nominantur, qui habent pectus angustum & depressum, collum oblongum, & scapulas alatas, quibus si pulmonis mollities & hæreditaria dispositio accedat; inuitabili fato, eos ex hoc morbo concidere necessarium est. Sunt etiam ad phthisim dispositi qui caput habent debile, quod faciliè superfluis humoribus impletur, eosque ad spiritus organa demittit.

Veræ & propriè dictæ phthiseos differentia alia non sunt, quam quæ à causarum varietate desumuntur. Hipp. tamen plures tabis species proponit notatu dignissimas, quæ non ad veram phthisim, sed ad tabem generaliter sumptam reduci debent, & sine pulmonis exulceratione cōtingunt. Ac primum *lib. 6. epid. sect. 8. text. 47.* tabem ex gonorrhœa proponit historiâ sequenti. *Saryrus in Thaso cognomento grypalopex cum esset annorum circiter viginti quinque, semen per somnum effudit sæpè, & interdum quoque sæpè ipsi prodibat: cum autem ad trigesimum peruenisset, tabidus fiebat, & mortuus est.* Ex continua autem & superflua seminis profusione corporis alimentum surripitur, vnde partes solidæ absumuntur & exsiccantur, ac tandem in tabem incidunt.

Alia

Alia tabis species proponitur ab Hippocr. 2. de mor-  
bis, tabes dorsalis appellata, quæ fit ex nimia venere  
corporis habitum vniuersum absumente, solidisque  
partibus alimentum subripiente, hæc recenter spon-  
sis effrenatæ libidini deditis solet contingere, & est  
præcipua tabis dorsalis species; quatuor enim illius  
species in Hipp. scriptis reperiuntur. Prima est iam  
descripta ex immodica venere oriunda. Secunda de-  
scribitur lib. 2. de internis affectionibus text. 13. pen-  
dens à nimia sanguinis, & nutrimenti copia in me-  
dullam spinalem irruente, ex qua calor eius innatus,  
ac facultates omnes obruuntur, ac suffocantur. A  
sanguinis autem copia emaciari corpus docuit Hipp.  
5. in hystoria viri in Oeneade, qui cum ab alimentis  
non restauraretur, sed in dies magis contabesceret,  
venâ sectâ in vtraque manu, sanguineque extracto  
quovisque exanguis redderetur, hoc solo remedio per-  
fectè liberatus est, cum omnia incassum antea tenta-  
ta fuissent. Tertia species loco citato proposita est,  
quando spinalis medulla resiccatur, & inde totum cor-  
pus arefcit & contabescit.

Huius autem exsiccationis causæ in Hippocratis do-  
ctrina duæ inueniuntur. Vna est obstructio venarû, quæ  
ad spinam tendunt, quarum humores nutritur, eoq; de-  
ficien- te, resiccatur. Altera est bilis influxus à capite in  
spinam, quem Hipp. lib. de locis in homine proponit.

Quarta describitur in libro de locis in homine, quæ  
fit ex distillatione in medullam spinalem irruente,  
his verbis. Porro cum retrò in spinam fluxio processerit,  
tabes fit huiusmodi: lumbos dolet, & interiores capitis  
partes vacua videntur ipsi esse. In eodem etiam libro  
numero 18. hæc habentur. Cum verò in medullam fluxio  
contigerit, tabes occulta ac inconspicua exoritur. Occul-  
tam eam dixit, quoniam hinc languescente corpore

morbi causa non ita facile patet. Inconspicuam autem, quia nec destillationis, nec tabis nocumenta, destillatione in medulla spinali firmata, & non ultra progrediente sensibus clare deprehenduntur. Desinit tamen esse occulta & inconspicua, si fluxio non in sola spinali medulla firmetur, sed ultra progrediens in os sacrum, & coxendicem irruat. Tam enim evidenter apparet distillatio, & dolores, ac motus impedimenta cum summa animi demissione, prodeunt.

Hæc ab eodem Hippocrate clarius explicatur lib. de glandulis numero 10. his verbis: *Alius morbus oritur ex defluxione capitis per venas in spinalem medullam; inde autem in os sacrum impetum facit, quo medulla ipsa fluxionem producit, & in coxendicum acetabula, siue iuncturas deponit & si tabem fecerit, homo marcescit, atque hoc modo contabescit & vivere non expetit. Statim enim scapulae dolent amboque pedes, ac crura consequuntur, & semper tandem pereunt multo tempore curati. Sic deflorescit homo, ac moritur.* Hæc tabis species à Medicis observanda est, quia aliquando in praxi occurrit, & iis præcipue contingit, quibus nervi languidi & tabefacti, huiusmodi fluxiones facile recipiunt.

Ad tabis species etiam referri potest tabes ex inedia & fame; cuius mentionem facit Gal. lib. de Marasmo, cum deficiente nutrimento corpus absumitur, & contabescit. Deficit autem nutrimentum in solidis partibus, non solum ob ciborum penuriam, quos ventriculis concoquit, & ad hepar generando sanguini, totius corporis alimento, transmittit. Sed etiam quando chylus in ventriculo sufficienter concoctus, venas malaricas peruadere non potest, propter graues earum obstructions; ut in strumis laborantibus sæpissime contingit, quorum mesenterium ut plurimum glandulis refertum; est

est ; à quibus venæ lacteæ comprimuntur , vnde totum corpus contabescit , & illi tabidi moriuntur.

Priuantur etiam partes solidæ necessario alimento, quando sanguis falsuginosus, & parùm nutritioni idoneus in venis congeritur , qui nisi per epicrasim currentur , vt docuit *Gal. 5. meth.* omninò insanabiles sunt , & ineuitabiliter tabidi euadunt. Ac denique *Gal. lib. de Morafino , decimo methodi* , & aliis in locis tabem proponit ex inflammatione manifesta, vel occulta , ex syncope cardiaca , vel stomachica , & alias minùs frequentes , quæ dictis locis videri possunt.

Veræ phthificos signa diagnostica , alia imminentem , alia incipientem , alia verò confirmatum affectum ostendunt. Quæ omnia graphicè describuntur ab *Hipp. 1. de morbis.*

*Imminentis phthificos signa proponuntur ab Hipp. lib. prædicto text. 9. his verbis.*

*Fis autem & suppuratus , si pituita à capite in pulmonem destillet. Et primum quidem ut plurimum latenter defluit , tussimque tenuem exhibet , & sputum paulò amarius solito , & aliquando tenuis adest calor. In hac sententia quatuor signa continentur phthisis imminētis.*

Primum signum est , quod fluxio à principio latenter defluat ad pulmonem. Quia tunc temporis materia destillans quantitate est pauca , quia tenuior humoris portio quæ defluit per parietes asperæ arteriæ, non irritat pulmonem , qui alioqui à principio magis reluctatur , nondum à morbo labefactatus ; vnde fit vt cum ex his minima sequatur læsio , hæc materia dicatur latenter defluere.

Secundum signum est , quod humor ille defluens

H h 2 tussim

tussim tenuem excitat. Cum enim in principio paucus sit , & tenuis , leuem tantum tussim excitare debet.

Tertium signum est , quod sputum amarius solito appareat. Quia humor defluens pulmōni exulcerando idoneus dulcedinis , acrimoniæ , vel falsedinis particeps esse necessario debet ; quæ qualitates ulteriori calore , & præternaturali alteratæ in amaram qualitatem degenerant ; notum enim est dulcia & falsa dum prætermodum coquuntur , amaritudinem contrahere. Cum autem calor ille præternaturalis in principio non sit valde intensus , idēd sputum leuem tantum præ se fert amarorem , & subamarum tantum efficitur.

Quartum signum est , quod aliquando tenuis adest calor ; id est quandoque illis aliquæ accedunt febres , leuiore tamen , & non vehementes. Cum enim materia non sit conculcata , sed potius ex diuturna mora , & ex loci continentis calore præternaturali aliquam concipiat putredinem , hinc febris non potest esse intensa ; habet enim materia putrescens multa spiracula , per quæ diffilari potest : quare non est mirum quod à principio febres non vrgeant , & sint leuiore.

His signis ab Hippocrate propositis adiungere possumus malam thoracis conformationem , & ætatem iuuenilem. Si enim illa duo cum prædictis concurrant , phthisim in procinctu esse , certò pronuntiare possumus.

Praua thoracis conformatio in iis reperitur qui habent thoracem angustum & scapulas prominentes alarum modo , & in similitudinem autum , partem thoracis anteriorem angustam , posteriorem autem latam habent , quare & paruitatem & malam conformatio

formationem thoracis simul possident. Thoracis angustia penuriam caloris natiui, mala conformatio eiusdem imbecillitatem significat. Si enim calidum insitum plurimum ac vegetum fuisset, thorax amplius & magnus, extensâ ab eo validè materiâ formatus fuisset; tanta autem & talis est hæc dispositio ad tabem, ut eam Hippocrates natiuam tabem appellauerit, quod ab intimis ortus primordiis, & naturæ principiis concepta sit. Quamobrem necessarium ferè videtur ita affectos in phthisi tandem incidere, nisi ab aliis grauioribus morbis præueniantur. Notandum enim est obiter eos qui talem habent dispositionem, si graui aliquo & acuto morbo corripiantur, ut plurimum interimi. Cum enim in his calor natiuus existat paucus in quantitate, & debilis in virtute, causis morbificis vehementibus facillè succumbit. Idèd cautiore Medici in huiusmodi naturis & habitibus, si graui aliquo morbo corripiantur, mortem potius quam salutem, aut saltem graue periculum prælagient.

Ætas verò iuuenilis in dispositis ad hunc morbum producendum maximè est idonea, quam definit Hipp. *Aph. 9. sect. 5.* à decimo octauo anno ad 35. in illa enim ætate adest maxima sanguinis copia ruptioni venarum efficiendæ idonea: adest etiam eiusdem sanguinis tenuitas, & acrimonia, apertioni, aut erosioni vasorum producendæ disposita. Contrà verò in pueris catarrhi humido multo hebetantur; in senibus frigore torpent; cum in media ætate propter rationes dictas, frequentius exulcerent. Adde quod in adolescentia & iuuentute plurimi errores committuntur in victu, à quibus prauorum humorum copia cumulari solet, & praua qualitas massæ san-

guinis induci ; tum etiā ob vehementiora exercitia in cursu , lucta saltu , armis , & insolatu , ruptio vasorum in pulmone , & ab ea phthisis excitari potest.

Incipientis phthiseos signa proponuntur ab eodem Hippocr. de morbis antea citato textu 10. his verbis : *Temporis autem progressu exasperatur pulmo , & intus ulceratur à pituita inbarente , & putrescente , & gravitatem exhibet pectoris , & dolorem acutum ante , & retrò , caloresque acutiores in corpus incidunt , & pulmo à calore ad se trahit pituitam ex toto corpore , & maxime ex capite , caput verò calefactum ex corpore , & hanc putrescentem subcrassam sputit.* In hoc contextu sex signa continentur phthiseos incipientis.

Primum signum est , quod temporis progressu , exasperatur pulmo ; hoc est tussis vehementior , & molestior efficitur , procedente enim morbo destillatio inualefcit , ab eaque pulmo lancinatur , atque irritatur ad expulsionem rei noxiæ. Quæ, quidem tussis non solum à materia fluente excitatur sed etiam ab ea quæ antea fluxa est. Cum enim illa sufficienter non expurgetur , diuturna mora putredinem contrahit , & pravam concipit qualitatem , à qua pulmo magis irritatur ad expulsionem , unde tussis vehementior exoritur.

Secundum incipientis atque finientis phthiseos signum est gravitas thoracis , quæ ex materia in pulmone congesta exoritur. Licet enim pulmo ex se parum aut nihil sentiat , & dolorificos affectus in se ipso non percipiat ; quia tamen thoraci per membranas alligatur , ideo illi gravitatis sensum communicat , quando à maiore copia grauatur.

Tertium signum est dolor acutus ante & retrò. Ma-  
teria

teria enim in pulmone contenta etiam praua qualitate grauitatis sensum infert, sed non solum quantitate & putredine, pulmonis membranas pungit, & vellicat, vnde acutus dolor exoritur; dolor enim membranarum propriis, pungitius est. Percipitur autem ille dolor ante & retro; quoniam hæ membranæ sterno alligantur ex parte anteriore, & dorso ex parte posteriore. Infertur etiam talis dolor à molestissima tussi, quæ tussis, ratione ingentis molestiæ & turbationis quam infert, maligna & ferina ab Hippocrate nominatur.

Quartum signum est, quod calores acutiores in corpus incidunt, hoc est, febres insignes, & vehementes superueniunt. Cum enim in progressu morbi maior ex diuturniori mora materiæ morbificæ, putredo inducatur, maiores inde febres excitari necesse est. Quamuis enim in solo pulmone ab initio materia illa putrescat, attamen ex suppuratione in thorace facta, & vlcere superinducto, putredo, humoribus in venis existentibus communicatur; quibus putrescentibus, varia putridarum febrium genera exoriuntur, & hæ febres de putridarum genere sunt, toto genere diuersæ à febricula illa, quæ ab vlcere pulmoni excitatur ex putridis vaporibus ab eo in cor translatis, quæ febricula cum temporis progressu in hecticam degenerat, & idè in phthysicis complicatio febris hecticæ cum putrida plerumque annotatur.

Quintum signum est, quod magna pituitæ copia descendat à cerebro in pulmonem, quod indicauit Hippocr. causam referens magni illius defluxus, quoniam scilicet pulmo à colore ad se trahit pituitam ex toto corpore. Hinc patet humores



in toto corpore contentos fieri materiam fluxionis continuæ , & copiosæ , quæ phthisicos infestat. Pulmo ex putredine concepta caliditatem contrahit, cuius ministerio pituitam attrahit à cerebro , cerebrum verò à toto corpore ; & hæc est vna ex præcipuis extenuationis & consumptionis totius corporis causis. Humores enim omnes tum præci tum laudabiles ad illas partes deferuntur , sicque totum corpus exhauritur.

Sextum signum est , quòd æger pituitam putrescentem subcrassam expuit ; quandoquidem materia fluxa iam putredinem concipit , & superueniente ulcere , necessariò pus ex eo excernitur ; & idèò purulentum sputum scaturit. Est autem pituita subcrassa , id est inter crassam , & tenuem mediocris ; quia cum ex mora quam facit in pulmone crassitiem acquisierit , admixtione saniei , quæ ex ulcere pulmonis exudat , tenuior efficitur ; atque adeò mediocrem quandam crassitiem acquirit, cuius ratione subcrassa ab Hippocrate nominatur.

Prædictis signis ab Hippocr. propositis hoc tanquàm certissimum adiungendum est , nempe corporis extenuatio cum febre lenta , & continua. Nam præter febres putridas suprà enumeratas , quæ per vices accedunt , & recedunt , & ex humoribus in venis putrescentibus oriuntur , adest semper febris lenta , & assidua ex vaporibus ab ulcere ad cor continuò translatis , quæ nutritionem in toto corpore corrumpit , eique calidam siccamque intemperiem imprimat , vnde extenuatio necessariò consequitur.

His etiam adiungendi sunt sudores nocturni, quibus

quibus ut plurimum phthifici vexari consueverunt simulatque somno corripuntur. Per somnum enim calor concentratur & pulmonis inflammationem auget ; ex calore autem intus augeſcente magna fit euaporatio quæ in cute condenſatur , & in ſudorem vertitur.

Addi etiam poſſunt rigores frequentes nullum typum ſeruantes , qui ex puris acrimonia membranas vellicante oriuntur.

Ac denique addi poteſt ſputi dulcedo , quæ in pure incipiente generari ſolet , ſiquidem illa eſt principium falſedinis.

Factæ denique ac confirmatæ phthiſeos ſigna proponuntur ab Hippocrate. *lib. prædicto textu undecimo* his verbis. *Quanto verò magis tempus progreditur, tanto magis pus ſincerum expuit , & febres acutiores ſunt, & tuſſis frequens ac fortis , & inedia vexat , & tamen aluus infernè turbatur : Turbatur autem à pituita , pituita verò de capite deſcendit. Hic cum ad hoc peruenerit, perit.* His dictis quinque ſigna confirmatæ phthiſeos continentur.

Primum ſignum eſt , quòd ſputum redditur magis purulentum , imò pus ſincerum expuitur.

Secundum ſignum eſt , quòd febres ſunt vehementiores , & acutiores , putredine ſemper vlteriùs procedente , & vlcere magis ſanioſo , ac purulento reddito.

Tertium ſignum eſt , tuſſis frequens ac fortis ; id eſt , frequentior ac fortior quàm antea fuerit. Frequentior quidem , quoniam plurima eſt irritatio, pauca verò expurgatio ; vnde natura iteratis vicibus perſicere conatur, quod vnica non poteſt. Fortior autem eſt tuſſis non ſolùm quia maior puris acrimonia facul-

tatem expultricem acrius stimulat; sed etiam quia emaciatis solidis partibus, thorax quo ad cauitatem amplior factus est, vnde fit tussis quædam rauca, & resonans, vt in illis rebus contingit quæ ex cauo & recondito loco resonant.

Quartum signum est, inedia seu inappetentia, quæ ægrotantes vexat, & maiorem corporis extenuationem inducit. Fit autem illa inappetentia ex eo quod distillatio à capite defluens, non solum ad spiritualia membra descendit, sed etiam naturalibus partibus communicatur, ventriculo præsertim, cuius orificum inde labefactatum, functionem propriam nimirum appetitiam amittit. Adde quod ex putridis exhalationibus, quæ partim ratione febrium putridarum, partim ratione putridæ pulmonum affectionis, ori ventriculi communicatur, appetitricis facultatis robur destruitur.

Quintum & vltimum signum est alui fluxus, qui à pituita ex capite defluente producit, vnde successu temporis ventriculus, & intestina labefactantur, ac facultas retentrix debilitatur, hincque alui fluxus exoritur, qui ad interitum ægrotantem deducit vt in prognostico fusiùs dicetur.

His signis ab Hippocrate propositis adiungenda sunt alia. Primum est summa totius corporis extenuatio, itavt in illo statu caro musculosa vniuersa absumpta sit, & ossa omnia se prodant, sola cute contracta. Hinc vngues incuruantur absumpta carne, quæ in summis digitis exstebat, vnguesque fulciebat.

His etiam addenda est respiratio difficilis, tum quia facultas est debilis, tum quia bronchia pulmonis, à materia putrida & purulenta obstruuntur; tum quod ipsum viscus maiori parte consumptum & putrefactum,  
acrem

ærem sufficientem non trahit ad cordis refrigerium; itaut quod vnica respiratio præstare non potest, pluribus atque iteratis perficere conetur.

Ac denique addendum est, quod in phthisi confirmata, & interitum vergente capilli defluunt; malæ liuescunt, nisi quod post cibum eleuatis sursùm vaporibus rubescunt; pediculi magna copia generantur, & pedes intumescunt.

Neque tamen in eo statu tanta signorum speculatione opus est. Si quis enim vel plebeius (inquit Aretæus) hominẽ viderit pallẽtem, imbecillem tussientem, macie confectum, hunc verã phthoẽ laborare pronũtiat.

Aduertendum tamen est diligenter, quod in praxi maximi est momẽti, catarrhum cõtumacem in pulmõnem defluẽtem sæpẽ verã phthisim ementiri; siquidẽ pituita putrida puris æmula per tussim excernitur, hinc ex putredine fiunt febres, ac corporis extenuatio cõsequitur: attamen ita affecti diligenti curatione adhibita faciliẽ liberãtur. Ideò attentẽ distinguẽdus est hic affectus à vera phthisi; quod fit præcipuẽ distinctione pituitæ putridæ à vero pure. Quæ distinctio his præcipuẽ signis perficitur; quod videlicet pus coloris est cineritij & minùs albũ quàm pituita, & interdũ variij coloris, & in aquã tepidam proiectũ, fundũ petit in eaque dissoluitur. Pituita verò aquæ innatat, & propter visciditatẽ cohæret ac minimẽ dissoluitur; si verò sputi portio dissoluatur alia verò minimẽ, tale sputũ fit ex pure cũ pituita mixto, quod vt plurimũ in phthisi. cõtingit.

Quod ad prognosim attinet recentis vlceris pulmonis sanatio difficillima est, inueterati omninò impossibilis: quia vlcus continuo pulmonis motu, & tussis magis laceratur, tantũ abest vt coalescere valeat. Tum medicamentorum vis longo tractu ferẽ exole-

cit & deperdita pulmonum substantia nullâ arte resarciri potest. Adde quod vlcus, sputum, febris & macies contraria remedia exposcunt. Illa enim quæ vlcus exsiccant, sputum impediunt, febrem augent, & maciem; humectantia verò quæ febri & maciei obsistunt, vlcus sordidius efficiunt. Interdùm tamen quibusdam vlcus sanatum videtur, crustâ superinductâ, quæ tamen leui occasione decidens, morbum renouat, ægrumque ad priorem statum reducit.

Phthisis quæ ab vlcere paruo & non diuturno prouenit, licet curatu difficillima sit, non est tamen omninò incurabilis, si curatio idonea maturè adhibeatur, & nò pauca curatorum phthisicorû exempla apud observationum collectores reperiuntur. Spem autem aliquam curationis præbere possunt, virēs robustæ, sputum album, æquale, vnius coloris, & quod facili expectoratur. Si humor à capite defluens ad nares conuertatur; indeque febris remittatur; si appetitus vigeat; sitis; absit; aliusque quotidie compacta, & asumptis conuenientia deponat. Si æger bono habitu præditus sit, in ætate puèrili, aut pectus habeat amplum & hirsutum.

Quibus phthisicis sputum grauiter olet, aut alui fluxus superuenit, aut sputum supprimitur, aut facies Hippocratica apparet, mors in propinquo est, docente Hip. 1. *prognost.* & Aph. 11. & 12. *sect.* 5. & Aph. 16. *sect.* 7.

Phthisis acuto morbo superueniens breui interimit. Ab aliis verò causis genita chronica interdùm euadit, & ad multos annos perseverat. Refertque Auicenna se mulierem phthisicam vidisse quæ per 23. annos vixerit & Matthæus de Gradi dicit aliam mulierẽ phthisicam quæ circa furnum & ignem quotidie occupabatur, plus viginti octo annis vixisse.

Curatio

Curatio huius affectus, vt antea dictum est, plurimum impossibilis est. Si nimirum affectus altiores egerit radices: quia tamen incipiens affectus interdum curari potest, & multò facilius, imminens in iis scilicet qui ex dispositione hæreditaria in phthisim incidere proclives sunt; nondum tamen in eam inciderunt; Idè prophylactica curatio prius proponenda est, postea verò affectus iam geniti cura erit instituenda.

Ad corrigendam igitur prauam illam in tabem propensionem, conuenit victus refrigerans & humectans, & ea omnia quæ sanguinem corrigere eumque mitem ac blandum reddere possunt, omnemque illius acrimoniam & salsedinem corrigere, qualia sunt aquarum dulcium balnea, lactis vsus & cibaria similis naturæ. Tum etiam decoctum radicis chinæ in potu ordinario exhibitum. Sed multò efficacius erit decoctum fantalorum, quod non solum in curatione tabis instantis, vel incipientis, sed etiam in distillationibus falsis, præcipuè autem tenuibus, in diurnis sanguinis fluxibus, ab illius ardore productis, miranda præstat: & fit simili omnino ratione, quâ guaiaci decoctum componi solet, idque vel in aquis stillatitiis, modo addita portioni vini, vel albi, vel rubri, pro ratione affectus. Paratur autem decoctum fantalorum vt guaiaci decoctum, cum primum, tum secundarium, & eodem modo exhibetur. His addenda est mutatio aëris, quæ ad imminentiæ affectus præcautionem, & incipientis curationem plurimum potest. Ac denique illa conuenient remedia quæ in morbi iam facti curatione primo loco vsurpanda proponere aggredimur.

Tota igitur iam factæ & confirmatæ phthiseos curatio versatur in vlceris absterfione & conglutinatione, causarum producentium, vel fountium ablatione, febris lentæ & hæcticæ oppugnatione, ac consumptionis  
restau

restauracione.

Prinò igitur, quia cacochymia redundans in corpore vlcus pulmónis fouere, & augere solet, blandis purgantibus auferenda est, per interualla repetitis, quando corpus non est valdè consumptum, Eaque purgationes componantur ex rhab. manna, crassia, aut syrup. rosac. in hunc modum.

℞. Hordei integri P. β. liquirit. rasæ, & passul. mundat. an. ʒ. iij. iuiubar. par. ij. flor. bugloss & violar. an. P. semis Coquantur ad ʒ. iij. In colat. dissolue rhab. in aqua scabios. cum santalo citrino infusi scrup. iij. manna ʒ. j. syrup. rosac. ʒ. semis. Fiat potio.

Vel manna ʒ. ij. cum iusculo pulli, aut communi exhiberi poterunt.

Vel parari potest bolus ex cassia ʒ. j. cum puluer. liquirit. scrup. j.

In principio phthiseos valentiora etiam purgantia vsurpari possunt, ad catharrum acrem & salsum, præcipuam vlceris causam, potentiùs reuellendum: qualia in catharro calido proposita sunt.

In eodem etiam phthiseos principio, antequam corpus sit emaciatum, conuenit venæ sectio, ad febrem temperandam, & humoris acrimoniam demulcendam.

Ab ipso etiam curationis initio catarrhus, si affectum istum foueat, sistendus, & à pectore auertendus est: alioqui frustrà cæteris remediis pugnatur. Huic autem negotio conferunt ea omnia, quæ in catarrhi calidi curatione proposita sunt.

Ac præter illa remedia setaceum ceruici admotum summè est efficax. Refertque Fabricius Hildanus, se nonnullos phthisicos hoc præcipuè remedio curasse.

Tandem ad vlceris ipsius curationem veniendum est. Cui vsui maximè conferunt, quæ abstergunt, consolidant & expectorant. Ad hanc rem infinita vsurpari solent

solent medicamenta. Efficacissima verò sunt quæ sequuntur.

Lac omnes intentiones ad phthysicorum curationem propositas adimplet. Abstergit serosâ suâ parte, conglutinat caseosâ, corpus nutrit & reficit butyrosâ. Cum autem varia sint lactis genera, omnibus præferendum est muliebre, vtpotè naturæ nostræ magis familiare, vtiliusque erit si ex ipso vbere sugatur. Huius vsu se aliquot restitutos vidisse testatur Platerus: ex iisque vnum non solum conualuisse, sed etiam tantas vires recepisse, vt ne lac sibi in posterum deficeret, nutricem de nouo imprægnarit.

At quia multi ab eo lacte abhorrent, vtilitius est asininum. Quod quia valdè serosum est, facillè venas penetrat, & vlcus optimè detergit Huic verò succedit caprillum. Asina nutriatur foliis plantag. rubi, vitis, polygoni, gramine, hordeo. & secali. Lac autem recentissimè mulctum, & adhuc calens hauriatur. Idcirco inducta propè cubiculum asina, in vas calefactum mulgeatur. Assumatur primùm in parua quantitate ad ℥. iij. vel iiij. vt ventriculus illi assuescat, quantitatem illius sensim augendo vsque ab ℥. viij. x. & lb. j. Ne verò ace scat, aut coaguletur in ventriculo, vtque pulmoni magis fiat amicum, saccharum rosaceum ci permisceatur eâ proportionem, vt ad lactis ℥. viij sit sacchari ℥. j. Post assumptum lac non dormiat æger, sed leui deambulatione per cubiculum se exercent. Non prandeat donec lac benè coctum à ventriculo secesserit, & æger fame prouocetur ad cibum. Vt denique lac commodè vsurpari possit, non debet adesse magna febris aut dolor capitis, aut hypochondriorum tumor, aut biliofus alui fluxus, iuxta Aphor. Hipp. 64. sect. 5.

Vulgò sumitur lac semel tantum in die; sed melius est bis in die sumere. Et adhuc melius, si æger solo lacte



ete nutriatur. Nam præter quàm quòd in maiori copia sumptum, maiores exerit effectus; magnum vitatur incommodum, quod ex iusculis & carnibus cum lacte permixtis exoritur, facilè enim putrescunt. Si ergo in morbo desperato curatio tentanda sit, exhibeatur lac præmissâ purgatione, sextâ quaque horâ additâ manu Christi perlatâ, & corallata. Et ne vires deficient, per intervalla potionibus lactis intermedia capiat distillatum restaurans; & continuetur hæc methodus, donec vires refici videantur.

Saccharum rosatum phthificis vtilissimum est, tum etiam conserva rosar. Cuius usu refert Auicenna quandam mulierem phthificam, & desperatam, ita curatam fuisse, vt non solum sana, sed etiam pinguis redderetur.

Eadem testatur Mesuæus multos fuisse restitutos; præcipitque, vt conserva rosar. recens sit, non excedens vnû annû magna quantitate, & frequenter assumatur, cum medicamentis, cibis & potibus, tum etiam per se omni horâ. Prius tamen mundificantia vsurpentur, quia materiam purulentam & excrementitiam in pulmonem retinet.

Quoties verò contingit restringi anhelitum, aut sputum suppressi, expectorantia vt syrup. de hyssopo, de tussilag. eclegmata, & similia vsurpentur.

Si denique contingat calefactio propter desiccationem, detur syrup. violac. iuiubinus, mucilago seminis psyllij, cydoniorum & similia.

Saccharo rosac. se quosdam vidisse curatos, testantur Mótanus, Vareriola, & Forestus, quo ægri in maxima quantitate utebantur. Quidam Pharmacopœus phthificus nobis notus, ingentem sacchari rosacei quantitatem sibi ipsi præparabat; idque perpetuò comedeat, & hoc solo remedio sanatus est.

Phthificis

Phthificis etiam maximè confert infusum ex millefol. torment. pimpinell & conserua rosar. in B. M. paratum, & in cap. de sputo sanguinis descriptum, si per xx. dies illius vsus continuetur.

Decoctum bugulæ in iusculo veruecis, phthisi & internis vlceribus mirè prodest; parùm & clementer ventrem laxat, contra naturam consolidarum.

Trallianus l. 7. c. 1 se multos phthificos curasse gloriatur vsu lapidis hæmatitis. Cuius præparationem & vtendi modum proposuimus in curatione sputi sanguinis.

Syrupus ex succo hederæ terrestris commendatur à Quercetano, cuiusque descriptio talis est.

℞. Succo hederæ terrestris lb. ij. β. Digeratur vt purificetur ad ignem B. M. Huic succo perfectè depurato adde sacchari rosar. lb. j. penidiat. ℥. iij. Coquantur in syrumpum, quo vtatur æger ex cochleari.

Huic etiam syrupo idem Quercetanus flores sulphuris admiscet, ad consistentiam looch, de quo exhibet quater in die, eoque se multos phthificos desperatos, & proclamatos restituisse gloriatur.

Syrupus ex florib. hyperici per infusionem præparatus in B. M. huic etiam affectui, quemadmodum omnibus vlceribus internis consolidandis conuenientissimus est.

Syrupus de symphyto optimus: Nam detergit, consolidat, & astringendo roborat; tum etiam radix symphyti decocta in iusculo.

Hydromelite sequenti quosdam phthificos fuisse curatos à nonnullis asseritur.

℞. Rad. chinæ in taleolas sectæ Vnc. vj. rad. ruffilaginis idoneo tempore collectæ Vnc. iij. rad. bardanæ, & garyophyllatæ, ana Vnc. iij. rad. enulæ cãp. Vnc. ij. fol.

Ii pulmo

pulmonariæ, scabiosæ totius, veronicæ vtriusque, vlnariæ, nummulariæ, ana M ij. capillar. omnium ana M j. summit. floridarum bugulæ, betonicæ, flor. herbæ paraliseos, & veronicæ rubræ, ana P. iv hederæ terrestres totius M. iij. iuiubar. dactylor. sebesten, passul. mundat. ana Vnc. j. ß. liquirit. hispanicæ Vnc. j. ß. Omnia debite concisa bulliant debito ordine in aquæ fontis purissimæ lb. xxxij. ad mediæ partis cõsumptionem, subdito calore lento. Colaturæ clarificatæ addè mellis Narbonensis lb. iiij. Coquantur iterum despumando ad supernatâtis oui terminum. Colentur per manicam Hippocratis, addendo cinam inter. 3. ß. sem. coriandri Drach vj ß. anisi & fœniculi dulcis, ana Drach iij Ponatur liquor in dolium satis capax, & sinatur fermentari; quod promptius fiet si dolium in sole manserit, hoc enim modo intra 40. dies satis erit fermentatum: alioqui multò longius tempus necessarium est. Semper autem vas apertum, & plenum feruari debet, vt optimè despumetur. In hunc finem maior quantitas hydromelytis conficienda est, quàm quæ in dolio contineri possit. Imò verò si morbus vigeat, recens, & non fermentatum vsurpari potest, dum aliud in dolio fermentatur; quod etiam duplâ, vel triplâ quantitate componi poterit, quia per plures menses est vsurpandum. Huius capiat æger bonum haustum bis aut ter in die.

Syrupus sequens paratu facilior eximias habet vires.

℞. Succor. hederæ terrestres, veronicæ & card. bened. depurat. an' Vnc. viij. in quibus bulliant leuiter fol. adiathi, polytrich, scabiosæ, & lactucæ, an M sem. In colat. dissolue sacchari albiss. lb. j. sem. fiat syrupus perfecte.

fectè coctus, addendo in fine extracti iuniperi Drach. iij. succi liquirit & extracti card. bened. an. ʒ. iv. Capiat æger cochl. j. horâ vna ante prandium, & ante cœnam, & in ingressu lecti.

Cardanus se multos phthificos etiam desperatos restituisse testatur sequenti regimine. Vt scilicet non utatur æger aliò alimento, quàm hordeato sine iusculo carniū confecto. Potus sit aqua saccharata. Et singulis diebus manè capiat Vnc. iij. decocti caudarum, & brachiorum cancrorum fluuiatilium facti in aqua hordei cum sacchari Drach. ij.

Admiratione dignum est, quod testantur Arcæus, Ingraffias, Fracastorius, & Erasus, se multos phthificos curasse vsu decocti ligni sancti, per longum tempus continuato; cùm illud ratione causæ antecedentis, humoris scilicet calidi & acris, maximè aduersum videatur.

Refert Auenzoar, ab auo suo quendam phthicum perfectè curatum fuisse, cibando eum pane benè fermentato cum oleo oliuarum. Tum etiam seipsum alium ægotantem eodem morbo, eadem ratione liberasse.

Puluis sequens à Valesco de Taranta valdè commendatur, & Haly Abbati tribuitur: eoque præcipuè verum phthificum se restituisse affirmat. Eodemque Forestus fratrem proprium curasse testatur.

℞. Sem. papau. albi Drach. x. gummi arab. amyli, tragacath. ana Drach. iij. sem. portulac. sem. malux. ana Drach. v. sem. cucurb. melon. cucumeris citrulli, cydonior mundat. ana Drach. vj. spodij, succi liquirit. ana Drach. iij. penidiar. ad pondus omniū, fiat puluis; detur omni manè Drach. cum syrup. de papau. vel iuiubino

bino. Eo etiam vtatur æger in hordeatis, amygdalaris, aliisque cibis.

Capiuaccius & Claudinus probant oleum vitrioli ad vlcus exsiccandum, ad guttas ij. vel iij. cum aqua rosar. vel succo plantag & modico saccharo.

Crollius etiam valde commendat elixir proprietatis, quod ex spiritu sulphuris. cum spiritu vini, myrrha, aloë, & croco componitur.

Chymici medicamenta ex sulphure, vt flores, lac & balsamum maximè laudant, vt in eorum scriptis videre est. Illorum vsus commodissimus talis esse potest.

℞. Florum sulphuris, & thuris puluerat. ana ʒ. j. Includantur pomo appiano excauato. Coquatur pomum, & saccharo conspersum comedatur ab ægro, manè per viij. aut x. dies. Vel

℞. Conferuæ rosar. antiquæ, diamarg. frig. diapienid. ana ʒ. j. flor. sulphur. puluerat. ʒ. iij. Cum malle despumato, fiat opiata, de qua capiat magnitud. auellanae, bis aut ter in die. Vel

℞. Flor. sulphur. ʒ. iv. sacchar. in aqua rosar. dissoluti ʒ. iij. Fiant tabellæ, quas teneat in ore frequenter. Vel

℞. Lactis sulphur. ʒ. ʒ. magisterij perlat. & coral. ana ʒ. ʒ. emuls. sem. melon. cum aqua ruffilag. vel veronicæ factæ ʒ. ij. iulep. rosac. ʒ. vj. aquæ cinam. & manus Christi perlat. ana ʒ. ij. Misce, capiat cochlear. vnum vel ij. singulis diebus manè.

Laudant etiam Chymici nonnulli antimonium diaphoreticum, cum triplo salis petrae probè calcinatum, vt omnis vis vomitiua ablata fuerit. Quod singulis diebus exhiberi debet, in tabellas redactum

redictum cum saccharo rosaceo , vel cum conferua rosarum permixtum , vel cum aliis remediis suprà descriptis.

Balsamum Peruuianum ad vlcera pulmonum sananda multum conducit , si eius gutta vna cum saccharo in pilulam redacta singulis diebus exhibeatur.

Puluis pimpinellæ ad Drach. j. cum iusculo singulis diebus exhibitus maximæ etiam creditur efficaciz.

Pilulæ Ruffi à nonnullis commendantur tanquàm efficacissimæ, sumèdo Scrup. j. singulis diebus. Verùm in sequentem modum compositæ mirabiles edunt effectus.

℞. Massæ pilular. Ruffi Vnc. j. antimon. diaphoret. & gummi guaiaci , ana Vnc. ss. cum balsamo Peruuiano fiat massa, de qua capiat Scrup. j. per mensem integrum.

Syrup. corallorum, & gelatina cydonior. huic affectui etiam maximè conducunt.

Rodericus à Fonseca decoctum fantali citrini cõmendat, tanquam præstantissimum remedium ad fluxionem à pulmone inhibendam , quod parat in sequentem modum.

℞. Aquæ cichorij, acetosæ, ana lb. iv. fantali citrini mñutim concisi Vnc. iij. Fiat infusio per vnam diem. Deinde fiat coctio in B. M. feruenti , obturato vase , per tres horas. Huius decocti capiat Vnc. iij. manè, & bibat in potu per 40. dies.

Omnia denique remedia , quæ ad venam pulmonis ruptam conglutinandam in hæmoptoës curatione proposuimus, huic etiam affectui prodesse possunt

sunt.

Suffumigia etiam vtiliter vsurpari poterunt , ad vlcus pulmonis potenter exsicccandum, & illa ore, naribusque frequenter attrahenda sunt. Compositio autem talis esse potest.

℞. Gummi hederæ Drach. i. β. [thuris Drach. i. myrrhæ Drach. β. succini Scrup. i. benjoini, styracis, ana Drach. β. hypocist. Scrup. ii sem. cotiandri, rosar. rubr. fantali rubri, ana Scrup. i. Puluerentur, & excipiantur mucilag. gummi tragacanth. vel resinâ lariceâ. Fiant trochisci, super prunas iniiciendi.

Vel simplicius fiant suffumigia ex thure, myrrha, mastiche, benjoino, quæ semper sint in thalamo, vt siccus aer & odoratus attrahatur.

Efficacius suffumigium, sed non nisi in robustioribus corporibus vsurpandum, ita componi potest.

℞. Gummianimæ, vel guaiaci ʒ. ii. tabaci indici ʒ. β. fol. siccor. tussilag. ʒ. i. hyssopi, marrubij albi, rosmar. auripigmenti, ana ʒ. iij. Fiat omnium puluis, cuius portiuncula indatur fistulæ; quâ fumus tabaci hauritur; accendatur & hauriatur fumus bis in die, longè à pastu, & post dimidiam horam capiat dosim decocti sequentis.

℞. Rad. chinæ, & falsæparill. ana Vnc. β. fol. scabiosæ, tussilag. hederæ terrestris, vlmariæ, capill. ven. & garyophyllatæ totius, ana M. i. hordei integri P. j. liquirit. ras. & vuar. corinth. ana Vnc. i. Coquantur ad lb. ij. Colaturæ adde sacchari rosac. ʒ. iv. capiat lb. β. bis in die, vt dictum est.

Pro delicatioribus suffitus humidus vsurpari poterit,

Ex decocto herbarum compositus, qui processus utilis-  
simus est; sic enim vires herbarum recta via ad pulmo-  
nem feruntur. Omnes autem pulmoni appropriatæ, &  
ulceribus curandis idoneæ usurpari possunt. Sequens  
formula pro exemplo habeatur.

℞. Tussilag. viridis M. viij. hyssopi M. ij. Incidan-  
tur, & includantur in olla, cum tantillo aquæ; lutetur  
operculum perforatum in summitate, ita tamen ut fo-  
ramen sit etiam lutatum. Immittatur olla in clibanum  
circa medium coctionis panis, qui cum extrahitur de-  
matur olla; & aperto foramine imponatur infundibu-  
lum, atque ita per os attrahatur fumus in pulmones;  
per nares reiciendus. Mirabiliter mouet expuitio-  
nem.

Exteriùs verò linimentum refrigerans, & leniens  
pectori admoendum est, manè & serò.

℞. Gummi tragacanth. & arabici, ana 3. j. Infun-  
dantur in aquâ rosaceâ per diem & noctem; adde olei  
violac. Vnc. j. sem. butyri recentis Vnc. sem. salis pru-  
nellæ 3. ij camphoræ ʒ. j. lactis muliebris q. s. Miscan-  
tur in mortario, & fiat unguentum.

Ad consumptionem reparandam, aut saltem impe-  
diendam, vel retardandam; præter victum analepticum,  
ad quem præcipuè referuntur hordeata, amygdalata,  
pincata, oryzata, auenata, & instaurantia varij gene-  
ris, quæ passim apud auctores inueniuntur; maximè  
conueniunt lac ab initio laudatum, & balneum aquæ  
tepidæ, vel ex decocto hordei mundati, & amygdal.  
contusarum. Quod ramen præsentì catarrho non  
conuenit, aut quamdiu febris putredinis particeps  
esse iudicatur, aut quando pulmo multis scatet excre-  
mentis.



Potus sit aqua saccharata , decoctum hordei , &  
liquirit. infusum liquirit. hydromel tenue , vel leue  
chinæ decoctum.



PRAXEOS



P R A X E O S  
M E D I C Æ  
L I B E R V. I I I.

---

*De affectibus cordis.*

P R Æ F A T I O.

**C**OR variis patitur morbos, similes, organicos & communes, cum tamen paucissimi sint, qui Medici curantis ditioni subiiciantur, quandoquidem viscus nobilissimum graues affectus diu ferre non potest, quin homo confestim de medio tollatur, sicque nullus remediis locus relinquatur; Nos ideo qui omnes labores nostros ad vsum artis conferre iam diu constituimus, tres tantum cordis affectus explicare decreuimus, qui frequentius in praxi medica occurrunt, & multorum remedium apparatu oppugnari possunt. Atque

li 5      adeo

adè tria illis capita destinauimus , quorum primum erit de syncope. Secundum de palpitazione. Tertium denique de virium imbecillitate.

---

## C A P V T P R I M V M.

### De Syncope.

**S**yncope definitur à Galeno 12. meth. c. 5. præceptis omnium virium lapsus. Licet enim in ea solum cor patiatur , & sola facultas vitalis intercipiatur , eâ tamen collabente cæteras perire necesse est , cum ab eâ continuum , & necessarium influxum recipiant.

Dicitur præceptis omnium virium lapsus, vt ab aliis affectibus distinguatur , in quibus vires paulatim deficiunt , donec mors subsequatur ; neque obstat doctrina Auicennæ fen. 1. lib. 3. tract. 1. cap. 2. proponentis signa syncopes paulatim aduenientis , licet enim causæ spiritus dissoluentes aliquando sensim & paulatim operentur , attamen ingrauescentes subito syncopem efficiunt , & idèd Auicenna proponit potius signa antecedentia syncopem, quàm ipsam syncopem præsentem.

Demum hæc definitio videtur etiam apoplexiæ competere, in qua contingit præceptis omnium virium lapsus, quod tamen non est veritati consentaneum, siquidem vires cordis in apoplexia permanent, & pulsus vt plurimum magnus, ac plenus reperitur. Adde quod respirationis læsio, quæ in apoplexia insignis reperitur etiam vt plurimum cum stertore , maximè eam à syncope distinguit , in qua respiratio nullo modo læditur.

Quæritur

Quæritur cur cessante actione cordis, actio cerebri statim cesset, cum spiritus animalis ex vitali generetur per viam coctionis, & in cerebro aliquamdiu manere debeat, licet vitalis continuò non influat. Respondemus cerebrum vt & alias omnes partes, ad actiones suas perficiendas indigere continuo affluxu caloris influentis, quo cessante illæ statim cessant. Calor autem influens per spiritus vitales defertur.

Alij dantur affectus ad syncope maximè accedentes & ab ea tantum secundum magis & minus differentes, nempe *ἑκλυσις*, *λειποθυμία*, & *ἀσφυξία*, *ἑκλυσις* leue est animi deliquium, *λειποθυμία* seu *λειποφυξία*, seu *ἀποφυξία* grauius, syncope grauissimum, quæ si eo vsque deueniat vt in toto corpore pulsatio aboleatur, *ἀσφυξία* nominatur, quæ proximus ad mortem gradus est.

Apud Hippocratem & Græcos antiquiores vox ista *σῆγχωσις* vsitata non fuit, qui affectum hunc lipothymiam, lipopsychiam & asphyxiam appellarunt. Sed paulò ante Galeni tempora hæc vox inuenta, & in medium adducta est, & in specie grauiori malo tribuitur, quàm sit lipothymia, & lipopsychia; sic apud *Gal. 1. ad Glauc. cap. 14.* lipothymia est syncope imperfecta, & syncope semper præcedit.

Ex prædictis patet partem affectam in syncope esse cor spirituum vitalium officinam; quorum influxu insitus singularum partium calor ac spiritus in actum deducitur, ideò cessante illa actuatione ob prohibitum spirituum vitalium influxum, omnium partium vires collabi actionesque cessare necesse est.

Causa huius affectus proxima & immediata est spirituum vitalium defectus, nõ totalis, mortem enim subitanæ afferreret; sed tantus vt natura cogatur (ne vires cordis penitus exoluantur) spiritus ab aliis partibus

bis ad ipsum cor retrahere, vnde illæ à functionibus suis feriari coguntur.

Ille autem spirituum defectus quatuor modis potissimum contingere solet. Vel quia sufficienti copiâ non generantur, vel quia geniti dissipantur, & euacuantur; vel quia præter naturam alterantur, & corrumpuntur. Vel denique quia suffocantur, & obruntur: Non generantur vitio facultatis, vel materiæ. Facultas spirituum generatrix læditur, vel proprio cordis affectu, vel per consensum.

Morbi proprii cordi insigniores sunt intemperies magnæ natiuam temperiem euertentes, aut substantiam partium, & caloris natiui depascentes. Quales sunt febres syncopales, acutæ, & malignæ, syntecticæ seu colliquantes, pestilentes, hecticæ, marasmodies; his accedunt morbi organici, vt constrictio, & dilatio nimia, & continui solutiones quæ ad ventriculum cordis penetrantes citissimè interficiunt.

Per consensum facultas cordis læditur à reliquis principiis cerebro & hepate, quæ maximam cum corde sympathiam habet: sæpissimè etiam ab ore ventriculi, ob viciniam sensumque exquisitum; vnde orta est diuisio syncopes in cardiacâ, & stomachicam. Cardiacâ est illa quæ fit corde primariò affecto. Stomachicâ verò quæ per consensum stomachi producitur. Non rarò etiam ab utero exoritur, ex tetræ vaporibus ab ea parte ad cor transmissis, vnde præfocatio, apnœa, & syncope hysterica proficiuntur, prout vapores illi pulmonem, diaphragma, aut cor impetunt, & inuadunt.

Vitium materiæ est defectus, vel corruptio aëris & sanguinis; ex quibus spiritus vitales generantur. Aëris defectus contingit, ex respiratione, vel transpiratione

ratione læsa; sanguinis verò defectus ex læsa nutritio-  
ne. Vtriusque corruptio accidit cum alienam qualita-  
tem induunt; sic aër inquinatus in constitutione pesti-  
lenti lipothymiam & syncopem nõ raro inferre solet;  
Sic tetri odores nonnullis eundem effectum præ-  
stant, imò verò suaues mulieribus quibusdam: sic ex  
prauis eduliis corruptus interdum sanguis genera-  
tur.

Spiritus dissipant euacuationes nimix, tum sensi-  
les, tum insensiles. Sensiles fiunt primò ipsius san-  
guinis (per os, nares, vterum aluum, hæmorrhoi-  
des, phlebotomiam, aliaque vulnera insigniora: se-  
cundò aliorum humorum, qui licet excrementitij sint,  
maiori tamen copiâ excreti maximam spirituum dis-  
sipationem faciunt, & syncopem inferunt. Tales  
autem humores excerni solent per vomitum, aluum,  
vrinas, sudores, magni abscessus apertionem,  
præcipuè introrsum, vt empyematis; tum etiam  
extrorsum, vt in hydrope, aperto vmbilico, con-  
tingit.

Insensiles euacuationes fiunt ex nimia cutis rarita-  
te & contentorum tenuitate, & acrimoniâ, immo-  
dico æstu, balneo, vel laconico calidiori, immo-  
dico labore. Dissipant etiam vigilix pertinaces, ine-  
dia longa, effrænata venus, ira vel gaudium ve-  
hemens, ægritudines, longæ & acutæ: his adde ingen-  
tes dolores cordis, ventriculi, intestinorum, re-  
num, aurium, dentium, & partium omnium neruosa-  
rum.

Spiritus alterant & corrumpunt praua viscerum di-  
spositio, & quæcunque malignam & cordi inimicam  
qualitatem obtinent, vt aër, & halitus foetidus, vene-  
nosus, & pestilens respiratione, vel transpiratione at-  
tractus; vel in corpore ex putredine humorû genitus.

Idem

Idem præstat venenum assumptum; vel admotum, vel morfu animalium venenatorum communicatum.

Denique suffocant & obrunt spiritus vitales sanguinis, & spiritus ad cor vehemens refluxus, copiosa fuliginum prauarum circa cor, & membra vicina congregatio; nimia sanguinis frigidi & crassi circa cor, eiusque venas, & arterias, & membrana vicina redundantia.

Syncope[m] grauissimam quam mors repentina subsequuta est à sanguinis & spirituum subito refluxu ad cor, nuper vidimus in nobili virgine, quæ ab incunte ætate huic symptomati erat valde obnoxia; ita ut ex quouis animi pathemate, etiam leuiori in lypothymiam aut syncope[m] incideret. Cum autem egregio adolescenti: qui illam ardentem deperibat matrimonio iungeretur, facto celebri parentum consanguineorum, affinium, & amicorum conuentu, postquam ipsi pena à tabellione tradita fuisset, ut nuptialem contractum subscriberet, vix dimidiam syngraphi sui partem exarauerat, cum illa subito in terram concidit exanimis, & omnino demortua, vnde facile fuit coniicere, ex vehemēti animi pathemate, maximam & subitanam sanguinis & spirituum retractionem, ad cor factam fuisse, quæ calorem natium, & spiritum insitum suffocauerit, vnde mors repentina subsequuta est.

A sanguine vero frigido & crasso copiose circa cor & in maioribus vasis congregato syncope[m] oriundā vidit Petrus Salius Diuersus, ut ipse refert *lib. de affectibus particularibus cap. 4.* in puella quartum decimū annum agente, quæ cum per diem capitis grauitatem, vertigines, & anxietatem passa esset, die sequenti subito extincta est. Secto post mortē cadauere in arteria magna, & in vena caua totus sanguis concretus apparuit, ut apprehenso illius altero principio, ita integer

ex vena & arteria educeretur ac gladius è vagina extrahi solet. Quale iudicatum fuit subitâ hanc mortem à sola interceptione venarum, & occlusionè à sanguine concreto, causatam fuisse. Casus iste rarus est, cum sanguinis concretio in venis in cadaueribus quidem contingere soleat; tanta enim est venarum sanguinis continendi proprietas, velut proprium illius conceptaculum, vt etiam post mortem illum fluidum conseruet, qui in omnibus aliis locis illicò concrescit. Huius autem extraordinariæ cōcretionis rationem desumit Salius ex analogia sanguinis extrauafati, qui simul atque refrigeratur, statim concrescit, quod magis ei admixti sunt humores frigidiores, crassiores, & viscidiores pituitosi nimirum & melancholici, quorum ratione intemperiem consequutus frigidiorum, ad concrescendum maiorem aptitudinem, & promptitudinem recipit. Simile quippiam euenire potest sanguini intra venas coërcito, qui vitiosis abundas succis, crassioribus & frigidioribus venas maiores adedò replet, vt spiritus intercipiens, & penetrare non permittens, eos in extinctionem ducat, iisque extinctis sanguis refrigeretur ac concrescat, propter humores frigidos & concretioni idoneos illi admixtos; qui si præsto non fuissent, sanguis liquidus & incorruptus permanisset. Spagirici hunc effectum referrent ad spiritum quemdam coagulantem & congelantem, ex peculiari & extraordinaria humorum diathesi genitum, quæ cum rarissimè contingat, rarissimus etiam solet esse iste affectus. Et certè simplex refrigeratio concretionem istam efficere non potest, alioquin in defunctorum cadaueribus hyemis tempore præsertim, sanguis in venis perpetuò concresceret, cum tamen omni tempore fluidus reperiatur. Spiritum autem hunc congelandi vt præditum, existimare possumus similem esse illi, qui cataleptim



catalepsim inducit; in qua membra frigida & congelata redduntur, vt inflecti nullo modo valeant. Spiritus huiusmodi fixantes, & congelantes Chymici in multis animalibus, vegetalibus & mineralibus agnoscunt: tales etiam è terra interdum suscitari docent historiae quorundam hominum & brutorum, à terris vaporibus in terræ motibus, aut etiam è cauernis quibusdam erumpentibus congelatorum, vt repente corpora illorum rigida facta fuerint, tales denique spiritus fulminibus misceri docet Cardanus historia octo messorum sub quercu cœnantium, qui fulmine percussi, rigidi omnino facti sunt, & in eadem specie permanserunt, vt vnus comedere, alter manum poculo admo- uere, alius bibere videretur.

Signa huius affectus diagnostica, vel respiciunt subiectum, ad illum recipiendum magis idoneum, vel paroxysmum imminensem vel eundem præsentem, vel denique causas illum producentes.

Subiecta magis ad syncopem disposita sunt homines debilitate quadam natua, vel adscititia à morbo, aut alio casu præditi, pusillanimes, fœminæ potius quam mares, virgines menstrua patientes, mulieres grauidæ, tum etiam illi qui sunt raræ texturæ, icterici, splenici & melancholici.

Syncopem imminensem significant in illis præsertim qui illi obnoxij sunt, improuisa anxietas, animi perturbatio, capitis grauitas, vertigo, alieni & varij coloris, viridis; & flauï obuersatio, coloris faciei, tum etiam & pulsus frequens ac subita mutatio.

In lypothymia præsentem prædicta etiam signa reperiuntur, sed paulò grauiora; quibus non raro sudor frigidus adiungitur, tum ægrotantes (quod præcipuum est) de animi defectione conqueruntur.

Præsentem verò syncopem demonstrant, præcepta omnium virium

nium virium lapsus, pulsus rarissimus, formicans, obscurus, tandemque abolitus; color faciei summo pallore, aut liuore suffusus, totius corporis præsertim extremorū frigiditas sudor frigidus, syncopiticus idè dictus præcipue in temporibus, collo & thorace.

Signa causarum maiori ex parte per se manifesta sunt. Febres enim malignæ, acutæ, syncopales, syntecticæ, syncopem idiopathicam efficientes, per se satis conspicuæ sunt, causæ etiam externæ, repentinam syncopem inducentes, sensibus obuiæ sunt; vt ira & gaudium immodicum, terror subitus & repentinus, odores tetri, hæmorrhagia larga, aliæque euacuationes copiosæ, vigiliæ pertinaces, inedia longa, effrænata venus, dolores atrocissimi.

Humores tenuiores, & corporis raritatem significant, nares acutæ; oculi concaui, collapsa tempora. Flauæ bilis abundantiam ostendunt, morsus oris ventriculi, anxietas, vellicatio, calor & dolor insignis.

Humorum crudorum copiam significant, totius corporis moles amplior; præcordiorum tumor, color faciei albidus, nigricans aut liuescens, pulsus minor, obscurus & inæqualis.

Syncope verò sympathica ex aliarum partium vitio producta, ex earundem partium affectarum signis innotescit: sic ex affecto ventriculo si proueniat, eiusdem partis affectus præcesserunt vt nausæa, vomitus, ventriculi morsus oris amaror, sitis & similia. Idem de aliis partibus esto iudicium. Si verò nullum alicuius partis affectæ iudicium appareat, ex primario cordis affectu syncopem exoriri indicio est.

Ab aliis affectibus syncope proprii etiā signis distinguitur. Ab epilepsia quidè quod in ea sit cōuulsio, non autem in syncope; ab apoplexia, quod in ea insigniter lædatur respiratio; etiam vt plurimùm cum stertore, &

pulsus non admodum imminuatur, nisi in mortis proximo. In syncope verò pulsus ferè aboleatur, & respiratio libera permaneat. Ab vteri suffocatione distinguitur, quòd in ea partes spiritales vt plurimùm maximè afficiantur, ægrotantes strangulari videantur, pulsus tamen non valdè immutetur, neque faciei color, qui statum naturalem seruat, imò frequenter rubicundior apparet; in syncope verò respiratio non læditur, pulsus ferè abolitus est, & facies admodum pallor. Aliquando tamen syncope cum vteri suffocatione coniungitur, & tum pulsus interdum non percipitur.

Prognosis huius affectus ex Hippocr. primum desumitur *Aph. 41. sect. 2. Qui frequenter ac fortiter sine causa manifesta deficiunt animo, derepenitè moriuntur.* Quia vt ante dictum est, syncope grauior vires cordis penitus opprimit, vel exoluit, vnde mors consequitur.

Syncope à qua homo non restituitur post irrorationem faciei cum aqua rosacea, post vini exhibitionem, & sternutatoria naribus immissa, lethalis.

Cum quis à syncope suscitatur, non statim salus promittenda est. Si enim pulsus non restituitur, & color viuus non redit, ægerque frigidus semper manet, in synopem citò relabitur, ex qua periculum impendet.

Quæ ab immodicis euacuationibus, timore, tristitia aut alia euidenti causa syncope exoritur, minùs periculosa est, quàm quæ ab interna causa procedit.

Quod ad curationem spectat; cum syncope à variis causis dependeat, illarum ratione diuersum curandi modum desiderat.

A quacunque tamen fiat causa, virgente paroxysmo, sequentia conueniunt: Supinus decubitus, iniectio aquæ frigida in faciem, sternutamenti concitatio; vini generosi, aquæ cinam. imperialis, vitæ cœlestis, & similium

lium in os immissio. Admotio propè nares panis è fur-  
no calentis; vociferatio & ægri agitatio, narium com-  
pressio, & digitorum contorsio, pilorum auulsio, fri-  
ctiones, ligaturæ, & cucurbitulæ.

At ratione causarum diuersarum curatio varianda  
est in sequentem modum.

Si ex defectu alimenti ducit originem; vino gene-  
roso assumpto reparetur, & crustâ panis in eodem ma-  
defactâ & assumptâ: tum etiam alimentis sorbilibus, &  
valde nutrientibus, vt iusculis, & destillatis restauran-  
tibus & similibus.

Inter alia plurimum valet ferculum ex ouis, saccha-  
ro, vino, & cinamomo sequenti capite descriptum.

Si ab humorum tenuitate, quâ spiritus facilè exha-  
lant; odoramenta & cibi boni succi, incrassantesque  
exhibeantur; cutis pori constringantur ol. rosaceo;  
maneât æger in aëre frigidiori.

Si ab hysterico affectu; remedia illi appropriata ad-  
hibeantur.

Si à maligna qualitate; cardiaca, & alexipharmacâ  
vsurpentur, qualia in febrium malignarum curatione  
præscribi solent.

Si à veneno hausto; venenum illud euacuantia, &  
tum manifestis qualitatibus, tum peculiari propieta-  
te oppugnantia propinentur. Ideoque vomitus statim  
prouocetur, postmodum theriaca exhibeatur. Deinde  
si sentiatur ardor, vel erosio ventriculi; lac vel buty-  
rum accipiat, vel iuscula pingua, aut portiones car-  
diacas refrigerantes.

Si ab immodica euacuatione; æger odoribus, cibo,  
potu, somno & quiete reficiendus.

Si à nimia profusione sanguinis; ponatur æger supra  
lectum, capite declini, aquâ frigidâ facies irroretur, de-  
tur parum vini aquâ frigidâ diluti.

Si à superpurgatione , detur theriaca recens , vel in eius defectu antiqua cum opij. gr. ij. in vino dissoluta; vel quod melius est laudani gr. iij. Totus venter oleis sequentibus inungatur.

℞. Ol. myrtin. & cydon. an. Vnc j. semis ol. absinthij Vnc. j. aceti rosac. parum Misce, fiat inunctio frequenter.

Iniiciatur clyster ex lacte chalybeato addendo vitellos ouorum n. iij pilonij. romani 3 ij.

Fiant frictiones brachiorum , & partium superiorum.

Mica panis vino madefacta , aut etiam vinum ipsum exhibeatur.

Ac denique euacuatio quæuis , siue sanguinis sit per nares, vterum , aliâsue partes ; siue aliorum humorum per vomitum, aut alui fluxum ; remediis , propriis capitibus describendis , erit cohibenda.

Quæ à sudore nimio exoritur syncope, curatur remediis sudorem coërcentibus , vt aquâ frigidâ , vel rosaceâ , solâ, aut cum modico aceto , in faciem & manus affatim coniectâ. Aer etiam prædictis aquis , & flabellatione refrigeretur. Epithemata frigida cordi adhibeantur ex aqua rosar. acetosæ , borrag. & pulu. diamarg. frigidi , cum tantillo vini penetrationis gratiâ.

Iulepi etiam refrigerantes ex syrupo acetoso , violaceo , de pomis , aut de limonibus , cum aquis refrigerantibus , & sale prunellæ frequenter exhibendi. Obstruantur pori inunctionibus cutis ex ol. rosac. myrtino mastichino. A vino æger abstineat. Nullo pacto fricetur , sed sæpè locum mutet , & leuiter operiatur. Lectus sequenti puluere sinapisetur.

℞. Flor. nymphææ & rosar. rubr. ana ʒ. iij. ladani puri ʒ. β. styrac. ʒ. ij. myrtill. & sumach. ana ʒ. ij. Fiat puluis.

Si

Si ex suffocatione spirituum; ad ambitum corporis illi reuocandi sunt frictionibus, ligaturis, cucurbitulis, & similibus remediis. At si à plenitudine oriatur suffocatio, sanguis copiose, sed per interualla, detrahendus est.

Si à terrore & metu; sanguinis missio etiam vsurpanda est, ne ex affluxu sanguinis, obstructio aliqua vel inflammatio excitetur.

## C A P V T II.

### De palpitatione cordis.

**V**T in syncope motus cordis imminutus, sic in palpitatione est deprauatus. Malè à quibusdam tremor cordis nominatur, cum tremor sit passio motus animalis & voluntarij, & non nisi partibus voluntario motu præditis competat.

Galenus lib. de tremore, palpi. & conuul. dicit palpitationem à solo morbo fieri, nempe à sola causa morbifica partem attollente & deprimente, sine vlllo facultatis concursu; tremorem verò partim à morbo, partim à facultate. Hinc multi palpitationis vocabulum cordi & aliis partibus vniuocè tribuentes, eodem modo fieri existimant in corde, ac in cute & musculis in quibus palpitatio contingi à spiritu flatulento, ad eas partes violenter impulso. Si enim ab eodem spiritu impletū, atq; iterum euacuatū cor moueatur vtrius instar, (in quo tale aliquid à liquore violèter infuso, vel spiritu inflato & rursum cōpresso contingit) palpitationem pati existimant. Verūm dispar admodum est ratio; cutis enim & muscoli non habent naturalem sese dilatandi, ac constringendi vim, sed tantum à causis

morbificis motum illum acquirunt. Cor verò cum naturalem habeat dilatandi sese ac constringendi facultatem ; Palpitatio cordis sine motu illius fieri non potest. Et frustra à nonnullis multa loca congeruntur ex Galeno, quibus probare conantur, palpitationem cordis non fieri à natura, sed à morbo , vel potius causa morbifica. Galenus enim in omnibus iis locis, agit tantum de palpitatione quæ in cute & aliis partibus externis fit ; non verò de palpitatione cordis , quæ alterius naturæ est ; ipse Galenus 2. de sympt. caus. cap. 2. palpitationem cordis, & arteriarum ab aliarum partiū palpitatione discernit.

Est igitur cordis palpitatio, immoderata & præternaturalis illius partis concussio , vehementi diastole, ac systole molesta; quæ tanta interdum est , vt (docente Fernelio) sæpè sit animaduersa thoracis vicinas costas effregisse ; sæpè & eas, quæ supra mammas sunt, de propria sede depulisse; sæpè etiam arteriam foras dilatasse in aneurisina contracti pugni magnitudine , in quo & tactu , & visu conspicua erat pulsatio.

Fit autem immoderata illa cordis concussio , & facultate pulsifica stimulata , & irritata à re molesta , & usu illius plurimum aucto.

Hic obiici potest , in febribus hæc omnia reperiri. Immoderata enim fit systole , & diastole , facultate irritata à re molesta , vel usu aucto ob calorem immodicum cordi impressum.

\* Respondemus motum cordis in febribus distinguere à palpitatione tantum per magis & minus ; & motum cordis deprauatum dici palpitationem quando insignis , & vehemens est ; si verò tantam vehementiam non habeat, pulsus frequens , magnus , velox , aut celer nominatur, ad aliasque pulsus immutati & præternaturalis differentias refertur.

Causæ

Causæ igitur palpitationem cordis efficientes ad tria ca; ita reduci possunt. Vel enim est res molestans & irritans, vel refrigerationis necessitas; vel spirituum defectus: quæ duæ causæ posteriores ad vsum auctum referri possunt.

Causa molestans omnium frequentissima est, ita ut quamplurimi authores hanc vnicam agnouerint, reliquæ verò rariores. Ista autem causa molestans ut plurimum est vapor, vel flatus qui quantitate, vel qualitate, vel vtrâque cordi molestiam parit. Qualitas autem vel manifesta est vel occulta.

Vapor manifestâ qualitate molestus, vel in ipso corde est, & partibus vicinioribus; vel aliunde ab aliis partibus remotioribus transmittitur; isque subito in abditos cordis sinus ingressus, expultricem visceris stimulat, quod summo robore naturaliter præditum, potenter insurgit, & vehementiori nisu hostem expellere nititur.

In corde aut partibus vicinis, potissimum pericardio humores frigidi & crassi interdum colliguntur, è quibus vapores eleuantur, & ad cordis ventriculos transferuntur, vbi palpitationem efficiunt.

Ab aliis verò partibus remotioribus vapores & flatus ad cordis ventriculos eleuantur; puta ventriculo, liene, vtero, cæterisque in ventre inferiori contentis.

Vapor occultâ qualitate molestus cor non raro afficit in febribus malignis, pestilentibus, in venenis assumptis, & aliquando vermes putrescentes; sanguis menstruus retentus, semenque corruptum, aliaque putrida materia, vapores malignos ad cor mittunt, qui facultatem illius vehementer irritant.

Humores varij cordi molestiam exhibent, quantitate, vel qualitate peccantes; sic sanguis nimia quanti-



tate venas , & arterias , tum & cordis ventriculos grauians , vt liberè moueri nequeant , cordis palpitationem efficit , motum illius liberum impediens , quem defectum vt refarciat facultas violentius mouet. Sic aqua in pericardio contenta , nimia copiâ luxurians , cordis substantiam comprimit , illiusque ventriculos vt liberè dilatari non valeant ; idem præstant humores confertim ad cor affluentes , vt fit aliquando in vulneribus , formidine , ac terrore.

Humores qualitate peccantes cordi infensi sunt , eique molestiam afferunt , si venenati , putridi , corrupti , acres , & calidi nimis fuerint , eiusmodi est præcipuè bilis torrida & exusta in cordis substantiam impetum faciens , illiusque vim expultricem irritans.

Tumores etiam , licet rarius , huiusmodi affectum excitant , vt inflammatio cordis , abscessus , tuberculum in arteriis pulmonum propè cor exortum ; quod Antipatro medico contigisse refert Gal. 4. *de lpc. aff.* vnde post pulsum inæqualem , in palpitationem , & Asthma incidit , ex quo subito interiit. Sic refert Dodonæus se callum in arteria magna , loco cordi proximo obseruasse ; vnde palpitatione orta erat , multis annis perseuerans.

Tumores etiam in pericardio excitati , siue humoris expertes , & scirrhusi , siue humorem in se continent , vt sunt pustulæ hydatides. In corde ipso calculi , officula , & carnis frustula interdum generantur , quæ palpitationem efficiunt. Sic refert Platerus in quodam diuturnâ cordis palpitatione vexato , & tandem è medio sublato , osseum quiddam in corde deprehensum fuisse. Schenkius verò refert , in sacerdote quodam , qui à teneris annis , vsque ad annum 42. quo è vita discessit , cordis palpitatione laborauerat

tat, in cordis basi carnis excrescentiam repertam fuisse, quæ sex drachmas pendeat, & alterum corculum representabat.

Secunda palpitationis causa supra proposita fuit refrigerationis necessitas, quæ tum præcipuè adest cum calor præter naturam in corde augetur, à quo spiritus intus accenduntur, ac propterea motus cordis, & arteriarum augetur, ut quod absumitur restituatur, & calor refrigeretur. Id quidem fieri solet interdum à causis internis, quod tamen rarissimum est, ut antea diximus, frequentius verò ab externis, ut ira, excitatione vehementi, & similibus. Quemadmodum observavit Platerus iuvenem quendam admodum calentem, cum in ludo parvæ pilæ irâ corripere, sicque duæ causæ coniungerentur, palpitatione cordis adeo vehementi correptum fuisse, ut inde mors consequuta sit.

Tertia causa fuit spirituum defectus, qui fit per incediam, vigilias, iram, gaudium, metum, pudorem, morbos vehementes, aliasque causas subito & copiosè spiritus dissipantes, quem spirituum defectum cor resarcire contendens, ut illos promptius & copiosius regeneret, & ad totum corpus celerius transmittat, motum suum intendit, ac celeriores efficit.

Notandum est pro coronide palpitationem cordis longè frequentiores esse, quæ fit per consensum aliarum partium, quàm ipso corde primariò affecto. Habet enim cor cum omnibus corporis partibus confectum per arterias & venas, per quas vapores, flatus, & humores transmittuntur. Quæ omnia suo loco in diagnosi iam proponenda clariùs innotescunt.

Diagnosis huius affectus vel ad ipsum affectum, vel ad causas illum producentes.

Affectus ipse sensibus conspicuus est, æger enim

manifestè palpitationem in se percipit , & adstantes manum regioni cordis admoventes motum illum vehementem percipiunt. Imò verò visui etiam & interdum auditui sese obicit : subsultans enim arteriam motus præcipuè in iugulo , visu deprehenditur , aliquando etiam audiri testatur Forestus exemplo iuuenis cuiusdam , cuius cor adeò palpitabat , vt prætereuntes fenestræ cubiculi clausæ aurem admoventes , clarè exaudirent.

Causæ palpitationem producentes suis etiam signis distinguuntur , calida intemperies dignoscitur , ex pulsus magnitudine , celeritate , & crebritate , febre , & calore thoracis , magna & frequenti respiratione , & frigidorum appetentia.

Si à vapore aut flatu generetur cordis palpitatio , citò fit & citò desinit , à leui corporis motu excitatur , respiratio interdum difficilis est , interdum etiam tremor genuum contingit , oculorum tenebræ , sonitus aurium , & dolor non raro alicuius partis subito evanescens , cuius autem naturæ , & qualitatis sit vapor aut flatus palpitationem committens ex signis humoris in corpore aut partibus quibusdam redundantis colligitur , cum vapores , & flatus ab humoribus perpetuò eleuari soleant.

Si ab humoribus cordis palpitatio generetur , affectus non ita subito inuadit , & diutius perseverat , qualis autem humor causa huius mali sit , ex signis humoris in toto corpore redundantis facile internosci potest. Ac præcipuè sanguinis copia , à qua frequentius quàm ab aliis humoribus hic affectus generatur , cognoscitur. ex pulsu vario & inæquali , ita vt nunc magnus , nunc parvus , tardus iterùmque velox existat , cui etiam respiratio proportionè respondet , cor ægro-  
calor

calor excedens , distensio venarum , rubor faciei, tempus vernum , ætas , regio , & victus ratio sanguinem multiplicans.

Quæ per consensum aliarum partium palpitatione exoritur , ex propriis illarum partium affectuum signis innotescit. Sic ventriculi consensum indicat, inappetentia , nausea humorum pessimorum vomitus , & stomachi morsus. Molesta circa pancreas aut lienem pulsatio , aut alius lienis affectus, materiam in iis partibus latitantem significat , à qua vapores , & flatus, ad cor transmittuntur ; sic mensium suppressio , & affectiones hystericæ , ab utero malum exoriri significant.

Aqua in Pericardio redundans difficilior cognoscitur , coniecturâ tamen eam suspicari possumus , si pulsus mollis , & languidus sit , & æger conqueratur sibi , cor velut in aqua innatare , & suffocari. Si malum sit continuum , & in atrophiam vel hæcticam degeneret.

Si humores maligni & venenati huic affectui originem dederint, magna in pulsu varietas apparet, virium maxima deiectio , & interdum lipothymia , aliaque malignitatis signa conspiciuntur.

Si à tumore palpitatione oriatur , notabilis in pulsu apparet varietas , & motus cordis à naturali valde recedit, admodum inæqualis , & inordinatus est , & si humor sit calidus , ingens in corpore erit inflammatio , sitis magna , difficilis respiratio , succedit lipothymia , & tandem mors consequitur. Si verò tumor durus sit in pericardio, affectus est continuus , & æger sensim & sine causa manifesta contabescit. Si caro vel quidpiam aliud solidius cordi adnascatur , palpitatione à morbi principio usque ad mortem continuo hominem infestat.

Denique

Denique spirituum defectus cordis palpitationem excitans cognoscitur ex causis præcedentibus, à quibus magna spirituum exolutio fieri potuit, tum etiam ex pulsu crebro, celeri & paruo; & quòd ex quouis labore etiam leuissimo palpitatione cõtingit. Simile enim quippiam conualescentibus accidit, quibus ex deambulatione, aut quauis alia corporis agitatione, etiam leuiori, pulsus immutatio fit satis insignis & palpitationi analoga.

Prognosis huius affectus ita instituenda est, vt periculosus existat, ob læsum cordis motum, quo vita conseruari debet, & frequenter ad syncopem deducat, tandemque hominem de medio tollat. Verissima enim est obseruatio à Gal. proposita *comm. Aph. 41. sect. 2. et 5. de loc. aff. cap. 2.* omnes qui iuuenes aut in declinante ætate cordis palpitationi maximè obnoxij fuerunt, ante senectutem mortuos esse. Frequens enim palpitatione signum erat facultatem vitalem admodum debilem fuisse.

Palpitatione idiopathica est sympathicâ periculosior, imò vt plurimum lethalis. Tum etiam illa quæ ab interna causa fit periculosior est illâ quæ ab externa producitur, nisi magna sit externæ causæ vehementia, vt veneni vel alicuius vulneris insignioris.

Si à cordis tumore, vel soluta vnitæte palpitatione procedat insanabilis est, & deplorata.

Curatio palpitationis cordis varia esse debet pro varietate affectuum, à quibus dependet; ac primum ea quæ à peculiari affectu cordis aut pericardij curationem non recipit, idèd tota practicoꝝ curatio ad sympathicam dirigitur, quæ à variis partium inferiorum affectibus dependet, quorum curatio è propriis locis depromenda est.

At præter illa remedia, quæ causæ sublationem respiciunt;

respiciunt; vsurpanda etiam sunt, quæ symptomatis sedationi, aut lenitioni conferunt, cor reficiendo, roborandoque, nec non flatu & vapores ex humoribus melancholicis, aut crudis, & pituitosis eleuatos discutiendo. Qualia sunt iulepi cardiaci, opiata, epithemata, & odoramenta in virium imbecillitatis curatione describenda, tum etiam sequentia.

℞. Conseruæ melissæ, anthos, flor. borrag. & caryophylli nostratis, ana ℥. j. confect. alkerm & theriacæ vet. an. 3. j. pulu. elect. diambrae, & diamoschi dulcis, ana ʒ. j. Cum syrup. de cortice citri, fiat opiata, quâ vtatur frequenter.

℞. Aquar. buglossi, rosar. & flor. arantiorum, ana ʒ. ij. syrup. caryoph. nostr. ʒ. j. ʒ. flor. aquæ cinamom. ʒ. ʒ. spiritus rosar. 3. ij. confect. alkerm. 3. j. Miscé, dentur cochlear. ij. per interualla.

Liquor sequens ad imitationem succi ex cordibus, sequenti cap. describendi, erit vtilissimus.

℞. Corda porci, aut veruecis num. iij. cinam. & caryoph. ana 3. j. sem. acetosæ, & lactucæ. ana 3. j. sem. vini albi Vnc. ij. aquar. borrag. scabios. & rosar. ana Vnc. j. sem. confect. alkerm. 3. j. Bulliant omnia inter duo vasa. De hoc liquore capiat cochl. ij. manè & vesperi.

℞. Rosar. rubr. & flor. rorism. ana 3. ij. flor. laundulæ Drach. j. sem. angelicæ cortic. citri, caryophyll. cinamom. macis, ana 3. ʒ. croci Scrup. j. moschi, ambræ, ana gr. vj. Cum sindone rubra fiat sacculus, qui irroretur vino albo, & aquâ rosar. & applicetur tepidè regioni cordis.

℞. Vnguenti rosar. ʒ. ʒ. olei cinam. & caryophyll. an. gutt. vj. moschi, ambræ, ana gr. iv. Miscé, fiat linimentum, quo illinatur regio cordis.

Clystere

Clysteres purgantes, & carminantes frequenter infecti flatuosam materiam potenter euacuant, & discutunt.

Sed venæ sectio omnibus remediis præstat in hoc affectu, urgente paroxysmo. Et Gal. testatur 5. *de locis affectis, cap. 2.* se nunquam inutiliter venam secuisse in palpitatione cordis.

Quidam practici admovent thoraci cucurbitulas sine scarificatione, quibus magnam vim tribuunt discutientiendis ac digerendis flatuosis spiritibus, qui in partibus internis inclusi continentur. Alij hypochondriis admovent, quando in iis locis mali minera re-fidet.

At Zacutus Lusitanus cucurbitulam scarificatam regioni cordis admouit cum miro successu, vt videre est in historia ab eo descripta in *Praxi Medica admiranda, obseru. 133. lib. 1.*

Alij verò commendant thaponticum verum ad ʒ.ij. cum vino exhibitum, aut vinum in quo eadem radix macerata fuerit.

### C A P V T I I I.

#### *De imbecillitate virium*

**E**T si virium imbecillitas, omnium actionum, scilicet animalium, vitalium & naturalium læsiones generatim comprehendat: strictè tamen, & peculiari-ter vitales significat, quæ pulsu debili, & infirmo denotantur. Illa autem vitium imbecillitas in omnibus morbis grauib, in quibus natura vel succumbit, vel ægerrimè resistit causæ morbificæ reperiri solet.

Quemad

Quemadmodum igitur in palpitatione, actio cordis, nimirum pulsatio est deprauata, sic in virium debilitate est imminuta, in quo quidem cum syncope coincidit. Ab ea tamen differt, quod pulsus imminutio in syncope tanta est, ut ille sit ferè abolitus, & ægerrimè percipiatur: at in debilitate virium, pulsus manifestus est, & conspicuus, neque adeò imminutus quemadmodum in syncope.

In hac perpetuò facultas animalis etiam offenditur, vnde motus impotentia consequitur, quæ sine vllò cerebri, neruorum, aut muscutorum vitio contingit; sed tantum procedit à spirituum vitalium defectu, qui sufficienter cerebro non communicantur, ut ex iis spiritus animales genentur.

Causa proxima virium imbecillitatis est caloris nativi, & spirituum defectus; à quibus vita, & robur partium dependet. Contingit autem ille defectus in singulis partibus, ex defectu spirituum vitalium caloris influentis à corde. Deficiunt autem spiritus vitales, vel quod sufficienti copiâ non generantur, vel quod geniti dissipantur, corrumpuntur, aut suffocantur, quemadmodum in syncope fieri diximus. Vbi tamen hæc differentia reperitur, quod in syncope causæ defectum spirituum producentes, subito & derepente effectum suum producant: in virium autem imbecillitate sensim & paulatim operantur. Atque adeò in syncope & lipothymia spiritus vitales penè toti & subito deficiunt; ac in virium imbecillitate pauciores, quàm debeant, singulis partibus communicantur.

Præterea cum calor natiuus, non solum calore influente, sed etiam humido primigenio, tanquam pabulo indigeat; si humidum istud deficiat, & imminuatur, etiam calorem natium debilitari, & vires labefactari necesse est.

Causæ



Causæ autem efficientes, ut spiritus non generentur, vel dissipentur, vel corrumpantur, vel suffocentur in syncope theoria propositæ sunt.

Diagnosis huius affectus nullâ explicatione indiget, siquidem malum per se patet, & ægri spontè de vitium imbecillitate conqueruntur. Signa verò causarum in syncope fuere proposita.

Prognosis etiam ex varia causarum dispositione dependet: prout enim causæ virium imbecillitatem producentes, leuiores, aut grauiores sunt, maius vel minus indè periculum emergit.

Curatio huius affectus ad duo dirigenda est, ad causarum sublationem, & cordis ac spirituum vitalium instaurationem.

Causæ sunt omnes ferè morbi graues, in quibus vel natura succubât vel ægerrimè resistit causæ morbificæ. Ergo causarum sublatio omnium ferè morborum curationes respicit, quæ à suis locis erunt desumendæ.

Cordis verò roboratio, & spirituum vitalium instauratione seorsim instituenda est; imò interdum causarum morbificarum curationi præferenda, cum mortis periculum impendat; cauendo tamen perpetuò, ne vires reficiendo causas morbificas augeamus. Atque adèd in calido morbo cardiaca magis temperata, in frigido calidiora potius vsurpentur.

Primò igitur in alimentis cardiaca permiscenda sunt, ut confectio alkermes, vel de hyacintho cum iusculis, vel etiam cum vino odorifero, aut aqua cinnam. si summa sit imbecillitas.

In iusculo etiam decoquatur inter duas patinas frustulum coxæ veruecinæ, detractis membranis & pinguedine. Postèa colatum iusculum capiat æger vno haustu. Vel

Caro

Caro caponis , detracta pelle & pinguedine , in frusta diuisa , ponatur in olla vitreata benè lutata , & maneat in B. M. bulliente per quinque horas. Tum liquoris inde manantis capiat æger cochl. ij. vel iij. cum singulis iusculis.

Vel poterit fieri destillatum restaurans in hunc modum.

℥. Caponem vel gallinam , detracta pelle & pinguedine , ac in frusta diuide. Deinde affunde aquar. buglossi , borrag. acetosæ , rosar. & flor. arant. ana. lb. s. pulu. aromat. rosar. triasantal. & cinam. elect. ana ʒ. s. santal. citrin. ʒ. j. limones incisos num. iij. Fiat destillatio secundum artem , quæ detur ex cochleari omni horâ.

Succus carnis veruecinæ solus ac simplex in vsu est frequentissimo. Coxa veruecina in veru assatur, & inter assandum , cum iam semicocta est , mucronato cultro pungitur. Expressus succus parum adhuc in patina coquitur , & exhibetur per se , vel cum iusculis , aut vitellis ouorum permixtus.

Valeriola succum ex cordibus veruecinis extractum miris effert laudibus. Et Zacutus Lusitanus propria experientiâ confirmat , dicitque se hoc remedio per mensem exhibito , diuitem quendam virum liberaſſe, qui frequenter in syncopem incidebat ex debilitate facultatis vitalis, sanguinis, & spiritus resolutione ; cum multa alia remedia antea vsurpata nihil profecissent. Extrahendi huius succi hæc est ratio. Accepto veruecis corde , aut hædi, finditur medium , & probè aquâ eluitur, & vltimò aquâ rosaceâ fouetur; in taleolas oblongas dissecatur, inque vitreato vase testaceo , cum caryophyllis aliquot imponitur, sine vllò liquore. Probeque operculato vase, pastâ vel luto sapientiæ, in calentem furnum extracto pane inditur , quoad calore.

contabescens in succum eliquatur. Inde post extrahitur, & aperto vase sumitur inuentus in vase succus, & ægro propinatur.

Itali in vsu habent sorbitionem ex vitellis ouorum, vino, saccharo, & cinamomo paratam, quæ optima & valdè reficiens est.

Zacutus Lusitanus ex viginti ouorum vitellis ferculum parat, vt videre est *Obseru. 107. lib. 2. Praxis admiranda.*

Poterunt etiam fieri iulepi cardiaci in sequentem modum.

℞. Aquar. buglossi, rosar. & flor. arantior. ana ℥. j. syrup. de pomis, & de limonib. ana ℥. β. confectio. alkerm. ℥. aquæ cinam. ℥. ij. Fiat iulep.

Vel paretur mixtura sequens.

℞. Sacchari albi ℥. ij. Humectetur cum aqua cinam. optima, & nonnihil fluidum reddatur saccharum. Deinde adde spiritus vitrioli q. s. ad manifestam aciditatem, essentia cinam. gutt. iv. essentia macis, nucis moschat. & anisi, ana gutt. iij. essentia caryophyllor. gutt. ij. Misce, vtatur per se, vel cum iusculo.

Parari etiam poterit opiata restaurans in sequentem modum.

℞. Conseruæ rosar. buglossi, borrag. & caryophylli nostratis, ana ℥. j. cortic. citri condit. & nucis moschat. condit. ana ℥. iij. myrobal. condit. num. j. confect. alkerm. ℥. β. spiritus rosar. & essentia citri, ana Drach. sem. essentia cinam gutt. vj. Cum syrup. de pomis, fiat opiata, qua vtatur frequenter.

Aqua sequens præstantissima est.

℞. Gelatinæ cornu cerui cum vino albo extractæ lb. iv. sanguinis agni, & vituli manibus agitati, & ab omnibus fibris liberati, ana lb. ij. vini moscatellini, canarini, aut maluatici lb. iij. Corda vituli per frusta secta,

cta,

cta , & valdè recentia num. iv. micæ panis albissimi recentis , lacte vaccino inebriatæ lb. ij. sem. succi mellissæ recenter expressi lb. j. sem. aquæ rosar. fragrantis , & flor. arantiorum an. lb. j. mala citria maiora in taleolas secta numero iiij. cinam. opt. ʒ. iv. macis Vnc. j. Ponantur in alembico vitreo capaci , & destillentur in B M Aquæ dimidia pars , quæ prima prodibit servetur ad vsum.

Liquor cardiacus excellens , & pretiosus in hunc modum componi poterit.

℞. Ambra griseæ Drach. ij. moschi opt. scrup. ij. ligni aloës ʒ. j. sem. partis albæ benzoini purissimi ʒ. iiij. contusis & simul mixtis affunde spirit. vini , ut quatuor digitis supernatet ; & ad leniss. cinerum calorem extrahatur tinctura saturata , fiatque liquoris tincti per chartam emporeticam colatura : & euocetur dimidia pars spiritus in cineribus lentissimo igne per alembicum. Liquor in cucurbita restans servetur in ampulla vitrea forti optimè obturata subere cerato , & vesicâ. Cuius guttæ ij. iiij. iv. poterunt sumi cum iusculo , vino , iulepis , aliisque liquoribus prædictis , vel cum syrupo sequenti.

℞. Aquæ cinam. Vnc. iv. aquæ flor. arantiorum fragrantissimæ , aquæ rosar. admodum odoratæ , an. Vnc. vi. Misce , & in his dissolue sacchari candi quantum dissolui poterit ; & fiat sine vlllo calore veluti syrupus , cuius cochleari vni permisceantur guttæ iv. liquoris cardiaci prædicti.

Ex magmate residuo illius liquoris , addito pari pondere rosarum damascenarum , & quadruplo benzoini , poterunt fieri pastilli valdè suaues pro suffitu cubiculi.

Cordi applicentur epithemata tum liquida , tum solida , & pulli columbini per medium secti & pulveri-

bus cardiacis conspersi.

Ventriculo admoucantur sacculi ex aromatibus, in vino madefacti. Testes & pudenda foueantur confectiōe alkerm in vino dissoluta.

Arteriæ temporum, manuum & pedum eadem confectiō illinantur, addendo tantillum aquæ cinam.

Odoramenta offerantur naribus, in sequentem modum composita.

℞. Fol. melissæ, ocymi, & maioranæ, ana Drach. ij. cortic. citri santal. citrin. caryophill. ana Drach. j. croci scrup. sem. ambra gr. gr. vi. moschi gr. iv. Ligentur in nodulo, & irrorentur aqua cinam. & rosar, ac naribus frequenter offerantur.

Vel ex prædictis oleis distillatis ex nuce mosch. cinam. & cariophillis, cum tantillo ceræ fiant balsama, quibus nares illinantur.



PRAXEOS  
 MEDICÆ  
 LIBER IX.

*De affectibus ventriculi.*

PRÆFATIO.

**V***T ventriculi varia sunt actiones, sic varia earum lesiones diuersos affectus constituunt. Cum enim illa pars ciborum coctioni, & chyli confectioni destinata sit, ad illud opus perficiendum p imò instituta est cibi & potus appetentia, quæ imminui, adoleri, & deprauari solet. Abolita ciborum appetentia, anorexia, & apositia nominatur. Imminuta, inappetentia & cibi fastidium. Deprauata verò caninam famem, & picam, ac malaciam constituit. Nimia potus appetentia sitis morbosa nominatur. Vitia prædicta attracticem facultatem respiciunt. Ea*

*verò quæ ad ciborum concoctionem spectant prout imminuitur, aboletur; aut deprauatur unico laesa concoctionis nomine comprehenduntur. Retentio & expulsio laesa in vomitu & singultu versatur. Vomitus tamen varia sunt species pro diversâ materia quæ excernitur natura, & conditione. Quia verò ventriculus sensu tactus exquisito præditus est, propter neruum quem à sexta coniugatione recipit satis insignem doloribus idèò, quemadmodum alia partes sensiles, obnoxius est. Ac dinique tumores, quemadmodum alia partes, præsertim inflammationes, tum etiam abscessus, & ulcera pati consuevit.*

*Ut igitur omnes ventriculi affectus, qui frequentius in praxi Medica occurrunt, in hac sectione explicemus, eam prorsus undecim concludemus capitibus. Quorum primum erit de inappetentia, & cibi fastidio. Secundum de fame canina. Tertium de pica & malacia. Quartum de siti morbosa. Quintum de concoctione laesa. Sextum de singultu. Septimum de vomitu. Octauum de vomitu sanguinis. Nonum de cholera morbo. Decimum de dolore ventriculi. Undecimum de ventriculi inflammatione, abscessu, & ulcere.*

## CAPVT PRIMVM.

*De Inappetentia, & cibi fastidio.*

**I**nappetentia, & cibi fastidium actionem ventriculi abolitam & imminutam comprehendit. Abolita vocatur *ἀρεσξία*, & *ἀνοσμία*. Imminuta verò *δυσρεξία*. Vfus tamen obtinuit, vt *ἀρεσξία*, & *ἀνοσμία* pro imminuta & abolita appetentia vsurpentur.

Causæ huius affectus variæ sunt atque multiplices, quæ vt in ordinem quendam redigantur considerandæ sunt causæ naturales, quæ famem, seu appetitum naturalem efficiunt. Illæ autem à Gal 1. *de sympt. caus. cap. 7.* symptomata improprie nominantur, & quinario numero comprehenduntur. Quarum prima est inanitia partium. Secunda est inanitarum partium appetentia naturalis, & tractio alimenti à iecore, & venis, vsque ad ventriculum cõtinuata. Tertia est venarum melsaraicarum (ad quas omnium partium attractio terminatur) suctio & attractio ab intestinis & vetriculo. Quarta est suctionis sensus in ventriculo. Quinta appetentia animalis, quæ sensu tactus officio stomachi implantato per neruum insignem à cerebro communicato, perficitur. Hanc etiam actionem non parùm adiuuat humor melancholicus à liene in ventriculum transmissus, qui aciditate suâ, & astrictione tunicam interiorem ventriculi vellicat, & corrugat, estque illi instar acetarij, ad excitandam appetentiam. Vt igitur appetentia secundum naturam se habeat, omnes istas causas benè cõstitutus esse necesse est. Si verò aliquod vitium in qualibet earum contigerit, inde appetitus læsio exoritur.

Prima ergo causa, quæ est partium inanitie, si qua-



cunque de causa defuerit, non fit ab illis attractio ab aliis partibus & ventriculo, sicque appetentia non excitatur. Deest autem illa partium inanitio, vel quando repletæ sunt crudorū succorum copiâ, ob crapulam & ingluuiem; vel ob intermissas exercitationes, aut euacuationes consuetas, vel quando tanta est pinguedinis moles ut partibus ipsis ad alimoniam sufficiat. Impedit etiam partium inanitionem pororum cutis constipatio magna; vel ingens caloris natiui imbecillitas, ut nihil aut perexiguum substantiæ partium dissipare valeat; vel eiusdem caloris ad morbificæ cuiusdam materiam pepasimum reuocatio, neglectâ interim partium nutritione, ut in febribus fieri consuevit.

Secunda causa erat appetentiæ naturalis, & tractio alimenti vsque ad ventriculum producta. Illa autem vitiatur quando partes, licet inanitæ sint, non trahunt tamen à venis, ob exolutum illarum robur, sed velut effætæ, ac muneris sui oblitæ, languent & feriantur; ut solet contingere in febribus acutis malignis, pestilentibus, syntecticis, & hecticis. Idem contingit in immodicis ac diuturnis euacuationibus, ut in fluxu hepatico, vterino, hæmorrhoidali, hæmorrhagia è naribus, sudore diaphoretico, venere effrænata, inedia longa, & similibus.

Tertia causa erat, tractione quæ fit è ventriculo per venas mesaraicas, quæ vitiari solet per obstructions insignes illarum venarum, quarum ratione partes inanitæ non possunt materiam chylosam attrahere, neque orificio vetriculi diuulsionis sensum inferre. Sic videmus sæpè pueros strumis laborâtes cū alui fluxu chyloso, eoque diuturno sensim contabescere, & ad marasimum deduci: propterea quod in iis vniuersum mesenterium glandulis refertum est, quæ venas illius obstruunt, & chyli ad iecur cōmeatum impediunt, vnde fit

fit vt ille semiconfectus per aluum excludatur, sicque partes alimento necessario priuentur.

Quarta, & quinta causa quæ sunt suctionis sensus, & appetentia animalis, bonam ventriculi, cerebri, & neruorum dispositionem requirunt. Ideo quæcunque illas dispositiones euertere possunt, appetentiam quocunque deicere valent. Si quæcunque intemperies ventriculi valdè excedens appetentiam vitiat; præcipuè calida & sicca. Calor enim ingens humidam ventriculi substantiam dissipando, appetentiam aufert. Frigus etiam valdè intensum appetentiam vitiat, non solum positium, quando nimirum viscera ab externo aëre, aqua, gelu, niue, & similibus ita refrigerantur vt in narcosim incidant; sed etiam priuatium ab exhausto calore natiuo, quod Galenus Narcosim appellat, vt per longas hæmorrhagias, febres ardentes, & similia; quibus exhauritur ventriculi, & aliarum partium robur. Sic etiam humores prauis & excrementitij tum calidi, tum frigidi, inappetentias excitare solent. Calidi quidem vt biliosi, & adusti, putridi aut virulenti, siue in ventriculo ob vitiatam coctionem generentur, siue ex aliis partibus malè affectis transferantur. Frigidi verò, & pituitosi, viscidi, ac lenti in ventriculo collecti, ex malè concoctis alimentis; vel illapsi ex toto corpore, vt in illis qui per vomitiones consuetas, aliarum partium impuritates in ventriculum allicere consueuerunt; vel ex cerebro per catarrhos in quibus frequenter ventriculus ab humore pituitoso grauari consuevit, suppressis mensibus, aut hæmorrhoidibus calorem suffocando, appetentiam imminuit.

Cerebri etiam & neruorum vitia faciunt vt in stomacho suctionis sensus non percipiatur, in quibus scilicet facultas animalis concidit, vel deprauata est,

atque adeò iis mens ægrotat , vt in apoplexia , lethargo , phrenitide , mania , & similibus contingit ; quemadmodum etiã in paralyfi , propter obstructionem nerui sextæ coniugationis , qui ad ventriculum deferretur ; vel propter eiusdem obstruſæctionem ex vſu refrigerantium , & narcoticorum contractam.

Diagnosis huius affectus per ſe ſatis innotefcit , æger enim ipſe de appetentia deieſta , & alimentorum auerſione ſatis conqueritur. At ſigna cauſarum partim conſpicua ſunt , partim verò artificioſè elicienda.

Ac primùm illæ quæ inanitionis defectum pariunt cognoscuntur , ex victu liberaliori prægreſſo, corpore admodum repleto , intermiſſis exercitationibus , aut euacuationibus , ſomno longiore , & aliis cauſis crudorum ſuccorum copiam congerere idoneis ; tum etiam ſi corpus obefum , & venæ diſtentæ appareant. Eundem inanitionis defectum ſignificat cutis denſitas , quæ humoris alimentarij diſſipationem impedit, tum etiam morbus aliquis grauis , peculiare membrum obſidens , à quo facta eſt caloris natiui diſſipatio in toto corpore , ita vt ſumma debilitas illius non poſſit attractum ad partes alimentum ſufficienter conficere , eiufque penuriam inferre.

Secundæ cauſæ ſigna ſatis conſpicua ſunt , nimirum febres acutæ , malignæ , peſtilentes , aut ſyntheticæ , vel euacuationes immodicæ , aliæque cauſæ, à quibus magna caloris natiui exolutio producta eſt in partibus , vt non poſſint neceſſarium alimentum attrahere.

Tertiæ cauſæ ſigna ad obſtructiones præſertim referuntur , quarum ſigna in hepatis , lienis , & meſenterij affectibus innotefcent.

Quartæ

Quartæ & quintæ causæ signa maiori indaginæ opus habent. Ac primùm calidam ventriculi intemperiem, & biliosi humoris redundantiam, significant, æstus in præcordiis, ac præsertim in regione ventriculi, sitis, linguæ, & faucium ariditas; & amaror, febris interdum adest, & si ab alia parte humores calidi & biliosi influant: illius partis affectus innotescet, ut hepatis inflammatio, aut alterius partis. Si verò nulla alia pars laborare videatur, in ipso ventriculo intemperiem residere coniiciendum est, aut vitiosorum alimentorum usu præcessisse. His ut plurimum accedunt, cardialgia, nausea, vomitus, vel alui fluxus, & ab eorum quæ excernuntur qualitatibus humoris peccantis natura innotescit. Frigida intemperies & pituitosorum humorum copia, ex causis refrigerantibus prægressis, vel nativum calorem insigniter dissipantibus & extinguentibus innotescit, tum etiam ex grauitatis sensu, in regione stomachi, ructu acido, humore viscido & crasso, per os aut per aluum excreto. Idem etiam significant catarrhus frequens aut diuturnus, & affectus alicuius partis quæ humorem pituitosum, aut melancholicum ad ventriculum transmittere potest, ut lienis, uteri, & similium. Cerebri denique & nervorum vitia per propria indicia erunt distinguenda.

Quod ad prognosim spectat, quemadmodum bona appetentia in omnibus morbis laudabilis est, ut docuit Hipp. *Aph.* 33. *sect.* 2. Mente constare, & benè se habere ad ea quæ offeruntur bonum: sic etiam inappetentia, malum omen esse consuevit. Magnam enim à statu naturali peruersionem significat; oriturque, ut docet Gal. *comment. in 3. Epid.* aut à prauis malignisque humoribus ventriculi orificium occupantibus, aut

ab

ab ipsius facultatis extinctione, cuius munus erat alimentum indigentiam sentire, idque consequenter appetere. Sic Hipp. in 1. *Epid.* de tabidis in Epidemica constitutione mortuis, ait *cibos omnes perpetuò fastidiebant, non sitiebant.* Sic etiam Gal. *comment. in 3. Epid.* multos se vidisse affirmat in quadam pestilenti constitutione, qui nihil quicquam ciborum assumebant, & de medio tollebantur. Quidam tamen, ut ipse ait, fortiores quippè, qui vim sibi ipsis afferentes, cibum oblatum assumpserunt, superstites fuerunt Ita apud Hipp. 3. *Epid. sect. 1. Aegr. 2. Hermocrates*, qui die 27. mortuus est, *cibum aduersabatur toto morbi tempore, & ultimis diebus ne degustare quidem poterat.* Et *sect. 2. eiusdem libri Aegr. 6. Euryanactis filia* abhorrebat omnes cibos toto tempore, neque appetebat quicquam, sine siti, neque aliqui bibebat effatum dignum; ex quo morbo interiit post diem duodecimam.

Aduertendum tamen est, cibi fastidium esse quidè funestum, si à caloris natiui exolutione prodeat: sed non esse ita perniciosum si ab humorum prauorū redūdātia & cacochymia oriatur, ut videre est apud Hipp. 7. *oppid.* in Cleomenis filio cibi fastidio citra febrē totos duos menses, laborāte ex pituitæ crudæ, & viscidæ copia, quæ tandem vomitu copioso fuit exclusa Sic in morborum ac febrium præcipuè initiis, non est adeò periculosa innapetentia, quia tunc natura putrescentium humorū perasmo intenta, minùs appetit alimentum, quod illam ab instituto suo reuocaret. Postmodū enim sedatā febrē, & humoribus morbificis exclusis, sponte suā munus suum repetit intermissum.

In pueris inappetētia grauior est, quàm in alia ætate, propter humidam valdè & dissipabilē substantiā, quod præditi sunt, & quæ maiori restauratione indiget usu alimentorum, quibus priuantur per inappetentiam.

In conualescentibus, cibi fastidium recidiuam minatur, propter reliquias materiæ morbificæ inappetentiam producentes.

In morbo diuturno cibi fastidium, & deiectiones syncerae, malum. *Hipp. aph. 6. sect. 7.* cibi fastidium per seipsum prauum est signum in morbis diuturnis: in iis enim qui à talibus morbis sunt euasuri, contrarius affectus solet accidere vehemens scilicet ciborum appetentia. At deiectiones syncerae, iis superuenientes deterius multò præsagium efficiunt; quandoquidem per synceras deiectiones intelligit Hippocr. permixtas aquosæ humiditati, quando solus humor sero suo destitutus eiicitur, siue is biliosus sit, siue melancholicus. Nam deiectiones huiusmodi exustam esse omnem humiditatem natiuam significant à calore febrili.

In longis difficultatibus intestinorum cibi fastidium malum, & cum febre peius *Hipp. Aph. 3. sect 6.* quando in dysenteria profundiora & putrida vlcera sunt, ventriculus ipsis compatiens non benè concoquit, quâ offensione, magis ac magis ad superiora perueniente, quando os ventriculi vnâ afficitur, tum ægrotantes cibi fastidio laborant. Sunt quidem dysenterici non rarò ab initio morbi cibum fastidientes, ob prauos humores ab hepate confluentes; pars enim eorum superfluitans, ad os ventriculi effertur, quod tamen non est perpetuò periculosum. Sed in longis difficultatibus intestinorum cum hic casus aduenerit, duorum alterum est, vel putredo aliqua circa vlcera, vel magna inflammatio, quorum vtrumque admodum est exitiosum.

Curatio huius affectus si ab aliarum partium vitio dependeat ab earum curatione desumenda est. Si verò ex proprio ventriculi vitio contingat, ad calidam vel frigidam illius intemperiem cum materia coniunctam

redu

Causæ autem efficientes , vt spiritus non generentur, vel dissipentur , vel corrumpantur , vel suffocentur in syncope theoria propositæ sunt.

Diagnosis huius affectus nullâ explicatione indiget , siquidem malum per se patet , & ægri spontè de virium imbecillitate conqueruntur. Signa verò causarum in syncope fuere proposita.

Prognosis etiam ex varia causarum dispositione dependet : prout enim causæ virium imbecillitatem producentes , leuiiores, aut grauiiores sunt , maius vel minus indè periculum emergit.

Curatio huius affectus ad duo dirigenda est , ad causarum sublationem , & cordis ac spirituum vitalium instaurationem.

Causæ sunt omnes ferè morbi graues , in quibus vel natura succūbit vel ægerrimè resistit causæ morbigicæ. Ergo causarum sublatio omnium ferè morborum curationes respicit , quæ à suis locis erunt desumendæ.

Cordis verò roboratio , & spirituum vitalium instauratione seorsim instituenda est ; imò interdum causarum morbigicarum curationi præferenda , cum mortis periculum impendit ; cauendo tamen perpetuò, ne vires resciciendo causas morbigicas augeamus. Atque adeò in calido morbo cardiaca magis temperata , in frigido calidiora potius vsurpentur.

Primò igitur in alimentis cardiaca permiscenda sunt , vt confectio alkermes , vel de hyacintho cum iusculis , vel etiam cum vino odorifero , aut aqua cinnam. si summa sit imbecillitas.

In iusculo etiam decoquatur inter duas patinas frustulum coxæ veruecinæ , detractis membranis & pinguedine. Postèà colatum iusculum capiat æger vno haustu. Vel

Caro

Caro caponis , detracta pelle & pinguedine , in frusta diuisa , ponatur in olla vitreata benè lutata , & maneat in B. M. bulliente per quinque horas. Tum liquoris inde manantis capiat æger cochl. ij. vel iij. cum singulis iusculis.

Vel poterit fieri destillatum restaurans in hunc modum.

℥. Caponem vel gallinam , detracta pelle & pinguedine , ac in frusta diuide. Deinde affunde aquarum buglossi , borrag. acetosæ , rosar. & flor arant. ana. lb. 6. pulu. aromat. rosar. triasantal. & cinam. elect. ana 3. 6. santal citrin. 3. j. limones incisos num. iij. Fiat destillatio secundum artem , quæ detur ex cochleari omni horâ.

Succus carnis veruecinæ solus ac simplex in vfu est frequentissimo. Coxa veruecina in veru assatur, & inter assandum , cum iam semicocta est , mucronato cultro pungitur. Expressus succus parum adhuc in patina coquitur , & exhibetur per se , vel cum iusculis , aut vitellis ouorum permixtus.

Valeriola succum ex cordibus veruecinis extractum miris effert laudibus. Et Zacutus Lusitanus propria experientiâ confirmat , dicitque se hoc remedio per mensem exhibito , diuitem quendam virum liberasse, qui frequenter in syncopem incidebat ex debilitate facultatis vitalis, sanguinis, & spiritus resolutione; cum multa alia remedia antea vsurpata nihil profecissent. Extrahendi huius succi hæc est ratio. Accepto veruecis corde , aut hœdi, finditur medium , & probè aquâ eluitur, & vltimò aquâ rosacè fouetur; in taleolas oblongas dissecatur, inque vitreato vase testaceo , cum caryophyllis aliquot imponitur, sine vllò liquore. Probèque operculato vase, pastâ vel luto sapientiæ, in calentem furnum extracto pane inditur , quoad calore.



contabescens in succum eliquatur. Inde post extrahitur, & aperto vase sumitur inuentus in vase succus, & ægro propinatur.

Itali in vsu habent sorbitionem ex vitellis ouorum, vino, saccharo, & cinamomo paratam, quæ optima & valdè reficiens est.

Zacutus Lusitanus ex viginti ouorum vitellis ferculum parat, vt videre est *Obseru. 107. lib. 2. Praxis admiranda.*

Poterunt etiam fieri iulepi cardiaci in sequentem modum.

℞. Aquar. buglossi, rosar. & flor. arantior. ana ℥. j. syrup. de pomis, & de limonib. ana ℥. β. confectio. alkerm. ℥. aquæ cinam. ℥. ij. Fiat iulep.

Vel paretur mixtura sequens.

℞. Sacchari albi ℥. ij. Humectetur cum aqua cinam. optima, & nonnihil fluidum reddatur saccharum. Deinde adde spiritus vitrioli q. s. ad manifestam aciditatem, essentia cinam. gutt. iv. essentia macis, nucis moschat. & anisi, ana gutt. iiij. essentia caryophyllor. gutt. ij. Misce, vtatur per se, vel cum iusculo.

Parari etiam poterit opiata restaurans in sequentem modum.

℞. Conseruæ rosar. buglossi, borrag. & caryophylli nostratis, ana ℥. j. cortic. citri condit. & nucis moschat. condit. ana ℥. iiij. myrobal. condit. num. j. confect. alkerm. ℥. β. spiritus rosar. & essentia citri, ana Drach. sem. essentia cinam gutt. vj. Cum syrup. de pomis, fiat opiata, qua vtatur frequenter.

Aqua sequens præstantissima est.

℞. Gelatinæ cornu cerui cum vino albo extracta ℔. iv. sanguinis agni, & vituli manibus agitati, & ab omnibus fibris liberati, ana ℔. ij. vini moscatellini, canarini, aut maluatici ℔. iiij. Corda vituli per frusta secta,

ſecta , & valdè recentia num. iv. micæ panis albiſſimi recentis , lacte vaccino inebriatæ lb. ij. ſem. ſucci meliſſæ recenter expreſſi lb. j. ſem. aquæ roſar. fragrantis , & flor. arantiorum an. lb. j. mala citria maiora in talcolas ſecta numero iiij. cinam. opt. ʒ. iv. macis Vnc. j. Ponantur in alembico vitreo capaci , & deſtillentur in B M Aquæ dimidia pars , quæ prima prodibit ſeruetur ad uſum.

Liquor cardiacus excellens , & pretioſus in hunc modum componi poterit.

℞. Ambra grifſæ Drach. ij. moſchi opt. ſcrup. ij. ligni aloës ʒ. j. ſem. partis albæ benzoini puriſſimi ʒ. iiij. contuſis & ſimul mixtis affunde ſpirit. vini , ut quatuor digitis ſupernatet ; & ad leniſſ. cinerum calorem extrahatur tinctura ſaturata , fiatque liquoris tincti per chartam emporeticam colatura : & euocetur dimidia pars ſpiritus in cineribus lentiſſimo igne per alembicum. Liquor in cucurbita reſtans ſeruetur in ampulla vitrea forti optimè obturata ſubere cerato , & veſicâ. Cuius guttæ ij. iiij. iv. poterunt ſumi cum iuſculo , vino , iulepis , aliisque liquoribus prædictis , vel cum ſyrupo ſequenti.

℞. Aquæ cinam. Vnc. iv. aquæ flor. arantiorum fragrantiffimæ , aquæ roſar. admodum odoratæ , an. Vnc. vi. Miſce , & in his diſſolve ſacchari candi quantum diſſolui poterit ; & fiat ſine vlllo calore veluti ſyrupus , cuius cochleari vni permiſceantur guttæ iv. liquoris cardiaci prædicti.

Ex magmate reſiduo illius liquoris , addito pari pondere roſarum damascenarum , & quadruplo benzoini , poterunt fieri paſtilli valdè ſuaues pro ſuſſitu cubiculi.

Cordi applicentur epithemata tum liquida , tum ſolida , & pulli columbini per medium ſecti & pulverii-

bus cardiacis conspersi.

Ventriculo admoveantur sacculi ex aromatibus, in vino madefacti. Testes & pudenda foueantur confectiione alkerm in vino dissolutâ.

Arteriæ temporum, manuum & pedum eâdem confect. illinantur, addendo tantillum aquæ cinam.

Odoramenta offerantur naribus, in sequentem modum composita.

℞. Fol. melissæ, ocymi, & maioranæ, ana Drach. ij. cortic. citri santal. citrin. caryophill. ana Drach. j. croci scrup. sem. ambtæ grif. gr. vi. moschi gr. iv. Ligentur in nodulo, & irrorentur aquâ cinam. & rosar. ac naribus frequenter offerantur.

Vel ex prædictis oleis distillatis ex nuce mosch. cinam. & cariophillis, cum tantillo ceræ fiant balsama, quibus nares illinantur.



PRAXEOS  
 MEDICÆ  
 LIBER IX.

*De affectibus ventriculi.*

PRÆFATIO.

**V***T ventriculi varia sunt actiones, sic varia earum lesiones diversos affectus constituunt. Cum enim illa pars ciborum coctioni, & chyli confectioni destinata sit, ad illud opus perficiendum p̄ imò instituta est cibi & potus appetentia, qua imminui, adoleri, & depravari solet. Abolita ciborum appetentia, anorexia, & apostia nominatur. Imminuta, inappetentia & cibi fastidium. Depravata verò caninam famem, & picam, ac malaciam constituit. Nimia potus appetentia sitis morbosa nominatur. Vitia prædicta attracticem facultatem respiciunt. Ea*

verò quæ ad ciborum concoctionem spectant prout imminuitur, aboletur; aut deprauatur unito lasa concoctionis nomine comprehenduntur. Retentio & expulsio lasa in vomitu & singultu versatur. Vomitus tamen varia sunt species pro diversâ materia quæ excernitur natura, & conditione. Quia verò ventriculus sensu tactus exquisito præditus est, propter nervum quem à sexta coniugatione recipit satis insignem doloribus idèò, quemadmodum alia partes sensiles, obnoxius est. Ac denique tumores, quemadmodum alia partes, præsertim inflammationes, tum etiam abscessus, & ulcera pati consuevit.

Vt igitur omnes ventriculi affectus, qui frequentius in praxi Medica occurrunt, in hac sectione explicemus, eam prorsus undecim concludemus capitibus. Quorum primum erit de inappetentia, & cibi fastidio. Secundum de fame canina. Tertium de pica & malacia. Quartum de siti morbosa. Quintum de concoctione lasa. Sextum de singultu. Septimum de vomitu. Octauum de vomitu sanguinis. Nonum de cholera morbo. Decimum de dolore ventriculi. Undecimum de ventriculi inflammatione, abscessu, & ulcere.

## CAPVT PRIMVM.

## De Inappetentia, &amp; cibi fastidio.

**I**nappetentia, & cibi fastidium actionem ventriculi abolitam & imminutam comprehendit. Abolita vocatur ἀρεσξία, & ἀποσιτία. Imminuta verò δυσρεσξία. Vfus tamen obtinuit, vt ἀρεσξία, & ἀποσιτία pro imminuta & abolita appetentia vsurpentur.

Causæ huius affectus variæ sunt atque multiplices, quæ vt in ordinem quendam redigantur considerandæ sunt causæ naturales, quæ famem, seu appetitum naturalem efficiunt. Illæ autem à Gal 1. de sympt. caus. cap. 7. symptomata impropriè nominantur, & quinario numero comprehenduntur. Quarum prima est inanitio partium. Secunda est inanitarum partium appetentia naturalis, & tractio alimenti à iecore, & venis, vsque ad ventriculum cōtinuata. Tertia est venarum mēfaraicarum (ad quas omnium partium attractio terminatur) suctio & attractio ab intestinis & vētriculo. Quarta est suctionis sensus in ventriculo. Quinta appetentia animalis, quæ sensu tactus orificio stomachi implantato per neruum insignem à cerebro communicato, perficitur. Hanc etiam actionem non parùm adiuuat humor melancholicus à liene in ventriculum transmissus, qui aciditate suâ, & astrictione tunicam interiorem ventriculi vellicat, & corrugat, estque illi instar acetarij, ad excitandam appetentiam. Vt igitur appetentia secundum naturam se habeat, omnes istas causas benè cōstitutæ esse necesse est. Si verò aliquod vitium in qualibet earum contigerit, indè appetitus læsio exoritur.

Prima ergo causa, quæ est partium inanitio, si qua-

cunque de causa defuerit, non fit ab illis attractio ab aliis partibus & ventriculo, sicque appetentia non excitatur. Deest autem illa partium inanitio, vel quando repletæ sunt crudorū succorum copiâ, ob crapulam & ingluuiem; vel ob intermissas exercitationes, aut euacuationes consuetas, vel quando tanta est pinguedinis moles ut partibus ipsis ad alimoniam sufficiat. Impedit etiam partium inanitionem pororum cutis constipatio magna; vel ingens caloris natiui imbecillitas, ut nihil aut perexiguum substantiæ partium dissipare valeat; vel eiusdem caloris ad morbificæ cuiusdam materiam pepasimum reuocatio, neglectâ interim partium nutritione, ut in febribus fieri consuevit.

Secunda causa erat appetentiæ naturalis, & tractio alimenti usque ad ventriculum producta. Illa autem vitiatur quando partes, licet inanitæ sint, non trahunt tamen à venis, ob exolutum illarum robur, sed velut effætæ, ac muneris sui oblitæ, languent & feriantur; ut solet contingere in febribus acutis malignis, pestilentibus, syntecticis, & hecticis. Idem contingit in immodicis ac diuturnis euacuationibus, ut in fluxu hepatico, vterino, hæmorrhoidali, hæmorrhagia è naribus, sudore diaphoretico, venere effrænata, incidia longa, & similibus.

Tertia causa erat, tractione quæ fit è ventriculo per venas mesaraicas, quæ vitiari solet per obstructions insignes illarum venarum, quarum ratione partes inanitæ non possunt materiam chylosam attrahere, neque orificio vetriculi diuulsionis sensum inferre. Sic videmus sæpè pueros strumis laborâtes cū alui fluxu chyloso, eoque diuturno sensim contabescere, & ad inaratum deduci: propterea quod in iis vniuersum mesenterium glandulis refertum est, quæ venas illius obstruunt, & chyli ad iecur cōmeatum impediunt, vnde  
fit

fit vt ille semiconfectus per alium excludatur, sicque partes alimento necessario priuentur.

Quarta, & quinta causa quæ sunt succionis sensus, & appetentia animalis, bonam ventriculi, cerebri, & neruorum dispositionem requirunt. Ideo quæcunque illas dispositiones euertere possunt, appetentiam quoque deiicere valent. Si quæcunque intemperies ventriculi valdè excedens appetentiam vitiat; præcipuè calida & sicca. Calor enim ingens humidam ventriculi substantiam dissipando, appetentiam aufert. Frigus etiam valdè intensum appetentiam vitiat, non solum positium, quando nimirum viscera ab externo aëre, aqua, gelu, niue, & similibus ita refrigerantur vt in narcosim incidant; sed etiam priuatium ab exhausto calore natiuo, quod Galenus Narcosim appellat, vt per longas hæmorrhagias, febres ardentes, & similia; quibus exhauritur ventriculi, & aliarum partium robur. Sic etiam humores prauis & excrementitij tum calidi, tum frigidi, inappetentias excitare solent. Calidi quidem vt biliosi, & adusti, putridi aut virulenti, siue in ventriculo ob vitiatam coctionem generentur, siue ex aliis partibus malè affectis transferantur. Frigidi verò, & pituitosi, viscerati, ac lenti in ventriculo collecti, ex malè concoctis alimentis; vel illapsi ex toto corpore, vt in illis qui per vomitiones consuetas, aliarum partium impuritates in ventriculum allicere consueuerunt; vel ex cerebro per cararrhos in quibus frequenter ventriculus ab humore pituitoso grauari consueuit, suppressis mensibus, aut hæmorrhoidibus calorem suffocando, appetentiam imminuit.

Cerebri etiam & neruorum vitia faciunt vt in stomacho succionis sensus non percipiatur, in quibus scilicet facultas animalis concidit, vel deprauata est,

Ll 5 atque



atque adeò iis mens ægrotat , vt in apoplexia , lethargo , phrenitide , mania , & similibus contingit ; quemadmodum etiã in paralyfi , propter obstructionem nerui sextæ coniugationis , qui ad ventriculum deferitur ; vel propter eiusdem obtufofactionem ex vfu refrigerantium , & narcoticorum contractam.

Diagnosif huius affectus per fe satis innotefcit , æger enim ipfe de appetentia deiecta , & alimentorum auerfione fatis conquiritur. At figna caufarum partim confpicua funt , partim verò artificiofè elicienda.

Ac primùm illæ quæ inanitionis defectum pariunt cognofcuntur , ex victu liberaliori prægreffo , corpore admodum repleto , intermiſſis exercitationibus , aut euacuationibus , fomno longiore , & aliis cauſis crudorum fuccorum copiam congerere idoneis ; tum etiam ſi corpus obefum , & venæ diſtentæ appareant. Eundem inanitionis defectum ſignificat cutis denſitas , quæ humoris alimentarij diſſipationem impedit , tum etiam morbus aliquis grauis , peculiare membrum obſidens , à quo facta eſt caloris natiui diſſipatio in toto corpore , ita vt ſumma debilitas illius non poſſit attractum ad partes alimentum ſufficienter conficere , cuiusque penuriam inferre.

Secundæ cauſæ ſigna ſatis confpicua funt , nimirum febres acutæ , malignæ , peſtilentes , aut ſyntecticæ , vel euacuationes immodicæ , aliæque cauſæ , à quibus magna caloris natiui exolutio producta eſt in partibus , vt non poſſint neceſſarium alimentum attrahere.

Tertiæ cauſæ ſigna ad obſtructiones præſertim referuntur , quarum ſigna in hepatis , lienis , & meſenterij affectibus innotefcent.

Quartæ

Quartæ & quintæ causæ signa maiori indaginæ opus habent. Ac primùm calidam ventriculi intemperiem, & biliosi humoris redundantiam, significant, æstus in præcordiis, ac præsertim in regione ventriculi, sitis, linguæ, & faucium ariditas; & amaror, febris interdum adest, & si ab alia parte humores calidi & biliosi influant: illius partis affectus innotescet, ut hepatis inflammatio, aut alterius partis. Si verò nulla alia pars laborare videatur, in ipso ventriculo intemperiem residere coniiciendum est, aut vitiosorum alimentorum usu præcessisse. His ut plurimum accedunt, cardialgia, nausea, vomitus, vel alui fluxus, & ab eorum quæ excernuntur qualitatibus humoris peccantis natura innotescit. Frigida intemperies & pituitosorum humorum copia, ex causis refrigerantibus prægressis, vel natium calorem insigniter dissipantibus & extinguentibus innotescit, tum etiam ex grauitatis sensu, in regione stomachi, ructu acido, humore ore viscido & crasso, per os aut per aluum excreto. Idem etiam significant catarrhus frequens aut diuturnus, & affectus alicuius partis quæ humorem pituitosum, aut melancholicum ad ventriculum transmittere potest, ut lienis, uteri, & similium. Cerebri denique & neruorum vitia per propria indicia erunt distinguenda.

Quod ad prognosim spectat, quemadmodum bona appetentia in omnibus morbis laudabilis est, ut docuit Hipp. *Aph.* 33. *sect.* 2. Mente constare, & benè se habere ad ea quæ offeruntur bonum: sic etiam inappetentia, malum omen esse consuevit. Magnam enim à statu naturali peruersionem significat; oriturque, ut docet Gal. *comment. in 3. Epid.* aut à prauis malignisque humoribus ventriculi officium occupantibus, aut

In conualescentibus, cibi fastidium recidiuam minatur, propter reliquias materiæ morbificæ inappetentiam producentes.

In morbo diuturno cibi fastidium, & deiectiones synceræ, malum. *Hipp. aph. 6. sect. 7.* cibi fastidium per seipsum prauum est signum in morbis diuturnis: in iis enim qui à talibus morbis sunt euasuri, contrarius affectus solet accidere vehemens scilicet ciborum appetentia. At deiectiones synceræ, iis supervenientes deterius multò præsagium efficiunt; quandoquidem per synceras deiectiones intelligit Hippocr. impermixtas aquosæ humiditati, quando solus humor sero suo destitutus eiicitur, siue is biliosus sit, siue melancholicus. Nam deiectiones huiusmodi exustam esse omnem humiditatem nativam significant à calore febrili.

In longis difficultatibus intestinorum cibi fastidium malum, & cum febre peius *Hipp. Aph. 3. sect. 6.* quando in dysenteria profundiora & putrida vlcera sunt, ventriculus ipsis compatiens non benè concoquit, quâ offensione, magis ac magis ad superiora perueniente, quando os ventriculi vnâ afficitur, tum ægrotantes cibi fastidio laborant. Sunt quidem dysenterici non rarò ab initio morbi cibum fastidientes, ob prauos humores ab hepate confluentes; pars enim eorum superfluitans, ad os ventriculi effertur, quod tamen non est perpetuò periculosum. Sed in longis difficultatibus intestinorum cum hic casus aduenerit, duorum alterum est, vel putredo aliqua circa vlcera, vel magna inflammatio, quorum vtrumque admodum est exitiosum.

Curatio huius affectus si ab aliarum partium vitio dependeat ab earum curatione desumenda est. Si verò ex proprio ventriculi vitio contingat, ad calidam vel frigidam illius intemperiem cum materia coniunctam

redu

lotor. ana ʒ. ij. ſantal. omnium, coralli rubri, coriandri præp. roſar. rubr. ana ʒ. j. gran kermes, & ſpodij, ana ʒ. ſ. ceræ albæ q. ſ. Fiat linimentum, quo ſubte-  
pido, & in vola manus tantum calefacto inungatur  
dicta regio bis, aut ter in die, addendo eiam aceti ro-  
ſac. parum vnctionis tempore

Vel eidem parti admoueantur placenta roſac. aceto  
irrorata, aut in eodem parum macerata, quæ remouea-  
da erit priuſquam incaleſcat.

Denique in perſeuerante affectu plurimum proderit  
balneum, vel ſemicupium refrigerans, & humectans,  
bis, aut ter repetitum. Quo maxime recreanter conua-  
leſcenter, & in priorem ſtatum atque appetentiam sæ-  
pè reſtituuntur.

In alimentis acetum, & acida omnia erunt vti-  
liſſima.

A frigida intemperie producit inappetentia,  
quando humores pituitoſi, & melancholici in ven-  
triculo collecti, functionem illius deſtruunt; vel  
aliundè illapſi à toto corpore, vt in illis, qui per  
aſſuetas vomitiones allicere ſolent aliatum partium  
impuritates in ventriculum; aut à cerebro, liene,  
vtero, aliisque partibus. Illiusque curatio primùm  
reſpicere debet intemperiem partium mandantium,  
quæ corrigenda eſt remediis, è propriis capitibus de-  
ſumendis.

Ipsi verò ventriculo medicatio adhibenda eſt, per  
euacuationem humoris morbifici, & partis corroborat-  
ionem.

Vacuatio poteſt fieri per vomitum, & ſecceſſum,

Per vomitum quidem, ſi æger ſit nauſcabundus, &  
facile vomat, medicamentis ciendo vomitui deſti-  
natis.

Si verò illi humores craſſi ſint, & tunicis ventriculi  
impacti,

impacti, ægerque vomitui non sit assuetus; per aluum deturbandi sunt. pilulis præcipuè, quæ hîc magis conueniunt, quia diutiùs in ventriculo morantur, vt docet Gal. *cap. 7. lib. 4. de sanitate tuenda.* Qui etiam valdè commendat pilulas de hiera, quæ exhiberi possunt ad  $\mathfrak{D}$ . ij. vel 3. j. manè duabus horis ante pastum, vel recenter in hunc modum componi possunt.

℥. Aloës electæ, succo absintij diligenter nutritæ 3. j. agarici trochisc. 3. ij. rhab. puluerat. & vino albo irrorati 3. j. nucis mosch. & spicæ nard ana 3. ʒ. salis tartari, mastich. & cinnam. ana  $\mathfrak{D}$ . j. Cum syrup. de absinthio, fiat massa pilular. de cuius 3. j. formen-  
tur pilulæ vj. deauratæ. Capiat summo manè, si velis integrè purgare, velumat. 3. ʒ. horis duabus ante prandium, bis aut ter in septimana. Possunt acui diagrydio si validiùs purgare volumus.

Si metus sit calidioris iecoris, potetunt misceri quædam refrigerantia, vt rosæ rubræ. santala, pulu. diamargariti. & fiet massa cum syrup. de cichor. composito.

Validiores pilulæ non conueniunt, quia humores ab aliis partibus ad ventriculum alliciunt.

Si pilulæ deuorari non possint, hiera propinanda est cum decocto conuenienti. Vel si potio videatur ingrata, fiat infusio fol. sennæ, myrobalan. rhei, & agarici, in vino absinthite, vel decocto stomachico: dissoluendo tantillum electarij de citro solutui, si magis purgans medicamentum componere sit animus.

Si à pituita admodum lenta viscidâque oriatur hic affectus, ante purgationem dissoluenda est vsu mellis rosac. oxymel. syrup. de hyssopo, aliisque cum decocto incidente & abstergente. Vel sequenti apoze-  
mate vtrumque simul præstari poterit.

℥. Rad.

℞. Rad. acori vulgaris, cyperi, & calami aromat. ana Vnc. ij. cortic. citri sicci, & rad. falsæ par. ana Drach. vj. fol. absinthij pontic. menthæ, maioranæ, chamæd chamæp. ana M. j. sem. citri & anisi, ana Drach. ij. sennæ mundat. Vnc. ij. sem. carthami contusi Vnc. j. agarici trochiscat. Drach. iiij. epithymi, flor. saluiæ, anthos & lauendulæ, ana P. j. Fiat decoctio ad lb. j. β. In qua dissolue syrup. de absinthio pontic. & condituræ cortic. citri, ana ℥. ij. Fiat apozema clarum, & aromat. pauco cinnam & pulu. electarii aromat. rosat. pro iv. dosibus matutinis. In quarum prima & vltima dissolui possunt, ad vberiore purgationem electar. de citro solut. ℥. iiij. cum rhab. puluerat. ℥. j.

Terebinthinæ vsus opportunissimus est, quia viscera omnia commodè repurgat; maximè si ex ea & rhab. pilulas confeceris.

Venæ sectio in hoc affectu non conuenit, nisi iecur sit calidus.

Post purgationem sufficientem ad roborantia veniendum est, tam interna quàm externa, quæ in sequentem modum præscribi poterunt.

℞. Syrup. de absinthio pontic. ℥. j. Capiat manè ieiuno stomacho per aliquot dies. Vel illius loco vinum absinthies substitui poterit.

℞. Conseruæ anthos, menthæ, cort. citri conditi, & & nucis moschatæ condit. ana ℥. β. myrobalan condit. num j. confect. alkerm. ℥. iiij. tunicar. interior. ventriculor. gallinæ præparat. ℥. ij. cinnam. & puluer. aromat. rosat. ana Drach. j. Cum syrup. de mentha fiat opiata; vel cum saccharo rosac. fiat conditum. Vtatur manè, superbibendo parùm vini generosi.

Diētis remediis vtiliter additur sal absinthij, vel ol. de mentha arte Chymicâ extractum.

Vel sal absinthij, & cortic. arantior. vel alteru-

M m trum

trum ad Drach. sem. in vino, vel iusculo dissolutum exhibeatur.

Sequens etiam syrup. efficacissimus est.

℞. Syrup. cydonior. & condit. cort. citri, ana Vnc. ij. aquæ cinnam. Vnc. j. ol. sulphur. gutt. xij. Misce, capiat cochlear. j. per interualla.

Aqua clareta frequentissimo in usu apud multos habetur, cuius compositio talis est.

℞. Cinnam. crassiusculè triti Vnc. ij. Macerentur in ℥. j. aquæ vitæ per se in vase vitreo. In alio vase vitreo per se, & seorsim macerentur sacchari albiss. Vnc. vi. aquæ rosar. ℥. β. Stent hæc omnia seorsim in infusione per duos aut tres dies, agitando quolibet die pluries hæc duo vasa. Tandem simul misceantur materiæ in ipsis contentæ, & per manicam transmittantur. Colatura seruetur in vase vitreo benè obturato. Sumat cochl. i. aut ii. ieiuno stomacho.

Apud Parisienses maximo in pretio habetur syrupus de absinthio Penæ. Cuius descriptio in hunc modum se habet.

℞. Cort. citri saccharo conditi & in taleolas dissecti ℥. sem. Coquatur in æquis partibus aquæ cichorii & agrimonii usque ad putrilaginem. Expressioni fortiter factæ adde succi cydon. & aquæ stillat. absinth. pont. ana ℥. sem. Quibus simul mixtis infunde per quadriduum schœnanth. Vnc. iv. in vase benè clauso, vitreato, supra cineres calidos. In expressione fortiter facta dissolue sacchari albiss. q. s. Coquantur postea in syrupum perfectum in quo calente dissolue ambraë cineritiæ Drach. j. Seruetur postea in vase vitreo benè clauso.

In maxima frigiditate ventriculi aqua cinnam. sola præstantissima est. Sin minùs cum aliis medicamentis permiscenda v.g. cum syrupo de absinthio, de mentha, corallor.

corallor. quibus etiam ambra gris. vtiliter addi poterit.

Non minoris est efficaciz syrupus cinnam. cum aqua vitæ confectus, prout describitur à Quercetano in Pharmacopœa.

Aqua cinnam. cum succo cydon. destillata præstantissima est.

Ad idem præstat spiritus mastiches, in hunc modum compositus.

℞. Mastiches Vnc. iij. galangæ Vnc. i. spiritus vini ℥. sem. Digerantur ac destillentur.

Vtile est etiam elixir proprietatis à Crollio descriptum. Cuius guttæ xii. aut xv. cum vino exhibitæ, mire stomachum roborant.

Tabellæ etiam ad eundem vsum componi poterunt in hunc modum.

℞. Pulpæ cortic. arantior. recent. & pulp. aromat. rosat. ana Drach. ii. sacchari albi in aqua flor. arantior. dissoluti Vnc. iv. Fiant tabellæ.

Eundem vsum præstant tabellæ aromat. rosat. opiat. Salomonis, & theriaca vetus.

In affectu inueterato plurimum conducit decoctum ligni guaiaci, aut saffras, in plures dies sumptum, cum leui sudore, aut sine eo in debilibus.

Aquæ etiam thermæ sulphuræ, & nitrosæ; quales nostræ Bellilucanæ, magnâ copiâ per plures dies sumptæ, crassos & mucilaginosos humores, omnemque ventriculi & intestinorum illuviem potenter abstergunt & euacuant.

℞. Fol. agrim. centaur. minor. & absinthij vulgaris ana M. sem. Coquantur ad ℥. sem. Dissolue sacchari Vnc. j. Fiat potio præstans, & in causa frigida, & calida efficax.



Hartmannus zedoariæ vsum valdè commendat, his verbis. *Frequens vsus zedoaria ventriculum malè affectum adeò roborat, ut nihil suprà. Ideoque vsum eius toties comprobatum magnificare licet, cum nullam non effectus consequatur petitus. Sapius autem zedoaria est comedenda.*

Costæus vini calidi vsum prædicat in sequentem modum. *In potu ordinario vinum calidum ebibitum ventriculi imbecillitatem corrigit. Non infrequens enim est observatio eorum, qui cum ventris flatibus, doloribusque ob malam coctionem perpetuò torquerentur, ubi calido potu uti cœpere, omni prorsus eiusmodi molestiâ soluti, meliorem multos iam annos vitam viuunt.*

Cum vino aqua potus ordinarij permiscenda est, quæ prius cum semine coriandri parùm bullierit.

Notandum autem est diligenter, si cum frigida ventriculi intemperie calida hepatis concurrat, ut sæpè fit, calida medicamenta esse cautè adhibenda, & temperatiora potius vsurpanda.

Zechius sequentem bolum his verbis commendat, *Ut stomachus moderatè calefiat, neque exsiccetur, nullum ex internis valentius hoc presidium vsurpari potest.*

℞. Terebinth. claræ ʒ. ij. mastich. puluer. ʒ. sem puluer. aromat rosat. ʒ. sem. Fiat bolus, duabus horis ante cibum dandus.

Pulvis digestivus, ad concoctionē ventriculi adiuuandam, in frequenti vsu esse consuevit.

℞. Coriandi præp. Vnc. ʒ. sem. fceniculi dulc. & anisi, ana ʒ. ij. cinnam. caryophyll. ana Drach. sem. sacchari ad pondus omnium duplum, fiat pulvis, de quo capiat cochl. j. post singulos pastus, nihil desuper comedendo vel bibendo.

balsamum

Balsamum Peruvianum ad roborandum ventriculum, præstans & efficax remedium, si eius guttæ aliquot; cum vino hippocratico; vel alio; horâ vnâ antepastum exhibeantur.

Vel balsami Peruvianii gutta vna aut altera, cum saccharo permixta in formam pilularum sumatur per multos dies.

Magis familiaria medicamenta ventriculo roborando & calefaciendo idonea sunt, vinum hippocraticum; bochetum ex decocto anisi & coriandri, cum saccharo & cinam. paratum pro potu ordinario. Pulvis ducis vulgò dictus, ex duabus sacchari partibus, & vna cinnam. conflatus, omnibus alimentis inspersus. Sal ad condiendos cibos cōfectum ex puluere coriandri, anisi, piperis longi, galangæ, & nuc. moschat. mixto cum pari portione salis communis. Piperis grana aliquot integra vel contusa, ventriculo ieiuno sumpta. Nuces iuglandes caryophyllis, & cinnam. transfixæ, & saccharo conditæ. Cortex citri & arantior. pariter conditus. Semina anisi, fœniculi, coriandri, & frustula cinnam. saccharo incrustata. Quæ omnia ægrotantes ad libitum vsurpare poterunt.

Ex prædictis cortex citri gustui gratissimus est. Sequia sæpè ab exsiccatione duritiem contraxit, vt dentibus faciliè comminui non possit; cogimur non rarò eū, in mortario marmoreo contundere cum aqua rosarum in formam opiatæ.

Myrobalani condit & nux. mosch. condit in eundem finem vsurpari possunt; & si opus fuerit eodem modo contundi, quamuis vtplurimum sufficientem mollietiem obtineant.

Essentiæ anisi, cinnam. cortic. citri, nuc. moschat. & caryophyll. ad ventriculum roborandum efficacissimæ sunt. Earumque vsus erit, quemadmodum suprà

in affectibus cordi propositus est.

Ex alimentis falsa appetentiam plurimum excitant. Imo vero & acida vsurpari poterunt in parua quantitate, cum aliis permixta, ne ventriculum refrigerent.

Exteriùs verò admoventur fomenta, linimenta, & emplastra, in sequentem modum composita.

℞. Rad. cyperi, galangæ, ireos Florent. & cort. citri sicci, ana Vnc. ij. fol. menthæ, hyssopi, saluæ. rorismar. & maioran. ana M. j. sem. anisi, baccar. lauri, nucis moschat. caryophyll. & cinnam. an. Drach. iij. flor. stœchad. schœnant. & rorism. ana P. j. Incidenda incidantur, & contundenda contundantur, vt artis est, includantur duobus sacculis interpunctis, qui macerentur in vino generoso, & applicentur regioni stomachi calidè vicissim.

℞. Ol. de absinthio de mentha & nardini, ana ℥. ss. ol. nucis moschat. ℥. ij. ligni aloës, macis, cinnam. ana ʒ. j. Cera parum, fiat linimentum. Quod præstantius euadet; si addideris olei caryophyll. gutt. vj. moschi & ambræ griseæ, ana gr. vij.

Linimentum ex ol. nucis moschat. & balsamo Peruuiano; vel ex oleo absinth. mastic. & balsamo Peruuiano.

℞. Massæ emplastri de mastiche ℥. j. pulu. aromat. rosat. ℥. j. ol. nucis moschat. q. s. Fiat emplastr. scutiforme; applicandum regioni stomachi.

Crato sequens emplastrum miris laudibus effert.

℞. Ladani ℥. ij. cera ℥. iv. olei nucis moschat. ℥. iij. Fiat emplastri massa ad vsu.

Admonet Galen. 7. meth. huiusmodi emplastra diutius non esse in parte detinenda, quia tandem calorem dissoluunt.

Multi practici huiusmodi remedia admovent, non solum parti anteriori supra cartilagine m xiphoidem; sed

fed etiam posteriori supra 13. vertebram, quia orificium ventriculi superius ad posteriora fertur. Attamen tantum est crassities vertebrarum, & musculorum eis subiectorum, ut vires medicamentorum eas partes penetrare nequeant, & ad ventriculum deferri.

℞. Rad. galangæ. & calami aromat. ana Drach. iij mastiches & caryophyll. ana Drach. ij. nuc. moschat. n. j. cort. citri sicci Vnc. s. sem. anisi Drach. j. s. Ex his contusis fiat sacculus interpunctus cum sindone rubra, & cotone moschato, perpetuo gestandus supra regionem stomachi.

Ad idem valde laudantur pelles vulturis præparatæ, & supra regionem ventriculi gestatæ: earum defecto pellis leporis, aut pannus scarlatinus usurpari poterit.

## C A P V T II.

### De Fame canina.

**C**um superiori capite de appetentia imminuta, & abolita actum sit, ordinis ratio postulat, ut depravata explicetur. Depravatur autem appetentia duobus modis; quando scilicet vel quantitate, vel qualitate peccat. Quantitate peccat dum maiori copia alimenta expetuntur quam naturalis ordo requirit, & ille affectus *βυλιμία* seu fames canina nominatur, qualitate vero, cum cibi absurdi, aut ea quæ extra rationem alimentum sunt, expetuntur; & pica seu *πίστα* appellatur. De priori hoc capite, de altero vero capite sequenti agendum est.

Nomen igitur *βυλιμία* dicitur & βύ βυλίου deducitur, quis βυ particula aliis vocibus addita significationem auget, ac si *βυλιμία* magnitudini conferatur. Vocatur

etiam *παγιδαινα*, quod nomen vlceribus quoque tribuitur, quæ carnem exedunt, & continuū incrementum capiunt; eaque idēdo autores vlcera *παγιδαινα*, id est depascentia nominant. Fames etiam canina nominatur, quoniam sic affecti vehementi appetitu canum more in cibos feruntur.

Notandum autem est hæc duo nomina, nempe boulimiam, & famem caninam interdum confundi, & pro vno & eodem vsurpari: interdum verò distingui, & famem canina dicatur, quando post nimium assumptum alimentum vomitus consequitur: & ita ægroti canum more afficiantur, qui cibos nimia quantitate assumptos, vomitu reiicere solent. Quibusdam tamen alui fluxus potius quàm vomitus accidit, natura copiam illā alimenti, quam ventriculus concoquere non potest, per aluum detrudente. In boulimia verò vomitus non accidit, sed eam interdum lypothymia comitatur. Sunt etiam quidam, qui infatiabili illo comedendi desiderio premuntur, non tamen vomunt, nec alui fluxu tenentur; sed omnes cibos ingestos probè concoquunt, & nisi mox alium sumant, malè habent. Quemadmodum narrat Sennertus de quodam studioso, nigro corporis habitu prædito, qui non solum de die, sed noctu etiam comedebat; cibum tamen quem sumebat, sine vomitu concoquebat; imò verò cibus delicatis satiari nō poterat, sed crassos expetebat, vnde nec panem à pistoribus confectum, sed à rusticis in vicinis pagis emptum, vt solidiorem, comedebat; sæpè manè tempore æstiuo pastinacæ satiuæ radices tot quot sex nummis emuntur, crudas sine damno comedebat.

Ex his pater hunc affectum esse symptoma actionis deprauatæ, respectu quantitatis, quæ actio aucta nominatur, nempe appetentia modum naturalem excedens. Pars affecta præcipua est os ventriculi superius. Causa  
continens

continens est sensus ſuctionis & vellicationis vehemens & immodicus, appetitum ſubindè irritans.

Galenus 2. de ſympt. cauſ. cap. 7. cauſas huius affectus proximas ad duo genera reducit, his verbis. *Vitioſa appetentia, quæ modum in quantitate excedunt, vocanturque à quibuſdam canina, tum exiſtunt, cum vel acidus quiſpiam vitioſus ſuccus ventriculum mordet, vel totum corpus immodicè digeſtum inops alimenti redditur. Vitioſus namque ſuccus, qui frigidus eſt, ſimilem ſuctui morſum inferi; appetentiam verò prouocat naturalis affectus ſimilitudine.* Cauſa igitur proxima auctæ præter naturam appetentiæ, iuxta Galeni mentem, eſt primò humor vitioſus & frigidus in ventriculo hærens, ſecundò alimenti indigentia ob nimiam digeſtionem.

Humores vitioſi in ventriculo hærentes famem immodicam excitat, quatenùs nimia ſua frigiditate, acciditate & auſteritate oriſcium ventriculi conſtringunt, corrugant ac vellicant, adeoque ſenſum naturali ſuctioni ſimilem, & ſpuriam famem inferunt. Talis humor eſt, vel pituita acida in ventriculo reſtagnans, vel vt plurimum melancholia à liene in ventriculum transfuſa, quæ in ſtatu naturali exiſtens, & moderata quantitate, & qualitate prædita, naturalem & moderatam excitat appetentiam; ſi verò præter naturam ſe habeat, & in prædictis excedat, eam intenſiorem ac præternaturalem efficit.

Alimenti indigentia, ob quam venæ continuò ex ventriculo ſugunt, vel à nimiiſ oritur euacuationibus, per hæmorrhagiam, alui fluxum, vomitum, ſudorem & ſimilia; vel ex nimia ſubſtantiæ alimentariæ conſumptione, ob calorem partium immoderatum; aut humorum tenuitatem, corporis raritatem, & pororum laxitatem, vigilias, balnea, exercitia im-

modica, venerem effœnatam; quæ omnia humiditatem substantificam maximè dissoluunt; ab iisque facta inanitione, & alimenti penuria, cibus citiùs quàm debebat à ventriculo abripitur.

A lumbricis etiam chylum depascentibus potest fieri fames canina; quemadmodum refert Trallianus *lib. 7. cap. 4.* de quadam muliere boulimia laborante, quæ ab usu hieræ vermem duodecim cubitos longum excrevit, & liberata est.

Hermetici aliam huius stupendi appetitus causam statuunt; nempe spiritum quemdam dissoluentem in corpore genitum, qui insita proprietate quidquid ciborum ingeritur, tum promptè consumit, & resoluit, ut legitimum & necessarium nutritioni terminum naturæ non concedat. Hunc spiritum vocant famelicum, esurinum, voracem, salinum, acidum, & vitriolatum. Quemadmodum enim, inquiunt, ex variis salibus, vitriolo, sale communi, ammoniaco, & similibus, spiritus seu liquores, quos aquas fortes vocant, arte chymica eliciuntur, qui lapides durissimos, & durissima metalla, brevi temporis spatio in liquorem resoluunt; ita ut aurum, quod ne igne quidem fortissimo intra mensis spatium dissolui potest, attamen intra horæ quadrantem in aqua regia solvatur, & in liquorem aquæ ipsi persimilem conuertatur.

Hæc doctrina diligenti examine digna est. Sicut enim digestio ventriculi naturaliter se habens sedulis rerum naturalium indagatoribus quippiam mirabile, & stupendum ostentare videtur: sic eadem immoderata & præternaturalis reddita, quippiam habet admiratione dignissimum. Hoc autem admirabile est in digestionem ventriculi naturali; quod cibi durissimi in eo dissolvantur,

tur, & trium vel quatuor horarum spatio in liquorem chylosum cōuertātur, ita tenuem, vt per angustissimos venarum lactearum ramos transcolari, ac veluti filtrari valeant : quod canes ossa durissima in eundem liquorem conuertant; hoc certè calori intensiori validè concoquenti tribui non potest, cūm cibi in olla, igne quantumuis luculēto, intra 24. horas ac plures dies in similem succum conuerti nequeant. Dicunt Galenici à facultate vetriculi illud depēdere. Sed facultas non agit sine instrumento, quod etiam assignatur idiosyncrasia partis; quæ tamen idiosyncrasia, si est certa primarum qualitatum proportio, vt vulgò circumfertur, præcipua illius actio erit à calore, frigiditas enim, humiditas & siccitas, nihil faciunt ad eximiam illam ciborum liquationē, calor autem, vt dictum est, non habet illam efficaciam. Est igitur illa idiosyncrasia, aliquid aliud ignotum & inexplicabile. Liceat ergo illud inquirere per ea quæ fiunt in macrosmo, quorum analogia quædā esse potest in microcosmo. Et idē dicunt Hermetici acutiores, spirituum quemdā seu liquorem acidum transfundi à liene in ventriculum, qui solidiora alimenta dissoluit, & in liquorem chylosum breui tempore conuertit; ita vt spiritus ille seu liquor acidus sit præcipuum digestionis instrumentum. Et quædam huius rei coniectura ex eo elici potest, quòd aues, quæ durissima alimenta conficiunt, lienem habeant, ventriculum vndiquaque ambientem, caro enim illa quæ ventriculis auium circumducta reperitur, lienis substantiam omninò repræsentat; vndē nobiliorē lienī vsum tribuunt, quā qui ab antiquis est traditus, qui eum solummodò limosæ sanguinis parti expurgandæ dicatum censuerunt; cūm alimentorum concoctioni, iuxta nouam hanc doctrinam, maximè inferuiat.



inferuiat. Si igitur spiritus aut liquor ille acidus à liene promanans naturaliter se habens, digestionem naturalem & moderatam perficiat; ille idem spiritus à naturali statu deiectus, & vitiosus redditus, acutior nempè & nimia dissoluendi vi præditus, solida alimenta promptiùs liquabit & conficiet; iisque dissolutis & à ventriculo confestim deturbatis, noua fames, eaque immodica exurget. Nouam hanc doctrinam certam & indubiam non statuimus, sed eam tantùm proponimus, vt à solidioribus ingeniis sedulò examinetur. Eamque inferiùs iterùm discutiemus, dum læsæ concoctionis causas inquiremus.

Signa huius affectus diagnostica satis manifesta sunt. Per se enim ægotantibus & astantibus apparet appetentia deprauata & excedens, quæ plures cibos assumere cogit; qui tamen postmodum nimium grauantes per vomitum reiciuntur, & est fames canina; vel si vomitus non subsequatur, animi deliquium adest cum extremorum refrigeratione, & tunc est boulimia.

Signa causarum ex antecedentibus, comitantibus, & consequentibus, facile desumi possunt. Frigida, intemperiei & humorum acidorum in ventriculo restagnantium signa sunt, ructus & vomitus acidi deiectiones crudæ, sitis carentia, & causæ externæ refrigerantes prægressæ. Si à defectu alimenti dependeat, ægri emaciantur, & causæ humiditates corporis dissoluentes adsunt, vel præcesserunt, ac denique lumbricorum signa ex proprio capite erunt desumenda.

Prognosis huius affectus ita instituenda est, vt si à causis externis omninò dependeat, periculosus non sit; modò illæ cito auferantur, à lumbricis etiam oriundus parùm infert periculi, quia illis sublatis affectus etiam tollitur.

Maximè

Maximè autem periculosus est , si ingentes euacuationes , aut colliquationes corporis consequatur ; præcipuè si post ingestum alimentum , & ventriculo adhuc pleno existente , animi deliquia contingant , quando enim ea quæ maximè iuuare debent , inutilia existunt , magnam significant ventriculi atoniam

Sic etiam canina appetentia , cum vomitu aut crebra deiectione perseverans periculosa est , in cachexiam enim , hydropem , lenteriam , marcores , aliosque lethales affectus degenerare solet.

Quod ad curationem spectat , quia ut plurimum fames canina ab humoribus melancholicis aut pituitosis , ventriculi tunicis impactis , & imbibitis , ducit originem : ad eos præsertim remedia dirigenda sunt , quæ tum humoris peccantis euacuationem & alterationem ; tum partis laborantis roborationem respicient.

Euacuatio instituenda est per vomitum , vel secesum , remediis suprà in curatione inappetentiæ à frigida causa ortæ propositis. Licèt enim hi duo affectus inuicem contrarij sint , ab iisdem tamen humoribus , sed frigiditatis gradu & secundis qualitatibus , admodum diuersis , ac ventriculum diuersimodè afficientibus produci solent.

Remedia etiam ventriculum calefacientia & roborantia , tam interna , quàm externa , ibidem proposita , maximè conueniunt. Quæ non solum conferunt frigidam intemperiem corrigendo , sed etiam exsiccando & sitim inducendo. At urgente siti fames imminuitur.

Præterea vinum meracum satis copiosè sumptum famè potentissimè resoluit , iuxta Aph. Hipp. 2 1. *sed.* 2. Idque potentiùs adhuc præstat illius spiritus , aqua vi-

tæ

tæ vulgò nuncupatus.

Famen illam peculiariter obtundunt , quæ ventriculū potenter humectant & relaxant , humorisque aciditatem leniunt. Qualia sunt pingua omnia , & oleaginosa , vt adipēs , olea , extremitates animalium. Quemadmodum Villanouanus refert , quendam hoc affectu percitum , panem calentem , amurcā olei imbutum , comedisse : & mulierem bouis liquatum adipem , cum pari calentis olei quantitate , duabus vicibus bibisse , & in tantum cibi fastidium vtrumque incidisse , vt nihil per quinque dies comederint , & à priori affectu liberati sint.

Narcotica medicamenta sensum ventriculi nimis exquisitum obtundendo , famem illam caninam possunt imminuere. Et inter alia theriaca recens magis ex vsu est. Quia præter vim narcoticam , humorum etiam malignam qualitatem , quæ à nonnullis in hoc affectu subesse creditur , virtute alexiteriâ corrigere valet.

Quia verò narcotica rarò , & non nisi summā urgente necessitate vsurpanda sunt ; aliis temporibus theriaca antiqua , propter rationem dictam , tum etiam roborationis causā erit vsurpanda.

Ambra grisea ad gr. v. vel vj. cum ouo sorbili sumpta , non solū ventriculū roborat , sed etiam proprietate specificā huic affectui prodesse creditur.

## CAPVT III.

*De pica & malacia.*

**P**ica & malacia est appetitus deprauatus quo agrotantes res absurdas, inutiles, & noxias appetere consueuerunt.

*Kirila*, siue pica nominatur, à pica aue, siue ob varietatem coloris quo donata est, siue quòd terræ globos esitat; mulieres autem hoc affectu laborantes, terram, gypsum, & similia, plerumque comedere solent. Malacia etiam ex Plinio appellatur; quia mulieres huiusmodi, præ animi impotentia, & mollicie, à recto & naturali alimentorum appetitu deficiunt.

Producitur hic affectus à prauis & certo modo corruptis humoribus, quì in ventriculo ob læsam illius coctionem colliguntur, vel ab aliis partibus in eum transferuntur.

Ad horum autem humorum productionem maxime disposita sunt corpora pituitosa, & melancholica, præsertim vero mulieres, quibus hic affectus proprius & peculiaris esse videtur; quamuis pueri interdum, imò etiam viri, sed rariùs, eo affligantur. Ad hanc rem maximè faciunt, prauorum eduliorum vsus, suppressa aliqua euacuatio naturalis, præcipuè menstruorum, animi mœrores, hepatis & lienis intemperies, obstructions & imbecillitates, vteri affectus varij & similia.

Illi autem humores vitiosi pro variis intemperierum, aliarumque dispositionum gradibus, variam & dissimilem naturam obtinent, vnde variæ rerum absurdarum appetentiæ oriuntur. Cum enim huiusmodi hu-  
mores

mores alias crudi & incocti , alias exusti & præassati existant; sic quorundam appetitus ad res acidas, austeras, acerbis & valde frigidas feruntur, ita ut fructuum immaturorum , aceti , omphacij, succi limonum, granatorum , & arantiorum , aquæ frigida , niuis , glaciæ , & similibus usu assiduo & copioso delectentur: alij terrea , sicca, & exusta appetunt, ut garyophyllos, cinamomum, nucem moschatam aliaque aromata, sal, cineres, gypsum, & similia.

Familiaris est hic appetitus virginibus; chlorosi laborantibus , & grauidis mulieribus ob suppressionem menstruum , quæ in corpore moram trahentia , vitiosam induunt qualitatem , ad partes superiores delata , ventriculum inficiunt prauo illo succo , à quo actiones illius deprauantur , & appetitus in primis statu naturali maximè deiicitur. Pueri interdum hoc affectu detinentur , præcipue qui à matre chlorosi laborante oriundi sunt. Neque viri ab eo omnino immunes sunt , quamuis rarius id contingat , & præsertim illi obnoxij sunt, qui melancholico temperamento præditi sunt , obstructionibus laborant , aut fluxus hæmorrhoidum consueti suppressionem patiuntur.

Apud autores maximè controuertitur an appetitus deprauatus feratur ad ea quæ diathesi ventriculi præternaturali similia sunt , an verò ad contraria. Dubitandi ansam dedit Gal. cap. 3. *artis parua* , ubi docet ventriculum præternaturam se habentem appetere contraria , & in statu naturali appetere similia. Quam doctrinam sequutus Auic. *fen. 13. lib. 3. tract. 2. cap. 10.* sic loquitur. *Quando in stomacho aggregatur humor malus diuersus à consueti in qualitate sua natura , tunc requirit aliquid sibi contrarium. Quapropter incidit quibusdam appetitus huius , imò carbonum , & terra , & gypsi &*  
*rethm*

rerum huius generis; propter qualitatem qua iis est, excitantem, aut incidentem, contrariam qualitati humorum, Saniorum tamen iudiciū eò dirigitur, vt similia potius quàm contraria appetantur. Cum enim ad appetentiam excitandā phantasia maximè concurrat, quæ à dispositione corporis maximè excitatur verisimile est dominantem humorem ad similiū appetitum phantasiam mouere. Sicut enim biliosi in statum sano tum morbofo, ignis, & itarum insomnia patiuntur; pituitosi, niui, glaciei & aquarum: quarum rerum phantasmatum ab humore in corpore prædominante excitantur, sic etiam affecta sede appetentiæ humores vitiosi in ea diu stagnantes, sui speciem phantasie imprimunt, quæ ab ea obsessā, similiū appetentiam excitat, etiam ratione repugnāre, quæ à vehementi illa imaginationis vi superatur. Adde quod si contraria morbo aut illius causæ appeterentur, continuato illorum usu, morbus tādē curaretur, cū tamen ab iis deterior in dies reddatur. Huic sententiæ quotidiana experientia suffragari videtur, qua docetur virgines chlorosi laborantes, & prægnantes mulieres ea plerumque appetere, quæ illarum temperamento & præsentī caco-chymie consentanea sunt; vt scilicet illæ quibus falsi & adusti insunt humores, carbones, salem, aromata, & similia expetant: quibus verò melancholia, aut acida pituita dominatur, ad acetum, fructus immaturos, & similia ferantur.

Quod ad Galeni auctoritatem spectat, quidam penitus eam reijciunt, dicentes quod si verum esset morbofas dispositiones cōtraria appetere, ægrotantes omnes conualescentes, & reliqui caco-chymia laborantes, cibos euchymos expeterēt, quod tamen veritati non est consentaneum. Videmus enim sæ-

pè ægrotantes & conualescentes prauos cibos appetere, laudabiles verò respuere. Videmus etiam corpora excalefacta siue in statu præternaturali, vt in febribus, siue in naturali, vt per exercitia immodica, refrigerationem expetere.

Alij verò hanc Galeni sententiam cõciliare nituntur dicentes, in pica intèperiem ventriculo impressam esse veluti habitualem & connaturalem, & ided facere appetentiam similem naturali, quæ est ad similia. Quod in hunc modum explicari potest, dicẽdo, omnem temperiem naturalem appetere similia: præternaturalem verò contraria; intelligendum esse, postremum de intèperiebus, quæ fiũt sine succi redundantia. Quæ enim sunt cum succi redundantia quando succi admodum imbibiti sunt in tunicis vètriculi, appetũt potiùs ipsis succis, quibus mader, similia, quia humor qui totas tunicas iam penetrat, quamuis noxius sit, molestiam non infert. Contra verò quando humor partẽ tantum aliquã ventriculi occupat, vel est solùm in cauitate, ventriculus appetit contrarium ei quod sibi noxium est. Si autem humor totum ventriculum occupet, illiusque tunicis imbibitus sit, tunc facultas illius naturalis obruitur, & ita immutatur, vt non appetat nisi similia humori imbibito. Et ita rectè dici potest, illum humorem factum fuisse veluti connaturalem.

Platerus & Sennertus ab hisce difficultatibus facile se expediunt, ad qualitatem occultam confugientes; huiusque perfugij occasionem quærunt, ex eo quòd si huiusmodi ægrotantes appeterent similia causæ morbificæ, ex eorum vfu copioso maximè augetetur affectus, cum tamen videamus si à laborantes, gypso, calce, carbonibus, aliisque rebus noxiosissimis sese ingurgitare, ex iisque leuissimam

noxam

noxam percipere, à quibus benè sani ad internecionem vsque læderentur. Præterea dicunt prægnantes mulieres humores falsos & acidos læpè, reiicere cùm tamen falsa & acida non appetant, sed toto genere diuersa. Ac denique nullà esse inter carbones, calcè, carnes crudas, aliaque, cum humoribus conuenientià constanter asseuerât, atque adedò in qualitatibus manifestis non esse acquiescendum cèsent, ex iisque symptomatis huius, & appetentiæ mirabilis causam desumi non posse: sed ad qualitatem quandam occultam & inexplicabilem esse confugiendum.

Fatetur tamen Sennertus probabile esse à simili potius quàm contraria qualitate appetentiàm istam deprauatam prouenire. Quænam verò sit, illa qualitas, explicari non posse, cùm res quæ appetuntur nullam humoribus, vel dulcibus vel falsis, vel acidis, in manifestis qualitatibus vt plurimùm conuenientiam habeant.

Hæc omnia conciliare possumus dicentes, rerum absurdarum appetentiàm ab humoribus simili naturâ & temperie præditis excitari, sed illos humores, præter natiuam temperiem, vitio quodam peculiari è corruptela quadam oriundo, esse præditos, quod vitium eum disertè explicari nequeat, ad qualitatem occultam reuocari potest.

Diagnosìs huius affectus per se satis facilis est; ex sola enim ægrotantis relatione innotescit. Parrem præcipuè affectâ esse orificiũ ventriculi notissimum est, cùm illud sit sedes appetentiæ. Causa etiam ex supposita similium appetentiâ, coniecturâ indagari potest. Si enim appetant carbones, salem & similia colligere possumus, ab humoribus falsis, & exustis affectum dependere: quæ omnia clarius innotescēt, humorum prædictorum portio per vomitũ vel al-



uum reiiciatur; si ructus acidi, vel nidorosi, sapor amarus, acidus, vel salinus adfuerit.

Quod ad prognosim spectat, chronicus est iste affectus, non tamen admodum periculosus, si natura vel arte corpus ad pristinum statum reuocetur, quod non valde difficile contingit. Excluditur enim sæpè successu temporis humor noxius crebris vomitionibus vel medicamentis conuenientibus euacuatur, & suppressæ mensium aut hæmorrhoidum euacuationes quæ huic malo ansam præbebant, cum tempore restituntur. Quæ tamen si negligantur, & natura oneri succumbat grauissimi morbi succedere possunt. Vitiatâ enim prima cōctione, necesse est secundâ & tertiam corrumpi, vnde graues obstructiones, cachexiæ & hydropes contingunt. Vel etiam si humor maiori copia in ventriculum feratur, & maioris malignitatis particeps sit, cardialgias insignes interdum producit, ex quibus lipothymia & syncope, & nonnunquam mors succedere solet.

Si mulieres hoc affectu laborantes ab eduliis prauis abstinere incipiant, & laudabilibus uti cum minori fastidio, proximæ salutis, & curationis incipientis signum est certissimum.

Grauidæ mulieres à malacia ut plurimum liberari solent, circa quartum gestationis mensem, quia fœtus grandior factus, maiorem humorum copiam absumit, & ipsa mater crebris vomitionibus istam illuuiem exclusit. Quod si malum vlteriùs progrediatur, periculosum est. Significat enim altius impressam fuisse prauam istam diathesim, quæ difficili negotio exterminari valeat.

Melius est hoc affectu laborantes, acida & acuta appetere; peius si res planè à natura alienas exoptent, ut docet Auic. *fen. 13. lib. 2. tract. 2. cap. 20.*

Maiorem

Maiorem enim significat à statu naturali recessum, qui difficiliùs emendari valeat.

Curatio huius affectus varia instituenda est, pro varietate corporum ægrotantium.

In gravidis enim mulieribus pauca celebrantur remedia, ob subiecti ineptitudinem; & abortus periculum, In illis tamen leuiora vîsurpari possunt, & benigniora, ex iis quæ ad ventriculum euacuandum, & roborandum in curatione inappetentiæ fuere proposita. Neque omittenda erit venæ sectio, quæ parçâ manu celebrata, & frequenter, ( si opus fuerit,) repetita maximum ad huius affectus curationem momentum habet.

In virginibus autem chlorosi laborantibus curatur iste affectus iisdem remediis, quæ ad ipsius chlorosis curationem suo loco proponuntur.

Quæ verò pica contingit in viris, quod tamen rarissimum est, cùm ab obstructionibus hepatis, & lienis dependeat, earum curatione suis locis proponendâ eliminabitur.

## C A P V T I V.

### *De Siti morboſa.*

**S**itis seu potus appetentia non minùs ac fames tripliciter lædi potest, imminutè, abolitè, & depravatè. Imminuitur non rarò à dulci & insipido humore, ventriculi tunicas irrigante, vel ab humiditate nimia in toto corpore dominante, vnde fit vt partes potulentam materiam à ventriculo non trahant. Aboletur verò in morbis acutis propter intercessionem primi sensorij, quando mens ægrotat, aut quia concidit omninò facultas naturalis, extincto propemodum calore natiuo, vnde Hippo-

erat. *In causa sitisera non sitire, malum;* cum tamen sitis imminuta ab iisdē causis pendeat; à quibus inappetentia ciborū producitur. Abolita verò morborū acutorum sit confectaria; earum ratio peculiaris hūc habenda non est. Sed sufficiet nobis de siti prauata, tanquam frequentiori specialius agere. Quæ quidem sitis deprauata etiam bifariam diuidi potest, quemadmodum fames, vt vna potulentorum varia genera feratur; altera verò sit aucta, & potus quantitatem, ac frequentiam respiciens. Quæ potus genera absurda respicit, ad picam refertur, quando scilicet ægrotantes appetunt acetum, succum limonum, vel aquam salſam. Superest igitur vt sitimauctam contemplemur, quod symptoma frequentissimum esse consuevit, dum appetitus humidi quantitate peccat, & potus immodicè expetitur.

Causa illius proxima est defectus alimenti humidi, & siccitas ventriculi, aliarumque partium quæ stomacho penuriam suam communicare valent.

Illa autem siccitas, vel humoris penuria exoriri solet ab omnibus iis quæ roridam humiditatem ventriculi totiusque corporis abſumere, & exſiccare valent; quæ omnia ad caleſcientia & exſiccantia referuntur. Exſiccantia per se, & primario exſiccant caleſcientia ſecundariò, humidum abſorbendo.

Est autem sitis hæc morboſa idiopathica vel sympathica. Idiopathica fit, cum innata ventriculi humiditas alteratur, & exhauritur ab inæquali intemperie ſicca, vel calida, vel vtraque; interdum & rariùs ſimplici; frequentius cū materia coniuncta: cum humore ſcilicet, acri, ſalſo, aur putrido, ventriculi tunicis impacto, vel in illius cavitare incluſo. Sympathica verò fit ex conſenſu totius corporis, vel ali-

qua

quarum partium, quarum venæ exhausto humido, à ventriculo sugunt : vt in febribus contingit, hepatis, pulmonis & aliarum partium inflammationibus; tum etiam intemperiebus calidis, & siccis, præcipuè renum, vt videre est in diabete, quæ eo nomine displacus nominatur, propter sitim ingentem, quæ illam comitatur.

Causæ externæ sunt quæcunque impensè calefacere vel exsiccare valent, vt aër valdè calidus & siccus, diuturna in sole vel ad ignem mora, vsus ciborum salforum acrium, & aromatibus conditorum, vsus copiosus vini antiqui, & generosi, vigiliæ nimia, nimia corporis euacuatio, præcipuè per medicamenta purgantia.

Hermetici sitim immodicam & præternaturalem à spiritibus quibusdam sitibundis, ex impuritatibus sulphureis genitis, exoriri contendunt, qui non simplici refrigeratione & humectatione, sed spiritibus aliis sibi analogis satiari volunt, quemadmodum videmus in febrium accessionibus sitim intensam multo aquæ potu parum inhiberi; quæ tamen spiritus acidis vitrioli, sulphuris, salis, & similium cum longè minori aquæ quantitate permixtis, faciliùs cedat.

Diagnosis nihil habet difficile, satis enim ægri de siti urgente conqueruntur. Causæ etiam propriis signis dignoscuntur, vt calida, & sicca intemperies ventriculo, aut alijs partibus inhærescens; tum humores acres, salsi, vel amari, quorum portio interdum excluditur, vel saltem similes saporès in ore repræsentant. Si in ventriculo contineantur, vel si per consensum aliarum partium sitis excitetur, affectuum eorundem signa sese prædent.

Quod ad prognosin attinet, sitis quæ à causis

procatarcticis excitatur tutissima est; illa enim potu assumpto facile sedatur. Quæ verò à causis internis procedit, pro illarum varietate, magis vel minus periculosa existit.

Sitis quæ in febribus contingit aliisque affectibus curatu facilibus, cum eorum solutione spontè evanescit. Si verò à grauibus morbis & periculosis dependeat, est valdè periculosa; vt in hydropè contingit, in quo sitis potu non sedatur, sed potius magis intenditur.

Curatio sitis morbosæ frequentius occurrit in febribus, & quarumdam partium inflammationibus, quæ tamen sufficienter descripta est in methodo nostra curandarum fabrium *sect. 2. cap. 2.*

Si verò sitis à sicca ventriculi intemperie ex immoderatis euacuationibus, aliisque causis contracta sit, illius curatio perficitur vacuationes illas supprimendo, tum partes inanitas restaurandos remediis humectantibus.

Instituto igitur priùs victu analeptico, qualis in febre hectica, phthisi, & marasmo concedi solet; omnium præstantissima erunt duo remedia à Galen. proposita 7. meth. scilicet lac, & balneum. Quamuis enim Hippocr. *Aphorism. 64. sect. 3.* lac siti culosis interdicit; illud tamen intelligendum est de iis, qui ob biliosi, putridique humoris copiam, siti afficiuntur, in quibus lac facillimè corrumpitur; non de iis, qui siti ex siccitate, & consumptione laborant. Lactis vsum in curatione phthiseos edocuius.

Balneum verò fiat ex decocto rad. althææ, & liliæ. fol. malvæ, violariæ; vel ex decocto capitis, pedum & intestinorum veruccis. Aut butyrum recens, vel oleum violaceum in aqua tepida dissoluatur. pro balneo

balneo, quod tepidum esse debet, & frequenter vsurpari.

In exitu balnei inungantur lumbi, dorsum, & ventribulus ol. violac. medullâ cruris vituli, & similibus; quibus immisceatur lactis muliebris, aut caprilli, quantum cibere poterit.

Vtatur interea æger syrupis, & tabellis instantibus, aliisque remediis, quæ in febris hæcticæ curatione latius proponentur.

Sequens etiam opiata erit vtilissima.

℞. Conseruæ rad. eryngij & buglossi, ana ℥. ij. confer. flor. violar. & borrag. an. ℥. j. confect. alker-  
nies ℥. ss. diapenidij sine speciebus recenter præpa-  
rati ℥. ij. Cum syrupo de pomis redol. fiat opiata, de  
qua capiat ad magnitudinem castaneæ sitis tempo-  
re, superbibendo parum aquæ borraginis.

## C A P V T V.

### De Ventriculi concoctione laesa.

**V**entriculi concoctio chylosis appellata, quem-  
admodum, & reliquæ omnium partium actio-  
nes, tripliciter læditur, imminutè, abolitè & depra-  
natè, Imminuta concoctio *βραδυρεσία* dicitur; abo-  
lita *ἀναρσία*, deprauata *δυσρεσία*; quæ omnes diffe-  
rentiæ vnico cruditatis nomine comprehenduntur.  
Hæc autem cruditas duplex constituitur, nidorosa  
scilicet, & acida; cruditas nidorosa fit quando ali-  
mentum in nidorosam, & vltam quasi materiam  
mutatur, vt per eructationem odor ouorum, & pis-  
cium corruptorum, vel olei frixi efferatur; qui ru-  
ctus nidorosi in calidis, ac biliosis naturis frequen-  
tius contingunt. Acida verò cruditas fit, cum cibi in  
acidam naturam mutantur, & ructus acidi exclu-

N n 5 duntur

duntur, & hæc à frigida intemperie procedit. His & tertia addi potest cruditatis differentia, quando ob calorem debilem cibus imperfectè coquitur, & in pituitosam quandam materiam mutatur, citra tamen aciditatem.

Causæ ventriculi concoctione lædentes, ad tria capita reduci possunt, vitiū scilicet organi, obiecti, & rerum externarum, seu extrinsecus aduenientium.

Organi vitium omnes ventriculi morbos completur, siue similes sint, siue organici, siue cōmunes, qui omnes illius actione euertere possunt. Intemperies tamē frequentissima est læsæ cōcoctionis causa. Cū enim cōcoctio à moderato calore rectè & secundum naturam se habente, perficiatur, si ille à debita moderatione recesserit, coctionis læsio cōtingit. Sic frigida ventriculi intemperies, quæ caloris imminutionem facit, si remissior fuerit, cōcoctionem imminuit, bradypepsiam parit. Si vero intensior, concoctionem abolitam, & apepsiam producit. Calida verò intemperies concoctionem deprauat, & dyspepsiam generat. Illæ autem intemperies interdum simplices sunt, ut in iis qui abortu calore debili, & ventriculi imbecillitate præditi sunt; vel calorem acrem & exurentem obtinuerunt, vel plurimum autem cum materia cōiunctæ; vnde in melancholia hypochondriaca, pituitæ copia, & fermentatio nigri humoris, cruditates, flatus, inflationes, fluctuationes, ructusque acidos excitari solent.

Vitium obiecti, alimenti scilicet, quod est ventriculi proprium obiectum, multis modis contingit, dum scilicet peccat in substantiâ, quantitate, qualitate, tempore, & ordine assumendi.

Vitiosa sunt alimenta ratione substantiæ, quæ duriora sunt & concoctu difficiliora, ut carnes cervinæ,

næ, leporinæ, præcipuè vetuſtiores, ſale vel fumo induratæ, panis furfuraceus, tubera, radices, legumina, & ſimilia, quæ dyſpepra nominantur.

Quantitate peccant alimenta, quæ nimia copiâ aſſumuntur, & eo nomine à calore vinci & ſuperari nequeunt, vnde cruditates oriuntur, illis maximè familiares, qui genio & crapulæ indulgent. Minor etiam quàm par ſit alimenti quantitas, ſpeciem quandam cruditatis inducere poteſt, quando cibi pauciores, in ventriculo, (in primis bilioſo) exuruntur & præaſſantur.

Qualitate peccant alimenta, quæ nimis frigida & humida, flatuoſaque exiſtunt: vel quæ calidiora tenuiorem chyli portionem exurunt, & in nidoſos vapores conuertunt.

Ad hoc genus reducenda eſt concoquendi & condiendi ratio, varij enim elixandi, aſſandi, & condimentorum modi, nouas alimentis diſpoſitiones inducunt, propter quas concoctu facilia, vel diſcilia redduntur.

Tempus & ordo aſſumendi præpoſterus concoctionem etiam vitare poſſunt; vt ſi quis horam cibandi conſuetam omittens nocte intempeſtâ, & immediate ante ſomnum cibus ſtomachum repleat: vel ſi poſt ſolidorum & aſtringentium, vt caſci, pyrorum cydoniorum, & ſimilium aſſumptionem, liquida poſtmodum, & corruptioni obnoxia ingerat.

Res denique externæ coctionem vitare poſſunt, ſi immoderatæ ſint: atque ita aër frigidior, calorem natiuum obtundendo, ſi debilior fuerit, vel calidior, eundem calorem diſſipando, coctionem euertere poteſt; tum etiam exercitationes immodicæ, præſertim à paſtu, calorem natiuum eliciendo à ventriculo ad partes exteriores eūque præter modum diſſipan



dissipando, nec non chylum adhuc imperfectum præcipitando versùs intestina. Alui & aliorum excrementorum suppressio, aut fluxus immodicus; vigiliæ immoderatæ, somnus diurnus, animi pathemata grauiora, præcipuè inæror, & profunda meditatio statim à pastu & similes causæ externæ, ventriculi actionem non parùm vitare possunt.

Præter causas enumeratas Hermetici nonnulli recentiores aliam adducunt minùs tritam, & ab antiquis minimè perspectâ; quæ quidem ab iis perspicuè non demonstratur; quibusdam tamen coniecturis minimè contemnendis stabilitur; cuius etiam suprâ in famis caninæ causis explicandis mentionem fecimus. Primùm itaque statuunt coctionem ventriculi naturalem à solo calore non perfici; sed promptam illam ciborum solidorum liquationem, ac dissolutionem, qua in chylum conuertuntur, ab alia causa dependere; cum experientia doceat cibos in ollas bullientes igne luculento, etiam per plures dies continuato, nūquam talem dissolutionem pati, cum tamen ossa in ventriculis canum, breui temporis spatio dissoluantur, & in chylosum liquorem conuertantur: cū in ventriculis piscium nullo calore actuali præditis, cibi quilibet ingesti, eodem modo dissoluantur & concoquantur. Causam itaque præcipuam huiusmodi liquationis esse statuunt spiritum quendam, aut liquorem acidum à liene in ventriculum transfusum, qui eximiam dissoluendi facultatem habeat. Quam sententiam ex Galenicorum doctrina eliciunt, qua sancitum est humorem melancholicum à liene in ventriculum trās fusum excitare apperentiam; idque vel constringendo, ac corrugando tunicam interiorem ventriculi; vel aciditate sua vellendo. Quod quidem impugnari potest ex eo quod  
fi

si constringendo id facere omnia adstringētia idem præstare possent; & si vellicando, acria quælibet potentiùs quàm acida appetentiam excitent. Probabilius igitur existimant humorem illum appetentiam excitare per accidēs, penuriam scilicet alimenti inferendo, per dissolutionem illius quod ingestū est; ex qua penuria appetitus excitatur. Atque ita longè nobiliorem leni vsum tribuunt, quàm qui ab antiquis fuit propositus; nempe ventriculo subministrandi præcipuum coctionis instrumentum. Huius rei coniectura satis valida ex auibus elicitur, quæ durissima plantarum semina dissolunt, & lenem habent ventriculo vndiquaque circumductum, ut potentiùs spiritum illum dissoluentem inspiret, vel liquorem acidum commodiùs communicet, Validum autem auibus inesse acidum illum spiritum ostendit Helmontius proprio experimento: refert enim se in pueritia cum passerē aleret, ipsi aliquando linguam obtulisse, quā ille rostro apprehendens deglutire conabatur: se verò linguæ apice passeris guttur contingentem, maximam in eo aciditatem percepisse. De spiritu verò dissolvente auium ventriculis in hærente probatur ex praxi medica, in qua gallinarum ventriculi ad iuuandum concoctionem passim præscribuntur in pulueribus digestiuis quos hunc affectum præstare credibile est, ciborum dissolutionem adiuuando, cum iidem gallinarum ventriculi calculosis etiam præscribantur, quibus calculorum dissolutio maximè iuuatur. Idque manifestiùs elicitur ex eo quod ex auium ventriculis sal elicitur maxima calculos dissoluendi efficacia præditum. Ex quo quidem sale ventriculis auium magna copia infixio, natura sagax & prouida spiritum elicere nouit in viuente animali, cuius adminiculo

culo ( concurrente calore nativo ) solidiorum alimentorum dissolutionem moliri possit. Et vulgò notissimum est ex salibus dissoluētibus, putà vitriolo, nitro, ammoniaco, & sale communi, spiritus elici, longè efficaciori dissoluendi vi præditos.

Ille igitur spiritus, seu liquor acidus à liene ni ventriculū transfusus, dum secūdum naturam se habet bonam ac laudabilem ciborum concoctionem efficit; si verò à statu naturali recedat, ventriculi actionē euertere potis est. Sicut antea dictum fuit ex hisce præsuppositis, caninam appetentiam excitari, quando spiritus ille seu liquor acidus nimia actiuitatem, & potentiorē dissoluendi vim obtinuit. Sic etiam ex aduerso, si vis illa dissoluens debilior efficiatur, aut omninò deficiat; coctio ventriculi imminuta, aut abolita sequetur. Hinc dicit Hermon-tius Aphorismum Hippocratis primum sect. 6. qui sic habet: *In longis fauitatibus intestinorum, si ructus acidus superueniat, qui prius non erat, signum bonum*, ita interpretandum esse; vt scilicet ructus acidus superueniens significet fermentum illud acidum, quod à morbo fuerat perditum, restitui incipere.

Fulciamus & nos nouam hanc doctrinam proprio experimento. Cum enim anno præterito 1648. alui fluxu pituitoso, & melancholico per quatuor menses integros, afflicti fuerimus, & ab eo ad extremam maciem, & veluti marcorem perducti; quandoquidem omnia alimenta in pituitosam & mucilaginosam substantiam conuertebantur, ex debilitate ventriculi ea perfectè concoquere nequeuntis; post multa remedia per totum illud tempus vsurpata, quorum maxima pars parum aut nihil profuit: tandem aceti acerrimi vsu frequenti, intra paucos dies, à sæuo illo affectu integrè liberati sumus: cuius equidem

equidem aceti vi, acidum illud naturale penè deperditum, plurimùm adiutum, ac restitutum fuisse coniecere possumus. Vñus autem aceti fuit in pastibus cum ovis induratus, quæ frustulatim dissecta, aceto intingebamus & per aliquot dies hoc solo edulio in omnibus pastibus utebamur. Tum hoc manifestè percipiebamus, quòd si acetũ non esset valdè acre, exiguum ventriculo adiumentum ferebat.

Diagnosis huius affectus iuxta læsæ coctionis differentias, varia est. Ac primùm apepsia, & brady-pepsia iisdem insignis indicantur, per magis & minùs tantùm differentibus. Illa autem signa sunt, ructus acidus, alimenti incocti, vel semicocti per os aut aluum reiectio; causæ ventriculum refrigerantes prægressæ; gravitas, tensio, & inflatio in regione stomachi; læsio à frigidis assumptis; urinæ tenues, aquosæ & decolores. Interdùm tamen urinæ crassæ & rubræ apparent, ex succo impuro ac sæculento, qui ob primæ coctionis imperfectionem, à chylo sufficienter separari non potuit, sed ad renes vsquè transmissus cum seroso humore, impuras etiam urinas reddit, quales interdùm à melancholicis præfertim, & scorbuticis excerni solent. Fusio rem huius urinæ explicationem vide apud Sennertum *lib. 3. præct. med. part. 8. sect. 2. cap. 7.* Dyspepsiam verò seu depravatam coctionem ostendunt, ructus nidorosi, sapor similis aut putredinosus in ore; sitis & æstuationis sensus; à calidis assumptis læsio.

Si idiopathicè ventriculus laboreat, propria eiusdè morbosæ dispositionis signa aderūt. Si verò sympathicè afficiatur, ex propriis partium affectarum signis, illa sympathia est elicienda. Si verò ex errore causarum externarum, vel obiecti vitio symptoma dependeat, ex earum præsentia aut prægressa constitutione,

tionem obtinet, quæ pro inappetentia à similibus causis oriunda fuit proposita, quàm hîc frustra repetere non opus est.

Si denique Hermeticorum causa peculiaris supra proposita animaduersione digna sit; illi prouidendum erit, primò lienis prauam diathesim corrigendo, & spiritus dissoluentes restituendo substantiâ quadam acidâ, cuius generis sût spiritus sulphuris, vitrioli, salis, succi limonũ, granatorum, arantiorum, & acetum.

## C A P V T VI.

### *De Singultu.*

**S**ingultus est motus ventriculi deprauatus, quo rem sibi noxiam expellere nititur.

A vomitu distinguuntur ex eo quòd materia quæ vomitu reicitur, in ventriculi cauitate continetur; & ille totus inuertitur, vt materiam illam excludat: in singultu verò materia peccans, tunicis eiusdem infixa est, ideò ventriculus sese constringit, ac fibras suas concutit, vt etiam excludat. Et vt nauseam quoque in hac definitione comprehendamus, dicimus motus ventriculi expulsiuos tripliciter fieri: vel enim natura quandoque vult insurgere ad expellendum, & non potest; aut non sufficienter ad hunc motum irritatur, & tunc nausea fit: aliquando insurgit, & expellit, & fit vomitus: vel denique insurgit, vt expellat, sed non potest expellere, & tunc fit singultus.

Ille autem motus conuulsius est, non autem vera conuulsio, quæ solis musculis competit, & partibus voluntario motu donatis.

Causæ singultus immediatæ proponuntur ab Hippocrate.

pocrate, *Aph.* 39 *sect.* 6. inanitio, & repletio, sicut & conuulsionis. Galenus & Auicenna tertiam addunt, nempe irritationem à materia acri. Alij anxie laborant, ut materiam irritatam ad repletionis genus trahant, quod sententiam Hippocratis illasam tueantur. Verum ubi res ipsa loquitur perspicue, non opus est rerum euidetias propter Autorum verba confundere & obscurare. Quod enim clarius est, quam singultum fieri à facultate expultrice irritata? Quæcunque igitur irritationem illam efficere possunt, erunt causæ proximæ singultus. Iam verò humores & vapores quantitate vel qualitate peccantes, ventriculum irritare possunt ad expulsionem, & sic repletio, & acrimonia sunt causæ diuersæ toto genere distinctæ. Inanitio verò quomodo singultum excitare possit, non est facile explicare. Cum enim illius essentia consistat in defectu, nemo dixerit, naturam insurgere ad defectum expellendum; quin potius mouebitur ad illum reficiendum ac reparandum; & sic attractricem potius, quàm expultricem facultatem mouebit. Si verò interdum singultus magnas euacuationes sequatur, ut in acutis, & malignis febribus, & purgatione ex helleboro contingit; id non euacuationi simpliciter tribuendum, sed potius malignæ cuidam qualitati à morbo, vel medicamento ventriculo impressæ.

Materia autem singultum efficiens, vel in ipso ventriculo colligitur, vel aliundè ab hepate, liene, intestinis, aliisque partibus, vel etiam toto corpore communicatur. Sic alimèta vel medicamenta acriora, humores acres, aut lumbrici mordentes in ventriculo contenti, singultum idiopathicum producant. Sympathicum vero inferunt vicinarum partium inflammationes transmissio ad ventriculum ichore, aut vapore acri: tum etià quodd tumor, hepate præsertim inflam-

mato:

maro, ventriculum comprimit, vnde facultas expultrix assidue irritatur. Denique à toto corpore possunt transferri ad ventriculum humores, vel vapores acres, in affectibus totum corpus occupantibus, ut interdum in febribus acutis & malignis contingit.

Diagnosis huius affectus per se conspicua est. Causæ verò signa ita distinguenda sunt, ut si idiopathicè contingat, affectus magis continuus sit, & humorum in ventriculo contentorum signa appareant; & affectio vomitu sedetur. Humor verò peccans in ventriculo collectus, vomitu, aut ructu, aut oris sapore, aliisque signis internosci poterit. Si denique ab aliterius cuiusdam partis morbo oriatur, eiusdem signa ex propriis capitibus erunt desumenda.

Quod ad prognosim attinet. Singultus qui à causa aliqua procatactica, ut cibo, potu, aut frigore exoritur, periculosus non est; tum etiam ille qui crism per vomitum interdum antecedit; sed tunc reliqua signa in bonum consentire, & salutaria esse debent.

Si quis in laboriosa febre singultiat, morbo laborat pessimo. Hippocrat. in *Coacis*. Fit enim ille singultus ab humoribus acris & malignis, tunicam ventriculi interiorem vellicantibus, & facultatem illius expultricem stimulantibus. Et dicit Vallesius se nullum vidisse servatum, in extenuatis, aut febre ardente, vel maligna correptis, cui singultus supervenerit. Sic apud Hippocr. 3. *Epid. sect. 2. Aeg. 12.* Mulier que in Mèdaciū foro habitabat, die 12. frequentes singultus patiebatur, & 14. interiit. Observavit etiam Platerus singultum in febribus ardentibus supervenientem, & perseverantem, plerumque mortis esse prænuntium, eundem etiam in dysenteria esse lethalem.

A vomitu singultus, & oculorum rubor, malum, Hippocr. *Aph. 3. sect. 7.* duo hæc signa si vomitui super-

eniant in morbis acutis, & ad aliquod tempus perseverent, idè lethalia habenda sunt, quia inflammationem cerebri, aut ventriculi denuntiant; quæ inflammatio non modò ipsius singultus ac ruboris oculorum causa sit; sed etiã vomitus. Si enim vomitus citaretur ab acris humoribus os ventriculi eiusque tunicas mordentibus; excretis per vomitum illis humoribus, cessaret vomitus & singultus; nec à vomitū ullus vapor acer ad oculos deferretur, qui oculus rubros efficeret: At cū vomitus non solum nō profuerit, sed etiã post se singultum & oculorum ruborem inuexerit; certissimum est illa tria vomitum, singultum, & oculorum ruborem, ab inflammatione cerebri, aut ventriculi dependere. Cerebrum enim inflammatum sanguinem ad oculorum venulas exprimit præ copia, & in extimam oculi tunicam effundit vnde oculorum rubor, cui ventriculus consentiens per nervos sextæ coniugationis admodum insignes, ab ea cerebri inflammatione facili in vomitum; ac singultum impellitur. Ventriculus quoque inflammatus vomitum, & à vomitu singultum, & vna cum singultu ruborem oculorum inuehit, facto concursu sanguinis feruidioris ad oculos propter maximum consensum, qui inter istas partes intercedit: quem facili ostendunt suffusionum initia, imaginumque ante oculos apparitiones, quæ plerumque vitiato vinticulo contingunt; vnde meritò Hippocrates *In libro de locis in homine*, à vomitu oculos maximè lædi asseruit.

A iecoris inflammatione singultus, malum. Hippocr. *Aph. 17. sect. 7.* singultus tum iecoris inflammationi superuenit, vt docet Galen. *in comment. huius Aphorismi*, quando inflammatio auctior, & deterior euasit, tūc enim magna inflammatio in hepate



eo usque accreuit, ut vehementer superiori ventriculo incumbat; & singultum inducat: imò verò affluente materiâ nonnunquam inflammatio aut erysipelas gignitur in ipso ventriculo. Sin minùs, ab ea ventriculi tunicis imbibita, morsus excitatur.

Curatio huius affectus ad illius causas dirigitur, quæ ut antea dictum est, vel sympathicè hunc affectum producant, vel idiopathicè. Sympathicè afficientes causæ sunt aliarum partium affectus, quibus curatis singultus etiâ aufertur, quamvis ea remedia quæ symptomati demulcendo idonea sunt, interim usurpari valeant, quæ inferiùs proponentur.

Idiopathicus verò affectus fit, à pituita, flatibus, bile, aliòve humore acri, aut malignæ qualitatis partecipe.

Qui fit ab humore pituitoso, tunicis ventriculi imbibito, curatur remediis humorem illum incidètib, detergentibus, expurgantibus, ac ventriculum roborantibus; qualia in curatione inappetentiæ à frigida causa oriundæ fuerunt proposita. Quibus sequentia, velut affectui magis appropriata, adiicienda.

℞. Castorei ʒ. j. succi menthæ ʒ. iiij. Misce, capiat æger cochl. j. vel ij. urgente singultu. Eodèmq. remedio potest iungi ventriculus calidè, bis aut ter in die.

Acetum scillit. sumi potest frequenter, ad materiam tunicis ventriculi impactam incidendam & resoluendam, vel illius loco oximel scilliticum.

Caryophylli in ore frequenter detenti non parùm iuuant.

Vtile est etiam elixir proprietatis à Crollio descriptum.

Seminis anethi ʒ. ij. vel iiij. decoquantur leuiter in viui generosi .viij. de quibus .j. capiat æger, mane

duntur, & hæc à frigida intemperie procedit. His & tertia addi potest cruditatis differentia, quando ob calorem debilem cibus imperfectè coquitur, & in pituitosam quandam materiam mutatur, citra tamen aciditatem.

Causæ ventriculi concoctionē lædētes, ad tria capita reduci possunt, vitiū scilicet organi, obiecti, & rerum externarum, seu extrinsecus aduenientium.

Organi vitium omnes ventriculi morbos completitur, siue similes sint, siue organici, siue cōmunes, qui omnes illius actionē euertere possunt. Intemperies tamē frequentissima est læsæ cōcoctionis causa. Cū enim cōcoctio à moderato calore rectè & secundū naturam se habente, perficiatur, si ille à debita moderatione recesserit, coctionis læsio cōtingit. Sic frigida ventriculi intemperies, quæ caloris diminutionem facit, si remissior fuerit, cōcoctionem imminuit, bradypepsiam parit. Si vero intensior, concoctionem abolitam, & aepsiam producit. Calida verò intemperies concoctionem deprauat, & dyspepsiam generat. Illæ autem intemperies interdū simplices sunt, ut in iis qui abortu calore debili, & ventriculi imbecillitate præditi sunt; vel calorem acrem & exurentem obtinuerunt, vel plurimum autem cum materia cōiunctæ; vnde in melancholia hypochondriaca, pituitæ copia, & fermentatio nigri humoris, cruditates, flatus, inflationes, fluctuationes, ructusque acidos excitari solent.

Vitium obiecti, alimenti scilicet, quod est ventriculi proprium obiectum, multis modis contingit, dum scilicet peccat in substantia, quantitate, qualitate, tempore, & ordine assumendi.

Vitiosa sunt alimenta ratione substantiæ, quæ duriora sunt & concoctu difficiliora, ut carnes cerni-

næ,

*na*, leporinæ, præcipuè vetustiores, sale vel fumo induratæ, panis furfuraceus, tubera, radices, legumina, & similia, quæ dyspeptra nominantur.

Quantitate peccant alimenta, quæ nimia copiâ assumuntur, & eo nomine à calore vinci & superari nequeunt, vnde cruditates oriuntur, illis maxime familiares, qui genio & crapulæ indulgent. Minor etiam quàm par sit alimenti quantitas, speciem quandam cruditatis inducere potest, quando cibi pauciores, in ventriculo, (in primis bilioso) exuruntur & præassantur.

Qualitate peccant alimenta, quæ nimis frigida & humida, flatuosaque existunt: vel quæ calidiora tenuiorem chyli portionem exurunt, & in nidosos vapores conuertunt.

Ad hoc genus reducenda est concoquendi & condiendi ratio, varij enim elixandi, assandi, & condimentorum modi, nouas alimentis dispositiones inducunt, propter quas concoctu facilia, vel difficilia redduntur.

Tempus & ordo assumendi præposterus concoctionem etiam vitare possunt; vt si quis horam cibandi consuetam omittens nocte intempestâ, & immediate ante somnum cibus stomachum repleat: vel si post solidorum & astringentium, vt casei, pyrorum cydoniorum, & similium assumptionem, liquida postmodum, & corruptioni obnoxia ingerat.

Res denique externæ coctionem vitare possunt, si immoderatæ sint: atque ita aer frigidior, calorem natium obtundendo, si debiliior fuerit, vel calidior, eundem calorem dissipando, coctionem euertere potest; tum etiam exercitationes immodicæ, præsertim à pastu, calorem natium eliciendo à ventriculo ad partes exteriores eûque præter modum dissipant

diffipādō, nec non chylum adhuc imperfectum præcipitando versùs intestina. Alui & aliorum excrementorum suppressio, aut fluxus immodicus; vigiliæ immoderatæ, somnus diurnus, animi pathemata grauiora, præcipuè nœror, & profunda meditatio statim à pastu & similes causæ externæ, ventriculi actionem non parùm vitare possunt.

Præter causas enumeratas Hermetici nonnulli recentiores aliam adducunt minùs tritam, & ab antiquis minimè perspectâ; quæ quidem ab iis perspicuè non demonstratur; quibusdam tamen coniecturis minimè contemnendis stabilitur; cuius etiam suprâ in famis caninæ causis explicandis mentionem fecimus. Primùm itaque statuūt coctionem ventriculi naturalem à solo calore non perfici; sed promptam illam ciborum solidorum liquationem, ac dissolutionem, qua in chylum conuertuntur, ab alia causa dependere; cum experientia doceat cibos in ollas bullientes igne luculento, etiam per plures dies continuato, nūquam talem dissolutionem pati, cum tamen ossa in ventriculis canum, breui temporis spatio dissoluantur, & in chylosum liquorem conuertantur: cū in ventriculis piscium nullo calore actuali præditis, cibi quilibet ingesti, eodem modo dissoluantur & concoquantur. Causam itaque præcipuam huiusmodi liquationis esse statuunt spiritum quen-dam, aut liquorem acidum à liene in ventriculum transfusum, qui eximiam dissoluendi facultatem habeat. Quam sententiam ex Galenicorum doctrina eliciunt, qua sancitum est humorem melancholicum à liene in ventriculum trās-fusum excitare appetentiam; idque vel constringendo, ac corrugando tunicam interiorem ventriculi; vel aciditate sua velli-gando. Quod quidem impugnari potest ex eo quod  
fi

si constringendo id facere omnia adstringentia idem præstare possent; & si vellicando, acria quælibet potentiùs quàm acida appetentiam excitent. Probabilius igitur existimant humorem illum appetentiam excitare per accides, penuriam scilicet alimenti inferendo, per dissolutionem illius quod ingestum est; ex qua penuria appetitus excitatur. Atque ita longè nobiliorem lieni usum tribuunt, quàm qui ab antiquis fuit propositus; nempe ventriculo subministrandi præcipuum coctionis instrumentum. Huius rei coniectura satis valida ex aibus elicitor, quæ durissima plantarum semina dissolunt, & lienem habent ventriculo undiquaque circumductum, ut potentiùs spiritum illum dissoluentem inspiret, vel liquorem acidum commodiùs communicet. Validam autem aibus inesse acidum illum spiritum ostendit Helmontius proprio experimento: refert enim se in pueritia cum passerem aleret, ipsi aliquando linguam obtulisse, quàm ille rostro apprehendens deglutire conabatur: se verò linguæ apice passeris guttur contingentem, maximam in eo aciditatem percepisse. De spiritu verò dissolvente aium ventriculis inhaerente probatur ex praxi medica, in qua gallinarum ventriculi ad iuuandum concoctionem passim præscribuntur in pulueribus digestiuis quos hunc affectum præstare credibile est, ciborum dissolutionem adiuuando, cum iidem gallinarum ventriculi calculosis etiam præscribantur, quibus calculorum dissolutio maximè iuuatur. Idque manifestiùs elicitur ex eo quod ex aium ventriculis sal elicitur maxima calculos dissoluendi efficacia præditum. Ex quo quidem sale ventriculis aium magna copia infixio, natura sagax & prouida spiritum elicere nouit in viuente animali, cuius adminiculo

culo ( concurrente calore nativo ) solidiorum alimentorum dissolutionem moliri possit. Et vulgò notissimum est ex salibus dissoluētibus, putà vitriolo, nitro, ammoniaco, & sale communi, spiritus elici, longè efficaciori dissoluendi vi præditos.

Ille igitur spiritus, seu liquor acidus à liene ni ventriculū transfusus, dum secūdum naturam se habet bonam ac laudabilem ciborum concoctionem efficit; si verò à statu naturali recedat, ventriculi actionē euertere potis est. Sicut antea dictum fuit ex hisce præsuppositis, caninam appetentiam excitari, quando spiritus ille seu liquor acidus nimia actiuitatem, & potentiorē dissoluendi vim obtinuit. Sic etiam ex aduerso, si vis illa dissoluens debilior efficiatur, aut omninò deficiat; coctio ventriculi imminuta, aut abolita sequetur. Hinc dicit Hermon-tius Aphorismum Hippocratis primum sect. 6. qui sic habet: *In longis sauitatibus intestinorum, si ructus acidus superueniat, qui prius non erat, signum bonum, ita interpretandum esse; vt scilicet ructus acidus superueniens significet fermentum illud acidum, quod à morbo fuerat deperditum, restitui incipere.*

Fulciamus & nos nouam hanc doctrinam proprio experimento. Cùm enim anno præterito 1648.alui fluxu pituitoso, & melancholico per quatuor menses integros, afflicti fuerimus, & ab eo ad extremam maciem, & veluti marcorem perducti; quandoquidem omnia alimenta in pituitosam & mucilaginosam substantiam conuertebantur, ex debilitate ventriculi ea perfectè concoquere nequeuntis; post multa remedia per totum illud tempus vsurpata, quorum maxima pars parùm aut nihil profuit: tandem aceti acerrimi vsu frequenti, intra paucos dies, à sauo illo affectu integrè liberati sumus: cuius equidem

equidem aceti vi, acidum illud naturale penè deperditum, plurimùm adiutum, ac restitutum fuisse coniecere possumus. Vfus autem aceti fuit in pastibus cum ovis induratus, quæ frustulatim dissecta, aceto intingebamus & per aliquot dies hoc solo edulio in omnibus pastibus utebamur. Tum hoc manifestè percipiebamus, quòd si acetū non esset valdè acre, exiguum ventriculo adiumentum ferebat.

Diagnosìs huius affectus iuxta læsæ coctionis differentias, varia est. Ac primùm a pepsia, & brady-pepsia iisdem insignis indicantur, per magis & minùs tantùm differentibus. Illa autem signa sunt, ructus acidus, alimenri incocti, vel semicocti per os aut alium reiectio; causæ ventriculum refrigerantes prægressæ; grauitas, tensio, & inflatio in regione stomachi; læsio à frigidis assumptis; vrinæ tenues, aquosæ & decolores. Interdùm tamen vrinæ crassæ & rubræ apparent, ex succo impuro ac sæculento, qui ob primæ coctionis imperfectionem, à chylo sufficienter separari non potuit, sed ad renes vsquè transmissus cum seroso humore, impuras etiam vrinas reddit, quales interdùm à melancholicis præfertim, & scorbuticis excerni solent. Fusio rem huius vrinæ explicationem vide apud Sennertum *lib. 3. prælt med. part. 8. sect. 2. cap. 7.* Dyspepsiam verò seu depravatam coctionem ostendunt, ructus nidorosi, sapor similis aut putredinosus in ore; sitis & æstuationis sensus; à calidis assumptis læsio.

Si idiopathicè ventriculus laboret, propria eiusdè morbosæ dispositionis signa aderūt. Si verò sympathicè afficiatur, ex propriis partium affectarum signis, illa sympathia est elicienda. Si verò ex errore causarum externarum, vel obiecti vitio symptoma dependeat, ex earum præsentì aut prægressa constitutione,

tionem obtinet, quæ pro inappetentia à similibus causis oriunda fuit proposita, quàm hîc frustrâ repetere non opus est.

Si denique Hermeticorum causa peculiaris suprâ proposita animaduersione digna sit; illi prouidendum erit, primò lienis prauam diathesim corrigendo, & spiritus dissoluentes restituendo substantiâ quadam acidâ, cuius generis sūt spiritus sulphuris, vitrioli, salis, succi limonū, granatorum, arantiorum, & acetum.

## C A P V T V I.

### De Singultu.

**S**ingultus est motus ventriculi deprauatus, quo scem sibi noxiam expellere nititur.

A vomitu distinguūtur ex eo quòd materia quæ vomitu reicitur, in ventriculi cauitate continetur; & ille totus inuertitur, vt materiam illam excludat: in singultu verò materia peccans, tunicis eiusdem infixata est, ideò ventriculus sese constringit, ac fibras suas concutit, vt etiam excludat. Et vt nauseam quoque in hac definitione comprehendamus, dicimus motus ventriculi expulsiuos tripliciter fieri: vel enim natura quandoque vult insurgere ad expellendum, & non potest; aut non sufficienter ad hunc motum irritatur, & tunc nausea fit: aliquando insurgit, & expellit, & fit vomitus: vel denique insurgit, vt expellat, sed non potest expellere, & tunc fit singultus.

Ille autem motus conuulsius est, non autem vera conuulsio, quæ solis musculis competit, & partibus voluntario motu donatis.

Causæ singultus immediatæ proponuntur ab Hip-

O o pocrat



pocrate, *Aph. 39 sect. 6.* inanitio, & repletio, sicut & conuulsionis. Galenus & Auicenna tertiam addunt, nempe irritationem à materia acri. Alij anxie laborant, vt materiam irritatam ad repletionis genus trahant, quò sententiam Hippocratis illam tueantur. Verum vbi res ipsa loquitur perspicue, non opus est rerum euidetias propter Autorum verba confundere & obscurare. Quod enim clarius est, quam singultum fieri à facultate expultrice irritata? Quæcunque igitur irritationem illam efficere possunt, erunt causæ proximæ singultus. Jam verò humores & vapores quantitate vel qualitate peccantes, ventriculum irritare possunt ad expulsionem, & sic repletio, & acrimonia sunt causæ diuersæ toto genere distinctæ. Inanitio verò quomodo singultum excitare possit, non est facile explicare. Cum enim illius essentia consistat in defectu, nemo dixerit, naturam insurgere ad defectum expellendum; quin potius mouebitur ad illum resiciendum ac reparandum; & sic attractricem potius, quàm expultricem facultatem mouebit. Si verò interdum singultus magnas euacuationes sequatur, vt in acutis, & malignis febribus, & purgatione ex helleboro contingit; id non euacuationi simpliciter tribuendum, sed potius malignæ cuidam qualitati à morbo, vel medicamento ventriculo impressæ.

Materia autem singultum efficiens, vel in ipso ventriculo colligitur, vel aliundè ab hepate, liene, intestinis, aliisque partibus, vel etiam toto corpore communicatur. Sic alimèta vel medicamenta acriora, humores acres, aut lumbrici mordentes in ventriculo contenti, singultum idiopathicum producant. Sympathicum vero inferunt vicinarum partium inflammationes transmissio ad ventriculum ichore, aut vapore acri: tum etià quoddam tumor, hepate præsertim inflam-

mato:

maro, ventriculum comprimit, vnde facultas expultrix assidue irritatur. Denique à toto corpore possunt transferri ad ventriculum humores, vel vapores acres, in affectibus totum corpus occupantibus, ut interdum in febribus acutis & malignis contingit.

Diagnosìs huius affectus per se conspicua est. Causæ verò signa ita distinguenda sunt, ut si idiopathice contingat, affectus magis continuus sit, & humorum in ventriculo contentorum signa appareant; & affectu vomitu sedetur. Humor verò peccans in ventriculo collectus, vomitu, aut ructu, aut oris sapore, aliisque signis internosci poterit. Si denique ab alio cuiusdam partis morbo oriatur, eiusdem signa ex propriis capitibus erunt desumenda.

Quod ad prognosim attinet. Singultus qui à causa aliqua procatactica, ut cibo, potu, aut frigore exoritur, periculosus non est; tum etiam ille qui crìsim per vomitum interdum antecedit; sed tunc reliqua signa in bonum consentire, & salutaria esse debent.

Si quis in laboriosa febre singultiat, morbo laborat pessimo. Hippocrat. in *Coacis*. Fit enim ille singultus ab humoribus acris & malignis, tunicam ventriculi interiorem vellicantibus, & facultatem illius expultricem stimulantibus. Et dicit Vallesius se nullum vidisse servatum, in extenuatis, aut febre ardente, vel maligna correptis, cui singultus superuenerit. Sic apud Hippocr. 3. *Epid. sect. 2. Agr. 12.* Mulier que in Mædadium foro habitabat, die 12. frequentes singultus patiebatur, & 14. interiit. Observauit etiam Platerus singultum in febribus ardentibus superuenientem, & perseverantem, plerumque mortis esse prænuntium, eundem etiam in dysenteria esse lethalem.

A vomitu singultus, & oculorum rubor, malum, Hippocr. *Aph. 3. sect. 7.* duo hæc signa si vomitui super-

eo usque accreuit, ut vehementer superiori ventriculo incumbat; & singultum inducat: imò verò affluente materiâ nonnunquam inflammatio aut erysipelas gignitur in ipso ventriculo. Sin minùs, ab ea ventriculi tunicis imbibita, morsus excitatur.

Curatio huius affectus ad illius causas dirigitur, quæ ut antea dictum est, vel sympathicè hunc affectum producant, vel idiopathicè. Sympathicè afficientes causæ sunt aliarum partium affectus, quibus curatis singultus etiâ aufertur, quamvis ea remedia quæ symptomati demulcendo idonea sunt, interim usurpari valeant, quæ inferiùs proponuntur.

Idiopathicus verò affectus fit, à pituita, flatibus, bile, aliòve humore acri, aut malignæ qualitatis partecipe.

Qui fit ab humore pituitoso, tunicis ventriculi imbibito, curatur remediis humorem illum incidētibus, detergentibus, expurgantibus, ac ventriculum roborantibus; qualia in curatione inappetentiæ à frigida causa oriundæ fuerunt proposita. Quibus sequentia, velut affectui magis appropriata, adiicienda.

℞. Castorei ʒ. j. succi menthæ ʒ. iiij. Misce, capiat æger cochl. j. vel ij. urgente singultu. Eodēque remedio potest iungi ventriculus calidè, bis aut ter in die.

Acetum scillit. sumi potest frequenter, ad materiam tunicis ventriculi impactam incidendam & resoluendam, vel illius loco oximel scilliticum.

Caryophylli in ore frequenter detenti non parùm iuuant.

Vtile est etiâ elixir proprietatis à Crollio descriptum.

Seminis anethi ʒ. ij. vel iiij. decoquantur leuiter in viui generosi .viij. de quibus .j. capiat æger, mane

& serò. Idem semen inclusum linteolo naribus frequenter obiciatur.

In affectu contumaci pilulæ sequentes erunt efficacissimæ.

℞. Castorei & myrrhæ, ana ℥. iij. salis gemmæ ℥. β. diagryd. & mastiches, an. ℥. j. agarici recēter trochisc. ℥. iij. aloës electæ ad pondus omnium. Excipiantur succo menthæ, & fiat pilular. massa, de cuius Drach. j. formentur pilulæ vj. deauratæ. Capiat ij. vel iij. manè duabus horis ante cibum, bis in septimana.

Simpliciores pilulæ, & non parùm efficaces fieri possunt ex pulvere hieræ cum oxymelite, quarum Drach. j. exhiberi poterit.

Intermediis verò diebus vtatur pulvere sequenti.

℞. Sem. anethi ℥. β. zedoariæ. ligni aloës, nuc. moschat. caryophyll. pulu. diambra, an. Drach. j. Ca iat manè ℥. ij. cum paucio vino odorifero. Vel adde salis communis ℥. iij. vtatur pro condimento ciborum ordinariorum.

Ventriculo admoueaturs sequens cataplasma.

℞. Rad. aristoloch. longæ, ireos Florent. baccar. lauri, fol. rutæ & menthæ siccor. an. Drach. iij. castorei, & myrrhæ, ana Drach. ij. caryophyll. & hypocistid. an. Drach. vj. Cum melle anthosato fiat cataplasma.

Tandem in affectu contumaci ad decoctum guaiaci, & thermar. sulphurearum vsum, tanquàm remedia generosissima, confugiendum erit.

Qui à flatibus produciturs, iisdem remediis curatur, quibus addunturs flatus discutientia. Admoueanturs etiam cucurbitulæ regioni ventriculi, quæ instar miraculi, flatulentos infimi ventris affectus repentiè mitigant & tollunt.

Qui ab humore acris & bilioso oritur, præter ea remedia, quæ pro inappetentia à calida intēperie genitæ fuerunt

fuerunt propofita, huic etiam affectui conuenientiffima, curari debet phlebotomiâ (fi plethora adfuerit) vomitione, aut purgatione blandâ, tertio quoque die repetita in hunc modum.

℞. Rhab. elect. puluerat. & aquâ endiuiz donec mollescat irrorati ℥.ß. pulpæ tamarind. ℥.ij. sem. endiuiz. portulac. & spodij, ana ℥.j. fantali citrini, & diagrydij, ana ℥.ß. Cum syrup. de limon. fiat massa pilular. de cuius ℥.ß. formetur pilulæ iv. vel v. quæ dentur manè, vt dictum est.

Aliis verò diebus sumat conseru. rosar. & borrag. paucò puluere triasantali aspersam, vel opiatam in prædicta inappetentiæ curatione descriptam.

Emulsiones frequentes ex seminibus frigidis paratæ dicti humoris acrimoniam potenter demulcent, vel in affectu minùs calido lac amygdal. dulcium.

Syrupus de pomis, cum syrupo cydonior. mixtus, ex cochl. exhibendus.

Iusculum affatim, & sæpè propinandum.

Aqua frigida, vel calida, aut ptisana copiosè bibenda.

Oleum amygdal. dulcium humorum acrimoniam retundit.

Fouetur regio stomachi cum spongia in aceto rosac. macerata.

℞. Cerati santalini, & vnguenti rosac. ana ℥.j. mastiches ℥.ß. cortic. citri, & carnis cydonior, ana ℥.j. Cum succo semperuiui, & pauca terebinthina, fiant emplastra duo, quorum vnum anteriùs, aliud posterius stomachi sedi applicetur.

Inungatur regio hepatis vnguentis refrigerantibus, Qui ab ea parte humores in stomachum confluerè soliti sunt.

Si verò malignæ cuiusdam qualitatis suspicio sit,

theriaca, aliâque alexipharmaca erunt præscribenda, & regio ventriculi ol. scorpion. Matthioli inûgenda.

A quacunque vero causa oriatur singultus, sequentia vtiliter vsurpari poterunt.

Primò humoris peccantis euacuatio per vomitum, si æger facilè ferat, & reiteranda vomitio, si affectum imminuat, non autem prorsùs auferat; etiam fortioribus exhibitis, si necessitas exigat; quemadmodum docet Platerus in sua praxi. Cuius rei experimentum proponit in obseruationibus, his verbis. *Chirurgus æger factus mox singultire cæpit, adeò continuatis vicibus dies, noctesque, ut nec dormire, nec rectè loqui, aut cibum capere posset. Ad extremum hoc pacto debilitatus, cum nihil inuisset, & iam in agone esset, dedimus illi non sine metu, ipso tamen summopere rogante, vomitorium satis validum chymisticum, quod Medicus ad manum habebat. Vnde immensam bilis æruginosa & nigra copiam euomuit aliquoties, cessauitque singultus, ipseque sensim conualuit.*

Si æger vomitum auerfetur, per inferiora expurgandus est.

Præparandus humor ante vacuationem, aut ipsius iterationem, incidentibus, & abstergentibus. Postea sequentia conueniunt.

Circubitiola admoda dorso in regione ventriculi, vel etiam parti anteriori eiusdem.

Ventriculi per fasciam constrictio, quò minùs dilatari queat.

Extremorum ligaturæ.

Semen anisi assumprum, quod peculiariter singultum sedare creditur.

Clysteres frequentes, qui humores noxios à ventriculo reuellunt.

Animalia

Animalia iuniora ventriculo admota.

Acetum scillicum ex cochleari vsurpatum.

Sternutatio materiam in ventriculi tunicis impactam excutit. Quemadmodum Chrysimachus Medicus apud Platonem, Aristophanem singultientem, qui spiritus cohibitione, & aquâ frigidâ gargarisatâ curari non potuerat, sternutamento excitato curauit.

Galen. 8. de come. medic. secundum loc. proponit medicamentum Asclepiadis. Cuius singula examinat simplicia, idque probat, quasi omnes habeat facultates ad hanc intentionem idoneas, scilicet discutiendi, & euacuandi materiam noxiam per aluum & lottium, roborandi ventriculum, & postremo mitigandi actimoniam humorum. Compositio est talis, quæ recipit costi, vel illius loco galangæ croci, spicæ nardi, rosar. recent. mastiches, ana ʒ. iij. a. lari aloës, ana ʒ. ij. opij ʒ. j. cum succo psyllij fiant pastilli, de quibus datur ʒ. j. singulo mane.

Ad huius imitationem breuius parari possunt pilulæ pro vna dosi, ex aloës ʒ. j. laudani opiat gr. ij. vel iij. Si animus sit magis purgare, addi possunt digrydij gr. iij. vel iv.

Quoniam insignes vires habeant in hoc affectu medicamenta ex aloë parata, testatur Duretus his verbis. *Per multi cum singultiendo frangerentur, ductâ aluo per quinque dies hierâ picrâ, glutinosis & nigris humoribus eiectis, singultienti finem fecerunt.*

Platerus in obseruationibus refert, se puerum decem annorum per octiduum dies noctesque singultientem curasse aquâ nucum viridium, cum raphano prius in aceto, maceratarum, destillatâ, quam vomitionis excitandæ gratiâ propinare solebat. Verum etsi minimè vomierit, tamen statim singultum desisse, & cum sub

noctem denuò haustum bibisset, ab hoc symptomate penitus fuisse liberatum.

Forestus narrat se hominem; graui singultu laborantem, curasse vnico haustu decocti seminum anethi carui, portulacæ, & papau. albi in cereuisia tenuiori.

Clandinus valdè commendat diaphœnicum cum philonio romano, vbi causa & symptoma valdè videntur.

Narcotia denique sola pertinacem singultum, & aliis remediis minimè cedentem, facile compescunt, sensum partis obtundendo nimis exquisitum.

## CAPVT VII.

### *De Nausea & vomitu.*

**N**ausea & vomitus differunt tantùm per magis & minus, & vterque affectus est motus ventriculi, quo res in cauitate sua contentas expellit, vel expellere nititur. Est igitur nausea inane vomendi desiderium cum anxietate, & tenuis ac pellucidi humoris per simplicem saluationem, excretionem. Eam excitare solet, quidquid ventriculo quantitate, vel qualitate molestiam infert, nec tamen propter ventriculi imbecillitatem; aut orificij eiusdem superioris robur, vel materiae crassitiem, & visciditatem excludi potest.

Vomitùs verò qui Græcis *iperos*, vel *iperia* nominatur, est motus ventriculi deprauatus, & concussiuus, quos vis expultrix irritata, contractis fibris partis interioris, laxatisque superioris, materiam in capacitate conten-



contentam sibi moleſtam, ſenſibiliter per ſuperiora violento impetu reiicit. Dicitur motus deprauatus, tum ratione obiecti moleſtantis; tum ratione motus ipſius, qui fit à fundo verſus orificium, quaſi per ſubuerſionem; cum motus ventriculo naturalis, verſus inteſtina & pylorum compulſius fiat.

Vomitus differentię à cauſis deſumuntur, quę vel internę ſunt, vel externę; ideò vomitus primùm diuiditur in naturalem, & artificialem. Naturalis rurſum, vel extra conſtitutionem morboſam accidit, vel in ipſo morbo præſente; vnde triplex exurgit illius differentia, vt aliud ſit periodicus, aliud criticus, aliud ſymptomaticus.

Periodicus eſt qui extra morboſam conſtitutionem, & velut naturā aſſuetā exercetur præcautionis gratiā, & certis temporū ſpatiis repetitā, vnde apud Hippocratem legimus antiquos bis in menſe, continuis; aut interiectis diebus, vomere ſolitos. Et noſtris etiam temporibus multi reperiuntur, qui per quædam interualla, alij ſingulis mēſibus, alij ſingulis ſeptimanis, alij ſingulis diebus humorum biliolorū, & frequentius pituitolorum copiam, vomitu reiicere cōſueuerunt; quibus euacuationibus tanquā prophylacticis à multis morbis præſeruantur. Et hic vomitus verè ſymptoma non eſt, quia ſine vilo morbo præſente excitatur, ſed potiùs motus naturę nominandus.

Criticus vomitus non rarò contingit in morbis, eoque materia morbiſica, (priùs coctione præparata,) ſalutariter euacuatur, vel tota; vnde perfectæ morbi ſolutio; vel majori parte, vnde magna illius immutatio ſuccedit.

Symptomaticus vomitus fit à natura irritata & debilitata, & ſine ægri allevatione contingit, quia vel  
non

non satis copiosè, aut confertim fit, vel continuo materiæ morbificæ affluxu fouetur & perseverat.

Aliæ vomitus differentiæ petuntur ab excrecris. Quandoque enim materia quæ excernitur alibilis est; aliàs excrementitia, Alibilis materia est cibus, aut chylus, aut sâguis purus, vel permixtus. Excrementitia materia est pituita, bilis, melancholia, serum, pus, lumbrici: & similia.

Vomitum artificialis generali vocâbulo à nobis appellatur quicumque à causis externis inducitur.

Illæ autem causæ externæ, quæ vomitum excitare valent sunt præcipuè ictus, vel casus, compressio circa epigastrium; ær austrinus, vel contagiosus, aura venenata, foetidus odor, exercitationes violentæ aut molestæ, vt succussatio equi insueta, navigatio in mari, potissimum flante austro, aspectus vel imaginatio rei fœdæ, & exosæ, & similes causæ externæ, quæ naturam irritando vel humores commouendo vomitum excitare solent. Ac præ cæteris assumpta maximam vim habem ad vomitum excitandum, non solum medicamenta, emetica ideò nominata, & venena toto genere nobis infesta; sed etiam alimenta, vel suâ naturâ noxia, vel aliqui peculiariter exosa; vt est apud Hippocr. de illo qui ab esu fungorum vomitu vehementi excitato interit. Idem contigit aulico Antonini Imperatoris ex casco putri magnâ copiâ comesto. Idem præstat alimentorum qualitas, pinguis, & oleosa, tum etiam ordo assumendi præposterus, quando humectantia & relaxantia post astringentia sumuntur, denique alimenta, nimia quantitate ingesta, quantumvis euchyma, & laudabilia, vomitum excitare possunt, vt crapulæ deditis sæpè contingit. Tunc enim natura nimiam mole grauata, inutile pondus, cuius coctioni par esse non potest excludere tentat, ad quam etiam exclusionem excitatur malâ quali-

tate, quæ illis alimentis per corruptionem, ob prauam coctionem, inducitur.

Causæ internæ sunt antecedentes vel coniunctæ.

Antecedentes vel à corpore vniuerso; vel à peculiari aliqua parte in ventriculū confluunt. A toto corpore feruntur in plethora, cachexia, febribus, aliisque affectibus totum corpus occupantibus. A parte aliqua peculiari derinantur sæpè humores in ventriculum, in hepatis inflammatione, lienis, aut mesenterij obstructione, suppressis menstruis, aut hæmorrhoidibus, catarrhosa constitutione, & similibus. His addenda est praua pori cholidochi cōformatio, quādo scilicet nō in duodenū intestinum, sed in ipsum ventriculum implantatur, vnde picrocholi *αἷον* nominātur qui vomitu bilioso, propter prauam hanc conformationem frequenter diuexantur. Fit etiam vomitus interdum in peristaltico intestinorum motu, quando obstructa intestina, in colico, vel iliaco affectu, humores liberum exitum non inuenientes, ad superiora propellunt. Lumbrici etiam non rarè in ventriculum ascendentes ab intestinis eiusque tunicam interiorē vellēcantes vomitum efficiunt. Ac denique abscessus disruptus in liene, mesenterio aliisque abdominis partibus, vomitum purulētum & saniosum excitare solet.

Causæ vomitus coniunctæ sunt eadem causæ suprā memoratæ, quando ad vētriculum fluxerunt, quādiu enim in aliis partibus cōtinebantur, erāt causæ antecedentes. Postquā verò ad ventriculum translatae sunt, in eoque commorantur, causæ coniunctæ rationem obtinēt. Tales causæ sunt præcipuè humores varij, quorū etiam nonnulli in ipso ventriculo generantur, pituita potissimū, cuius maximus prouērus non rarè fit in ventriculo, per cruditates, & aepsias, quādo stomachus debilis alimenta probè non concoquit,

quit, eaque in pituitosum excrementum conuertit. Sic etiã in ventriculo interdum generatur bilis porracea ex corruptis alimentis, vt docet Gal. *commun. 2. prognostic.* & hoc luculenter apparet in pueris lactentibus, qui ex lactis corruptione in ventriculo, fæces porraceas, & æruginosas excernere consueverunt.

Hæc tamen bilis porracea, ex corruptis alimentis in ventriculo genita non est eiusdem naturæ cum ea quæ ex bile flaua per adustionem & torrefactionem generatur.

Signa vomitus diagnostica per se manifesta sunt. Causæ verò prout variæ sunt sic etiam variis signis innotescent.

Primo igitur si ventriculi ipsius vitio vomitus contingat; eiusdem partis laborantibus signa apparent, vt cibi fastidium, grauitas, tensio, & inflatio in regione stomachi, tarda & difficilis concoctio, ructus acidi, vel nidorosi, aliaque signa debilitatem & intemperiem illius partis demonstrantia. Sic etiam si ex morbo organico vel communi ventriculo in hærente, vt tumore, vel vlcere, vomitus oriatur, eorum morborum signa sese produnt. Si verò per sympathiam totius corporis, aut aliarum partium vomitus contingat; effectus totum corpus, vel aliquam partem obsidentes apparebunt.

Totum corpus afficitur in febribus, eachexia, ictero, atrophia. Partes verò peculiare, à quibus frequenter humores ad ventriculum transmittuntur, sunt cerebrum, hepar, intestina, & vterus.

Si è cerebro humores ad ventriculum confluant, distillationis signa apparebunt, tum etiam vomitus erunt spumosi, ac pituitosi, nausea erit magis molesta quo tempore cibus assumitur.

Si ex hepate humor transmittitur, is plerumque biliosus

biliosus esse consuevit; atque adeò bilis vomitu reijcitur, & vomitus antè cibum quàm eo assumpto molestior est; tum aliquis affectus, vt dolor, tumor, aliisque in hepate apparet.

Si ex intestinis materia ad ventriculum feratur, dolor colicus aut iliacus aderit, vellumbricorum signa sese ostentabunt.

Si denique per vteri sympathiam vomitus concitetur, conceptio aderit, vel mensium suppressio, vel alia ex vtero symptomata prodibunt.

Quibusdam etiam signis conicere possumus, vtrum humor in cauitate ventriculi contineatur, vel tunicis ipsius hæreat. Si enim in cauitate sit, leuissimo conatu reijcitur, & inest ventriculo tensio, & anxietas ab assumpto alimento, quæ non cessat, donec humores vomitu reiecti sint, qui soli plerumque excernuntur, alimentum verò retinetur. Si verò humores tunicis adhæreant, ab ingesto cibo præcipuè vomitus contingit, & alimenta sine humoribus reijciuntur; citra verò cibum nausea admodum molestat, & quod reijcitur crassum, ac viscidum est, magnoque conatu extunditur.

Causæ externæ ex ægrorum relatu innotescunt, vt si nimio cibo & potu sese ingurgitauerint, vel ictum aliquem grauem in illa regione acceperint; vel prauum aliquod edulium aut venenosum ingesserint.

Imminentis denique vomitus signa proponuntur à Galen. lib. 3. de cris. cap. ultimo, qualia sunt, dolor capitis, vertigo tenebrosa, tremor labij inferioris, oris ventriculi morsus, frequens & copiosa saliuatio.

Prognosis huius affectus in hunc modum instituenda est.

Vomitus

Vomitus ex bile flaua, & pituita mixtus, qui nec valdè crassus est, nec admodum copiosus, & qui duos isto humores habet exquisitè permixtos, bonus. Talis enim vomitus in substantia, quantitate, qualitate laudabilis est. Ex omnibus enim humoribus excrementitiis, pituita, & flaua bilis sunt omnium mitissimi, si autem quantitate, & consistentia mediocri, ac benè inuicem permixti per vomitum efferantur, omnes laudabilis vomitus conditiones obtinebit.

Vomitus biliosi aut pituitosi die critico erumpentes, boni. Non solùm enim vomitus permixti ex utroque humore boni sunt; sed etiam qui fiunt seorsim ex alterutro humore, si talis humor morborum committat, quo æger detinetur. Sic in biliosis febribus, bilis criticè erumpens, aut pituita in pituitosis, morbi solutionem efferunt, aut saltem maximam salutis spem pollicentur.

Longo alui profluvio laboranti spontaneus vomitus superueniens: morbum soluit. *Aph. 15. sect. 6.* fit enim reuulsio materiæ morbificæ in contrariam partem. Et illa reuulsio ostendit naturam refici, ac vires resumere. Vt enim Medicus eorum quæ ad partem aliquam fluunt retractionem molitur; ita natura, cum præualere incipit, humoris ad partem affectam confluentis, repulsionem facit, dum illa pars refici ac roborari incipit.

Vomitus paucus, & laboriosus in acuta febre, malus: nihil enim eorum quæ decretoria sunt, exiguè scerni conuenit, sed quæ ita vacuantur omnia duorum alterum significant; aut materiæ copiam, quam natura tolerare nequeat, sed ex ea aliqui symptomaticè effundat; vel naturæ imbecillitatem, quæ superflua expellere frustra nitatur.

Vomitus variegati ex multis humoribus constātes mali

mali: significant enim varios humores in corpore latitare, qui eò maius negotium naturæ facessunt, quò difficilius est pluribus inimicis resistere. Si enim aduersus varia alimēta pugnare naturā graue est, quāto difficilius erit, & periculo plenum tentare varios humores præter naturæ modum existentes concoquere, & edomare. Præcipuè in morbis acutis, in quibus breue est tempus pugnæ, quod deberet esse longissimum, vt maior spes victoriæ ex parte naturæ haberi possit.

Vomitùs porraceus, æruginosus, liuidus, niger, aut fœtidus, lethalis. Significat enim huiusmodi vomitùs bilem porraceam, æruginosam, aut atram in corpore redundare. At hæ omnes bilis species malignos morbos, atque lethales solent producere. His verò si fœtor adiunctus sit insignem humorum corruptelam significat, cum qua natura diu consistere nequeat.

Vomitùs synceri, & impermixti in acutis febribus, mali. Hip. i. *prorrhēt.* Hamor enim syncerus non solum crudus est, sed etiam incoctilis, quippè qui tum actum coctionis, tum potentiam excludat. Hippocrātes *ἀκραις* vocat humorē omnē mixtionis expertem, vel omne excrementum feruidum, & crudum, quod suo sero dilutum non est. Cuius generatio vel partis alicuius vitio fit, vel feruore, ac incendio febrili; exhaustā aquosā, & serosā parte. Ideoque in acuta febre magnum intus incendium latere ostendit, plerumque à natura inuincibile.

Quod ad curationem spectat, si vomitùs ab aliarum partium affectu dependeat, non aliis indiget remediis, quam iis quæ morbo à quo procedit, conueniunt.

Si verò fiat ab humoribus biliosis, pituitosis, aut melancholicis quantitate, aut qualitate suā ventriculum stimulantibus; humores illi vomitoriis medicamentis excludendi sunt.

Si verò crassi & glutinosi sint, incidendi & abster-  
gendi, quemadmodum in curatione inappetentiæ di-  
ctum est.

Vomitus etiam in hoc casu plurimum confert, qui  
pronocandus est emetico mediocri, non imbecillo,  
quale est oleum tepens; neque etiam vehementi, quod  
à lōginquis partibus trahat, ut quæ ex antimonio pa-  
rantur. Sed illud tantum maxime convenit, quod va-  
lidā detergendi ac dissolvendi glutinosum illum hu-  
morem virtute præditum est; talis est gylla Teophra-  
sti, seu vitriolum album præparatum; ac paulò effica-  
cius id præstat sal vitrioli, ex vitriolo ad intensam ru-  
bedinem calcinato extractum.

Si vomitoria non arideant, clysteribus frequenti-  
bus, & catharticis blandis materia peccans detrahen-  
da est, addito rhab. quod purgando astringit, & ven-  
triculum roborat.

Sic in vomitu bilioso pilulæ sequentes præscribi  
poterunt.

℞. Aloës opt. aquâ rosar. lotæ Drach. iij. rhab. pulu.  
& aquâ borrag. irrorati Drach. j. mastiches, santali ru-  
bri, coralli præpara. an. ʒ. j. Cum syrupo rosar. solut.  
fiat massa pilular. cuius capiat ʒ. ʒ. vel. ʒ. alternis die-  
bus, donec sedatus sit vomitus. Vel

℞. Rhab. pulu. ʒ. j. cortic. myrob. citrin. ʒ. j. spo-  
dij, & rasuræ cornu cerui, an. gr. vj. Fiat. pulvis, qui  
detur bis in septimana, cum paucis iusculo.

Vel fiat bolus ex hieræ picræ, aut catholici ʒ. iij.  
cum ʒ. j. rhab. puluerati.

In vomitu vehementissimo dētur laudani grana iij.  
cum cochiar. min. ʒ. ij. ʒ. Sedabitur vomitus, & ʒ.  
post horas purgatio fiet per inferiora; Satis magna  
ponitur purgantium quātitas, quia infringitur à lau-  
dano, quod idē miscendum est cum diagrydiatis, &  
colocyn



colocynthiatis. Si restitet medicamentum, clystere acriori euocandum.

Post sufficientem purgationem, vomitus cohibendus erit partem roborantibus; ut syrupo cydon. de granatis acidis, conseruâ rosar. veteri, vel rad. symphyti, minâ cydon. vel iulepo sequenti, si vehementissimus vomitus sit valdè biliosus, ut in cholera morbo.

℞. Succi granar. acidor. ℥. vj. succi menthæ depurati ℥. ij. aquæ oxalidis ℔. j. sacchari albi ℔. β. Fiat iulep. in cuius clarificatione leuiter bulliant in nodulo, santali citrini, rosar. & spodij, ana 3 j. Capiat ℥. iiij. manè & serò.

℞. Terræ sigillatæ, boli armeni, coralli rubr. margarit. præp. sem. portulac. & acetosæ, ana 3 j. rasuræ cornu cerui, fol. menthæ siccor. an. ʒ. j. rosar. rubr. P. β. Fiat puluis aspergendus iusculis, & panatellis, aut fumendus ex cochleari, cum pauca aqua ferrata: Ex eo etiam poterunt fieri tabellæ cum saccharo aqua plantag. dissoluto; vel opiata cum syrupo cydon. addendo conseruam rosar. aut rad. symphyti.

Mastices aliquot grana puriora, manè sumpta non parùm valent ad vomitum compescendum.

℞. Balsami Peruuiani gutt. iij. in ouo sorbili, aut cum saccharo in formam pilularum redactæ idem efficacius præstant.

Laudatur etiam decoctum fabarum aut lentium, abiectâ priori aquâ, & addito pauco aceto. Succus cydon. crudus miraculosè vomitum sistit, si eius cochlear j. vel ij. exhibeantur.

Camphora naribus frequenter admota, vel illita, atque etiam sumpta cum paucâ aquâ rosar. & cantillo pulu. diasmochi, ad idem est efficax.

Spiritus vitrioli cum aqua plantag. vel communi mixtus, & ad moderatam aciditatem exhibitus, vomitum etiam potenter cohibet.

Si verò admodum pertinax fuerit vomitus, spiritus vitrioli quantitas augenda est, ut aqua valdè acida reddatur. Cum vino generoso vtiliter etiam misceri potest. In spiritus vitrioli penuria, acetum fortissimum usurpari potest, cuius cochlear vnum, vel alterum purum & impermixtum exhibendum est.

Salis absinthij serup. j. cum succi limonum cochleari mixtus, remedium est præstantissimum, præsertim in vomitu, qui à febris malignis solet contingere.

Si vomitus vires valdè deiciat, detur laudanum cum miua eidon. vel syrupo de rosis siccis: & illico applicetur cucurbitula ventriculo, & catapl. ex fermento, pulu. absinth. & cortic. arantior. subactis cum succo menthæ.

Exterius verò regioni stomachi admoueantur foci ex sponsia noua, in aquam rosaceam, & acetum rosarum immersa, iique subfrigidi. Vel dicta sponsia bulliat in aceto forti, & calidè ventriculo applicetur. Vel componatur focus ex decocto rad. bistortæ, fol. plantag. porul. menthæ, summitatum rubi, & salicis. Deinde inungatur vnguento sequenti.

℞. Acaciæ, hypocist. granor. sumach. & myrtill. an. ʒ. ij. mastiches & granor. kermes, an. ʒ. j. olei myrtini ʒ. ij. ceræ q. s. Fiat vnguentum, vel sequens cataplasma admoueatur.

℞. Carnis cydonior. in aqua rosac. & aceto decoctor. aut cydoniati fortiter contusi ʒ. iiij. pulueris mastiches, granor. kermes, myrtill, & sem. plantag. an. ʒ. ij. Cum succo menthæ, vel cydonior. vel syrupo de absinthio, fiat instar cataplasmatidis.

Vel

Vel crusta panis in aceto rosar. macerata, & sequenti puluere conspersa.

℞. Rosar. rubr. balaustior. sem. coriandri præp. ana Drach. j. β. mastiches, corrali rubri, sem. acetosæ, spodij, ana Drach. β. santali citrini ℥. j. Misce, fiat puluis.

Vel emplastrum sequens applicabitur.

℞. Massæ empl. de mastiche Vnc. j. pulu. myrtill. & rad. distortæ, ana Drach. β. cum oleo lentisc. Fiat emplastrum scutiforme.

Si vomitus sit vehementissimus, & febrem symptomaticam inducat, & corpus sit plethoricum; vtile est nonnūquam sanguinem detrahère, ad præcautionem inflammationis, quæ in partibus internis ex concussione illa potest contingere. Id tamen cautè agendum, & parçâ manu, metu deiectionis virium.

Præterea cōueniunt cucurbitulæ dorso & vmbilico admotæ, frictions, & ligaturæ partium extremarum.

Fauces & collum obuolui possunt linteis oxycrato imbutis, vt humores repellantur. Manuum iniectione in aquam frigidam omnem vomitum compescit.

Ac tandem reliquis non conferentibus ad narcotica veniendum erit, quæ omnes euacuationes citissimè cohibent.

In vomitu pituitoso (si vomitoriis prædictis sedari nequeat) exhibendæ sunt pilulæ de hiera, addito rhab. & agarico, aut alia cathartica huic vsui idonea.

Postea ad ventriculum roborantia veniendum est, qualia in curatione inappetentiæ proposita sunt; quibus addi possunt sequentia.

℞. Conseruæ rosar. & rad. symphyti, ana Vnc. j. confectio. de hyacinth. Drach. iij. pulueris electar. diambræ, & aromat. rosar. ana Drach. β. trochisc. de spodio, terræ sigillatæ, & granor. kermes, ana ℥. j. cum syrupo cydonior. fiat opiata.

Spiritus vitrioli cum aqua absinthij, vel succo menthæ mixtus, vomitum potenter cohibet, & ventriculum roborat.

Vel aquæ imperialis cochl. j. aut duo post vomitum exhibeantur, si magna sit ventriculi frigiditas.

Exteriùs verò sequentia admoucantur.

℞. Absinthij, menthæ, melissæ, ana M. iij. Coquantur in f. q. vini & aceti, ad tertiæ partis consumptionem. Fiat potus pro stomacho.

Postea admoucantur emplastrum prædictum, vel cataplasma ex cydoniis, substituendo puluerem nucis moscat, & caryophyll. loco myrtil. & plantag. Vel

℞. Absinthij, & mentæ viridis, ana lb. j. crustæ panis assatæ, & in aceto rosac. infusæ lb. j. pulpæ cydonior. vel cydoniati Vnc. ij. mastiches Vnc. ss. macis, & nucis moscot. ana Drach. ij. Omnia pistentur fortissimè cum oleo cydonior. & fiat emplastrum.

Vel fiat cataplasma ex cydoniis in aceto fortissimo coctis & contusis, addendo parùm sem. sinapi, & pulueris caryophyllorum.

Vel admoucantur crusta panis torrefacta, & in vino generoso, cum succo menthæ madefacta, & pulu. nucis moschat. caryopgyll. thuris, mastiches, & granor. kermès sinapisata.

Villanouanus plurimùm commendat fermentum aere, quod aceto acerrimo, & succo menthæ maceratum applicatur ventriculo, & bis aut ter renouatur. Certissimè enim sedat, post conuenientes euacuationes, & reuulsiones.

In diuturniori vomitu, vbi magna est ventriculi laxitas, ad valdè astringentia veniendum erit, in sequentem modum composita:

℞. Rad. bistortæ, tormentillæ, cort. malorum granator. balauft. & hypocist. ana Drach. ij. sol menthæ, & absinthij

ſinthy ſiccor. ana M. ſ. granor. ſumac. & myrtill. ana Drach. j. roſar. rubr. P. j. cinnam. caryophyll. & maſti-  
ches ana Drach. ſ. gallar. viridium, & nucum cupreſ-  
ſi, ana Drach. ij. Fiat decoctio in aqua ferrata, & vino  
rubro, in qua diſſolui poſſunt grana aliquot moſchi,  
quia odorata maxime faciunt ad vomitus compeſ-  
cendos, Cuius decocti capiat æger manè ʒ. ij. & ex  
eodem foueatur regio ventriculi.

Post ſortum admoueaturn emplastrum, vel cataplaſ-  
ma aliquod ex ſuprà propoſitis.

## C A P V T VIII.

### De Vomitu sanguinis.

**S**anguinis è ventriculo per os exclusio, quæ vom-  
itus sanguinis vulgò nominatur, hoc cum omni-  
bus aliis hæmorrhagiis cõmune habet; vt per anasto-  
moſim, rixim, diabroſim, aut diapedeſim, ſanguis è ve-  
nis egrediatur; qui quidẽ venarum affectus in hæ-  
moptiſis theoria pathologicè expoſiti fuerunt.

Cauſæ etiam ſanguinis vomitum efficientes, cum  
hæmoptiſis cauſis coincidunt.

Ac primum cauſa coniuncta iſtas ſanguinis effu-  
ſiones produçens, eſt illius quantitas, vel qualitas ex-  
cedens.

Sanguis quantitate peccans, venas rumpere, aut  
oriſicia illarum aperire potis eſt: ſicque rixim, aut  
anastoſim efficit, quod in plèthoricis corporibus,  
& athletico habitu præditis contingit.

Idem verò qualitate peccãs, ſi nimirum calidior, te-  
nuiorque ſit, per anastoſim eſſluere poteſt; quia ca-  
lor oriſiciat dilata, & tenuitas efficit, vt facilius eſſluere

possit. Eadem qualitates diapedesim etiâ pariunt; calor enim rarefacit tunicas vasorum, tenuitas verò sanguinis efficit, ut per poros earum tunicarum facilius transfluere possit.

Sanguinis denique acrimonia, venarum tunicas erodit, & exulcerat; ac diabrosim producit.

Causæ antecedentes, eadem sunt, quas coniunctas appellauimus, loco tantum differentes, quando enim sanguis quantitate, vel qualitate peccans, venas immediate aperit causa coniuncta nominatur; Idem verò sanguis in venis contentus, causæ antecedentis rationem habet.

Ad causas etiam antecedentes referuntur, partes mandantes, quarum præcipuæ sunt, caput, hepar, lien, & uterus.

Plerumque fertur sanguis à capite ad ventriculum per palatum, & œsophagum: sæpè etiam catarrhus ferinus ex pituita acri & salsa genitus ventriculum erodit venasque illius aperit.

Ab hepate, & liene, per venas quæ ad ventriculum feruntur, & cum illis partibus communicant.

Ab utero denique sanguis refluens in suppressione mensium ventriculi venas aperit, ita ut quædam mulieres repertæ fuerint, quæ purgationes menstruas per vomitum sanguinis periodicum passæ fuerint.

Frequentius cōtingit sanguinis vomitus ab hepate, & liene, quàm ab aliis partibus: & à liene etiâ, sæpius, quàm ab ipso hepate: maior enim consensum habet lien cum ventriculo, quàm hepar. Pater siquidem ex anatome maximum ramum venæ portæ, in lienem dimitti, à quo venæ multæ ad ventriculum feruntur tum ad partem superiorem, tum ad inferiorem, seu fundum ventriculi & quidem insigniores; ita ut interdum flabibus, & sanguine distentæ, mediij digiti crassitem æquent

quent; quod ex dissectione cadauerum innotuit. Præterea vas breue patentissimum, vt excrementum melancholicum, in statu naturali continuò in ventriculū eructat; sic in præternaturali sanguinem magnā copiā in illius capacitatem effundere potest. Aduertendū autem hīc est nō solum per vomitum, sed etiam per alium in hoc affectu sanguinem excludi, tum quia portio illius qui ad ventriculū confluxit, ad inferiora deturbatur, tum etiam quia venæ mesaraicæ aperiuntur, & in intestina sanguinem profundunt; qui quidem sanguis in longo intestinorum anfractu dinigratur, & picis liquidæ instar reieicitur.

Causæ externæ sunt omnia, quæ vulnerare aut contundere possunt, tum etiam æstus vehementior ob ebullitionem quæ in sanguine commouetur, vnde iuuenes ad 35. annum sanguinis vomitui, aliisque hæmorrhagiæ speciebus maximè sunt obnoxij, frigus etiam immodicū constringendo, venam ruptionem moliri potest: id ipsum efficiunt motus intempestiui, & abores, ac exercitationes insuetæ, clamores, & vociferationes magnæ, quæ sanguinem in venis vehementer commouent.

Ac denique omnes causæ quæ hæmoptoën excitare possunt, proprio capite recensitæ. Sanguis enim in venis, & arteriis à quacunque causa, siue interna, siue externa vehementer commotus, ad eam partem facilius irumpit, quæ debilior, & illius receptioni magis disposita est, atque ita si ventriculū, aut venæ, quæ ad ipsum feruntur, talem dispositionem habeat, vomitus sanguinis excitabitur, potius quàm alia quæuis hæmorrhagiæ species.

Diagnos̃is huius affectus, in eo potissimū verfasur, vt pars à qua sanguis profluit nobis innotescat.

Si ex ipso ventriculo sanguis effundatur, situs par-

ris, & in ea doloris aut gravitatis sensus ferè continuus, illud demonstrabit. Deindè minor est illius copia, graciles enim sunt stomachi venæ, cum nausea sanguis effertur, ac in deglutiendo mordacitas percipitur; tum sanguis aliquando cum cibo, aliàs cum bile, vel pituita mixtus eiicitur.

Si à capite sanguis profluat, quædam circa fauces, & palatum titillatio percipitur; pars sanguinis aliquando per nares emungitur, muco permixta, capitis dolor, aut gravitas præcessit, quæ post talem hæmorrhagiam sedatur.

Ex liene, & iecore sanguis copiosior effunditur, & plerumque tumor aut dolor in illa parte apparet. Ex liene crassus, globosus, ac niger, ex iecore rubicundior, & quodammodo spumosus. Præterea sanguis qui ab hepate fluit, magis, per partem inferiorem elabitur, quàm per vomitum, qui ab hepate per venas mesaraicas plerumque fluit ad intestina, & ab iis, (vt vomitum efficiat,) ascendere debet in vètriculum; faciliùs verò descendit in aluum, cum viâ sit proclivior. Contrà qui à liene fluit, ver vomitum potius quàm per intestina purgatur; quia venæ à liene ad vètriculum sunt breviores, & minùs amplæ.

Si denique vomitus sanguinis fiat à suppressione mensium, ipsa suppressio ab ægrotantis relatu innotesceat, & sanguinis excretio periodica erit, quæ augebit coniecturam, si nullas aliarum partium affectus conspiciatur.

Quod ad prognosim spectat, vomitus sanguinis à quacumque causa oriatur non est expers periculi, vel enim ex nimia sanguinis effusione mortis subitanæ periculum imminet, vel si in ventriculo grumescat, corrumpatur, & putrescat: lipothymias, syncopen, & suffocationes parit.

Minus



Minus tamen periculosus est vomitus sanguinis ex suppressione mensium oriundus, quàm si ex hepate vel liene procedat: prouocatis enim quomodocumque mensibus, curari solet, vt docuit Hippocr. *Aph. 34. sect. 5.* his verbis: *Mulieri sanguinem euimenti, menstruis erumpentibus, solutio fit.* Ex in his sæpè solà venarum inferiorum apertione menstrua prouocantur, aut saltem paucis aliis remediis melanagogis adhibitis, & sic vomitus sanguinis cohibetur.

Qui ex vomitu sanguinis in hydropem ascitem prolabantur, ex eodem pereunt. Testatur Dodonæus; se neminem à tali hydropse seruatum vidisse, & docet experientia ex quacumque sanguinis profusione hydropem excitatum, esse lethaliissimum: quia ex summa caloris natiui dissipatione exoritur, quæ irreparabilis est.

Ad huius affectus curationem opus est remediis; sanguinem à ventriculo reuellentibus, eiusdem intemperiem corrigentibus, & apertionem venarum constringentibus ac glutinantibus. Quibus iungenda erunt, quæ partem primariò affectam respiciunt, à qua sanguis in ventriculum transmittitur, quibus pro varia earum natura & affectu, prospiciendum erit.

Ac primùm quia victus ratio in hoc affectu maximum momentum habet: illius præcipua capita hinc subnectenda sunt.

Alimenta igitur ordinaria debent esse astringentia, & emplastica, tum etiam refrigerantia. actu & potestate talia; vt hordeata, amygdalata, orisata, panatellæ, gelatinæ, & in primis amyllum, sine calce paratum, cum lacte coctum; quod ad hæmoptysim compescendam eximium est; his omnibus semper aliquid succi mali punici, vel aceti rosacei addi poterit. His accedere

cedere poterunt oua indurata aceto intincta ; mica panis aquâ frigidâ macerata ; iuscûla pullorum cum oxalide, portulaca, plantagine, & grânis vuz immaturæ parata; pedes & intestina veruecum, hædorum & vitulorum, ad putrilaginem vsque decocta. In principio mensæ sumatur aliquid adstringens, vt malum cydonium, pomum, aut pyrum austerum sub cineribus coctum, miua cydoniorum, aut gelatina ex cerasis acidis, mespilis, aut sorbis confecta.

Abstineat æger ab omnibus cibis acrioribus, salis, piperatis, & frixis: tum etiam euchymis, quæ multum sanguinem generant, nisi aliquando vires collabi videantur, ad quarum refectiorem illa aliquando, sed parcâ manu erunt exhibenda. Parcè admodum ægri nutriendi sunt, quo minùs enim sanguinis generabitur, eò minor erit fluxio, & partes inanitæ sanguinem magis attrahendo; illius effluxum prohibebunt.

Potus erit perexiguus, ex aqua ferrata cum pauco succo granatorum. Vinum interdicendum est, nisi si crassum & austerum; quod nos torrium appellamus; & tunc etiam febris carentia esse debet.

Aër sit frigidiusculus, extra ventorum flatus, Solis, & Lunæ radios. Somnus sit modicus, & non diurnus. Quamuis enim in somno omnes fluxiones cohiberi dicantur; hæc tamen ex diuturniori caloris concentratione renouari potest. Alius sit semper libera, & omnia animi pathemata vitentur.

Diætâ in hunc modum institutâ, ad chirurgica, & pharmaceutica remedia progrediendum est.

Ac primùm venæ sectio statim celebranda est parcâ manu; & repetitis vicib<sup>9</sup>, vt maior fiat reuulsio. Idque ex basilica cubiti dextri, si à iecore; vel sinistri, si à liene

liene malum exoriri videatur; vel ex vena malleoli, si ex mensium suppressione profluxerit.

Fiant frictiones & ligaturæ partium extremarum. Clysteres detergentes iniiciantur.

Applicentur cucurbitulæ natibus, cruribus & lumbis; imò & hypochondriis, ut sanguis retineatur.

Camphoræ scrup. sem. exhibeatur cum oxycrati, vel aquæ plantag.  $\mathfrak{z}$ . iiij. Quod remedium Rondeletius in consilio quodam, tanquam præstantissimum, commendat.

Oxycrati cyathus exhibeatur, si sanguinis concreti suspicio fuerit: eo enim facile dissolvitur sanguis, & à ventriculi venis propellitur, eademque constringuntur.

Eodem oxycrato ventriculi regio foveatur subfrigide.

Absente vomitu, ut venæ constringantur, sequentia usurpanda.

$\mathcal{R}$ . Album oui n. j. aquæ rosar. & aceti, ana  $\mathfrak{z}$ . j.  $\mathfrak{s}$ . Agitentur fortiter, deinde adde amyli  $\mathfrak{z}$ . ij. Misce, utatur æger ex cochleari. Vel

$\mathcal{R}$ . Corall. præpar. terræ sigillat. boli armenæ, lapidis hæmat. & trochisc. de carabe ana  $\mathfrak{z}$ . j. aquæ plantag. & syrupi myrtini, ana  $\mathfrak{z}$ . ij. Misce, utatur ut suprâ. Vel prædicto pulvere utatur cum iusculis. Vel

$\mathcal{R}$ . Succu plantag.  $\mathfrak{z}$ . iiij. Exhibeatur actu frigidus, manè & serò. Testatur Galen. hoc succo nihil esse præstantius, ad quodlibet sanguinis profluvium cohibendum.

Succus portulacæ, & polygoni cum saccharo sumptus ad idem est efficax.

$\mathcal{R}$ . Aquæ plantag. & portulac. ana  $\mathfrak{z}$ . j.  $\mathfrak{s}$ . syrupi myrtini  $\mathfrak{z}$ .  $\mathfrak{s}$ . syrupi de papavere  $\mathfrak{z}$ . ij. vel ij. salis pru-

nellæ  $\mathfrak{z}$ .j. Misce, fiat iulep. frequenter iterandus. Vel ex decocto prædictar. herbar. idem iulepus vtiliter componi poterit.

℥. Conseruæ rosar. antiquæ, & rad. symphyti ana  $\mathfrak{z}$ .j. cydoniati  $\mathfrak{z}$ .sem. myrobal. condit. n. j. trochisc. de carabe, & de terra lemnia, ana Drach. ij. corall. præpar. & croci Martis, ana  $\mathfrak{z}$ . j. Cum syrupo de ros. succis fiat opiata, quâ vtatur frequenter. Trochisci de carabe non solum astringunt, sed etiam sanguinem concretum dissoluunt; idè frequenter vsurpandi.

Syrupus corallor. vtiliter etiam vsurpari poterit, sed multò vtilius eorum tinctura, cum succo limonum recentè parata.

Vbi magno impetu sanguis excernitur, nec prædictis remediis illius vomitus sedatur, vt mortis periculum immineat; ad narcotica veniendum est, vel assumpta, vel per clysterem iniecta.

Extetiùs verò inungatur regio ventriculi ol. rosac. & myrtino, lotis in aceto, & post vnctionem aspergatur pulvis coralli, boli armenæ, terræ sigillatæ; vel inungatur vnguento sequenti.

℥. Succi plantag. & centinod. ana  $\mathfrak{z}$ .j. sem. aceti rosac.  $\mathfrak{z}$ .j. olei omphac.  $\mathfrak{z}$ .vi. Bulliant ad succor. consumptionem. Deinde adde sang. drac. malthiches, cortic. granat. & myrtil. ana  $\mathfrak{z}$ . ii. caphoræ  $\mathfrak{z}$ . i. ceræ rubræ q. s. Fiat vnguentum.

Pro potu vtatur aquâ ferratâ, cum syrupo cydonior. & spir. vitr. Iuscula etiam cum aquâ ferratâ decoquantur.

> Foucantur hypochondria & lumbi subfrigidè decocto plantag. & portulac. facto in oxycrato.

Manus demittantur in aquam frigidam: sic enim omnis vomitus sedatur.

Postea vnguentum refrigerans Galen. in acetolo-  
tum dictis partibus illinatur.

Celebrata sufficienter phlebotomia, ad causæ su-  
blationem, & integram morbi solutionem, purgatio  
blanda & frequens instituenda est, quâ sanguis à se-  
rosus & biliosus humoribus hunc affectum producen-  
tibus repurgatur. Cuiusmodi purgationes à Medico  
prudenter celebratæ miranda præstant, vt nos expe-  
rientiâ didicimus. Debent autem fieri ex rhabarb. my-  
robolanis; tamarindis, & tryphera persica; quæ medi-  
camenta purgando astringunt, & humores nullo mo-  
do exagitant, vt inde non metuenda sit vomitus san-  
guinis concitatio. Illa autem exhiberi poterunt, vel  
in forma boli, cum syrupo myrtino, aut de rosis sic-  
cis; vel potionis, cum decocto cichorii, acetosæ, por-  
tulac. & similium.

Dum purgatio celebratur, quæ per tres aut qua-  
tuor dies potest continuari, parca purgantium dosi;  
vespertinis horis exhiberi poterit opiata prædicta,  
aut syrupus corall. aut aliud ex prædictis medicamen-  
tis astringentibus & roborantibus.

Denique ad præcautionem, rhab. pulu. ʒ. i. semel in  
septimana, per longum tempus exhiberi poterit; vel  
syrupus magistralis ad hæmoptyleos præcautionem  
descriptus. Tum reliqua ferè remedia, quæ ad illius  
affectus curationem & præcautionem proposita sunt,  
in hoc etiam casu conuenire poterunt.

## CAPVT IV.

## De Cholera morbo.

**C**holera morbus est violentissima humorum biliosorum acrium, aut corruptorum, per vomitum & aluum excretio.

Cholera dicitur *ἀπὸ τῆς χολῆς*, à bile flaua, vt docet Gal. ex sententia Gnidorum medicorū 2. *meth. cap. 2.* cū ex bile flaua, & humore prauo bilem æmulante, suprà & infrà erumpente hoc malum oriatur. Attamen Alexander Trallianus *lib. 7. cap. 14.* non vult hoc nomen ab humore bilioso esse deductum, quia non semper bilis euomitur, sed etiam sæpè serosus, & pituitosus humor, sed potius *ἀπὸ τῶν χολάδων*, id est ab intestinis, quæ ab antiquis *χολάδες* nominata sunt; quoniam ab intestinis, & interraneis humores isti eructantur. Prior tamen etymologia magis probanda est, quia non solum à Galeno, sed etiam ab Hipp. 7. *epid. textu. 19.* Celso *l. 4. c. 11.* & Aureliano *lib. 3. acutor. cap. 19.* recipitur. Et quamuis biliosus humor non semper reiiciatur, est tamen acer, mordax & corruptus, ac bilis naturam accedens.

Partem affectam alij statuunt ventriculum, alij intestina, alij ventriculum, & intestina simul; verū Galeni sententiæ inhærendum est afferentis 3. *de sympt. causis cap. 2.* partem primariò affectam esse ventriculum, cuius facultas expultrix vehementer irritatur, vt per vtrumque orificium humorem noxium expellat; secundariò verò, gulam, & intestina affici dubium non est.

Est igitur hic affect⁹ symptoma facultatis expultricis  
laxæ

læsa, & vehementer irritata: non potest autem dependere à retentrice debilitata, qui in ea humore paulatim effluuit, vt in lienteria, & coeliaca passione. Fateri tamen oportet, vehementiorem fieri affectum, & retentrix debilis expultrici nõ resistat. Cõcurrit etiam ad hoc opus concoctio læsa, ob quam prauī humores in ventriculo generātur, & expultricē irritāt; sed hæc causæ tantum antecedentis rationē habet. Hipp. 4. *de victus ratione in acutis* textu 104. duas proponit cholerae species, vnā humidam, alterā verò siccā. Humida est illa quæ hætenus descripta est, quæue sola propositā definitione describitur, tanquam frequērior & magis vsitata. Sicca verò lōgè infrequērior est, fitque à spiritu flatuoso à vētriculo & intestinis exeūte, partesque per quas transit, mordicāte. Generātur isti flatus, vel à ventriculi calore igneo cibos corrūpente, & in nidore conuertente; vel à cibis flatuosis & nidorosis, vt sunt cepæ, raphani & similia. Sennertus aliam causam addit ab Hermericorum doctrina mutuātam, nempe humores salios, & adustos circa hypochondria cumulos, & alterius humoris permixtione efferuescentes. Quantam enim (inquit) spiritunū copiam sales & spiritus salini cū spiritibus acris permixti suppedient ex olei vitrioli, & aquarum fortium cum sale tartari mixtione apparet. Tale ergo quidpiā etiā in corpore humano accidere & ex humoris falsi atque adusti cum aliis spiritus commixtione, magnam spiritus flatuosi copiam excitari posse incredibile non est.

Causa proxima huius affectus est humor biliosus, exustus, acidus, falsus, vel putrescens in vētriculo, intestinis, hepate, liene, mesenterio, vel pancreate collectus: vel alimētum praua substantia præditū, medicamentū vehemens & deleterium, aut venenum assumptum. Hipp. 7. *Epid. tex. 90.* causæ ferè omnes, à quibus

pravi isti humores generantur: diligenter enumerat, his verbis. *Cholerica sursum & deorsum eruptiones è nimio esu carnis potissimum suilla crudioris: item ex cibis insuetis, & ebrietate vini veteris, & dulcioris, ex granis pini, locustis, nucibus rācidis atque ex aliorum usu. porri, & ceparū, maxime à lactucis costis, brassica, & similibus crudioribus, à placentis etiam, & dulciariis, & mellitis, fructibus horariis, potissimum cucumere, & pepone. Fiunt autem magis aestate, quia tunc facilius corrumpuntur, vel inconfecta manent.*

Adnimaduersione dignū est, vnde tanta humorum copia deriuetur, quæ per vomitum, & in aluū in cholera morbo reiicitur. Vulgò respondetur illos humores in mesenterio, & locis ei vicinis contineri, Nonnunquam etiam è toto corpore confluere. Quodd cum veritati consentaneum sit; dicere tamen possumus humores corruptos in ventriculo, aut partibus vicinis contentos, malignā qualitate alios quoque humores corrumpere, eosque à natura irritata ad ventriculum & intestina prottudi; quemadmodum venenata medicamenta, vt antimonium; colocynthis, elaterium, & similia bonos humores corrumpendo, hypercatharsi efficiunt.

Signa huius affectus diagnostica sunt, humoris biliosi, acidi, vel aliis modis corrupti, per vomitum, & secessum, frequens & copiosa excretio; ventriculi & intestinorum morsus, inflatio & dolores, sitis cum æstu & anxietate; nausea vehemens, quæ frigidā nonnihil sedatur, sed calefacta statim reiicitur; pulsus non raro paruus, & inæqualis; sudor interdum diaphoreticus, erurum & brachiorum conuulsio, syncope, extremorum frigiditas, aliaque grauissima symptomata.

Causæ etiā hunc affectum producentes facile inter nosci poterunt. Ac primū externæ, ex ægrorum, & astantiū relatu innotescēt. Si nimirum æger alimēta

in



in nimia copia, vel praua qualitate infecta ingesserit: si venenum aliquod, aut vehemens medicamentum hauserit. Internæ verò ex humorum qui reiciuntur qualitate, eorundem intus genitorum copia dignoscuntur. Primariū esse affectum, & ventriculi vitio oriundum coniicimus, si reliquæ partes benè constitutæ sint, nulloque affectu laborent. Præterea adest nausea perpetua, angustia, morsus, & dolor ventriculi, materia reicitur viridis, & æruginosa. Si verò in venis sit genita, febris ut plurimum maligna adest.

Prognosis huius affectus ita instituenda est, ut nimirum morbus dicatur acutissimus, subitam plerumque mortem inferre solitus. Si tamen ex assumptorum vitio oriatur, minus periculi est, quia iis exclusis affectus plerumque soluitur.

Quo grauiora sunt in cholera symptomata, ut syncope, cōuulsio, & extremorum frigiditas, eò breuiorem historiā, & mortem propinquiorem expectare oportet.

Hippocrates in *coacis* choleras quasdam criticas esse docuit, quæ lipyriis febribus adueniunt, & alio modo ex illius sententia solui non possunt, nisi ingenti bilis eruptione sursum & deorsum facta: quæ tamen crises rarissimè cōtingunt & valdè suspectæ esse debent, ut potè bonæ crisis & salutaris cōditiones nō habentes.

Si vomitus mitigari & sedari incipiat, si faciei color cadauerosus, & habitus Hippocraticus in meliorem restituitur, salutis spes affulget.

In huius morbi curatione primū affectu incipiēte, euacuatio aliquantulum permittēda est, dum prauis & corruptis humoribus exierint. Tum etiam interdū eorum exclusio molienda, vomitione concitatā haustu aquæ tepidæ, cum syrupo acetoso mixtæ, aut iusculo pulli magnā copiā sumpto; & si non vomatur, humorum acrimoniam saltem cōtemperat. Vel dictorum humo-

tum exclusio perficiatur rhab. exhibito cum syrupo de absinthio, in formam pilular. redacto; necnon clysteribus nonnullis detergendi vi præditis.

Præterea clysteres pingues & lenientes identidem iniiciendi, ex lacte, ol. rosato, butyro insulso, loto cum aqua rosar. vel ex decocto pulli, carnis vitulinæ, vitellis ouor. quibus interdum, urgente affectu, narcotica permiscenda.

Clysteres etiam ex oxycrato plurimum conferunt; vel ex decocto lactucæ, portulacæ, plantaginis addito aceto, syrupo de nymphæa, & vitellis ouorum.

Internis etiam humorum acrimonia demulcenda; vt decocto portulac. & plātag. cū syrupo cydonior. & de rosis siccis, & sale prunellæ, si ardor & sitis urgeant.

Ac denique vomitus cohibendus iis medicamentis tam internis, quàm externis, quæ pro vomitu bilioso fuerunt descripta.

Inter quæ narcotica principem locum obtinent, ac præcipuè theriaca recens, quæ ad Drach. j. exhibita vehementes illas euacuationes velut in momento cohibet. Idem præstat laudanum opiatum, ad ḡ. iv. exhibitum.

Si magna sit virium exolutio (vt sæpissimè contingit) integra laudani dosis tuta non est; sed melius est ḡ. j. vel ij. tantum exhibere, & semel in die repetere, atque etiam bis, si res admodum urgeat. Si enim impetus humorum cohibetur, & naturæ dantur induciz, vt eos concoquere ac edomare valeat.

Cohibito vomitu, & alui fluxu remediis supra propositis; & viribus aliquantulum instauratis cardiacis remediis; ægri à periculo liberati videntur; quod non solum astantes, sed etiam medicos interdū fallit; symptomata enim post vnū aut alterum quietis, & intermissionis diem, fortiora ac vehemētiora resurgunt, & ægrum

ægrum, à priori insultu valdè debilitatum, de medio tollunt. Cui ingenti periculo occurrendum est, non solum vires instaurantibus, & humoris feruorem demulcentibus suprâ propositis, quæ etiâ sedato insultu continuari debent; sed præcipuè venæsectione, quæ sanguinem illum torridum & æstuantem reuellit, & & maximè contemperat: eaque semel, bis, tertie erit iteranda, si vires à prima euacuatione nullo modo debilitatæ, sed potius recreatæ appareant. Quidam practici in ipso insultu, etiam valdè prostratis viribus venam secare audent, quas dicunt esse oppressas, non exolutas. Attamen sine periculo tunc temporis sanguis mitti non potest: Et interdum ægrotantes paulò post illam euacuationem è medio sublati sunt, non sine remedij opprobrio. Ac licet virium oppressio quædâ agnoscenda sit ab humore superfluo, & naturæ infesto in venis contento: maxima tamen earum exolutio negati non potest; ab horrendis euacuationibus per vomitum, & secessum subsecuta. Satiùs ergo est humorum impetum primum cohibere, mox pacatis symptomatis ad venæsectionem confugere.

Quia verò in hoc affectu vires ex maximis euacuationibus citissimè concidunt, earum instaurationi diligenter incumbendum est iis auxiliis, quæ in virium imbecillitatis curatione proposita sunt.

---

## C A P V T X.

### *De dolore ventriculi.*

**D**olor ventriculi est tristis eiusdem partis sensatio, à rebus mordentibus, aut distendentibus, sique continuitatem illius soluentibus excitatus.

Qq 3 In

In ventriculo autem tres partes plurimum inter se discrepantes, considerandæ sunt; orificium nempe illius superius, orificium inferius, pylorus nominatus, & reliquum illius corpus totam cauitatem constituens.

Orificium ventriculi superius exquisitissimo sensu donatum est, propter neruum insignem, quem à sexta coniugatione mutuatur, & idè dolores in eo fiunt acutissimi, qui viscus nobilissimum, sibi que vicinum, cor nimirum in consensum trahit; vnde cardialgia, & cardiogmos nominatur. Tantus enim est ille cordis cum orificio ventriculi superiori consensus, ut veteres illud orificum *καρδια* nominauerint.

Si verò membranæ ventriculi cauitatem constituentæ, aut pylorus dolore afficiantur, dolor ventriculi simpliciter nominatur, & interdum, colica ventriculi, præcipue quando à flatibus excitatur.

Proxima huius doloris causa est solutio continui, à rebus mordentibus, vel distendentibus excitata. Illæ autem res mordentes, vel distendentes præcipuæ, & frequentiores sunt, humores, vel flatus. Quibus addi possunt lumbrici tunicas ventriculi vallicantes.

Humores acres, vel maligni, ut bilis porracea, æruginosa, vel atra, pituita salsa, corrupti ichores, pus foetidum, ex disrupta hepatis aut thoracis vomica, in ventriculū effusum, & quicumque alij humores acrimonia præditi, dolores in ventriculo excitare possunt.

Vapores etiam acres ex iisdem humoribus eleuari, hunc dolorem efficere consueverunt.

Flatus verò in cauitate ventriculi contenti, inflationem, & tensionē dolorificam efficiunt; sed multò magis intra tunicas illius coerciti, qui affectū contumaciorem efficiunt; cum difficilius inde excuti valeant.

Morbi etiam tum ipsius ventriculi, tum partium vicinarum;

cinarum, hunc doloꝛem parere conſueuerunt, vt in-  
tẽperies quælibet excedens, tum calida, tum frigida  
& multò magis inflammatio; interdum verò ſcirrhus,  
aut alius tumor durus, grauantem doloꝛem efficiens:  
Ac denique vulnera, & vlcera eiꝛſdem partis, vicina-  
rum etiã partium tumores, & inflationes ventricu-  
lum comprimendo, doloꝛem ipſi inferre poſſunt.

Humores autem & ſtatus, ventriculi doloꝛem exci-  
tantes, vel in ipſo ventriculo generãtur, vel à toto cor-  
pore, aut quibuſdam illius partibus in eum confluunt.  
A toto corpore in febribus, vel dũ corpus prauis hu-  
moribus reſertũ eſt. Ab aliis partibus verò fluũt præ-  
cipuè ab hepate, liene, & cerebro; ab hepate bilis, à lie-  
ne melancholia, vel atra bilis; à capite pituita falſa.

Ab aliis etiã cauſis extraordinariis, & in frequen-  
tioribus talis dolor excitari poteſt, vt de lapidibus in  
ventriculo genitis narrat Schenckius *lib. 3. obſeruationum*.  
Et de corio lardi fumo exſiccato reſert Fabricius  
Hildanus *obſeruat. 33. bib. 4.* cuius fruſtrum deglu-  
titum matrona quædam in ventriculo ſeruauerat per  
duos annos, continuis excruciatã doloribus, idque  
tandem aſſumpto vomitorio medicamento, vomitu  
reiecit & liberata eſt.

Cauſæ externæ hunc affectum producente, ſunt ali-  
menti vel praua qualitate infecta, aut ſumma acrimo-  
nia prædita, quæ per ſe talem doloꝛem, inferre poſ-  
ſunt; vel flatibus generandis idonea; vel nimia quan-  
titate aſſumpta; ita vt putreſcant & acrimoniam in-  
duant; vel calidiora plus iuſto, vt ex iis copia bilis  
ducatur. Sic etiã medicamenta fortiora, vel acriora,  
vel deleteria facultate prædita, vel nimia quantitate  
aſſumpta, vel non ſatis correctã; & venena exhibita  
hunc doloꝛem facile inferre poſſunt.

Signa diagnoſtica ad partem affectã, & cauſam di-

rigenda sunt. Ac primùm situs doloris orificiũ ventriculi sepeius affici ostendit, quando scilicet sub cartilagine xiphoide percipitur. Sed multò certius hanc partem affici significat, & veram esse cardialgiã, dolor acerbissimus ab exquisito partis sensu promanans anxietates, & iactationes, ut æger in vno situ consistere non possit; quibus etiam sæpè accedunt lipothymiz, & animi defectiones, propter cordis consensum, cuius summa est cum ventriculo sympathia, non solum propter vicinam, sed etiam propter magnam spirituum dissipationem, quæ per istos cruciatus contingit. Interdum etiam cerebrum trahitur in sympathiam, ob insignem neruum qui huic particulæ implantatur: & vapores acres, qui inde rectâ viâ ad caput eleuantur, vnde cephalalgia, & hemicrania, & aliquandò vertigines, & epilepsia oriuntur.

In aliis verò ventriculi partibus dolores sunt quidem acerbi, sed tam grauibz symptomatis comitati non sunt, atque aded dolores colicos æmulantur, situt tantum doloris differentes.

Causæ istos dolores efficientes propriis etiam signis distinguuntur, quorũ magis perspicua ab excretis desumuntur. Si enim bilis vel pituita vel flatus, vel lumbrici per os, aut aluum excernantur, facile est coniecere ab huiusmodi causis affectum dependere. Attamen etiam si nulla materiæ morbificæ excretio fiat, signis peculiaribus bilis, aut pituitæ, aut flatuum redundantiam internoscere possumus; tum etiam signa lumbricorum intus latitantium ex proprio capite erũt desumenda. Quemadmodum etiam morbi peculiares, tum ventriculi ipsius, tum partium vicinarũ hũc affectum producentes ex propriis cuiusque signis innotescunt. Colligitur etiam diagnosi humori, dolorẽ committentis, ex tempore inuasionis, incrementi, aut cessatio-

nis doloris. Quibusdā enim antē cibumolor exacerbatur, & hoc bilis dominium significat, quæ ieiunij tempore exagitur, & in ventriculum attrahitur, aut magis intenditur, & acrior euadit, Aliis statim ab assumpto cibo dolor cōmouetur, quia humores crudi & mordaces, qui antea quieti erant, & ventriculi tunicis infixi, ab assumpto cibo commouentur, vel qui in fundo ventriculi hærebant, sursum attolluntur, & orificium ventriculi afficiunt. Aliis dum cibus concoquitur dolor exacerbatur, quia vapores acres, & mordaces eleuantur ex materia morbifica, à calore aucto in ventriculo tempore concoctionis. Aliis quatuor aut quinque horis à pastu, quia concoctione deprauata cibi corrumpuntur, & corrupti ventriculum vellicant. Quibusdam denique post somnum dolor exacerbatur, & ille fit à catarrho, fluente humore à cerebro per somnum, qui maiori copia cumulat, dolorem in vigilia producit. Sedatur verò interdum dolor à cibo, quia ciborum benignitate humoris acrimonia demulcetur.

Quod ad prognosim spectat. Certum est cardiagiā reliquis vetricui doloribus esse longè periculosiorem, propter exquisitū oris ventriculi sensum, & maximum illius cum partibus principibus consensum.

Maior vel minor causæ morbificæ prauitas, & symptomatum vehementia maius vel minus periculum portendit.

Febris continua & acuta cum insigni ventriculi dolore coniuncta magnum minatur periculum, quod docuit Hippocrat. *Aphor. 65. sect. 5. In febribus circa ventriculum vehemens aestus, & cardiogmos, malum.* Magnam enim ventriculi inflammationem; vel humorum vitiosorum copiam in ventriculo contentam, significat.

Ventriculi dolor à lumbricis, vel flatu oriundus, ut plurimum minùs periculosus est, quia causam minùs rebellem, & parti minimè affixam habet. Aliquando tamen ex lumbris in ventriculo contentis, eumque mordentibus grauissima symptomata oriuntur, ex quibus ægri derepente intereunt. Sic etiam ubi intemperies flatus generans rebellis facta est, ac veluti habitualis, non caret periculo, quia in hydropem siccum degenerat ex Hippocr. *Aphor. 11. sect. 4.* In Cardialgia extremorum frigiditas, mortem proximam prænuntiat.

Curatio huius affectus pro causarum varietate maxime varianda est. Si enim ab aliarum partium affectibus oriatur, illorum affectuum therapia adhibenda est. Si verò in ipso ventriculo causa stabuletur, dolor vel à flatu, vel ab humoribus acerbis & biliosis, vel ab inflammatione, abscessu, aut ulcere procedit.

Qui à flatu generatur, curandus est remediis discutientibus, & euacuantibus flatulentam illam materiam, tum etiam pituitam, à qua flatus concitantur.

Ac primùm iniiciendus est clyster emolliens & laxans, cui statim succedat alter carminans, & discutiens, ex decocto fel. origani, calamenthi, pulegij, rutæ, centaurei minoris; sem. anis. fœnic. dauci, cumini, & similium. In quibus dissoluatur benedicta laxatiua, ol. anethinum, rutaceum, mel anthosatum.

Si dolor perseueret, ex oleo rutæ, aut nucum, & vini generosi, aut hiopocratici partibus æqualis clyster erit componendus, addendo aquæ vitæ ℥. ii.

Vel parietur clyster ex vino albo, cum olei iuniperi, aut cinam. aut caryophyll. chymicè extracti gutt. viij. qui miraculi instar liberat.

Postea



Postea admoꝛueatur fotus sequens regioni stoma-  
chi.

℞. Rad. cyperi, galangæ, calami aromat. ana ℥. j.  
fol. mēthæ, origani, pulegij, maioranæ, hyssopi, saluicæ,  
ana M. j. sem. anisi, fœniculi, carui, dauci & baccar.  
lauri, ana ℥. sem. flor. cammomil. meliloti, authos, &  
lauendulæ, ana P. j. Contundantur, & incidantur, in-  
cludanturque duobus sacculis, qui bulliant in vino  
generoso; dein expressi, ventriculo, & toti ventri al-  
ternatim admoꝛueantur.

At in materia minùs frigida potest parari fotus  
sequens, maximè laudatus à Foresto, vt qui reliquis  
remediis non conferentibus, ægrum à dolore citis-  
simè liberauerit.

℞. Rad. althææ ℥. sem. rosar. rubr. flor. cham. sum-  
mitatum absenthij, ana M. j. Coquantur in aqua com-  
muni, & chamæm. ad ℔. j. sem. in fine addendo vini  
Rhenensis optaquæ rosac. & aceti, ana parùm. Fiat  
fotus.

Post fotum fiat illitus ex ol. rutaceo, & anethino  
mixtis cum aqua vitæ, quibus aliquid addatur ol. sal-  
uicæ, aut caryophyll. chymicè extracti.

Post inunctionem admoꝛueatur emplastrum de bac-  
cis lauri; vel eius loco cataplasma ex melle, & semi-  
ne cumini.

Interim dum hæc fiunt, si nausea adsit, excitabi-  
tur vomitus blandiori vomitorio, aut catharticum  
exhibebitur pituitam euacuans.

Purgato corpore exhibeatur ol. amygdal. amar. re-  
center extract. & cum vino albo mixtum: aut vi-  
num Hipp. aqua clareta, vel aqua cinam.

Iulepus sequens ad dolorem sedandum, flatus dis-  
cutiendos, pituitam detergendam, & ventriculum  
roborandum efficacissimus est.

℞. Fol.

℥. Fol. absinthij vulg. centaureij minor. & agrimoniana M. sem. Coquantur ad ℥. v. In colat. dissolu. sacchari albi Vnc. j. Capiat manè per biduum.

Amatus Lusitanus valdè commendat aquam è florib. chamæm. destillatam, tanquam præcipuū. leniendis ventriculi, & intestinorum doloribus, auxilium: cuius Vnc. iij. calidè exhibeantur. Vel in aquæ illius penuria, decoctum flor. chamæm. usurpari poterit, maximè laudatū à Foresto: Qui se mercatorem quendam, ingenti stomachi dolore affectum cum insigni clamore, hoc solo decocto semel exhibito curasse refert. Quo epoto, emissis ructibus in sudorem solutus est, & incantamenti instar omnis dolor evanuit, vt nullis aliis præsiidiis opus fuerit. Ex hoc autem decocto, cum semine anethi parato, aut etiam agarico, vel radice asari: dissoluendo oxymel, syrupum acetosum, aut rosatum solutivum, parari potest vomitorium, ab initio morbi exhibendum, quod euacuando mitigare dolorem poterit.

Docet Galen. cucurbitulam ventriculo admotam illius dolores citissimè resolvere instar incantamenti. Hæc tamen cautio adhibenda est, vt nihil aut parū humoris crudi in ventriculo lateat; alioqui dolorem intendit.

Vtiliter etiam admoventi potest eidem parti panis recenter è furno extractus, per medium sectus, tum per se, tum pulueribus aromaticis conspersus.

Tandem dolore pertinaciter adhærente, confugiendum est ad balneum ex decocto herbarum emollientium, & calefacientium, quod tutissimum & efficacissimum est: flatus enim diffundendo, & per poros apertos resoluendo, à dolore liberat. Quod citius efficietur, si in ipso balneo remedium aliquod discutiens ægro exhibeatur. Concurrente enim vtroque.

que præsidio, tum interno, tum externo, opus ritè peragitur.

Balneum esse debet valdè calidum, vt faciliùs flatus discutiantur, & humores crassi colliquantur.

Quòd si propter doloris vehementiam clysteres vel iniici, vel retineri nequiverint; in ipso balneo catharticum propinandum est, & in eo horam integram, aut dimidiam immorandum, donec vis cathartica ventriculum & viscera attingat.

Aliquando autem, vbi ex doloris vehementia periculum imminet, ad narcotica est confugiendum. Quibus prudenter exhibitis, admirandus non rarò subsequitur effectus.

Nonnulli etiam cum purgantibus narcotica permiscant, vt simul & dolor sedetur, & materia peccans educatur; quale est medicamentum Elidæi à Foresto laudatum, quod sic habet.

℞. Diaphæn. ʒ. β. philonij Romani ʒ. ij. Cum aqua vel decocto chamomillæ, fiat potio.

Dolore prorsùs sublato, in iis qui ei sunt obnoxij, semel aut bis in mense purgatio iteretur, vt proxima flatuum causa auferatur: tum remedia roborantia usurpentur, qualia in læsæ concoctionis curatione proposita sunt.

Qui verò à bile dolor excitatur, curandus est humoris peccantis euacuatione, vomitorio blando, aut cathartico medicamento; aut clysteribus frequentibus, emollientibus quidem, non acris, aut calefacientibus.

Postmodùm demulceatur humorum acrimonia iulepis refrigerantibus & incrassantibus; emulsionibus semin. frig. maior. lacte recenter mulcto, oleo amygd. dulcium recenti, vitellis ouor. & similibus.

Interim

Interim non omittantur opiatæ, aliæque roborantia, in superioribus curationibus descripta.

Ac tandem necessitate urgente, ad narcotica confugiendum est.

Extrinsècùs admoueatùr cataplasma ex mica panis in lacte decocta, additis vitell. ouor. & croco.

Vel admoueatùr panis recenter ab igne extractus, per medium sectus, & in aceto madefactus.

Vel foueatùr eadem pars decocto flor. chamomill. violar. & nymphææ. Aut quod multò præstâtius, demergatur æger in balneum aquæ tepidæ; id enim ad huius affectus curationem præcipuam vim obtinet.

Dolore sedato, si fortè reuerti contingat, æger purgabitur bis in mense, & viscerum intemperies calida corrigetur victu refrigerante, & remediis conuenientibus.

Qui verò dolor sit ab inflammatione, abscessu vel vlcere, remediis in sequenti curatione proponendis oppugnabitur.

## C A P V T XI.

### *De inflammatione, abscessu, & vlcere ventriculi.*

**L**icet in ventriculo, quemadmodum in omnibus aliis partibus omnia tumorum genera contingere possint, non hic tantùm de inflammatione, seu phlegmone agemus, quæ frequentior est, cùm reliqui tumores rarissimè eueniant, & eadem methodo qua reliquarum partium internarum tumores, curari valeant.

Est

*Cap. XI. De Ventr. inflam. abscess. & vlc. 623*

Est igitur inflammatio ventriculi, tumor præter naturam à sanguine per venas quibus alitur à venæ portæ ramis derivatis, in ventriculi substantiam eiusque membrana effuso.

Ille autem sanguis vel purus est ac syncerus, & phlegmonem propriè dictam producit, vel cum bile, pituita, aut melancholia permixtus, & phlegmonem erysipelatofam, œdematofam, aut scirrhopfam efficit.

Causæ externæ plurimæ esse possunt; quæcunque videlicet, sanguinem feruidiorem efficiunt, ut alimenta calidiora, & meri potio, vel cum ad illam partem promouere possunt, ut contusio ventriculi, dum præsertim cibo turget. Quibus addi possunt calidissima, & acerrima assumpta, ut cantharides, sublimatum, & similia.

Signa huius affectus diagnostica sunt, ingens dolor, ardens & pungens, distendens & pulsans, & in dorsum vsque protensus, tumor adest tactu conspicuus; imò & interdum visu. Scapulæ deorsum trahuntur; respiratio difficilis est, sicut & deglutitio, atque eructatio, Cruentum nonnunquam aliquid euomitur, febris adest ardentissima sæuissimis comitata symptomatis.

Si inflammatio est pura à solo sanguine oriunda, mitior aliquantulum est; si verò erysipelatosa, symptomata grauissima sunt, & speciatim febris lipyria adest, in qua exteriora rigent, & interiora vruntur, & sitis adest inextinguibilis, quæ etiam febris inflammationi intestinorum erysipelatossæ aduenire solet.

Huic ventriculi inflammationi plurimum affinis est inflammatio, quæ vel summam iecoris partem, quâ ventriculus obtegitur; vel incumbentem illi

abdominis regionem occupat ; quæ sola sympto-  
matum vehementia & perniciæ distinguitur ; nempe  
ventriculū obsidens inflammatio omnia sæuissima  
& periculosissima præ se ferre consuevit.

Ex prædictis facile est prognosim elicere , & affe-  
ctum valde periculosum, imò vt plurimum lethalem,  
nuntiare.

Periculosior tamen est qui totum ventriculū aut  
superiorem eius partem occupat , vel qui ad erysipe-  
latis naturam accedit.

Galen. *in 3. prorrh.* nauseam , & conturbatio-  
nem ventris plurimam, ac frequentem prauam esse  
docet ; ostendit enim prauos humores ventriculi tu-  
nicis pertinaciter adhærere, easque vellicare , & ad  
expulsionem irritare.

Si inflammatio non interimat, neque resolutione  
curetur, in abscessum degenerat, qui cognoscitur do-  
loris & febris remissione, tumore perseverante.

Rupto abscessu vlcus relinquitur , quod puris ex-  
cretionē , per vomitum & secessum reiecti inno-  
tescit.

At verò vlcus ventriculi non solum ex abscessu  
disrupto, sed etiam ab aliis causis producitur , quæ  
hic etiam numerandæ sunt , ne quippiam in illius  
Theoria deficiat.

Causæ igitur vlceris ventriculi sunt, vel internæ  
vel externæ.

Internæ sunt humores acres in ventriculo geniti,  
vel aliunde in eum transmissi, vt bilis flaua, vel atra,  
vel pituita salsa.

Externæ causæ sunt medicamenta acria eroden-  
tia, aut venena. Huc etiam referri possunt, vulnera  
ventriculi malè curata, quæ in vlcus degenerant: tum  
etiam ruptio alicuius venæ, insignioris, quæ coales-  
cere

*Cap. XI. De Ventr. inflam. abscess. & vlc. 625*  
cere sufficienter non potuit post vomitum sanguinis copiosum.

Cognoscitur vlcus in ventriculo genitum præcipuè ex pure quod vomitu aut secessu reicitur. Cui signo primario alia addenda sunt. Primò enim percipitur in ventriculo dolor pungens cum ardore coniunctus, præcipuè dum quippiam excedente aliqua qualitate præditum assumitur, acre scilicet, salsum, vel acidum; aut intensè calidum, vel frigidum. Adest præterea deiecta appetentia, ructus foetidus, febris lenta, & assidua.

Prognosis funesta ut plurimùm instituenda est, nisi vlcus sit perexiguum, & superficiem tantùm occupet, ac febrem coniunctam non habeat. Membrana enim ventriculi ulcerata, utpote pars spermatica difficillimè coalescit; alimenta in ventriculo malè affecto non benè concoquuntur, & ante absolutam coctionem reiciuntur vlcus lancinans. Præterea medicamenta parùm præstant, quia detergentia vlceris curationi necessaria dolorem excitant; exsiccantia verò, quæ alteram vlcerum curandorum indicationem implent, impediuntur continuò ab esculentis, & potulentibus & chylosa materia, aliisque humoribus, qui in ventriculo debili continuò retagnant.

Curatio prædictorum affectuum sigillatim instituenda est.

Ac primùm inflammationis curatio inchoanda est à venæ sectione pluries repetita in utroque brachio, quantum vires ferre possunt. Ac licet ob syncopen, & extremorum refrigerationem, vires ab initio deiectæ videantur: illa tamen virium infirmitas est ab oppressione, quæ vacuationem postulat, atque ita venæ sectionem prohibere non debet.

Præterea apertio hæmorrhoidum, si æger huic evacuationi

R r

cuationi

cuationi assuetus sit, sanguinem à ventriculo vtiliter euellere poterit. Quod etiam minus vtiliter præstabit cucurbitulæ scapulis, dorso, & naribus admotæ, tum siccæ, tum humidæ; frictiones & ligaturæ partium extremarum; & calefactio earumdem partium, (quæ frigere plerumque solent (admotis linteis calentibus, & inunctione olei irini, nardini, aliorumque calidorum.

Purgantia in hoc aff. Atq. improbantur, quia humores conturbant & in partem affectam attrahunt.

Attamen Auic. tamarindorum decoctum, aut cassiæ ℥. β. cum aqua endiuiz, vel sero lactis dissolutam commadat, singulis diebus vsque ad septimum diem exhibitam. Quia molliendo, non trahendo expurgat, mitigat acrimoniam, & lenit dolorem. Satius tamen est ab omni purgatione in principio abstinere. Septimo elapso, apparentibus quibusdam concoctionis & declinationis indiciis, potest etiam institui purgatio ex rhab. ℥. j. cum santal. rubr. ꝯ. j. in aqua borrag. infusa, addendo syrupi rosac. ℥. j. vel ij. vt sordes parti hærentes paulò valentiùs educantur.

Interim clysteres emollientes, refrigerantes, & lenientes singulis diebus erunt iniiciendi, quorum formula talis esse poterit.

℥. Iuris pulli, vel decocti maluæ, & violariæ lb. j. cassiæ recentè extractæ ℥. j. olei rosac. & violac. ana ℥. ij. sacchari ℥. j. β. vitell. ouor. num. ij. Fiat clyster.

Alterantia verò & roborantia per os assumenda, eadem esse poterunt; quæ in curatione doloris ventriculi ab humore bilioso fuerunt proposita.

Peculiariter autem conferre possunt syrupi de nymphæa, & de succo portulacæ, potissimùm in principio, quia repellentis medicamento vicem implere possunt.

Conferunt



*Cap. XI. De Ventr.inflam.abscess.& vlc. 627*

Conferunt etiam non parùm emulsiões iv. sem. frig.maj.& sem.papau.albi:dolorem enim leniunt,& calorem contemperant. Tum etiam iulepi sequentes.

℞. Aquæ rosar. ʒ. iij. aquæ plantag. Vnc.ij. succi acetosæ,vel vini granat.Vnc.j.ß.sacchari rosar.Vnc.j. Bulliant parùm & colentur. Capiat Vnc. ij. bis aut ter in die.

Si dolor vehementer vrget, syrupus de papau.exhiberi potest.

Pro potu vratur decoctio hordei cum syrup. violac.& frigidum bibatur.

In progressu morbi, alia medicamenta prædictis erunt permiscenda, quæ resolutionem adiuuent. In hunc finem iulepi sequentes præscribi poterunt.

℞. Syrup.nymphææ, de pomis,& de succo portulacæ, ana Vnc.j. syrupi de absinthio pontico Vnc. ʒ. aquar.lactucæ,acetosæ,& fœniculi, ana Vnc. iij. pulueris electar.diamarg.frig. ʒ. j. Fiat iulep. pro iij. dosibus, bis in die sumendis.

His addere licet opiatas instaurantes, narcotica & similia. Quæ omnia varianda erunt multis modis, pro Medici iudicio & prudentia.

Terebenthina cum aqua absinthij lota, si bis, terve detur, vel resoluit, vel maturat ventriculi apostema.

Exteriùs verò fots sequens in principio admoveatur.

℞. Rad.acetosæ Vnc.ij. fol.end. cichorij, & malux ana M.j. seminis lactuc.& papau.albi, ana ʒ. iij. santali albi & rubri, ana ʒ. ʒ. florum violar.& nymphææ, ana P.j. Fiat decoctio, addendo aceti rosacei parùm;foveatur regiò ventriculi tepidè.

Vel ex aquis stillatiis end. lactuc. & nymphææ, cum tantillo aceti,& pulu. triasantali, idem fots parari poterit.

Post fotum inungatur eadem pars oleo rosac. & violac. inuicem permixtis, vel vnguento sequenti.

℞. Ol. rosac. Vnc. j. β. ol. violac. aceti rosac. succi hieracij, ana Vnc. β. Bulliant ad succor. consumptionem, deinde adde santali rubri ʒ j. rosar. rubrar. ʒ. β. spicæ & camphoræ, ana ʒ. β. ceræ albæ q. s. Fiat vnguentum.

Cataplasmata in principio non conueniunt, quia partem pondere suo grauant, & calorem retinendo inflammationem augent.

In declinatione, sit contingat, & tumor resolutione finiatur, quod maximè est exoptandum; focus resoluens admoueri poterit, in hunc modum compositus.

℞. Rad. ireos Florent. Vnc. ij. fol. menthæ, maioranæ, pulegij, & absinthij pontici, ana M. j. feminis fenugræci & anisi, ana ʒ. ij. granor. kerme. ʒ. j. florum stæchados, anthos, chamomillæ, ana P. j. Fiar decoctio, addendo sub finem parùm vini albi; quâ foueatur regio ventriculi.

Post fotum inungatur eadem pars oleo absinthij, nucis mosch. nardino, & similibus, quibus additâ cerâ, & pulu. ireos Florent. aut cinam. potest concinnari vnguentum. Emplastra vero, & cataplasmata, quia pondere grauant partem, hic non conueniunt.

Si verò tumor ad suppurationem tendere videatur, Foueatur pars decocto flor. chamæm. & rosar. rubr. Postea cataplasma sequens admoueatur.

℞. Rad. althææ Vnc. ij. fol. branch. vsinæ, & rosar. ena M. j. Coquantur optimè & contundantur; deinde adde farinæ hordei, sem. lini, fenugræci, & pulu. chamæm. ana Vnc. sem. santali albi & rubri, ana ʒ. ij. Cum oleo rosat. & chamæm. & pauca pinguedinæ gallinæ fiat

*Cap. XI. De Ventr.inflam.abſceſſ.& vlc. 629*  
fiat cataplaſma ſæpè renouandum.

Rupto abſceſſu, vlcus detergeatur hydromelite in potu exhibitio. Cui addenda eſt interdum manna thuris, Galen. præcepto. Vel aquâ hordei cum ſaccharo roſaceo in principio, & conſtitutione calidiori exhibendâ.

Vlcere verò in vetuſtatem abeunte; ſiue ab hac cauſa, ſiue ab alia quauis, vt in humoribus acribus, & erodentibus; vel aſumptis cauſticis, & venenatis rebus, genitum fuerit, conuenient primùm iuſcula, herbis refrigerantibus & modicè aſtringentibus alterata, hordeata, amygdalata, cum ſaccharo roſac. parata, lac. recens mulctum cum ſaccharo, & tantillo mellis, ac tandè chalybeatum: tum etiam aqua ferrata pro potu ordinario, aut in qua boli armenæ, vel terræ ſigillatæ fruſtula maduerint. Cui addi poterit vinum rubrum auſterum, ſi per exigua caliditas in parte appaueat.

Deinde apozema ſequens in vſum reuocetur.

℞. Hord. integri P. j. fol. ſcabioſæ, agrimon. pimpinell. & capill. ven. ana M. ſſ. ſem. melon. Drach. ii. roſar. rubr. ſiccar. P. j. Fiat decoctio ad lb. i. In qua diſſolue ſyrup. de roſis ſiccis ℥. iiij. Fiat apozema pro iiij. doſibus frequenter iterandis.

Ad interna etiam vlcera plurimùm conſert decoctum rad. chinæ, vbi febris abſuerit, per viginti aut plures dies ſumptum, leuiter ſudores prouocando, ſic enim vlcus paulatim exſiccatur. Si verò tabes, & corporis conſumptio timeatur, decoquatur prædicta radix in iuſculo pulli gallinæ, vel columbini, cum herbis prædictis & hordeo munito.

In diuturniotti vlcere potus aquar. mineralium vitriolarum, ferratarum, aut aluminofarū, quales ſunt

R c 3 . noſtræ

nostræ Meinenſes , per menſem integrum ſumptæ,  
non parum conferunt.

Toto morbi decurſu, ad ventriculum ab illuue re-  
purgandum, conferunt leuiora cathartica; vt rhab. ta-  
marindi, myrobal. ſyrup. roſac. & catholicum , ſemel  
in ſeptimana uſurpata.

Denique ad vlceris occluſionem ſequentia uſurpari  
poterunt.

℥. Boli armenæ, terræ ſigillatæ, corall. rubr. lapid.  
hæmat. aquâ roſar. diligenter lotor. ana Drach. i. ſang.  
dragon. gummi arabici, & tragacanth. ana Drach. ſſ.  
ſem. papau. albi leuiter contuſi, & aſſi, hypocift. thu-  
ris, & ſarcocollæ, ana ꝰ. j. ſacchari roſac. Vnc. j. Fiat  
puluis, cuius capiat Drach. j. cum aqua plantag. aut  
conſerua roſar. ſingulis diebus.

Vel ex eodem puluere poteſt fieri opiata, cum con-  
ſerua ſymphyti, & roſar. ſyrup. cydonior. aut myrtino  
exceptis. Vel etiam poſſunt fieri trochiſci ex eodem  
puluere, cum mucilagine ſem. pſyllij, aut tragacan-  
thæ. Quibus omnibus viciffim uti æger poterit , ne  
eiufdem remedij tædio afficiatur.

Exterius verò, ad vlceris occluſionem , admoueri  
poterit regioni ventriculi ſotus ex decocto abſinthij,  
roſar. malicorij. gallar. balauſtior. myrtillor. thuris,  
maſtiches ac ſimilium. Ac deinde pars eadem inun-  
genda erit vnguento aſtringente, vel emplaſtrum  
aſtringens eidem admouendum.



P R A X E O S  
M E D I C Æ  
L I B E R X.

---

*De affectibus intestinorum.*

P R Æ F A T I O.



V M M A totius nutritionis perfe-  
ctio in tribus hisce operationibus  
consistit ; optimè scilicet ingerere  
digerere, & egerere. Prima qua ap-  
petitum respicit , & secunda qua  
concoctionem , ad ventriculum pertinet. Tertia  
verò respicit intestina ; quarum egestio moderata,  
& secundum natura leges peracta , maximum  
toti corpori commodum afferre solet. Contrà verò  
si deficiat, ut in astrictione alui ; vel exuperet,  
ut in variis alui fluxibus contingit ; maxima in-  
de incommoda , & gravissimi morbi emergunt.  
Præterea superfluum retentio in intestinis do-

R r - 4      lores

lores colicos, iliacos & hamorrhoidales, inferre solet. Ac denique putredines in intestinis genitæ, non solum alui fluxus prædictos, sed etiam lumbricos, generare solent. Vt hac omnia sigillatim exponantur, uniuersus hic tractatus undecim comprehendetur capitibus. Quorum primum erit de dolore colico. Secundum de Iliaco. Tertium de astrictione alui. Quartum de lienteria affectione cæliaca. Quintum de diarrhæa. Sextum de dysenteria. Septimum de tenesmo. Octauum de fluxu hepatico. Nonum de lumbricis. Decimum de fluxu hamorrhoidali. Undecimum de hamorrhoidum dolore.

---

## CAPVT PRIMVM.

### *De dolore colico.*

**C**olicus dolor nomen desumit à parte affecta quæ est colon intestinum; quod longum & anfractuosum est, & totius ferè corporis excrementis recipiendis destinatum, illa autem excrementa diutius retenta, dolores huiusmodi parere consueuerunt.

Causæ igitur colici doloris sunt materiæ excrementitiæ quæcunque solutionem continui, distendendo, pungendo, aut erodendo efficere possunt, cæque sunt, flatus vel humores.

Flatus ex cruditatibus, aut frigida ventriculi, vel intestinorum intemperie geniti, si commodè non excludantur, propter induratas fæces, aut alias causas in-

-testina

testina obstruentes, magnâ copiâ in intestinis crassioribus, colo præsertim cumulantur, dolorem intensissimum efficiunt.

Humores enim crassi, frigidi, & pituitosi tunicis intestinorum impacti, eiusmodi dolorem efficere possunt; tùm mordendo, si acrimonia quadam aut falsedine præditi sint: tùm refrigerando partem, quæ consequenter concoctionem & diuulsionem patitur, quem admodum Galenus de se ipso narrat, se dolorem colicum acerbissimum patientem, pituitam vitream actu frigidam excreuisse; tùm denique flatu emittendo, qui facilè ex humore crasso, viscido ac lento à calore debili eleuantur.

Humores denique biliosi & acres, tùm etiam melancolici & acidi, pungendo ac vellicando intestina, huiusmodi dolores efficiunt. In harum autem causarum actione dubitare licet. quomodo colicus iste dolor suas exacerbationes & remissiones habeat, eadem materiâ in intestinis remanente, quæ quamdiù præsens est, distentionem aut morsum inferre debet. Cui dubio respondemus materias illas interdum quietas permanere, & nullum tunc temporis aut exiguum dolorem efficere: interdum verò commoueri, & excitari per fomentationes varias, quæ in humoribus contingunt, vel solet fieri in epilepsia, hystericis affectibus, & febrium accessionibus.

Aduertendum autem est diligenter, flatu illos aut humores non tantùm in cavitatibus intestinorum residere, tunc enim facilè excluduntur, ab euacuantibus, detergentibus, & carminantibus medicamentis; sed plerumque ipsis intestinorum tunicis infixos esse; unde fit ut non tam facile inde auelli possint, morbumque longiorem ac contumaciorem efficiant, qui prædictis remediis nõ ita facilè oppugnari valeat. Sic humores

R r 5      crassi,

crassi, pituitosi, aut melancholici, per venas intestinorum in eorum substantiam sensim ac paulatim conflunt, & non statim dolorem efficiunt, donec sufficient copia cumlati naturam irritent ad expulsionem, sicque commoti & exagitati dolorem inferunt; vel flatus ex ea eleuantur, qui inter intestini tunicas conclusi, eas distendunt; ac diuellunt; facilemque exitum non inuenientes dolorem inferunt diuturnum. Bilis etiam eodem modo per venas intestinorum, in eorum tunicas effusa, iisque imbibita, dolores acerrimos excitat, qui diuturni, ac contumaces esse consueverunt; quia difficillimo negotio ab intestinorum substantia auelli potest.

Est alia colicæ biliosæ species, quæ in paralysem degenerat, veteribus parùm nota, quæ sit ab humore bilioso, non in colon intestinum, quemadmodum prædicta, sed in abdominis membranas repète effuso, qui cò transfertur à cystide fellea, vel mesenterio in crisi diuturnam febrium, aut à vehementi iracundia, aliâque causa externa, quando propter obstructions ad vias communes effundi non potest; sed motu præpostero ad prædictas abdominis mēbranas repēte excutitur. Hinc dolor exoritur crudelissimus colicum imitatus, qui tamen neque clysteribus, neque fomentis, neque aliis remediis cedit; sed ad plures menses perseverat, vnde corpus contabescit; febris interdum alicuius ex intermittentibus typum referens, molestat; interdum, idque sæpius continua, ac leuita, ac tandem doloribus remittentibus, paralyssis succedit, humore illo per abdominis membranas in spinam dorsii sensim irrepète. Illa autem paralyssis partēs superiores magis occupat. Crura verò & tibiæ plerūque dolēt, in paucis resoluūtur omninò, bile scilicet ob leuitarem superiora petente. Imò verò interdum



interdum in ipsum cerebrum irrupit, & conuulsiones epilepticas producit, vnde mors vt plurimum solet succedere.

Dantur & aliæ colici doloris causæ, sed minùs frequentes, nimirum calculi in intestinis geniti, & lumbrici glomerati intestina obstruentes: compressio intestinorum à tumoribus vicinarum partium: vel angustia ab inflammatione, aliisque tumoribus intestinorum, vel contorsio eorundem à flatibus excitata, quæ via est ad iliacam passionem; interdum etiam materia quæ colicam excitat est venenata ac maligna, & colicam pestilentem efficit, sicut Paulus Ægineta refert, colicam pestilentem in Italia exortam multas Romanorum prouincias infestasse. Omnia denique corpora dura intestina obstruendo, vel distendendo, colicum dolorem efficere valent; vt calculi in intestinis geniti, nuclei cerasorum magnâ copiâ ingesti, cæcus durus, & similia. Sic refert Platerus præfectum quendâ colicis doloribus diu vexatû conuulsionibusque laborantem, post clysmatum vsum casei indurati magnam copiam per aluum reieciisse, qui per longum tempus in intestinis hæserat, propterea quod antequam ægrotaret, eo sese immoderate repleuerat.

Causæ externæ sunt aëris constitutio frigidior aluum comprimens & constringens, ac indurans: vel calidior, à qua sæces etiam indurantur; ex iis enim à calore omnis humiditas exsugitur: vsus ciborum, & potuum hominis temperamento minùs conuenientium, fructuum crudorum, & stypticorum, ciborum crassorum, & concoctu difficilium, quies nimia, & somnus immodicus; exercitia intempestiua, immoderata Venus, aliæquæ causæ externæ, quæ ventriculi coctionem inuerrere possunt.

Diagnosis huius affectus in genere satis facilis est.

In

In primis enim dolor acerbissimus est, aded vt si leuior fuerit, verè colicus appellari non debeat, ex sententia Galeni *lib. 6. de locis affect. cap. 2.* Deinde dolor iste interdum vagus est, & modò in hac, modò in illa parte grauiùs vrget, ita vt nunc hepatis, nunc lienis, nunc ventriculi, nunc renum regionem occupet, nunc supra, nunc infra vmbilicum appareat; ac sæpè in sinistro latere plus vrgeat, ex eo quòd in ea parte sit quædã angustia, primùm à Bauhino obseruata. Quando enim excrementa in superiori ac capacissima coli parte, in globos magnos, prout capacitas illius ferebat, indurata, à flatu versùs illam partem magna cum violentia pelluntur, fit vt non nisi magno cum dolore permeare possint, quo symptomate dolor colicus cum splenico & nephritico sæpè confunditur; ab iisque satis difficili negotio reliquorum signorum comparatione distinguitur. Interdum verò dolor magis fixus, & in vna parte stabilis, terebro perforanti, aut palo infixio similis. Ducto in consensum ventriculo, vomitus sæpè excitatur, quo interdum pituitosa, interdum biliosa, porracea, & æruginosa reliciuntur. Post cibum dolor intenditur, quia, repletus ventriculus comprimit intestina. Alius vt plurimùm astricta est, vt nihil per aluum ægrotantes, ne flatum quidem emittere possint. Si verò aliquid excernatur, vel sponte vel arte, id maiori parte flatulentum est, ac bouino stercore simile, & aquæ supernatans, vtpote maiori parte pituitosum, quia pituita per aluum excreta, aquæ & serosis excrementis supernatare consuevit. Tanta autem interdum est supradictaalui astrictio, vt sæuiente dolore medicamenta purgantia exhibita, etiam vehementiora, nihil operentur.

Signa causarum in hunc modum distinguenda sunt.

Si dolor fiat à pituita, non aded vehemens est, nisi  
flatum

flatum habeat adiunctum, qui ex iis locis in quibus continetur nequeat erumpere: tunc enim grauissimi dolores fiunt; modò in vna parte, ac si illa terebro, vel infixo palo perforetur; modo in pluribus, si flatu ille diuagetur. Ægri à calidis iuuantur, à frigidis læduntur. Præcessit victus ratio generandæ pituitæ idonea, vrina crudior, & albidior interdum est, non tamen perpetuò, quod iuniores & inexpertos medicos fallere solet, interdum enim etiam in colica pituitosa, ac flatulenta, vrina flaua ac rubicunda apparere consuevit; propter vehementem dolorem, qui spiritus & humores in venis & arteriis contentos accendit & inflamat. Quod sapienter annotauit Auicen. *sen. 13. lib. 3. tract. 3. cap. 11. Non oportet, inquit, ut decipiat aliquis, per id quod fortè sit de siti, & inflammatione, & rubedine aquæ, ut existimet quòd ægritudo sit calida, illud namque est commune omnibus.*

Si à flatibus colicus dolor oriatur, dolor sensus aderit, & quædam ventris inflatio; ægri flatuum multitudinem, & ventris rugitum percipiunt; à flatuum exclusione maximè leuatur, victus ratio flatibus generandis idonea præcessit, ut aquæ frigidæ potio intempestiua, vsus frequēs leguminum, raparum, castanearum, olerum, fructuum, & similium. Et si flatu in cauitatibus intestinorum contineantur, dolor vagus est, neque in vno loco consistit, & per interualla renouatur. Si verò intra eorū tunicas coërceatur, dolor fixus est, quia flatu locū mutare non possunt; continuus & pertinax, quia flatu exitum non inueniunt.

Si colicus dolor ab humore acri & bilioso oriatur, ille acerbissimus est, vellicās, & pungitius; æstus adest, sitis, & plerūque febris, vrinæ quæ sunt valde biliosæ. A calidis alimētis & medicamentis malū intenditur, à frigidis verò leuatur. Materiæ biliosæ excretionem ma-

imminuitur, & victus ratio bili generandæ idonea præcessit.

Dolores reliquarum partium in imo ventre contentarum à colico dolore propriis signis facile distinguuntur, excepto dolore nephritico, cuius signa cum doloris colici signis tantam habent affinitatem, ut Medicos non raro etiam peritissimos, in eorum distinctione errare contingat. Quod ipsi Galeno contigit, qui ut ipse fateatur, *de loc. aff. cap. 5.* colico dolore vexatus, se nephritico laborare, ex lapide alteri vreterum impacto arbitrabatur; donec humore per aluum excreto, & inde sedato dolore, colicum esse animaduertit. Sequentibus tamen signis hi duo affectus satis dilucidè inuicem distingui possunt, si accuratè examinentur.

Primò, dolor nephriticus fixus in rene est; & ab eo ad testem exporrigitur, secundum longitudinem vreteris. Colicus verò vagus est, & cinguli instar medium ventrem affligit.

Secundò, à pastu colicus dolor augetur, ob compressionem intestini, quæ fit à ventriculo repleto: nephriticus verò neutiquam augetur, sed potius imminuitur; quia aliquid humoris alimentarii ad renes transfertur, quod dolorem aliquantulum demulcer.

Tertiò, in colico dolore vomitus est vehementior, & aluus strictior; quia colon intestinum fundo ventriculi adiacet, & intestina distenta, aut vehementer irritata sese constringunt, ut inimicum expellant. Vtrumque tamen symptoma vtrique affectui commune est, ut eorum intensio, & remissio difficilem habeat diagnosim; quandoquidem dolor nephriticus intensior maiorem vomitum, & alui adstrictionem maiorem, efficere potest, quàm dolor colicus remissior.

Quartò.

Quartò in colico dolore, ab excretionibus per aluum, & per vomitum maius leuamen emergit, quam in nephritico.

Quintò, in dolore nephritico, vrina primùm clara; & tenuis, & transcolata, postea aliquid subsidet, & tandem arenulæ, aut lapilli excernuntur. At in colicis vrinæ ab initio crassiores existunt.

Quod ad prognosim spectat, colicus dolor vt plurimùm, si leuior ac remissior sit, neque admodum diuturnus, neque constans in vna parte, sed vagus, & instabilis, per vices intermittat, & aluum omnino non constringat; curabilis est, & periculo vacat. Si verò dolores sint acerbissimi, in vno loco firmiter fixi, nunquam intermittentes; nihil per aluum excernatur vrgeant vigilæ; ac demùm sequatur vomitus, singultus, delirium, refrigeratio extremitatum, & sudores frigidi, lethalis est affectus.

Colicus dolor contumax à materia acris, & biliosa præsertim oriundus, in alios affectus eosque grauissimos sæpè degenerat, arthritidem, epilepsiam, & frequentius paxalysim.

Colicus dolor epidemicus, contagiosus, & pestilens, lethalis vt plurimùm esse consuevit.

Curatio huius affectus pro varietate causarum varia instituenda est.

Ac primùm flatulentæ & pituitosæ eadem curatio adhibenda est; quæ incipit à clystere emolliente, cui postmodum succedat carminans & discutiens, (qualis in dolore ventriculi à simili causa descriptus est,) qui reiterandus est eadem die bis, ter, quater, donec dolor dispareat. Si tamen vno aut altero, clystere alius non deponat, vt interdum contingit, tunc suppositorio sollicitanda est. In vno autem prædictorum clysterum vtiliter adducitur aquæ benedictæ ʒ. iij.

Vcl

Vel colocynthidis ꝓ.ij. vel iij. in clystere emolliente & carminanto decoquuntur.

Si clysteres dolorem non soluant; in iis pertinaciter insistendum non est, sed satius est leui aliquo medicamento vti. Obseruatum est, cum æger quidam triginta clysteres sine fructu accepisset; alium Medicum mannæ ꝓ. j. β. cum ol. amygd. dulc. Vnc. ij. in iusculo gallinæ pingui exhibuisse, & ægrum à dolore liberasse. In odore tamen qui fit à pituita crassa, fortiora medicamenta exhibenda.

Posteà verò fomenta, inunctiones, balnea, emplastra, aliâque remedia, conuenient, quæ in doloris ventriculi curatione supra proposita sunt. Quibus addenda sunt specifica nonnulla, huic affectui maxime proficua.

Intestina lupi vino albo abluantur, posteâ in furno exsiccantur in vase terreo, donec in puluerem reduci queant. Huius pulueris capiat æger Drach. j. cum vino albo: subitò dolorem sedat.

Aqua simplex bulliat, eique feruenti adde ol. commun. quartam partem, & grana aliquot piperis crassiusculè triti; capiat æger cochl. iij. vel iiij. calidè, quâtum ferre poterit, Sedatur dolor ferè in momêto.

℞. Aloës opt. Drach. j. laudani opiati gr. iiij. diagrydij. gr. vj. Misce formētur pilulæ vj. deauratæ, capiat æger horâ commodâ; dolorem post horam sedant, & posteà humores noxios euacuant. His etiam pilulis substitui potest medicamentum ex diaphœnico & philonio Romano, in dolore ventriculi descriptum. Hippocr. lib. de internis affectib. proponit purgationem ex peplio & meconio.

Olei amygdal. dulc. aut amaran. recentis Vnc. vj. exhibitæ dolorem demulcent, & materiam intestinis adhærentem per inferiora deturbant.

Cum sequentibus etiam mixtum vtilissimum est.

℞. Ol. amygdal. dulc. vel alterius in papaueribus,  
Vnc. iij vini generosi Vnc. j. sem. syrupi de papau.  
Vnc. j. Misce, fiat potio.

Cum manna etiam exhibitum oleum amygdal. dulcium in iusculo pingui, vt suprà dictum est, dolorem lenit, & materiam peccantem euacuat.

Semen ameos puluerat, cum vino exhibit. ad 3. j. urgente dolore cum subito sistit, & secundâ exhibitione morbum plerumque aufert, ad mouendo simul cataplasma ex terebinth. ʒ. iij. stupis exceptum, sinapifatum pieris, & sang. drach. subtiliss. puluerat. an. 3. j.

Galbanetum Paracelsi humori discutiendo idoneum est, si totus venter eo illinatur. Illius descriptio à Cratone talis proponitur.

℞. Gummi elemi, hederæ, galbani, ol. laurini, ana partes æquas. Distillantur in arena per retortam; feruentur seorsim, primùm aqua; deinde ol. clarum; tertio ol. crassum instar mellis, quo imprimis vtendū est.

℞. Calami aromat. Vnc. j. galangæ ʒ. iij. flauedinis exterioris corticis arantior. Vnc. iij. cinam. electi, sem. anisi & fœniculi, ana Drach. iij. cumini Drach. vj. baccar. iuniperi recent. Vnc. ʒ. baccar. lauri Drach. iij. Puluerentur subtilissimè, & infundantur in vini maluat. opt. lb. vj. Stent in infusione in loco calido per v. dies. postea distillantur in balneo Mariæ. Dosis Vnc. j. præmissis euacuationibus.

Ventri admoueatut vtiliter gummi caragna, & tacamahaca; & prius cucurbitula magna vmbilico, affigatur.

Etiam si emplastra prædicta ventri non admoueantur; omittenda tamen non est cucurbitula vmbilico admota, quæ ipso Galeno teste dolorem à flatibus excitatum discutit instar incantamenti.

Si affectus sit diuturnior, decocto guaiaci per multos dies continuato feliciter curari poterit, purgando per interualla, & clysteres frequenter iniiciendo, At si colicus dolor fiat à pituita vitrea, decoquatur guaiacum cum vino, quemadmodum vsurpauit Amat Lusit. cum felici successu, *curat. 32. cent. 1.*

Sedato dolore apozema pituitam euacuans prescribendum est, quo reliquæ omnes educantur, vel eius loco decoctum galli veteris cum incidentibus, attenuantibus, & catharticis compositum. Vel iulepus efficacissimus in colica ventriculi descriptus.

Colica iliosa curatur clysteribus emollientibus, & acrimoniam humorum temperantibus.

Foueatür venter decocto emolliente & anodyno, aut quod melius erit, paretur semicupium ex eodem decocto.

Conueniet etiam cataplasma infimo ventri ex farina hordei, & sem. lini coctis in ol. chamæmel.

Tum etiam epithema refrigerans hepatis regioni admotum, in hunc modum compositum.

℞. Succi endiuia, & cichorij, ana ℥ss. β. Succi lactuæ, & acetosæ, ana Vnc. ij. Misce, fiat epithema.

Iulepi exhibeantur ex aquis papau. rhœad. lactuæ, endiuia, acetosæ, cum syrup. violac. de pomis, & de limonibus.

Si doloris atrocitas vrgeat, ad narcotica confugiendum erit.

Mitigato aliquantulum dolore, expressio rhei in aqua cichorij, cum syrupo rosaceo exhibenda erit, & frequenter repetenda, donec tota humorum saburra euacuata fuerit.

Si purgatio ista benignior morbo eradicando non sufficiat, confugiendum est ad mercurium dulcem, qui aliquoties exhibitus cū purgantibus diagrypiatis, curationem



rationem absoluit. Quibus suspectum est diagridium, solus exhibeatur mercurius dulcis, in pilulam efformatus, cum conferua rosarum; superhaustâ infusione fennæ, & rhab. additâ mannâ, & syrupo rosaceo.

Posteâ vtiliter vsurpantur aquæ acidulæ, & vitriolatæ.

Sæuiente dolore ad balneum, & laudanum confugiendum est, cui aliquando purgantia misceri poterût, sed maiori dosi, quia eorum vis retunditur à laudano.

Galbanetum Paracelsi, quamuis calidum, ad humorem discutiendum idoneum est, si totus venter eo illinatur. Illius descriptio suprâ proposita est.

Phlebotomia in hac colicæ specie aliquando conuenit, cum metus est, ne caloris vehementia sanguis incalascet, febrisque generetur. Si verò febris adfuerit, statim celebranda est.

Vrgente admodum siti, aqua frigida exhibenda est, docente Galen. *lib. 12. meth. cap. 7.* Eiusque vsu testatur Amat. Lusit. se talem dolorem subito, incantamenti instar, sustulisse. Eâdem se vsu fœliciter tum sumptâ, tum admotâ, testatur Sepralius duabus historiis, *lib. 7. animaduersionum practicarum descriptis.*

Ad colici doloris, qui in paralysem degenerat, curationem, aluo variis clysteribus solutâ, primisque viis cathartico apertis, demittatur æger in balneum tepidum, ex decocto emollientium paratum, bis, ter, quater, quinquies in die, vt acrimonia humoris temperetur, ac pori membranarum aperiantur. Postero die cathartico accommodato humor ille purgetur. Deinde repetatur balneum. Atque alternis diebus faciendum, si vires ægri ferre queant; donec expurgatis humoribus, & sedato dolore, æger, in tuto sit.

Interim clysteres continuentur; præsertim qui ex lacte parantur, ad dolorem demulcendum vtilissimi sunt, quibus cassia, ol. violaceum, & liliorum admisceri poterunt.

Venter ol. chamæmel, anethino, amygdal. dulc. lilior. cum butyro frequenter inungatur.

His feri lactis & acidularum usus tandem subli-  
ciatur.

Ac denique, affectu in longitudinem abeunte, ea quæ in melancholiæ hypochondriacæ curatione relata sunt, hîc aptari poterunt.

Neque omittenda est, ab ipso morbi initio, phlebotomia, eaque purgationi præmittenda, ac sæpè iteranda, si sanguis pravâ qualitate infectus appareat, aut si dolor rheumatismi participes esse videatur.

Denique omnia remedia, quæ in colica biliosa proposita sunt, hîc etiam aptari poterunt. Quibus non conferentibus, nonnulli Medici confugiunt ad potionem sequentem, quam licet sordidam, & delicatorum hominum ore indignam exhibent, & dolorem statim mitigare affirmant.

℞. Stercoris equini ʒ. j. Minutim diuidatur, & infundatur in lb. j. aquæ papau. rhœad. in aqua spiritus vini guttæ viij. vel x. dissolutæ fuerint. Colentur cum expressione leui, & diuidantur in tres doses satis amplas, sumendas horis exacerbationis doloris.

Si verò affectus in paralyism degeneret, lenienda est spina dorſi & paralytica, balsamo resolvente, & nervos roborante, modò febris adfuerit. Si enim adest, lana succida oleo, aut vnguento digerente imbuta, partibus paralyticis alligatur, cauendo diligenter frigus, quo humor partibus impingitur, illiusque diffusio impeditur.

Galbanum Paracelsi hîc præcipuè confert, si partibus

tibus prædictis, tum etiam vmbiculo admouea-  
tur.

## CAPUT II.

*De Iliaco affectu,*

**I**leos seu Iliaca passio nomen accipit, vt nonnulli volunt, ab ileo intestino, quod vt plurimum in hoc affectu laborat, quamuis alia tenuia intestina, imò & interdum crassa eodem tentari valeant. Vel potius ab *ἰλεός*, quod circumuolui & circumcingi significat; Ideò Latinis, voluulus seu conuoluulus nominatur, quòd in eo intestina manifestè conuolui, & motu præpostero ad superiora moueri videantur. *Χορδαίος* etiam nominatur, quòd intestina manum admoventi chordæ quasi tensæ, & veluti conuolutæ speciem repræsentent. Barbari *miserere mei* vocant: quòd miserabile sit malum, & vt plurimum lethale, atque adedò miseratione diuina opus habeat.

Est autem iliacus affectus, motus intestinorum præposterus & inuersus, in quo alius omninò constricta est, & quæ per inferiora deiici deberent, ad ventriculum feruntur, ac per vomitum reiiciuntur.

Notum est intestina motum habere naturalem, quo chylus & fæces ad inferiora sensim propelluntur, qui peristalticus nominatur. Hic notus fit per fibras orbiculares, & transversas intestina contrahentes, & comparatur motui lumbricorum terrestrium, qui partes corporis successiue mouent. Inuertitur autem

motus iste aliquando à causis præternaturalibus ; vt intestinorū fibræ, quæ à superioribus versùs inferiora contrahi debēt, ad superiora cōtrahuntur, & quæcunque in intestinis continentur, non versùs aluum, sed versùs ventriculum protrudātur: & tunc affectio iliaca generatur. Simile quidpiam in vomitu animaduertimus; dū enim fibræ œsophagi à parte superiore versùs ventriculū se contrahunt, fit deglutitio cibōrum; cum verò inuerso hoc agendi ordine à parte inferiore, versùs superiora se cōtrahunt, vomitus excitatur. Fit autem motus iste peristalticus inuersus à facultate intestinorū expultrice vehementer irritata, quæ quando materias superfluas & excrementitias per inferiora deturbare non potest, eas ad superiora violento motu propellit. Aded autem violentus interdū est ille motus, vt non solūm chylus, & flatus, & humores excrementitij, sed etiam fæces non rarò per vomitum excernantur; imò verò ea quæ per anum immittuntur, vt clysteres, & suppositoria rapiātur, ac vomitu reiiciantur. Sic refert Matthæus de Gradi puellam quamdam annos natam duodecim ileo laborantem, postquam per triduum non solūm fæces, sed etiam clysteres injectos vomitu reieciisset, tandem suppositoriū oblongum in anum immissum, post breue tempus vomitu excreuisse. Cū verò deinde suppositorium aliud filo ad coxam alligaretur; illud statim, disrupto filo, sursūm ascendit ad ventriculum, idque ægra cū parte fili appensi euomit. Et cum tertio suppositorium aliud quatuor filis fortibus alligaretur, illud etiā paulò post, ruptis filis, per os cum parte filorum, reiectum fuit. Tandem cū medicus iuberet, vt mater aliud suppositorium immitteret, tanta violentia sursūm attractum fuit; vt mater ne rursūm raperetur, illud

Iud extrahere coacta fuerit. Similes quædam historię apud autores reperiuntur quas breuitatis causa omitimus.

Illā autē facultatis expultricis intestinorum irritatio à pluribus causis dependet: quarum præcipuè & frequentiores ab obstructione referuntur. Quæcunque igitur intestina vehementer obstruere possunt, ut nihil per inferiora descendere valeat, hunc affectum producere solent. Postquam enim facultas diu enixa est fæces & alias superfluitates per viam ordinariam excernere, sine suo frustrata, & exclusionis necessitati satisfacere tentans, aliā viā aggreditur, & motu præpostero, ad superiora propellit, ut superfluitates illæ per vomitum reiiciantur.

Causæ autem obstruentes sunt fæces induratae ac rentæ; flatus crassi magnâ copiâ in intestinis collecti, eaque vehementer distendentes; inflammatio, aliique tumores magni, qui cavitatem internam intestini penitus occludunt; & intestini circumuolutio, ac complicatio, ut veluti nodus in ipso fiat: quæ quidem complicatio, & constrictio intestinorum in hernia sæpè contingit, tum etiam in colico dolore, cui sæpè succedit ileos, quia intestina flatibus distenta se conuoluunt ut interdum veluti nodum efficiant.

Causæ verò infrequentiores intestinorum facultatem expultricem ita irritantes, ut motum suum inuertere cogantur, sunt exulcerationes insignes, aut humores acerrimi, intestina vellicantes. Quando enim fæces aut alij humores, ad inferiora delabentes partem vlceratâ attingunt, eam acriter vellicât, ita ut ea irritata rem noxiam præterfluere non patiat, sed fursùm impetu propellat, quem motum reliqua intestina per sympathiam irritata sequuntur, donec materia noxia, ad ventriculum feratur, qui motum eundem se-

Signa caufarum in hunc modum fe habent. Si ileos ab inflammatione fiat, (quod vt plurimùm cōtingit,) morbus eft acutiſſimus, qui velociter ad ſtatum properat, febris adest intenſa, dolor vehementiſſimus, vomitus bilioſi, & pituitoſi citiſſimè apparent; quos, breui fæcum reiectione conſequitur, & reliqua ſigna exitialia ſuprà propoſita.

Si à fæcibus induratis, alui conſtrictione præceſſit per plures dies perſeuerans, & in principio non eſt dolor qui poſtea accedit; morbus longiùs protrahitur nec adeò eſt acutus, vt in inflàmatione, nec dolor adeò vehemens, neque adeò intenſa febris, imò interdū nulla.

Si à flatibus vel pituita iliacus affectus generetur, ille dolori colico vt plurimùm ſuccedit, & præceſſerunt ſigna colici doloris à pituita vel flatibus oriundis ſuperiori capite propoſita.

Quod ad prognofim ſpectat. Ileos omnis periculofus eſt, ſed vnus alio longè periculofior. Ille igitur eſt magis exitialis, cui vomitus ſuperuenit primùm quidem materiæ bilioſæ, vel pituitoſæ; poſtmodum verò fæculentæ; & ex his nullum ſaluari aſſerit Galenus 6. de loc. affect. cap. 1. Docet tamen experientia nonnullos euadere, quando ex fæcum retentione vel hernia intestinali affectus exoritur.

Quibus in ſtranguria iléos ſuperuenit, intra ſeptem dies moriuntur, niſi febre ſuperueniente copioſior vrina fluxerit. Hippocr. Aph. 44. ſect. 6. Si ſtranguria fiat ab humoribus craſſis & pituitoſis, qui etiam magnâ copiâ in inteſtinis. & in venis redundant, ſuperueniente febre poſſunt illi concoqui, liquari, & attenuari, ac per vrinas excerni, vndè ſolutio ilei contingit. Licet Gal. in comment. huius Aphoriſmi ſe ignorare aſſerat quæ Hippocrates dixit in hoc aph. cæque ratione, & experientiâ confirmari non poſſe.

Si symptomata remittantur, & medicamenta, vel alimenta ore assumpta, per inferiora descendant, salus expectanda est.

Curatio huius affectus iuxta causarum varietatem varianda est. Ac primum si à facibus induratis, vel à crassa & viscida pituita obstructio intestinorum dependeat, emollientia, & relaxantia remedia interna, & externa erunt vsurpanda.

Primo igitur iniiciantur clysteres, & decocto althææ, malvæ, violariæ, chamomillæ, & meliloti, cum sem. lini & scænugr. vel ex ol. communi solo ad lb. j. in quo butyri tertia pars dissolui poterit; vel ex decocto intestinorum, & omenti veruecis, in quo dissolvatur butyrum, mel, & sal gemmeum. Quibus decoctis, si flatu adfuerint, ut plerumque solent, carminantia, & discutientia addere convenit.

His demum clysteribus emollitâ aliquantisper materiâ, purgantia prius mediocria, mox paulò vehementiora erunt admiscenda; ac tandem ad vehementissima transeundum erit.

Interim fomenta & linimenta emollientia toti ventri erunt admovenda, diuque continuanda, omentum castrati in aqua feruente calefactum, ventri applicandum; & quod utilius multò, balnea emollientia administranda, quæ erunt efficaciora, si ex oleo solo componantur.

Interiùs verò exhiberi poterit oleum amygd. dulc. vel solum, vel dum vino albo permixtum. Quibus, si dolor valdè urgeat, syrup. de papau. addi poterit, ut in colici doloris curatione dictum est.

Ad denique, si vehemens dolor & flatuum copia adfuerit, reliqua remedia in colidi doloris curatione proposita vsurpari poterunt. Non omisiss purgationibus, quæ opportunè institutæ mali causâ euacuant.

Quæ

Quæ fit ab inflammatione intestinorum, curanda est venæ sectione frequenter repetitâ, si vires ferant; cum in brachio; tum in pede; cucurbitularum admotione inguinibus cum scarificatione. Clysteres etiâ emollientes, & refrigerantes iniiciendi erunt, in hunc modum compositi.

℞. Rad. alth. Vnc. ij. fol. malv. violariæ, ana M. j. sem. cucurbit. Vnc. β. sem. lini & psyllij, ana Drach. ij. flor. nymph. & rosar. ana P. j. flor. chamæm. P. β. Fiat decoctio, in cuius tb. j. dissolue ol. rosat. Vnc. ij. cassiæ recenter extractæ Vnc. j. Fiat clyster. In progressu verò addendum erit. ol. violac. & chamæmelinum.

Prædicta emollientia in oxycrato decoqui debent,

Vel lac recenter mulctum cum pauco saccharo & albu mine oui, vel mucilag. seminis psyllij. Vnc. j. ad dolorem leniendum iniici poterit.

Vel parari potest clyster ex lacte amygdal. dulcium, aut cremore hordei, ex illius mundati decocto expresso, addendo butyri recentis & sacchari parùm.

Ex oxycrato simplici parari potest enema, & singulis diebus iniici, quod ad inflammationem intestinorum cohibendam plurimum valet.

Inunctiones fiant ex oleo violato, amygd. dulc. & chamæm. additis mucilag. sem. lini fœnugr. cydonior. axungis gallinæ, anatis & butyro recenti.

Tum etiam foci admoveantur ex decocto simplicium, pro enemate suprâ descriptorum.

Tum ex oxycrato simplici foci in principio parari poterunt. In progressu verò prædicta simplicia in oxycrato decoquantur.

Necnon cataplasma, ex residentia eiusdem decocti, vel ex farina hordei, fœnugr. lini, cum butyro, axungis oleis prædictis compositum.

Ac denique balneum aquæ dulcis tepidum, huic etiam



etiam affectui erit conuenientissimum, in quo emollientia & refrigerantia bullierint.

Post venæsectionem exhibeatur olei amygd. dulce: Vnc. ij. ad dolorem leniendum, & si dolor valdè urgeat, ad narcotica veniendum erit.

Si vomitus non adsit, prouocandus est haustu aquæ tepidæ cum ol. violaceo, eo enim purgâtur superiora; & humores reuelluntur ad partem affectam defluentes. In toto morbi decursu propinandi sunt iulepi & emulsiones, in ventriculi inflammatione propositæ.

Potus sit aqua hordei. Et in principio morbi; abstinereat æger ab omni alimēto per viginti quatuor horas, vt materiæ morbificæ portio absumatur; postea iusculum pulli exhibeatur. Summâ enim curâ tractandus est hic affectus, quia vt plurimum lethalis est.

Præcipuum autem curationis negotium in abstinentia versatur; idque exemplo à vulneribus intestinorum deducto; qui enim ita vulnerati sunt, penè fame conficiuntur per 40. dies. Hoc igitur affectu laborantes per 4. aut 5. dies, tria tantum cochlearia iusculi sumant singulis diebus, vt vomitus impediatur, qui morbum graviter auget. Adde quod alimentum exhibitum nullum solatium affert ægrotanti, non enim in nutritionem cedit, sed planè corrumpitur, & chylus à ventriculo in intestina prolapsus, cum excrementis retentis permiscetur, & vomitionem auget.

In potu paulò maior potest esse libertas, quia facile transit ad hepar, & illius materia morbo expugnando idonea esse potest, si oxycratum exhibeatur valdè temperatum, & in parua quantitate.

Denique à circumuolutioni intestinorum quandoque contingit iliacus affectus, quod rarissimū est; vel à flatibus producit in intestina cōtorquentibus; vel ab  
hernia

hernia, quæ enterocoele nominatur.

Qui à flatibus exoritur, iisdem remediis curatur, quæ ad flatulentam colicam præscripta sunt. Si verò omnibus iis remediis satis diu vsurpatis, alius non aperiatur; sed omnia assumpta per vomitum excernantur, ut spes salutis in angusto posita sit; extremū remedium erit vsurpandum, quod proponit. Hipp. 3. *de morbis*, ut, scilicet, follis fabrilis ano adaptetur; & eo flatus in ventrem immitatur. Postmodum clyster emolliens cum trochiscis alhandal iniiciatur, ut fæces educantur. Valet hoc remedium, non solum ad ileum ex contorsione intestinorum; sed etiam ad eum qui fit ex obstructione graui, & contumaci: dilatando enim intestina obstructionem soluit. Amat. Lusit. *curat. vlt. cent.* 1. testatur se iliacum desperatum hoc remedio curasse; tum etiam Epiphanius Ferdinandus, in *historiis suis Medicis, hist. 74.* refert, Neapoli filium Ioannis Altimari, Medici expertissimi, qui ex colica & iliaca peribat, hoc eodem remedio ab orci faucibus fuisse reuocatum. Verum Aurelianus hoc remedij genus improbat, ex eo quod ventus à folle immixtus frigiditate suâ multum lædere potest. Attamen hoc incommodum euitare facile est, si iuxta ignem follis aëre impleatur.

Aliud prætereà remedium valdè inusitatum à Paræo proponitur, quo multos ab ilco desperatos imminente morte, liberatos esse refert, haustis scilicet, argenti viui in aqua sola libris tribus. Pondere enim suo intestinū velut vinctum expedit, & euoluit, prædurasq; & obstruentes fæces deorsum deturbat. Quod remedium ab aliis etiam authoribus non paucis approbantur, qui & illud innoxie sumi posse testantur.

Verum tanta mercurij quâtitas valdè pertimescenda est, ne frigiditate suâ calorem natium extinguat,

&

& sanguinem in venis coagulet. In casu igitur desperato satius est minorem quantitatem exhibere. Quidam exhibent Vnc. ij. in ovo sorbili, & iterandum censent, si prima exhibitio non succedat. Vnius tamen vnciæ exhibitionem felicem successum habuisse in obseruationibus nostris videre est.

Quando verò iliacus affectus procedit à prolapsu intestinorum in scrotum, tota cura eò dirigenda est, vt illa in suum locum reponantur. Quod fiet blandâ & prudenti manu Chirurghi, locum affectum diù antea fouendo decocto emolliente, & oleis relaxantibus, clysteribus etiam emollientibus, carminantibusque frequenter injectis; ægrum ita collocando, vt caput sit valde decliue, crura verò elata. Imo nonnulli, cum pedibus suspenderentur, citissimè liberati sunt.

Si hernia fiat cum inflammatione intestini, fotu ex aqua frigida curatur. Si flatus intestinum distendant, fotu ex spiritu vini discutiuntur. Vtriusque curationis exempla vide in obseruationibus nostris.

### C A P V T III.

#### *De astrictione alui.*

**P**ER astrictiōem alui nō intelligimus omnimodam alui suppressionem, qua nihil per inferiora deiciatur, qualis in ileo contingit. Sed tātūm pigram, & tardam alui dejectionem, quā fæces, & cibi reliquæ raro nec pro assumptorum ratione excernuntur. In hac fæces necessariò indurantur, quia diutiùs retentæ caloris vi continenter exsiccantur, ab iisque nonnihil succi semper exsugitur per venas mesaraicas, nō modò

ad

ad tenuia, sed etiam ad crassa intestina propagatas. Est symptoma facultatis expultricis imminutæ, vel retentricis auctæ. Causa tamen est multorum morborum; idè excreta & retenta in numero sex rerum nonnaturalium recensentur, quæ debitam naturæ legem non seruantes, infinitos morbos producant. Sicque aluius astricta vapores ad caput mittit, catarrhos aliosque cerebri affectus producit, ventriculi coctionem aliarumque partium actiones perturbat.

Causæ huius symptomatis quamplurimæ sunt. Ac primùm fæcum durities & siccitas non solum est effectus astrictiōis alui, vt suprà dictum est, sed etiam causa efficiens, quia fæces induratae difficilius excernuntur, & facultatem expultricem non irritant. Duræ autem fiunt, & sicciores, præcipuè & frequentius, ab hepatis calore excedente, qui omnem humiditatem in intestinis contentam potenter attrahit, & fæces sicciores relinquit. Cui rei etiam plurimum conferre potest motus vehementior, præsertim equitatio; excrementorum paucitas ex inedia proueniens; vel dum acrimoniam non habent, quæ intestina vellicare possit, quod ex cibis frigidioribus contingit, & quando bilis flaua ad intestina non descendit, vt in ictero fieri videmus. Ac denique morbi intestinorum non pauci, hanc alui constrictionem efficere possunt, vt frigida & sicca intemperies, tumores, obstructions, ani stupor, & paralysis; aliique non pauci.

Signa diagnostica ex causarum diagnosi depêdunt, quæ ex propriis fontibus haurienda. Calidæ enim hepatis intemperiei signa ex proprio capite desumenda sunt. Tumores etiam, aliique intestinorum morbi propriam habent diagnosim. Ac denique causæ externæ, vt ciborum paucitas, vel frigiditas, equitatio, & similia ex ægrotantis relatione innotescunt.

Quod

Quod ad prognosim spectat, constrictio alui magis vel minùs periculosa est, pro maiori vel minori gravitate causerum. Si enim ab inflammatione, aut alio intestinorum tumore fiat, valdè periculosa est. Ab aliis verò causis oriunda minùs habet periculi. Contumax, & diuturna plerunque esse solet, quando à facibus induratis producitur: indè enim sæpè colici dolores excitantur, qui semel sedati, frequenter tamen recurrunt, tum propter bonam facum exsiccationem: tum quia licet purgantibus aluus sufficienter soluta videatur, & excrementa liquida permulta euacuata sint: non pauca tamen interdum excrementa solida, & dura in intestinis subsistunt, quæ novos dolores pariunt, & non nisi clysteribus quam plurimis, etiam post purgationem iniectis auelli possunt.

Curatio huius affectus à causerum suarum sublatione dependet, quæ ex propriis capituli desumenda est. Cum tamen illa curatio, ut plurimum longa esse consueverit, præcipue quando à calida hepatis intemperie, aut sicca intestinorum dependet; & interim aluus astricta gravissima parit incommoda; ac illius correctioni scorsim incumbendum est. Quod fiet in vniuersum remediis emollientibus, simulque alui excretionem promouentibus in sequentem modum.

℞. Rad. alth. & lilior. ana Vnc. ij. fol. malu. alth. mercurial. violar. branc. vrsinæ, ana M. j. sem. lini & fœnugr. ana ʒ. β. sem. anisi ʒ. j. β. prunor. dulc. par. iij. flor. chamamel. & melilot. ana P. j. Coquantur ad lb. j. β. In colatura dissolue olei liliorum, & sem. lini. ana Vnc. ij. butyri recentis Vnc. j. β. catholic. duplic. & diaprun. simp. ana Drach. vj. Fiat clyster, iniiciendus quoties opus fuerit.

Interdum verò loco huius clysteris utatur sequenti.

℞. Decocti intestinorum veruecis lb. j. butyri recentis

centis Vnc.ij. cassiæ recenter extractæ, catholici optimi, vel diaprun. simpl. ana Dnc.ß. sacchari rubri Vnc.j. Fiat clyster.

Parari etiam potest bis. aut ter in mense clyster ex oleo communi solo ad lb.j.

Adnitendum tamen est aliis remediis aluum molli-  
lire, quandoquidem frequentiori clysmatum usu natura segnior euadit, & tandem assuescit nunquam aluum deponere, nisi clysteribus irritata.

In hunc finem pruna dulcia, vel poma cocta cum saccharo, per horam ante prandium erunt assumenda, vt docet Galen. 2. de alim. facult. cap. 31. Alioqui si immediatè ante prandium assumantur, nihil operantur. Vel iusculum pulli, aut commune, in quo fol. borrag. betæ, & poma aliquot bullierint, vel ol. amygd. dulc. recenter extracti sine igne cochlear. j. cum syrupo capill. ven. pari quantitate, vel cohlear. ij. syrupi sequentis.

℥. Mucilaginis sem. psyllij, & cydoniorum cum aqua malux extract. lb.j. ß. sacchari albi lb.j. Fiat syrupus secundum artem.

Vt pruna meliùs operentur, vinum lymphatum aute & post eorum assumptionem hauriendum est; ita tamen vt tota illius quantitas dimidium cyathum non excedat. Idem præstabit butyrum recens per horam ante prandium assumptum, magnitudine nucis maiusculæ, superbibendo vinum lymphatum.

Semel in septimana vtatur aliquo ex sequentibus.

℥. Cass. recent. extract. ʒ. j. cremor. tart. ʒ. j. Cum saccharo fiat bolus.

℥. Mannæ granat. ʒ. j. ß. Capiat manè cum iusculo.  
Vel

℥. Olei amygdal. dulc. & mannæ granat. an. ʒ. j.

T c dissoluantur

dissoluantur cum iusculo, & capiat manè duabus horis ante prandium.

℞. Pulpæ cassiæ ℥.ij. pulpæ tamarind. & mannæ granatana ℥.j. fol sennæ tenuiss. puluerat. ℥. β. cremor. tart. ℥.ij. Cum syrupo rosato solutio fiat opiata capiat ℥.β. vel Vnc. j.

Vel in decocto prunorum, mannæ ℥.β. vel ℥.j. dissoluatur, capiat horâ vnâ ante prandium, quemadmodum prædicta omnia per horam ante pastum exhibenda sunt, sic enim melius operantur.

Ptisana ex cichor. agrimon. & acetosa in aquam feruere incipientem coniectis, & per noctem infusis, pro potu ordinario vsurpata, vel sola, vel cum vino permixta, aluum liberam seruat.

Iusculum sequens aluum certissimè laxat, eamque diebus consequentibus laxiorem relinquit.

℞. Fol. betæ, & mercurialis, an. M. j. Coquantur in iusculo communi, & quod capiat per horam ante prandium.

Vel parari potest conserua rosar. laxans, ex rosis pallidis non explicatis, præcisis vnguibus, cum manna & saccharo, ana partibus æqualibus, cuius dosis Vn. j.

Denique balneum, vel semicupium frequens ex decocto herbarum emolliētium paratum, ad partes omnes naturales humectandas, & aluum emolliendam, erit vtilissimum.

C A P V T IV.

*De lienteria, & cœliaca passione.*

**L**ienteria est species alui fluxus, in quo cibus non immutatus, sed prout fuerat assumptus, per aluum celeriter excernitur. In cœliaca verò passione alimenta cruda, & imperfectè cocta per aluum reiciuntur. Vnde patet duos istos affectus differre inter se tantum, per magis & minus, ut lienteria ad actionē abolitam; cœliaca passio ad imminutam referatur. Licet autem cibi vel omnino inconcocti, vel imperfectè cocti reiciantur; non idè tamen ad concoctionem læsam hi affectus referuntur; sed potius retentionem. Malè enim vel nullo modo concoquuntur, quia citò deiiciuntur, nec satis diu in ventriculo retinentur, ut concoctionem subire valeant. Hinc etiam colligitur in hoc affectu, licet inter morbos intestinorum referatur ventriculus valdè affici, & plerumque magis quàm intestina; vnde Galenus 6. de locis affect. cap. 2. lienteriam, & cœliacam passionem tum ventriculi, tum intestinorum vitio fieri scribit.

Causæ lienterię, & cœliacę affectionis plurimę proponuntur ab auctoribus, quas omnes ad tria capita referre possumus, frigidam ventriculi, & intestinorum intemperiem; earundem partium irritationem, & summam facultatis retentricis debilitatem ex gravi ac lethali morbo.

Frigida intemperies magnam crudorum, pituitosorum, ac glutinosorum humorum copiam generat, qui ventriculi rugas obducit & obliniit, ut alimenta in eo retineri nequeāt. Vnde mirari licet Galenus 6. Aphor.



*riſm.* i. in veteres Græcos inuehi, qui hunc affectum lienteriam, ſed læuitatem inteſtinorum idcirco nominarunt, quòd interna ventriculi ſuperficies læuior reddita cibos non retineat: quandoquidem ventriculus non tam aſperitate tunicæ interioris, quam ipſa, ſe ſe conſtringendi proprietate, cibos tandiu contineat, donec concoctio peracta ſit. Vt enim concedendum eſt præcipuam retentionis cauſam eſſe facultatem; ſic etiam fateri oportet, facultatem illam inſtrumentis indigere certo modo diſpoſitis, ſine quibus actionē exercere non poteſt: atque adeò cū tunica ventriculi interior aſpera & rugoſa facta ſit, vt alimenta in ventriculo cōmodè retineantur; non eſt dubiū quin, ſi illa aſperitas tollatur, dum rugæ implentur humore pituiſo; retentio ventriculi lædatur, ita vt alimenta incocta præterlabantur. Simile quidpiam in vtero contingit, cuius tunica interior aſpera, & rugoſa facta eſt, vt ſemen facilius retineat ad conceptionem; at ſi lentis & glutinoſis humoribus obducatur, non retinet, & ſemen ſtatim effluit; vnde ſterilis non paucis mulieribus inducitur.

Aduertendum tamen, ſi quis hanc nomenclaturam rigide examinare voluerit, ventriculi læuitatem potius, quàm inteſtinorum, hoc ſymptoma eſſe nominandum; neque tamen omnes illius ſpecies comprehendere, ſed illam tantū quæ ab humore pituiſo producit, quæ cū omnium frequentiffima ſit, reliquarum denominatio ab ea ſumi poteſt.

Irritatio ventriculi, & inteſtinorum ab acris humoribus fit, qui vellicando partes illas ad excretionē præmaturam excitant; quemadmodum in veſica contingit, quæ ab urina acrimonia vellicata frequēti micturitione laborat, vnde ſtranguria exoritur. Galenus *6. aphor.* i. dicit ab illis humoribus acris fieri in ventriculo

triculo ulcerosam dispositionem, eo modo quo aphthæ in ore puerorum fieri consueverunt;

Summa facultatis retentricis imbecillitas in grauius & lethalibus morbis sæpè lienteriam efficit; vt videre est frequentius in dysenteria, quæ naturâ succumbente, in lienteriam degenerat, vetriculo in consensum intestinorum grauiter affectorum pertracto; eiusque facultatibus omninò deiectis. Sic etiam in febribus malignis, alui fluxus lientericus sæpissimè contingit, in quo iuscula statim ferè ac assumpta sunt, per aluum incocta reiiciuntur. Idem potest contingere à rebus venenatis, aut noxiosissima qualitate præditis assumptis.

Est & alia causa à prædictis diuersa, quæ peculiari-ter cœliacam passionem efficere cōsuevit, nempe obstructions venarum mesaraicarum, quæ transitum impediunt chylosæ materiæ ad hepar; vnde necesse est illam per aluum reiici. Verùm vt hæc affectio fiat, oportet omnes venas mesaraicas, aut maiorem illarum partem obstrui; quemadmodum contingit in pueris strumosis, quorum mesenterium glandulis innumeris refertum inuenitur, à quibus venæ mesaraicæ præcluduntur: & hi continuo alui fluxu chyloso & cœliaco laborant; multum comedunt, & in dies emaciantur, donec in marasmum incidunt.

Aëcius & Celsus multique eorum sequaces aliā etiā lienterię causam proponūt, nempe leuem & densam cicatricem intestinis ex magna dysenteria relictā; ob quam venarum osculis obstructis alimēti distributio impeditur, & ita fit lienteria. Quæ tamen causā non videtur recipienda, quandoquidem oportet vniuersa intestina fuisse ulcerata, & in iis postmodum genitam cicatricem omnes propemodum venas mesaraicas occlusisse, quod rationi nullo modo videtur consentaneum.

neum; siquidem impossibile est vniuersa intestina ulcerari, quin homo intereat.

Signa horum symptomatum præcipua ex antedictis patent. Si enim alimenta cruda, & inalterata celeriter, & frequenter per inferiora descendant, lienteriam significant. Si verò aliquantulum immutata, & nonnullam chyli speciem adepta effluant, celiacam affectionem ostendunt.

Signa verò causarum inde colliguntur, si lienteria aut celiaca passio fiat à frigida intemperie, & pituitosa excrementa per aluum deiciuntur, sitis, & doloris carentia; & si à capite fluat pituita, quod frequenter contingit, deiectiones sunt spumosa; maior est fluxus post somnum, & aliæ causæ caput alterantes, aliæque catarrhi signa apparent.

Si verò ab irritatione proveniat, mordicatio interdum in ventriculo sentitur; calor in hypochondriis percipitur, sitis interdum vrget, & deiectiones acres, ac biliosæ apparent.

Quod ad prognosim attinet, lienteria, & celiaca passio diu perseverans periculosa est, quia toti corpori nutrimentum subripit, unde atrophia, vel hydrops consequitur. Et si gravissimos acutissimósque morbos consequatur, lethalis ut plurimum esse consistit.

Curatio huius affectus pro varietate causarum illius producentium varianda est. Ac primum qui ab humore pituitoso producitur, iis remediis curari poterit, quæ pro inappetentia à frigida causa oriunda fuerunt proposita; eligendo ea quæ maiori astringendi vi prædita sunt, ut ventris fluxum possint compescere.

Incipiendum itaque erit à purgatione humoris peccantis

*Cap. VI. De lienteria, & cæliaca pass.* 663  
peccantis, medicamentis compositis ex aloë, rhab. &  
myrobalanis.

Clysteres hic parùm confertunt, cùm ventriculus præcipuè laboret; nisi immoderata deiectionis accedens ut in aliis alui fluxibus, eos requirat. Tùmque astringentes & roborantes esse debent, iuxta formulas, quæ in sequentibus curationibus proponuntur.

Post sufficientem purgationem roborandus ventriculus opiatis, pulueribus, sotibus, emplastris, aliisque remediis dicto loco propositis, in quibus, ut dictum est, astringentia non erunt omittenda, ut mastiche, cortex citri, sem. coriandri, rad. bistortæ, tormentillæ, corallia, &c.

Ac præter illa remedia conueniet opiata sequens ab Amato Lusitano maximè commendata, quâ senem quendam lientericum, post multa alia remedia frustra vsurpata, liberatum esse refert.

℞. Conseruæ ros. antiquæ ℥.vj. theriacæ opt. ℥.vj. muiæ cydonior. quantum satis. Fiat opiata, de qua capiat ℥.β. manè, nihil superbibendo.

Quæ sit ab humore bilioso curanda erit iis remediis, quæ ad vomitum biliosum fuerunt proposita: tum etiam iis, quæ in diarrhææ biliosæ curatione describuntur.

Quæ è retentricis facultatis imbecillitate oritur, in graui & lethali, aut saltem valdè periculoso morbo, curanda est, primùm fomentis ventriculi regioni admotis, in hunc modum compositis.

℞. Rad. bistortæ; tormentillæ, & corticis citri succi, ana Vnc. ij. fol. menthæ plâtag. & absinthij pôtici, ana M. j. nucis moschatæ caryophyll. & cinnam. ana ℥. ij. rosar. rubrar. P. iij. Contundantur, & incidantur, ut artis est, iisque impleantur duo sacculi interpuncti, qui macerentur in æquis partibus aquæ ferratæ, & vi-

ni rubri astringentis; vel in vino solo, si magna febris non adfuerit, & applicentur regioni ventriculi calidè vicissim.

Postea admoueaturngumentum, vel emplastrum aliquod ex iis, quæ pro vomitu bilioso proposita sunt.

Totus venter etiam oleis, vel linimentis astringentibus inungatur.

Clysteres iniiciantur ex iusculo communi, in quo rosæ rubræ bullierint, dissoluendo saccharum & vitellos ouorum; tum etiam interdum confectiorem de hyacintho, si æger sit valdè debilis.

Ac denique per os, roborantia, & astringentia, in curatione vomitus proposita, exhiberi poterunt; tum etiam ea, quæ pro alui fluxu proponuntur.

In cœliaca passione alimenta cruda, & imperfectè concocta per aluum reiiciuntur. Differt tantum à lienteria secundum magis & minùs, iisdemque remedia profligatur.

Si verò omninò chylosæ sint deiectiones, non à vitio ventriculi, sed ab obstructione venarum mesaraicarum dependet hic affectus, qui satis frequens est & infantibus præcipuè familiaris. Ideoque remediis obstructiones aperientibus curandus est, & hepato-robora-ntibus; quia illius imbecillitas sæpè coniungitur, non autem astringentibus, nisi alui fluxus species subsequatur. Horum materia in hepatis affectuum curationibus fusè describitur.

## C A P V T V.

### *De Diarrhœa.*

**D**iarrhœa est illa species alui fluxus, quâ humores excrementitij sine sanguine aut alimêto, & sine exulceratione

exulceratione intestinorum excernuntur.

Hiscæ conditionibus diarrhœa propriè dicta ab alijs alui fluxus speciebus distinguitur; quia in licenteria, & cœliaca passione alimentum incoctum, aut semiconfectum elicitur; in dysenteria & tenesmo, sanguis cum humoribus excrementitijs permiscetur, quemadmodum in fluxu hepatico, & hæmorrhoidali sanguinolenta excretio reperitur.

Plurimæ sunt illius differentiæ, quæ vt dilucidè exponantur, ad tria capita referendæ sunt quorum primum respicit materiam quæ excernitur; secundum continet locum à quo illa materia profluit; tertium verò modum & causam efficientem, quæ alui fluxum producit.

Ratione materiæ quæ excernitur, alui fluxus diuiditur in biliosum, pituitosum, melancholicum, & serosum.

Ratione loci à quo humores profluunt; vel alui fluxus prouenit à toto corpore, vel ab aliqua parte peculiari, puta cerebro, ventriculo, intestinis, hepate, liene, mesenterio, utero, aliisque partibus.

Tertiò ratione modi, & causæ efficientis; alia diarrhœa est critica, alia symptomatica; alia à causa interna vt intemperie, vel praua alia partium internarum diathesi; vel externa, vt medicamento, aut veneno assumpto.

Istæ autem differentiæ simplices vt plurimum non reperiuntur, sed in vno eodèmq; alui fluxu sæpè complicantur. Sic alui fluxus biliosus est ab hepate, vel toto corpore; pituitosus à cerebro, aut ventriculo; melancholicus à liene, serosus, à toto corpore.

Complicantur etiã vt plurimum istæ differentiæ ex varia humorum miscella; ita vt non raro bilis, & pituita

tuita, & serofus humor, eodem alui fluxu excrematur.

Est & alia diarrhœe species à prædictis diuersa, quæ συρτηκτική, seu colliquatiua nominatur; orta ex colliquatione substantiæ corporis, & humorum ab intensè calida partium solidarum intemperie: qualis contingit plerumque in viscerum inflammationibus; febre ardente intensiori, hæctica, & pestilentiz; in quibus materia pinguis, quasi adipe, vel oleo perfusa, per aluum deiicitur.

Denique ad alui fluxus species, refertur fluxus, stercorosus, in quo magna copia stercoris liquidi frequenter eiicitur, qui ex cibis excrementitiis in ventriculo corruptis, aut magna excrementorum copia in intestinis cumulata, exoritur.

Diagnosis in genere manifesta est; quando scilicet per aluum deiiciuntur excrementa liquidiora, & frequentiora, quàm instituto naturæ conueniat.

Signa etiam differentiarum quæ petuntur, à materia conspicua sunt; cum sensibus ipsis pateat utrum excrementa biliosa, pituitosa, melancholica, vel serosa deiiciantur.

Partes verò mandantes difficiliorem habent diagnosis, tamen ita distinguendæ sunt.

Si à toto corpore humores profluant, adest, vel præcessit febris continua, vel aliquis alius totius corporis affectus, ut cachexia, leucophlegmatia; vel ingestorum ciborum & potuum copia præcessit, & nullius partis peculiaris affectus innotescit.

Si autem critica sit illa diarrhœa, sit cum bonis ægri rebus, ac facili tolerantia, & inde morbi solutio, aut maxima illius imminutio consequitur.

Contingit etiam interdum critica diarrhœa sine vilo morbo, in corporibus nonnullis prauos humores cumulare

eumulare solitis, quæ cùm robore insigni prædita sint, prauos illos humores dum copia luxuriant, & naturam grauant, per interualla deponunt; vt docuit Galen. 7. meth. cap. 11. de quo etiam alui fluxu Celsus mentionem facit lib. 4. cap. 19. his verbis: *Vno die fluere aluum sæpè pro valetudine est; atque etiam pluribus, si febris absit, & intra septimum diem conquiescat; purgatur enim corpus, & quod intus læsum erat utiliter effunditur.*

Inter criticos etiam referri debet alui fluxus serofus qui sine vlllo morbo præcedente, contingit hominibus, quibus serum in venis plurimùm redundat, idque potissimùm tempore autumnali; cum videlicet frigus autumnus nocturnum, vel matutinum, apertos ab æstate prægressa cutis & partium externarum meatus offendens; ac propterea sese aliùs in corpus insinuans, serofos humores in venis contentos exprimit ad inferiora, quos deinde natura à nimia illorum copia grauata, per venas mesaraicas ad intestina protrudit, quamuis sæpissimè accadat eos per vrinas excerni, vnde contingit multos in principio autumnus, & primis illius frigoribus, magnam vrinarum copiam per aliquot dies profundere.

Si verò diarrhœa symptomatica sit, magnum facit laborem ægrotanti, vires plurimùm deiecit, & morbus cui superuenit, augetur, vel saltem in eodem statu perseverat.

Iste autem fluxus symptomaticus in febribus ardentibus & malignis sæpè fit colliquatiuus, & inde dignoscitur, quòd excrementa oleo aut pinguedine perfusa apparent; tum corpus confestim emaciatur & absumitur, ac ferè in marasimum perducitur.

Si à cerebro diarrhœa oriatur, deiectiones fiunt spumose, vt docuit Hipp. Aph. 30. sect. 7. Quod tamen



non est perpetuum ; quandoquidem pituita potest à cerebro defluere citra flatuū permixtionem, quæ unica est spumositatis causa; tum etiam humoribus genitis, aut contentis in ventriculo & intestinis, possunt permisceri flatus, unde excrementa erunt spumosa, licet non à capite profluant. Ideò huic signo alia adiungenda sunt, nempe si cerebrum aliquo affectu manifesto laboret, ut catarrho, surditate, lethargo, apoplexia, aut insignis saltem capitis grauitas, aut dolor, aut somnolentia appareat, & noctu magis alui fluxus quàm alio tempore fatiget.

Si à ventriculi vitio procedat, alui fluxus signa aderunt quæ vitiatam ventriculi coctionem demonstrare solent; verbi gratia, si alimenta corrumpantur, recipiantque acrem & nidorofam qualitatem, ex qua deinde irrita facultas expultrix, cogatur ea per aluum expellere, tùmque signa calidæ ventriculi intemperiei aderunt. Sic etiam si cruda & pituitosa deiciantur, & tarda, ac imminuta fuerit alimentorum concoctio; à frigida intemperie læsam ventriculi coctionem arguimus, ac denique vitium in ventriculo residere cognoscimus, si æger tante prauis eduliis sese impleuerit, quæ facile in ventriculo corrumpi poterint.

Ab intestinis procedit alui fluxus, præcipuè cum illa lumbricis repleta sunt; & tunc signa lumbricorum apparebunt, ex proprio capite desumenda.

Si ab hepate procedat alui fluxus, deiectiones erunt biliosæ, quia bilis in hepate generatur, & signa calidæ intemperiei, inflammationis, obstructionis, aut alterius cuiusdam hepatis affectus apparebunt.

Si à liene diarrhœa procedat, deiectiones maiori parte nigra, aut ad nigrum vergentes erunt, in sinistro hypochondrio tensio, grauitas aut dolor, & alia  
lienis

lienens laborantis signa conspiciuntur.

Si à mesenterio procedat; tensio vel dolor in illa parte apparebit. Verùm humores in mesenterio collecti; ab hepate vel liene plerumque oriuntur.

Si ab utero procedat alui fluxus; suppressio mensium, vel symptomata affecti uteri aderunt, quæ magis scire solent, & præsertim alui fluxus ingrauescit, quo tempore menstrua fluere consueverunt.

Prognosis diarrhœæ in hunc modum instituenda est.

Alui fluxus, qui cum facili tolerantia contingit, & ex quo æger leuamen aliquod percipit, bonus. Contrà verò qui laboriosus est ac vires deiecit, malus. Ille enim criticus censendus est, hic verò symptomaticus.

Alui excrementa liquida quæ in progressu morbi sensim crassescunt, bona virtutem enim benè operantem significant, quæ prauos humores concoquit, cum concoctio fiat incrassando.

Fluida alui excrementa cum dolore, & laboriosa, ac frequenti deiectione, mala. Significant enim maximam humorum acrimoniam, quæ intestina vehementer vellicat, stimulat, pungit & erodit.

Liquida deiectio quæ non sentientibus effertur, valdè mala. Aut enim errorem mentis, & delirium significat; aut caloris natui exolutionem, quam sensus abolitio consequuta est.

Liquida deiectio quæ cum morbo acuto incipit, & cum eodem perseverat, mala. Significat enim magnam materiæ morbificæ copiam, vel malignam qualitatem, quæ naturam cogit ad præcocem istam diarrhœam.

Si leucophlegmatia detento fortis diarrhœa superuenerit, malum soluit. Hipp. Aph. 29 sect. 7. Materiæ enim

enim in toto corpore restagnantis euacuatio sit. Id autem limitatione indiget. Verus siquidem est Aphorismus, si talis alui fluxus in morbi principio, & adhuc constantibus viribus accidat; alioqui non morbum, sed ægrum de medio tollit.

Mulieri vtero gerenti, si aluus multum fluat, periculum est ne abortiat. Hipp. *Aph.* 34. *sect.* 5. alimenta enim fœtus nutritioni necessaria per aluum maiori parte excernuntur, & vires deiiciuntur, tum vincula vteri continuo humorum ad illis partes affluxu laxantur; tum fœtus ac vterus tetro excrementorum continenter deiectionum vapore inficitur.

Alui deiectiones vitellinæ, virides, æruginosæ, lividæ, nigrae, variegatae, aut valde foetidae, malæ. Hæ deiectiones malæ sunt propter eas rationes, quas de simili vomitu capite proprio retulimus.

Quod ad curationem spectat: cum diarrhœa symptomatice plerumque oriatur ex pravis corruptisq; humoribus biliosis, pituitosis, melancholicis, aut serosis, & præcipue biliosis, acrimonia sua facultatem intestinorum expultricem irritantibus; illius curatio ab humoris peccantis euacuatione auspicanda est, quod fiet medicamento, quod purgando astringat; ne humoribus commotis alui fluxus nimium irritetur, quod in similem modum concinnari poterit.

℞. Rhab. elect. ʒ. j. myrobal. citrin. ʒ. β. santal. citrin. ʒ. β. Infundantur in aqua plantag. In expressione dissolue rhab. puluerati ʒ. β. syrupi rosac. Vnc. j. Fiat potio. Poterit addi catholicum, vel aliud medicamentum purgans, pro conditione humoris expurgandi.

Vomitibus etiam interdum convenire poterit, quia reuellit & euacuat materiam morbificam.

Si sanguinis redundantis indicia fuerint, & robur virium,

virium, phlebotomia initio celebranda est. At si febris adfuerit, sanguis detrahendus est, etiamsi nulla plethora appareat.

Ante & post purgationem, clysteres detergentes iniiciendi sunt, quorum descriptio talis esse poterit.

℞. Hordei integri P. ij. furfuris macri & rosar. rubrar. ana P. j. liquirit. rasæ & passul. integr. ana ℥. j. Coquantur ad lb. j. In colatura dissolue sacchari albi ℥. j. vitellos ouor. num. ij. Fiar clyster.

Corpore sufficienter euacuato, tum medicamentis purgantibus, tum ipso alui fluxu, astringentia & roborantia, vsurpanda erunt, tum per os assumenda, tum per clysterem iniicienda, tum ventri admouenda: quorum formulæ à curatione dysentericæ erunt repetendæ.

Præterea verò sequentia vtiliter vsurpari poterunt

℞. Aceti chalybeati partem vnam, aquæ chalybeatæ partes duas: fol. & fructuum myrti, cydonior. mespilor. sorborum, ana M. ij. nucum cpressi par. vi. Coquantur ad medias. Colaturâ foueatur totus venter, repidè frequenter.

℞. Ol. mastiches, cydonior. & myrtin. ana Vnc. j. sang. drach. thuris, & gummi tragacanth. ana ℥. j. ceræ quantum satis. Fiat vnguentum, illinendum post forum. Vel

℞. Micæ panis assatæ, & in aceto chalybeato infusæ, & carnis cydonior. sub cineribus coctorum, vel cydoniatæ, ana ℥. ij. thuris, mastiches, sang. drac. ana Drach. ij. Cum syrupo de absinthio cydoniorum. Fiat cataplasma.

℞. Mastiches ℥. ij. Bulliant in lb. ij. quæ fontis pro potu ordinario. Præstat aqua ferrata, quia aluum turbat, sed in affectu calido non valet: in cuius curatione conueniet uti tinctura rosarum; vel conferua rosar. cum

cum aqua fontis permixtâ cum aquâ extinctionis auri, cum syrupo cydoniorum agitâ.

Amatus Lusitanus refert quendam curatum diarrhœâ biliosâ largo frigida potu in æstate. Nos verò cuidam viro sanguineo, diarrhœâ biliosâ æstate mediâ laboranti, cum siti intensa, præscripsimus salem prunellæ in potu ordinario, tum etiam iulepis, cum aqua lactucæ & portulacæ, ter in die sumendis, & intra viginti quatuor horas curatus est.

Si humor fuerit valdè acer & adustus, parcius & mitioribus medicamentis purgandus est æger, alioqui affectus ingrauescit; sed refrigerantibus & humectantibus temperandus est; tum etiam sanguine parçâ manu detracto.

In eodem casu plurimùm confert semicupium tepidum, cuius exemplum habetur in obseruationibus nostris.

Folia plantaginis in iusculis decocta, ad hunc affectum vtilissima sunt.

Ne verò diarrhœa in dysenteriam transeat, ad demulcendam humoris acrimoniam, clysteres ex lacte chalibeato vsurpandi sunt; tum etiam emulsiones ex seminibus frig. maj. & sem. papau. albi.

Ad eandem diarrhœam biliosam syrupus sequens erit conuenientissimus.

℞. Succy cydonior. Vnc. vj. succi endiuiz & acetosæ ana Vnc. iij. sem. acetosæ, & plantag. ana Drach. ij. corall. rubr. ʒ. j. aquæ plantag. ʒ. iv. Coquantur ad mediæ partis consumptionem. Colentur & fortiter exprimantur. Adde sacchari parem colaturæ quantitatem, & fiat syrupus, de quo capiat Drach. ij. manè & serò.

In omni autem diarrhœa, præmissis vniuersalibus, bolus sequens vsurpari poterit.

℞. Conferæ rosar. antiquæ ʒ. β. cydonior. condit.

ʒ. j.

g. j. pulueris tormentillæ ꝯ. i. boli armeni ꝯ. ß. cum saccharo. Fiat bolus frequenter iterandus. Vel si affectus sit diuturnior, ex eisdem aut similibus maiori quantitate præscriptis, opiata concinnari poterit, ad plures doses sumenda.

Vel ad potentiùs astringendum vtatur æger pulvere sequenti.

℞. Sang. drac. thuris, mastich. mumix, terræ sigill. lapidis hæmatit. trochisc. de carabe, ana Drach. i. boli arm. veri Drach. iij. Fiat puluis, de quo capiat ꝯ. ij. cum liquore idoneo.

Rhab. bis infusum, & postea aquâ rosar. lotum bis aut ter, & exsiccatum, vtile.

Tabellæ triasantali quadruplicato rheo, bis in die exhibitæ, pondere Drach. ii. alui fluxus materiam auferunt, & viscera corroborant.

Conyzæ folia super prunas iniecta, vt fumus in cathedra perforata recipiatur specificâ vi alui fluxui medentur. Tum si eadem herba cum aceto trita, regioni stomachi admoueatur.

Suffitus etiam tapsi barbatî in cathedra perforata receptus, insignis est efficacix, cuius exemplum habetur in obseruationibus nostris.

Syrupus corallorum ad idem est efficax, & multò magis illius tinctura, vel magisterium.

Conserua cynorrhodi per se ad diarrhœam biliosam vtilissima est, tum etiam, si opiatis astringentibus permisceatur.

Vbi verò ex fluxu frequentiori, & acriori, periculum est ne vires deficient, laudanum opiatum cum mastiche, & terra sigillata vtiliter exhibetur.

In contumaci alui fluxu, clyster ex iusculo & theriaca recenti vtilis.

Pilulæ de bdellio bis aut ter in septimana, vel alternis

nis diebus vsurpatæ: ad diuturnos, & contumaces alui fluxus sistendos vtilissimæ sunt.

Ad idem valet mespilorum vsus frequens, vt se experientiâ comprobasse testatur Forestus *obs. 1. lib. 2.* his verbis. *Qui diuturno alui fluxu laborabat, & omnem suam substantiam frustrâ in Medicorum ope consumpserat, consilij causâ, vt ab hoc malo liberari posset, ad me accessit. Cui consilium dedi, vt mespila etiam immatura in maxima copia deuoraret. Quibus comestis alui profluvium paucis diebus cessavit. Vti & cuidam euenit mercatori Zelando, ad Ioannem Spirinchium quendam Medicum Louaniensem celebriorem profecto, vt ab eo curaretur. Qui cum multis mensibus laborasset profluvio, & tandem etiam dysenteriâ, neque ab ullis Medicis curari posset, tandem mespilis comestis, ex eiusdem Medici consilio, sanitatem consequutus est, & Medico trecentos aureos, pro sola mespilorum prescriptione numeravit, quibus solis in pristinam sanitatem fuerat restitutus. Hæc Forestus.*

Verum aduertendum est, vt ante mespilorum vsum corpus ab excrementis, & omni cacochymia liberum præstetur.

In diarrhœa inueterata sequentia vtilissima sunt.  
℞. Ras. eboris ʒ. iij. confect. alkerm. ʒ. j. sacchari in aqua ros. dissoluti Vnc. iij. Fiant tabellæ.

℞. Croci martis reuerberati gr. vj. bezcoard. miner. ʒ. ʒ. conferuæ ros. ʒ. ij. spirit. vitr. gut. iij. Misce, fiat bolus qui detur bis in die, longè à pastu.

℞. Succu persicariz maculatæ & semperuiui maj. an. ʒ. iij. bulliant ad tertiæ partis consump. & dentur manè. Certò curant quemlibet fluxum quantumvis inueteratum.

Mercurius diaphoreticus per aliquot dies ad gr. xij exhibitus, omnes corporis impuritates aufert, quæ cōtumaces

tumaces interdum alui fluxus parere consueverunt.

Decoctum granorum iuniperi in vino paratum, per triduum exhibitum multum confert. Tum pulvis cicadarum cum vino albo exhibitus ad Drach. j. Hæc duo conferunt, materiam alui fluxum committendum deriuando ad vrinæ vias. Paratur autem decoctum iuniperi in sequentem modum.

℞. Granor. iuniperi M. i. vini rubri. ℥. i. β. Bulliant ad duarum tertiarum consumptionem; colaturam capiat manè per triduum.

Potus aquarum sulphurearum, totum corpus expurgando, & ventriculum roborando, inueteratam diarrhœam curat. Cuius rei exemplum habetur in obseruationibus nostris.

Si diarrhœa fiat catarrho, cerebro prospiciendum est velut parti mandanti, iis remediis, quæ in catarrhi curatione proposita sunt. Si verò pendeat ab hepatis, aut lienis obstructione, vel imbecillitate; illis affectibus mederi oportebit, prout in peculiaribus eorum curationibus docebitur: tumque astringentium medicamentorum vsus nullus, aut paucissimus esse debet. Platerus in cura hæmorrhoidum, dicit sanguinem calentem iniectum mirabiliter aluum fluentem cohibere.

## C A P V T VI.

### De Dysenteria.

**D**ysenteria est frequens, & cruenta alui deiection cum ventris dolores, ac torminibus, ab intestinorum exulceratione dependens.

Dysenterix nomen apud veteres plerumque sumitur communiter pro omni cruenta alui deiectione:

V v 2      stricte



strictè tamen & propriè eam tantùm alui fluxus sanguinolenti speciem significat, quæ ab ulcere intestinorum exoritur.

Gal. 3. *de symptomat. caus. cap. 2.* quatuor cruentæ deiectionis species proponit, quibus etiam dysenterix nomen communiter usurpatum tribuitur.

Prima est, quando propter aliquam partem præcisam corporis; aut intermissam aliquam exercitationem, aut sanguinis euacuationem per alias partes, puta nares, vel uterum suppressam; sanguis copia luxurians, per venas mesaraicas ad intestina detruditur, & per aluum euacuatur.

Secunda differentia est, quando propter iecoris imbecillitatem sanguis aquosus, & loturæ carniū similis excernitur, quod in fluxu hepatico contingit, de quo intra tractabimus.

Tertia differentia est, quando sanguis melancholicus & splendens eiicitur, qui propter nimiam moram in hepate, aut liene vstione concepit, & cum humore melancholico permixtus est; splendor vstionem significat, quando quidem sanguis qui ex refrigeratione nigrescit, splendorem non habet; imò verò eum quem prius habebat, amittit.

Quarta differentia est, ubi breuibus quibusdam intervallis ægri cum humoribus, & excrementis sanguinem rejiciunt, cui interdum puris aliquid admixtum est, idque cum dolore, & torminibus, quibus intestinorum ulcus arguitur. Et hæc est propriè dicta dysenteria, de qua tantum hic agimus.

Causæ internæ dysenteriam efficientes sunt, humores acres & exulcerantes, ut bilis flava, porracea, æruginosa, & atra; tum etiā pituita falsa ab intenso calore genita, vel per putredinem in ventre falsedinem adepta, & ad intestina delata, ubi propter lentorem diutiùt

diutius hærens, assidue detergendo, tandem exulcerat.

Hic dubium non leue proponitur, ab autoribus, quomodo bilis flaua interdum breui temporis spatio dysenteriam faciat cum tamen non raro bilis portacea, & æruginosa simplicem faciat diarrhœam ad longum tempus perdurantem, quæ tamen nunquam in dysenteriam degenerat; cum bilis porracea & æruginosa ex flaua generetur vltiori adustione, & proinde maiorem habeat acrimoniam.

Respondet Mercatus, cum humorum acrimonia requiriti lentore & visciditate, cuius ratione diutius morantur in intestinis, eaque magis corrodant. Et ita si flaua bilis lentorem habeat dysenteriam efficiet, contra vero si porracea & æruginosa fluidior sit, & minorè in intestinis moram faciat, simplicem producet diarrhœam.

Sennertus hanc responsionem probabilè esse dicit, eam tamen omnino dubiù non soluere existimat, quod sæpè alui fluxus dentur, in quibus visciditas & lentor cum acrimonia reperitur, & tamen dysenteria non excitatur. Contra vero visciditas & lentor sæpè non adest in biliosis humoribus dysenteriam excitantibus, idèd censet humores qui dysenteriam pariunt, peculiarem & occultam quamdam qualitatem habere, quâ peculiariter intestinis infensi sunt, eaque exulcerant, sicut lepus marinus pulmonem, & cantharides vesicâ exulcerant, non autem alias partes. Illam vero qualitatem malignam & intestinis vt plurimum infensam probat ex eo quòd dysenteria plerunque contagiosa est, ita vt miasmata ex deiectionibus dysentericorum exhalantia sola intestina efficiant in iis qui contagium recipiunt, non autem alias partes. Idem contingit in aliis morbis epidemicis & contagiosis, in quibus venenû grassatur parti cuidâ peculiari infensum. Sic datur pleuritides, peripneumoniæ, & angina pestilètes. Sic venenû

canis rabidi soli cerebro infensum est. Id apertius in medicamentis purgantibus videre est, quæ peculiam vim obtinent, humores in corpore commouendi, & ad intestina propellendi; cum enim illa non solum ore sumpto, sed etiam umbilico admota, imò vapore ipsorum naribus attracto, aluum mouere, & purgare soleant; verisimile est illa per poros cutis, & vasorum extremitates in venas & arterias penetrantia, agitationem quandam & fermentationem in humoribus excitare, quia vitiosi humores à bonis separantur, & indeinceps naturam stimulant ad intestina propelluntur, vi medicamenti ad ea loca expulsionem dirigere. Pari etiam ratione, sed modo diuerso, sudorifera ad cutem, & diuretica ad vesicam insitâ vi humores propellant. Ex quibus licet colligere, contagium dysentericum quocunque modo, & loco intra corpus admissum fermentationem quandam in humoribus excitare, & sibi similem dispositionem imprimere, quæ intestinis inimica, ad ea cursum humorum promouet; eaque labefactat, atque exulcerat; & illa demum tali dispositione infecta humores, & alimenta inficiunt; unde vera & propriè dicta dysenteria emergit.

Quæritur etiam apud autores, quidnam sit illud mucosum, & album, quod magna copiâ plerunque in dysenteria excernitur, cum sanguine, aliisque humoribus permixtum. Quidam putant esse pinguedinem intestinorum abrasam; alij mucum quo intestina oblinuntur, ad faciliorem transitum, excrementorum; alij pituitam à cerebro, aliisque partibus defluentem, alij pus ex visceribus manans. Nos verò statuimus hanc mucosâ substantiam nihil aliud esse, quàm intestinorum excrementum præternaturale. Intestina siquidè labefactata, & à naturali constitutione deiecta, proprium alimentum ritè conuertere nequeunt in suam substantiam, sed illud imperfectè

imperfectè assimilâdo in mucosam illam substantiam commutant, quæ cum nutritioni illarum partium inepta sit, expellitur foras, & pars, demum nutritionis indiga non uero attrahit alimentum, quod denuo cum perfectè transmutari non possit ob vitium partis, in substantiam illam heterogeneam, & mucosam conuertitur, cuius magnus est prouentus, quoniam pars ad sui nutritionem continuo sanguinem attrahit à venis, qui in mucosam substantiam conuertitur, atque adeo pars, suo genio fraudata nouum iterum attrahit sanguinem ad sui nutritionem, quam perpetuo intendit, qui cum propter deprauatam homiosim in prædictam substantiam commutetur, magnus sit mucosi illius excrementi prouentus. Idem in quamplurimis aliis partibus contingit, & præsertim in iis quæ magna & profunda vlcera patiuntur. Pars siquidem ulcerata cum ob prædam diathesim probè nutriri nequeat, sanguinem continuo attrahit à venis, qui in purulentam substantiam commutatur, vnde totum corpus sc̃sim exhauritur, & tandem contabescit. Neque solum partibus ulceratis hoc vitium contingit, sed etiam aliis nullo vlcere aut abscessu affectis, ita ut licet excrementum prædictum puris naturam æmuletur, non sit tamen verum pus, quod non nisi ex vlcere vel abscessu procedit. id præcipuè apparet in ophthalmia, in qua oculus simplici inflammatione affectus, copiosum excrementum puri simile continuo emittit, quod ex sola partis intemperie & deprauata homiosi procedit; idem contingit sæpè asthmaticis & aliis qui pulmonum affectibus laborant; eorū enim pulmones malè affecti, proprium alimentum malè concoquunt, & in excrementum pituitosum atque interdū puri simile conuertunt, quod per anacatharsin, expellitur; in iis tamen nullum vlcus est in pulmone, quod multi Medici etiā periti statim pro-

citur quodd si dolor sit supra vmbilicum, tenuia intestina afficiuntur, si verò infra, crassa maximè laborant, quod tamè rationi manifestè repugnat, cum & tenuia & crassa intestina ad partem superiorem & inferiorem circumagantur. Meliùs igitur elicietur ista diagnosi ex qualitate doloris, & iis quæ excernuntur. Si enim tenuia intestina affecta sint dolor est acutissimus, ut ægri aciculis compungi videatur, quia tenuia intestina magis membranosa sunt, & sensu exquisitiori prædita. Deindè aluus statim post tormina & dolores non deponit; ac denique sanguis cum stercoribus omnibus permixtus est. Cum enim via à superioribus intestinis ad anum longior sit; sanguis, & purulenta materia antequam per aluum excernatur, in longiore itinere magis cum stercoribus permiscetur. Si verò intestina crassa afficiantur; dolor est minùs vehemens & diuturnus; à torminibus & cruciatu ventris statim fit excretio; cruor, & purulenta materia alui excrementis supernatat, aut parùm permixta apparet. In maiori exulceratione veluti carunculæ exernuntur.

Signa causarum ab excrementorum colore præsertim desumuntur, quatenùs illa citrina, flaua, viridia, albicantia, vel atra conspiciuntur. Quibus adiungenda sunt signa abundantium in corpore humorum quæ ab ætate, temperamento, anni tempore, & vitæ genere desumuntur.

Prognosis huius affectus in hunc modum instituenda est.

Si tenuia intestina exulcerentur, maius est periculum, substantiâ enim pollent magis nervosa, & hepaticæ viciniora bile synceriores recipiunt.

Dysenteria ab atra bile proveniens lethalis ex Hipp. Aph. 24. sect. 4. quia tale vlcus ad canceri naturam accedit, qui etiam in externis corporis partibus raro curationem

tionem admittit. Si tamen per crysin excreta atrabilis dysenteriam mouit, adedò periculosa non est. Cauendum tamen hîc est ne sanguis concretus, aut diutiùs retentus pro atra bile accipiat.

Dysenteria à flaua bile aut cibis acribus proueniens faciliè curabilis est.

A pituita salsa dysenteria veniens, & crudelior & contumacior est, quàm quæ à flaua bile, quia propter lentorem diutiùs intestinis hærens, grauiùs affligit, & magis exulcerat.

In longis difficultatibus intestinorum cibi fastidium malum, & cum febre peius. Hipp. *Aph. 3. sect. 6.*

Si dysenteria detento veluti carunculæ deiciantur, morriferum. *Aph. 26. sect. 4.* profundum enim vlcus significat, quod intestini particulas abradit.

Vigiliæ immodicæ, deiectiones synceræ, nigræ, foetidæ, sanguinis excretio cōpiosa, superueniens lenteria, singultus, vomitus biliosi, iecoris & præcordiorum dolor, sitis intensior, lethalem vt plurimùm dysenteriam prænuntiant.

Podagricis, & lienosis superueniens dysenteria, bonum. Hipp. 2. *progn. & aph. 46. sect. 6.* hæc tamen dysenteria talis reuera non est, sed potiùs ad simplicem diarrhœam referenda, quæ materiam morbificam, illos morbos producentem, euacuat.

Senes & pueri ex hoc morbo sæpiùs pereunt, quàm in media ætate constituti Hipp. 2. *progn.* pueri quidè, quia citò dissoluuntur ob molliem, tùm quia præceptis minùs obtemperant: senes verò quia viribus sunt exhausti, & quia magna status naturalis euersio significatur. Talia si quidem excrementa dysentericæ producendæ idonea, non faciliè gignunt.

Curatio huius affectus perficitur medicamentis humores acres lenientibus, abstergentibus, euacuanti-

tibus

tibus; vlcus consolidantibus, fluxúmque constringentibus,

Humoris peccantis euacuatio statim ab initio molienda est, vt citò educatur, antequàm grauiùs lædat: imò verò repetenda, donec magna ex parte sublatus sit.

Et si tutum non videatur singulis, vel alternis diebus purgare; fieri potest tertio, vel quarto quoque die. Huic vsui cæteris præstat medicamentis rhabarbarum, vel in substantia cum iusculo vsurpatum; vel in potionis formam reductum, vt in diarrhœæ curatione, vel in sequentem modum.

℞. Fol. plantag. M. β. liquirit. ras. & passul. integr. an Drach. iij. rosar. rub. P. j. tamarind. Drach. vj. corticis myrobal. citrin. ol. amygd. dulc. confricat. Drach. ij. Coquantur ad Vnc. iij. In colatura dissolue rhab. in aqua plantag. cum spica infusi Drach. j. syrupi cydonior. 3. j. Fiat potio. Vel

℞. Tamarindor. Vnc. sem. myrobolan. citrin. Drach. ij. Coque in aqua hordei & plantag. In colatura infunde rhab. Drach. j. sem. santal. citrin. 3. β. Colaturæ Vnc. iij. adde syrupi rosar. solut. Vnc. j. Fiat potio.

Commendatur à nonnullis decoctum myrobal. in plures doses exhibitum, hoc modo paratum.

℞. Corticum myrobal. cepulor. Drach. x. citrin. 3. v. passular. minor. Vnc. ij. Coque omnia in aquæ Vnc. xxvj. ad consumptionem tertiæ partis. Postea colentur. Adde colaturæ sacchari Drach. x. Clarificetur, aromatizando cinnam. Vnc. sem.

Penotus sequentem potionem laudat, tanquam singulare remedium ad dysenteriam, & diarrhœam desperatam.

℞. Corticis guaiaci contriti Vnc. ij. Bulliât in sufficienti quantitate aquæ ad medias, cui impone rosar. rubr.

rubr. balauft. sem. plantag. an. Drach. ij. Bulliant per horam. Deinde colaturæ adde rhab. puluerat. Drach. j. cathol. Drach. iij. Fiat potio.

Quamplurimi practici rhab. torrefactum exhibent, ut vis purgans ex parte auferatur. Sed Amatus Lusitanus secundâ rhabbari infusionem vsurpat, dicirque primâ infusione omnem eius acrimoniam auferri, & melius esse hoc modo vsurpatum, quàm torrefactum: illâ enim torrefactione empyteuma acquirere non pauci existimant. Præparatio autem talis est.

℞. Rhab. elect. Drach. j. sem. Infundantur in aquæ plantag. iij. per aliquot horas. Colentur & leuiter exprimantur, iterumque infundantur in nouæ aquæ plantag. Vnc. iij. In expressione dissolue cassiæ recent. extractæ Vnc. sem. Fiat potio.

Si propter humorum crudorum copiam magis purgare est animus, syrupus rosaceus, cathol. aliâque mitiora admiscenda sunt, abstinendo à vehementioribus.

Vomitus aliquando conuenire potest, si æger sit nauseabundus, & humores in ventriculo restagnare videantur; sit enim reuulsio à parte affecta. Quod discretè innuit Amatus Lusitanus curat. 44. cent. 2. in scholio his verbis: *Si ad intestina corruantem biliosum, & acrem humorem dysenteriam gignentem, Medicus per superiora retrahere posset, & eum per vomitum vacuare, dubio procul ineptum esset, contra Galeni præcepta libro artis Medicinalis, & methodi sua curatiua, per intestina, vlcerebus scattentia, materiam ducere. At cum hac Medicus non sic assequi possit, tamen si tentare pro viribus debeat, consequens est medicamenti purgatorii id efficiat, præsertim rhabbaro. Illud ipsum docuerat Hipp. Aphor. 15. sect. 6. A longo alui profluuiio habito, spontaneus vomitus superueniens morbum soluit. Galen. verò in com. huius Aphor. Hoc, inquit,*



quit, exemplum ex eorum quæ rectè fiunt à natura, quæ Medicum imitari oportet. Idem confirmat Mercatus, his verbis: *Aliò humores transferes, sanguine misso, si opus fuerit, item expurganti pharmaco exhibito, vel vomitibus, maxime in falsa pituita, nam hac viâ diuturnas dysenterias curari conspeximus.* Angelus Sala in dysenteria sequens præscribit vomitorium.

℞. Sal. vitriol. ʒ. β. vel Drach. j. Syrup. cydon. & aq. beton. an. ʒ. j. aq. cin. Drach. x. Misce & propina.

De phlebotomia in hoc affectu magna est dissensio inter authores. At peritorum sententia est præsentente febre & intestinorum inflammatione, quæ non rarò vlcer copulata est, ) debere celebrari in principio morbi, antequàm vires ab alui profluuiio diuturniori fuerint attritæ: sic enim fit reuulsio sanguinis & humorum acriorum ad intestina profluentium. Imò verò Valescus de Taranta, & Amatus Lusitanus in antiqua dysenteria sanguinem detrahunt. *Valdè senex*, inquit Valescus, *dysenteria à tribus iam mensibus miserè torquebatur. Vocatus in consilium, reluctantibus omnibus aliis Medicis, iussi venam aperire. Mox conualuit.* Amatus verò si habet. *Ad virum illum, qui dysenteriam diuturnam, & forte triginta dierum, ingenti cum febre patiebatur, & post multa ac varia adhibita remedia, imbecillis & gracilis est factus, perseverante etiam fluxu ventris multo cum sanguine; Medicus cordatus ingressus est, qui sanguinem ex basilica dextri brachij extraxit. Sed quanto inuamine, audite. Illicò, mirum dictu, sanguis cohibitus fuit, perseverante adhuc fluxu ventris. Caterum saccharo ad aliquot dies, & nonnullis ingestis clysteribus, ac topicis astringentibus remediis applicitis, alius in totum restricta est.*

Interim varij iniiciantur clysteres, primùm leniētes &

& detergentes; postea verò glutinantes & astringentes. Non rarò autem in vno eodémque clystere omnes prædictæ indicationes permiscuntur, aut earum plures.

Clysteres lenientes & anodynî parantur ex lacte, vel solo, vel cum vitellis ouor. n. ij. aut iij. vel mucilag. seminis psyllij & cydonior. Vnc. iij. vel ad simul astringendum, cum sacchari, aut mellis rosacei Vnc. j. vel ad glutinandum seui hircini recentis Vnc. j. aut ferro, auro, vel silicibus ignitis in lacte extinctis, vt ferosa illius portio absumatur, sicque glutinosum magis euadat.

In lactis verò defectu, lac amygd. dulc. vel cremor. hord. seu orizæ, quem oryzogalon vocant, sola vel inuicem mixta, tum etiam iusculum veruecis, pulli aut caponis, vel capitis & intestinorum veruecis usurpari poterunt, iisque reliqua permisceri. Vulgare autem est rosas, & caudam equinam cum capite veruecis decoquere. Vel decoctum sequens erit præscribendum.

℞. Rad. alth. Vnc. j. hord. mundat. vel oryzæ P. j. sem. lini, & cydonior. an. ʒ. j. sem. psyllij Drach. sem. flor. chap. chamæm. P. j. Fiat decoctio in lacte, vel iusculo, addendo seuum, vitellos, & alia præscripta.

Vel fieri potest ex lacte solo, cum rad. alth. decocto, in principio ad tergendum, & dolorem demulcendum.

Dolore admodum urgente, narcotica interdum dictis clysteribus admiscenda sunt; vt philonij Persici Drach. j. vel ij. pilul. de cynoglossa ʒ. j. vel ij. syrup. de papau. Vnc. j. sem. laudani opiatî gr. v. vel vj.

Si inflammatio intestina obsidere videatur, quod ex dolore ventris continuo, & contrectando sese exasperate, tum etiam febre, ac linguæ siccitate dignosci poterit;

poterit; iteretur phlebotomia, clysteres iniiciantur ex aqua rosarum, in qua sal Saturni dissolutum fuerit, & venter oxycrato foueatur.

Idem Sal Saturni per os exhiberi poterit ad gr. x. cum conferva rosarum.

Clysteres detergentes fiunt ex decocto hordei, furfur. macri, & rosar. rubr. cum saccharo, aut melle rosac.

Ad maiorem verò deterfionem, & vlcis glutinationem addi poterit terebinthinæ Drach. j. cum vitello oui dissoluta. In sordidioribus vlcibus, ad fortiora interdum detergentia erit confugiendum, vt betam, & parietariam, in prædicto decocto vsurpandam. Fortissima verò sunt centaurium absinthium, gentiana, muçia, ex Gal. 1 2. *meth. cap. 1.* & similia; quorum vsus hoc tempore rarissimè est propter dolores, qui grauiores multò solent euadere.

Zacutus Lusitanus ausus est vti arsenico, cum fœlici tamen successu; vt videre est *obser. 1 8. lib. 2. Præxis Medicæ admirande.*

Chymici nonnulli oleum ceræ in clysteribus dissolunt ad Drach. j. eoque venter inungunt.

Ad vlcus glutinandum, clysteres primò leuiter siccantes, & parùm astringentes conuenient, ad eos postmodum descendendo, qui maiori siccandi astringendique vi præditi sunt Atque ita fient primùm, ex lacte chalybeato, in quo rosæ decoctæ sint, vel ex decocto hordei, aut oryza torrefactæ, & rosar. rubr. P. i. addendo vtrique clysmati interdum vitellos ouor. affos n. ij. aliquando & mel rosac. & cum magis operari vis, succi plantag. Vnc. j.

Ad magis astringendum & glutinandum, in hunc modum parabitur.

℞. Radic. consolid. maj. & tapfi barbari, ana Vnc. i. fol.

fol. plantag. & consolid. ana M. i. rosar. rubr. hord. torrefacti, ana P. j. mirtillor. Drach. ij. Fiat decoctio in aqua cisternæ. In colaturæ lb. j. dissolue mellis rosac. ℥. j. album. oui num. j. vel mucilag. gummi tragacanth. Vnc. i. seui hircini Vnc. ij. succi millefolij vel polygoni Vnc. i. Fiat clyster. Vel

℥ Rhad. bistort. vel tormentill. Vnc. i. sem. rad. consolid. mai. Vnc. j. fol. burf. pastor. polygon. equiseti, & pilosell. an. M. i. balauft. calycum glandium, nucum cupressi, an. Drach. ii. oryzæ tostæ P. j. Fiat decoctio in aqua fabrorum. In colat. lb. j. dissolue succi plantag. Vnc. ii. vitellos ouor. assos num. ij. Fiat clyster.

Angelus Sala mirum in modum commendat clysterem sequentem.

Caput veruecis per medium sectum decoquatur, donec caro ab ossibus separetur. Iuri colato adde summit. hyperici M. ij. vel iij. rad. tormentill. crasso modo contusæ Vnc. ii. Infunde per 3. vel. 4. horas supra cineres calidos. Colatura bis, terve in clysteris formam iniiciatur.

Succus plantag. solus, vel lacte, & decocto hordei contemperatus vtiliter iniicitur.

Gummi tragacanth. Drach. ij. vel illarum infusio in aqua peculi rosar. & plantag. clysteribus vtiliter permiscetur; vel cum succo plantag. permixta, addito seuo hircino, efficacissimum enema cōponet. Loco tragacanthæ, aut etiam cum illa, vtiliter vsurpari poterūt gummi arabicum, thus, mastiche, sarcocolla. Quæ omnia in prædictis liquoribus soluta, glutinando operantur, nec ut valdè astringentia vlcus exasperant. Amatus Lusitanus valdè probat clysteres ex Emplasticeis prædictis paratos, quia internam intestinorum superficiem, contra fluentis materiæ morsum, crustæ instar obducunt, eòsque ita componit.

℥. aquæ

*℞.* Aquæ hord. Vnc. x. album. oui optimè concussum n. j. gummi arabici, adipis caprini, ana Vnc. sem. ol. rosac. Vnc. ij. bol. armen. & gum tragacanth. ana Drach. j. Misce, fiat clyster.

At ne clysteres isti emplastici suo lentore acres materias, tanquam carcere retentas, intestinis affigant; ad clysteres detergentes deueniendum est, qui non diu sunt retinendi; tum etiam clysteribus astringentibus detergentes identidem intericiendi sunt.

In clysteribus astringentibus vtiliter admisceri poterūt, acacia, hypocistis, sanguis draconis, lapidis hæmatitis succus rubeus, attritione cum aqua rosar. vel plantag. elicitus, bol. armen. terra sigill. trochisc. de succino, albi Rhasis ad Drach. j. vel ij. Alij verò pulueres qui à nonnullis præscribuntur, noxij potius sūt, cū in liquore subsideant, partemque vellicando irritent.

Imò verò satius est, etiam prædictos pulueres in liquore, vel decocto infundere, & factâ colaturâ iniicere.

Dum clysteres iniiciuntur, medicamenta iisdem viribus prædita per os exhibenda sunt: idque multò frequentius, quādo superiora intestina vlcerata sunt, ad quæ clysterum materia peruenire nequit.

Lac caprinum, vbi magis detergere, vaccinum, vbi magis glutinare est animus, cum saccharo rosac. vtiliter exhibetur, modo febris absit. At chalybeatam efficacius conglutinat; illius Vnc. iij. cum succi plantag. & sacch. rosac. ana Vnc. j. præstans efficiunt medicamentum. Vel symphyti maioris radix in lacte chalybeato vtiliter decoquitur & exhibetur.

Vel fiat panis ex subtilissima & purissima hordei farina cum vitellis ouor. Coquatur in furno post extractionem panis. Micas eius lacti saccharato immisce ad puliculæ consistentiam, de qua æger capiat cochlear. v. vel vj. bis aut ter in die.

Iusculum carnis vitulinæ, optimè & diu coctæ, vlcera dolores lenit.

Cremor oryzae mundæ benè coctæ, vlcera cōsolidat.

Refert Lerijs in sua historia, multos dysentericos in longinqua nauigatione fame proponendum enectos, oryza in lacte decoctâ, additis vitellis ouor. & succo hederæ terrestreis, fuisse restitutos.

In lacte etiam amygdalino oryza poterit decoqui, & vtrumque lac prius auro vstulari.

Hordei verò cremor cum saccharo paratus detergit & refrigerat.

Iusculum ex decocto pimpinellæ cum butyro paratum, & per triduum exhibitum, manè, & serò, dysenteria curationem mirabiliter promouet; idque magis, si eiusdem decoctum eodem tempore pro potu ordinario exhibeatur.

Cortices duorum arantiorum subauridiū in lb. viij. aquæ decocti pro potu ordinatio, curationē accelerat, rasura cranij humani Drach. j. bis aut ter exhibita cum iusculo, aut alio liquore idoneo, dysenteria curationem citissimè absoluit.

Macilaginis gummi tragacanthæ extractæ cum aq. rosar. cochlear. ij. vel gum. arabic. Drach. sem. in singulis iusculis & panatellis vtiliter dissoluitur, tū etiam gelatinæ cornu cerui cochlear j.

Tandem decocta astringentia ad integram sanationem, corpore benè euacuato, exhiberi poterunt. Quæ fient ex rad. bistortæ, tormētillæ, symphyti; fol. plātag. millefol. bursæ past. equiseti, pilosellæ, acrimoniæ; sem. plantag. acetosæ, sumach, vinaciorū, rosæ rubris, &c. in aqua cisternæ; dissoluendo syrup. cydonior. myrtin. aut de ros. siccis; tum etiā interdum acaciam, hypocist. bolum armenam, aut spodium.

Succus cydoniorum coctus sine additione ad consistentiam

sistentiam syrupi, vel rob, & ad cochlear i. vel ii. frequenter exhibitus valdè prodest. Similes succi ex pyris, cornis, aliisque fructibus austeris parari possunt.

Intestina veruecis pingua decoquantur in olla, donec iusculum redeat ad mediam scutellam; huic adde olei dulcis parem quantitatem, capiat æger per os. Dysenteriam non valdè contumacem vnâ vel alterâ exhibitione sistit. Idem præstant oleum & aqua rosarum pari quantitate exhibita.

Vitelli duo ouorum indurati, & in aqua rosarum dissoluti instar panatellæ, condiantur saccharo, & pauca nuce moschata, & bis aut ter exhibeantur.

Succus plantag. crudus ad Vnc. iij. vel iv. exhibitus solus, vel cum aliis permixtus præstantissimus est: & si inflammatio adfuerit, eam compescit.

Testatur Hollerius hederæ terrestris succum propinatum plurimos à morte liberaſſe.

Iulepi ex aquis, vel decoctis, & syrupis astringentibus frequenter etiam exhibendi.

Syrupus corallorum, tinctura, & magisterium huic affectui sunt valdè idonea, quibus vtatur æger ex cochleari frequenter, vel syrupis sequentibus.

℞. Syrupi de agreſta, myrtini, de succo plantag. cydonior. de ros. siccis, & de succo portulacæ, ana ʒ. j. Misce ad vsum dictum.

In fine dysenterię valdè confert succus absinthij & menthæ benè depuratus, & cum saccharo in syrupum redactus: habet enim mentha cum absinthio mixta miram vim corroborandi ventriculum.

Imò verò, si dysenteria à multo fructuum vſu contigerit, in ipſo principio valdè conducit syrupus de absinthio cum aqua cinamomi, vel theriacali; ventriculo interim admouendo fomenta & emplastra roborantia.

Malum cydonium excauatum, cerâ albâ derasâ impletum, & sub cineribus coctum, ac postea exhibitum per aliquot dies, specificum est dysenteriae remedium.

Quercetanus idem remedium parat ex pomo curtipendolo excauato, & gummi arabici ac rasuræ ceræ albæ, an. Drach. j. repleto, & ad ignem cocto. Pomo deuorato, statim exhibet haustum decocti astringētis.

Alij vsurpant pullum columbinum cerâ infarctum, & assum, ac in prandio exhibitum.

Mespilorum vsus dysenteriam inueteratam curat, vt testatur Forestus historiis duabus lib. 22. obs. 1. propositis, qui locus supra citatus est in diarrhoeæ curatione.

Bruyerinus verò lib. 8. de re cibaria cap. 22. scribit seipsum desperatâ dysenteria laborantem, de' anus cuiusdam consilio sorba cruda largissimè deuorasse, indeque sanitati restitutum fuisse.

Nec omittenda est illa vua quercina, à Martino Rulando descripta, quam dicit esse concretitiū quiddam in forma vuz, ad radices quercuum sub terra, tempore veris pullulans, saporis styptiei, colore foris purpureo, intus candido, & quasi lactifero, qui in æstate pereat, & quasi fiat lignea; ideòque tempore veris debeat exsiccari in umbra, & deinde puluerisari; hocque puluere nihil præstantius esse ait in dysenteria, omnisque sanguinis profluuium. Illius etiam vuz mentionem faciunt Encelius, Bauhinus, & Skenckius.

In omni fluxu à putridis humoribus, roboventur intestina panebiscocto, qui in aceto fuerit decoctus, & postea exsiccatus. Bis teruè repetitâ eâ præparatione ille puluerisetur, & iusculis indatur ad mediocrem crassitiem.

Pulueres



Pulueres ad eundem affectum varij etiam parantur in sequentem modum.

℞. Rad. bistort. & tormētill. an. Drach. ij. sem. acetos. & plātag. an. Drach. j. corall. rubr. & margarit. præparati an. Drach. Fiat pulvis tenuissimus, de quo capiat Drach. j. cum iusculo, vel liquore idoneo. Possunt add. huic pulveri ad maiorē astrictiōem, rosæ rubræ, myrtilli, balauſtia, cornu cerui vstum, vel spodiū, aut trochisci de spodio; vel ad maiorem adhuc astrictiōem, sanguis draconis, acacia, gallæ, bolus armena, terra sigillata, lapis hæmatites. Si simul glutinare desideres, adde sem. psyllij, amyllum, gum. tragacanthum.

Bolus armena orientalis ad ℥. j. cum iusculo, statim sedat dysentariā, si purgatio sufficiens præcesserit. Vel

℞. Pulueris tragacanthæ Drach. j. nucis moschatæ, corallij præparati, an. Drach. sem. Misce capiat in duas vel tres doses, cum ouo sorbili, aut cum iusculo. Vel

℞. Gummi arab. Drach. j. coralli præparati, boli armenæ. an. Drach. sem. Misce, vtatur loco prædicti. Vel

℞. Cornu cerui vsti, boli armen. corall. vtriusque, santalor. omnium, mastiches, an. Drach. sem. thuris, tragacanthæ, an. ℥. sem. Misce, fiat pulvis, de quo capiat Drach. sem. frequenter.

Forestus valdè commendat puluerem sequentem, aliquoties vsurpatum.

℞. Myrobalan. citrin. & rhab. parūm torrefacti, an. ℥. j. Fiat pulvis pro vna dosi.

Hercules Saxonia sequenti puluere dicit omnes dysenterię recentes, nisi fluxio admodū vrgeat, statim & certò sanari.

℞. Ossis sepis vsti Drach. ij. spongiæ pice imbutæ, & in ollula vstæ, & cortic. ouor. indurator. ablatâ pelliculâ interiori, an. Drach. j. Fiat pulvis Dosis Drach. j. in liquore idoneo.

Non minoris efficaciam, imò frequenti experientia confirmatus est pulvis granor. actes, à Quercetano descriptus in pharmacopœa, illiusque utendi modus ibidem videri potest.

Opiatæ etiam in sequentem modum præscribi possunt.

℞. Conseruæ rosar. antiquæ & cydoniati, ana Vnc. i, conseruæ rad. symphyti. ℥. sem. coralli præparati ʒ. j. β. croci Martis, boli armenæ, terræ sigill. sem. plâtag. an. ʒ. i. spodij ʒ. ii. Cum syrupo de rosis sicc. vel myrtino, fiat opiata, de qua capiat magnitudinem castanæ, bis au ter in die. Vel cum saccharo rosac. ad pondus omnium, poterit fieri conditum ad usum frequentem.

Myclera Nicolai ad dysenteriam, & reliquos alui fluxus utiliter usurpatur.

Sapienter monet Crato, ante septimum diem, potius quàm vlcera intestinorum probè abstergantur, astringentia per os non conuenire, nec foris etiam applicanda esse. Verum post septimū à leuioribus incipendum. Montanus verò astringentia penitus abdicat, detegentibus, lenientibus & incrassantibus contentus. Verum materiâ morbificâ probè euacuata, retentricis facultatis imbecillitas, quâ fluxus alui fouetur, astringentibus remediis opportunè tollitur.

Vtile ergo fuerit, post purgationem sufficientem bolum armenam, terram lemniam, puluerem granorum actes, aut alia astringentia, & exsiccantia per plures dies cum saccharo exhibere, & usque ad integram sanationem. Quod si astrictio nimia nocere videatur, purgandum iterum, & denuò astringendum; ac rursus purgandum. Aduertendum autem terras prædictas dupliciter conferre, astringendo scilicet, & malignam qualitatem quæ dysenteriae coniuncta est, oppugnando. Obstructio verò quæ ex horum astringentium usu meruitur, sacchari admixtione prohibetur.

Ad vlcus leniendum & consolidandum, electu-  
arium sequens vtilissimum est.

℞. Mucilag. sem. cydonior. mucilag. rad. consolidæ,  
& gummi tragacanthæ, omnium extractarum cum  
aqua rosar. ana Vnc. j. amyli Drach. j. coralli rubri  
Drach. ij. beli armen. præp. Drach. j. balauft. Drach.  
sem. rob. de sorbis, vel cydoniati Vnc. ij. sacchari ro-  
sac. Vnc. j. Fiat inftar electuarij, dosis Drach. ij.

Narcotica per os aliquoties exhibita miranda præ-  
stât: dolorem enim sedant, fluxum cohibent, somnum  
conciliant, & sic quoque vires reficiunt. At multò  
erunt vtiliora, si astringentibus, & roborantibus per-  
miscantur. Exempli gratiâ.

℞. Conseruæ rosar. antiquæ Drach. ij. laudani opiat  
g. iij. confectiois alkerm. ʒ. ʒ. Fiat bolus.

In dysenteria maligna & epidemica, bezoardica &  
sudorifica multùm possunt. Compertum enim est, per  
huiusmodi remedia, euacuatiâ, materiâ dysenteriam  
cassere: ideòque mox à principio, & dū reliqua fiunt,  
humoris peccantis natura aduertenda est. Si enim is  
malignus sit, qualis in dysenteria epidemica esse so-  
let, frustra laboratur reliquis medicamentis, nisi si-  
mul, & quidem statim in principio, alexipharmaca  
exhibeantur. Ad hunc vsum reuocari possunt ea om-  
nia, quæ febribus malignis conueniunt. Ac præter ea  
quæ diaphoretica sunt, vt lapis bezoardicus, aqua  
theriacalis; conferent etiam plurimùm cornu cerui,  
terra sigillata, bolus armena, vnicornu, corallium, ca-  
rabe, scordium, hypericum, plantago, tormentilla,  
pimpinella, & alia innumera.

Exteriùs verò admoueantur toti ventri olea cydo-  
nior. rosac. & si magis astringendū, omphacinum, vel  
addita aceti tertiâ parte, & concoquendo cõsumptio-  
nē aceti; si ventriculus simul affectus sit, addatur ma-

stichinum, vel absinthinum.

Post inunctionem, eadem pars conspergatur pulvere aliquo astringente, conflato ex myrtillis, cortice granator, gallis, nucibus cupressi, calycibus glandium, rosis rubris, balauſtiis, thure, mastiche. Cui ad maiorem aſtrictionem addi poſſunt bolus armena, terra ſigillata.

Ex iisdem pulueribus, oleis prædictis exceptis additâ cerâ, poſſunt parari vnguenta ad eundem uſum. Vel etiam vnguentum comitiſſæ ſolum, aut aliis permixtum admoueri poteſt.

Cataplaſma ad diarrhœam præſcriptum hîc conuenire poteſt; tum etiam ſequens, quando potentiùs aſtringere deſideras.

℞. Bol. armen. ʒ. vj. thuris ʒ. ſ. ſang. drac. maſtiches, mumia, ana ʒ. ij. Fiat puluis, qui excipiatuſ albumine oui, & aceto, & cum panno ventri ſub umbilico apponatur. Vel

℞. Telæ araneæ ʒ. iij. album. oui diu concuſſum n. j. Frigantur in ſartagine, & calidè umbilico applicentur.

In dyſſenteria epidemica laudatur cataplaſina ex theriaca, & terra ſigillata ventri appoſitum.

Cataplaſma ſequens hepâr roborans, à Solenandro multùm commendatur in omni alui fluxu, tam hepatico, quam dyſſenterico, & antiqua diarrhœa. Neque ob aſtringentia metuendum eſſe docet, quia hepâr roborantibus temperantur.

℞. Eupatorii, ſchœnanthi, ana M. j. ſpicæ indicæ P. ſem. maſtiches, ana ʒ. ſem. ligni aloës ʒ. iij. myrobala. chebul. & emblic. torrefact. ana ʒ. j. bol. armen. terra ſigil. lapid. hæmatit. ana ʒ. vj. coriâdri præp. Vnc. j. ſem. ſpodij ʒ. ij. roſar. Vnc. j. ſpécierum triaſantal. ſine camphora Vnc. ſem. ſcoriæ ferri præp. Vnc. j. fatinæ hordei Vnc.

Vnc.ij.olei de mastiche,& myrtill. ana quātum satis.  
Fiat emplastrum,quo totus venter contegatur,à car-  
tilagine xiphoidē ad os pectinis.

Fotus etiam fieri potest toti ventri, ex decocto  
astringentium facto in aqua ferrata, cum vini rubri,  
vel aceti portione. Vel

℞. Rosar. rubr. M.ij. absinthij, menthæ, ana M.j.  
nucis moschat.rad.cyperī, mastiches, galangæ, ana ʒ.  
j. Cum linteo albo fiat sacculus iustæ magnitudinis,  
qui in vino rubro, vel aceto calefactus ventri impo-  
natur. Vel

℞. Absinthij, menthæ, plantag. fol. quercus, sum-  
mitatum rubi, caudæ equinæ, centinodiæ, ana M.j.  
flor. chamæm. P.ij. rosar. rubr. M. sem. myrtillor. ʒ. j.  
sem. sumach, plantag. coriandri, ana ʒ. vj. nuc. mos-  
chat. num. iij. Fiat decoctio in aqua chalybeata, &  
vino rubro, quā foueatur venter.

Rulandus ventri admouet sacculum ex furfuribus  
in aceto decoctis.

Si dolor valdè vrgeat, ventri admoueantur lintea,  
in lacte chalybeato calente madefacta.

Quodd si fomenta non sufficiant, ad infusus deue-  
nire possumus, qui à Mattheo de Gradi, Sauanarola,  
& Iachino præcipuè laudantur. Idemque Iachinus ad  
pueros maximum esse secretum asserit. Nam calore  
actuali nonnihil humores ad cutem auertunt; quali-  
tate verò astringente fluxum cohibent. Iis tamen  
vrendum non erit, si corpus humoribus vitiosis re-  
fertum fuerit; si dysenteria fuerit maligna, & febrem  
comitem habuerit. Fiunt autem ex teneris germini-  
bus quercuum, baccis cupressi viridibus, nucibus pi-  
neis viridibus, vel pini foliis, & corticibus, aliisque  
in aqua decoctis.

Ex prædictis fortium decoctis possunt fieri suffumi-

gia, si nempe eorum vaporem recipiat æger in sella perforata.

Præcipuè commendatur suffitus ex decocto raphi barbati, qui etiam in diarrhœa laudatus est.

Faurentinus commendat suffumigiû ex terebinthina supra laminam candentem iniecta, bis in die exceptum.

Idem laudat fomentum sequens, ano admoendum.

℞. Melissæ lb. j. verbasci M. j. Includantur sacculo oblôgo, qui postea in vini rubri styptici, & aceti fortissimi ana quantum satis, coquatur ad tertias, & calidus ano imponatur.

Rulandus verò ano admouet forum ex decocto glandium in aceto paratum.

Idem Faurentinus hanc lotionem proponit, tanquam secretum ad sistendum fluxum dysentericum.

℞. Scoriz ferri, aceto præparata, limaturæ chalybis aceto præparata, ana lb. j. Bulliant in lb. ij. aceti fortissimi ad mediæ partis consumptionem. In hoc decocto æger plantas pedum, & volas manuum detineat per dimidiam horam, manè & vespere.

In affectu diuturno, & ubi vlcera contumacia intestina occupant, mercurius crudus ad eorum curationem plurimum confert, si cum vnguento rosaceo permisceatur, eoque venter illinatur.

Huic addi possunt clystetes pro sordidis vlceribus supra propositi.

Lac vaccinum eodem tempore exhiberi poterit cum syrupo myrtino.

Item balsami veri Drach. j. cum nebula exhibita, vlcera interna mirabiliter consolidat.

Ad dolores leniendos, omientum castrati, aut verueis receter mactati, ventri admotum & fasciis alligatum

tum, multum potest, præcipue in pueris, & pluries idem remedium iterari debet.

Si hepatis, aut ventriculus, aut cerebrum huic fluxui occasionem præbeant, propria remedia illis erunt adhibenda, ea perpetuo seligendo, quæ astringendi & roborandi vim habeant.

Pro potu ordinario exhibeatur aqua, cum confervarofar. agitata, tinctura rosar. decoctum fol. quercus, vel aqua infusionis terræ sigillatæ, vel aqua simplex auro vstulata, cum syrupo cydonior. myrtino, aut de rosis siccis. Vel absente febre leue decoctum mastiches cum syrupis prædictis. Potus chalybeatus, ex sententiâ Cratonis, exhibendus non est: non enim astringit, ut vulgò creditur, sed turbat aluum. Alij landant decoctum graminis, qui siccando prodest, & per urinam diuertendo.

Denique observatione dignum est, quod tradit Aëtius lib. 3. cap. 8 & Paulus lib. 1. cap. 35. inueterata alui profluvia per venerem exsiccari. Quod prius dixerat Hipp. Epid. in fine: *Impudens scortatio difficultati intestinorum medetur*. Huius rei veritatem experientiâ didicit Amatus Lusitanus curat. 47. cent. 1. *Dysentericus* inquit, *cum graviter opprimeretur, noctu cum uxore hymenæum excrevit, & illic deiectiones cessarunt, indeque sanus evasit.*

Hic pro coronide addatur, quod in curatione diarrhœæ, ex Platero in cura fluxus hæmorrhoidum relaturn est; sanguinem feruidum iniectum mirabiliter aluum fluentem cohibere, vel humanum, vel alterius animalis.

## CAPVT VII.

*De Tenesmo.*

**T**enesmus est assidua desidendi cupiditas, quâ nihil præter mucosum quoddam, & subcruentum aut purulentum excernitur.

Causa proxima huius affectus est vlceris recti intestini, à quo sanis quædam aut materia purulenta continuo emanat, & facultatem expultricem irritat; unde assidua desidendi cupiditas emergit. Præterea mucosum quidam cum sanguine aut pure permixtum excernitur ex deprauata homiosi partis vlcerata, quæ proprium alimentum probe non concoquit, & sibi assimilât; sed in substantiâ illam heterogeneam & mucosam conuertit; vt de aliis vlceribus intestinorum in dysenteria fusiùs exposuimus. Cum verò in dysenteria theoria dictum sit à nobis, omnia intestina in eo affectu posse vlcerari, hinc sequi videtur etiam recti intestini vlcerata ad dysenteriam esse referenda. Vnus tamen inualuit, vt quando solum intestinum rectum afficitur, peculiari tenesmi nomine donetur; cum tamen aliis intestinis affectis, si rectum etiam afficiatur, licet dysenteria nomen obtineat, frequens illa desidendi cupiditas, reperiatur, & ita tenesmus & dysenteria sunt eiusdem naturæ, & easdem habent generationis causas, vt tota eorum effectuum differentia in loci affecti diuersitate consistat. Atque ita omnes dysenteria causa superiori capite propositæ tenesmum etiam producere valent, vt eas repetere non opus sit.

Ad diagnosis huius affectus nihil aliud requiritur, quàm eum à dysenteria distinguere, quod facile obtinetur,



neretur, per ea quæ in definitione proposita sunt. In tenesmo enim assidua est egerendi cupiditas, in dysenteria verò interpolata, & dilucida habens interualla; prætereà in tenesmo post magnū desidendi conatum exiguus mucus, isque sanguinolentus, aut purulentus excernitur, in dysenteria verò tum excrementa, tum humores singulis deiectionibus excernuntur,

Signa causarum eadem sunt, quæ in dysenteriaë causis dignoscendis fuere proposita.

Quod ad prognosim attinet: Celsus *lib. 4. cap. 19.* tenesimum facile tolli asserit, & nunquā per se hominem iugulare. Gal. *tamen 5. de usu partium c. 4.* inter morbos qui ventri accidunt grauissimos emunerat, & certè ratione molestiæ & durationis, grauis morbus dici meretur; periculosus tamen non est, nisi atra bile excitetur, tunc enim ad canceri vlcerati naturā accedit. Prætereà graua incommoda asferre potest, vt abortum mulieribus. Sic apud Hipp. *Aph. 27. sect. 7.* Mulieri vtero gerenti, si tenesimus superuenerit, abortum facit. Assiduus enim deiiciendi conatus vterum recto intestino vicinum maximè fatigat; deinde muscoli sæcum exclusioni destinati, ad fœtus etiam exclusionem inferuiunt; idèd quando illi assiduè ventrem inferiorem comprimunt, abortum faciunt. Denique vlcera recti intestini ano vicina, si diutius durent, in fistulam immedicabilem degenerant.

Tenesmi curatio à dysenteriaë curatione parùm abest. Atque ita, primum humores acrés & erodentes, ab hepate, aliisve partibus profluentes, expurgandi sunt medicamenti astringendi vi præditis, quale est imprimis rhab. quod eò vsque iterandum est, donec exhausta & inhibita fluxio videatur.

Si adsit inflammatio, (quæ febre potissimum dignoscitur,) aut multitudo sanguinis, phlebotomia vsurpanda

panda est. Imò rerò si inflammatio post venæ sectionem perseveret, ut etiam stranguriam efficiat, (quod non rarò solet contingere,) venarum hæmorrhoidalium apertio per hirudines erit utilissima.

Tum clysteres, nunc lenientes, cum dolor urget plurimum; nunc abstergentes, glutinantes, aut astringentes, pro variis ulceris temporibus iniiciendi sunt, quorum formulæ ex dysenteria curatione desumendæ sunt.

In clysterum autem usu observandum est primò, ut sæpe & in parva quantitate, scilicet ad ℥b. β. iniciantur, quia difficilè ob conatum assiduum retinentur; deinde ut canalis in podicem blandissimè inferatur, ne locum irriter, doloremque augeat.

Tum pars affecta sedulò tractanda est fotibus, infusibus, suffumigiis, suppositoriis, & inunctionibus.

Fotus in hunc modum concinnari poterit.

℥. Fol. capsi barbat. & absinthij. ana M. vj. Decoquantur in lacte recenti, & includantur duobus sacculis, qui alternatim ano & toti ventri calidè applicentur. Vel

℥. Flor. chamæmel. & ros. ana M. j. vini rubri ℥b. ij. Infundantur per duas horas supra cineres calidos. Foveatur anus calidè quantum ferre potest, cum linteis quadruplicatis. Postea super spongiam in eodem liquore expressam sedeat æger ipsamque sedendo comprimat.

Vel impleantur duo sacculi furfure tritici, & in aceto bulliant. Sedeat æger, modò super vnum, modò super alterum calidum, quantum ferre potest.

Si multum sanguinis excernatur, fotus in hunc modum componi poterit.

℥. Fol. verbasci cum radic. M. ij. rosar. rubr. P. j. cortic. granat. & gallar. ana Vnc. sem. Coquantur in duabus

duabus partibus aquæ ferratæ, & vnâ vini rubri pro  
fotu:quem efficaciorẽ efficies, ſi aluminis Vnc. ſem.  
addideris.

Inſeſſus ad dolorem leniendum ſiunt ex emollien-  
tibus, in aqua vel iure extremitatum veruecis deco-  
ctis; quibus, ſi ardor increuerit, addi poterunt violæ,  
ſolanum, cucurbitæ, & melonis ramenta. Ad vlceris  
verò ſanationem, ex aſtringentibus pro fotu ſuprà  
deſcriptis erunt componendi.

Suffitus vlceri exſiccando idonei ſunt, ex thure in  
ignem coniecto, vel ex decocto ſabinæ facto in oxy-  
crato, aliisque in curatione dysenterię propoſitis;  
quorum fumum excipiat æger in cathedra perforata.  
Sequens autem maximè laudatur à Foreſto.

℥. Maſtiches ʒ. j. thuris ʒ. j. myrtilloꝝ. ʒ. j. β. roſar.  
rubr. ʒ. ij. Fiat puluis pro ſuffimigio.

Suppoſitoria in hoc affectu multum poſſunt, quæ  
blanda ac lenia eſſe debent, ne partem admodum ſen-  
ſibilem exaſperet. Fiunt autem comode ex ſeuo hirci,  
vel capræ, in formam ſuppoſitorij ſecto, & indito,  
dolorem enim ſedat, & vlcus conſolidat. Sed ad do-  
lorem ſedandum erunt præſtantiora, ſi ſemen papa-  
ueris, vel hyoſcyami ſubtiliſſimè tuſum permiſceas,  
& in nodulum chartaceum ſuppoſitorij formâ effun-  
das. Longè magis, ſi horum loco, oleorum ex dictis  
ſeminibus expreſſorum guttas tres cuilibet ſuppoſi-  
torio addideris, vel opij gr. j. in olei amygd. dulc. ʒ. β.  
diſſolutum.

Ad vlcus ſanandum efficacius fiet ſi ſeuo, vt dictum,  
ſoluto, vel ſimplici, vel narcoticis additis, amyllum &  
guinmi tragacanth. tritum, vel infuſum priùs in aqua  
plantaginis miſceas. Vel in ſequentem modum com-  
poni poterit.

℥. Gum. tragacanth. quantum ſatis. Affande tantil-  
lum

lum aquæ plantag. vt intumescat tantum, neque nimium lique scat; adde mucilag. sem. psyllij, aut cydonior. tantundem, & vitellum oui assum. Misce, iisque parum calentibus adde ceræ albæ liquatæ q. s. ad suppositorij consistentiam. Huic etiam narcotica addi possunt. Tum etiam, quemadmodum in prædictis, ad maiorem erosionem curandam, pulveres cerusæ, turthiæ, boli, balaustior. aliorumque circa acrimoniam siccantium; qui tamen subtilissimè læuigari debent, ne partis sensum exasperent.

Olea & vnguenta admoueri poterunt, tum ventri, qualia in dysenterici curatione proposita sunt; tum ano, vt vnguentum rosac. popul. vel ex mucilag. inibus, vitellis ouor. oleo rosac. &c. paratum, ad inflammationem & dolorem demulcendum, aliaque in hæmorrhoidum dolore proponenda; vel ad vlceris sanationem vnguentum album Rhafis, pompholygos, in hydromelite liquatum, & alia innumera.

Denique in grauiori affectu ad narcotica confugiendum est, non solum admora, sed etiam assumpta. Cæteris autem præstat laudanum opiatum ad gr. iij. vel iiij. cum mastiche & terra sigillata exhibitum, vel in clystere permixtum, ex decocto flor. chamæm. parato.

## CAPVT VIII.

### *De fluxu hepatico.*

**F**LUXUS hepaticus est ille, in quo serosi & sanguinei humores loturæ carniū similes excernuntur.

Producitur hic affectus ab hepatis imbecillitate & atonia, propter quam bonum & laudabilem sanguinem producere non potest; sed chylosam materiam in sanguinem

sanguinem tenuem, & serosum conuertit, qui cùm alendis partibus idoneus non sit, à natura expellitur ad intestina, vnde fluxus iste hepaticus contingit.

Illa autem imbecillitas & atonia à qualibet intemperie produci potest. A quocumque enim primarum qualitatum excessu robur hepatis natiuū, & vis illius sanguifica deicitur. Quod tamen dubitationem habet ab experientia desumptam, quandoquidem videmus sæpè graues hepatis intemperies, & insignes primarum qualitatum excessus, alios morbos producere: istum verò ab illis minimè induci. Contrà verò fluxum hunc hepaticum sæpè apparere sine insigni primarum qualitatum excessu. Vt igitur affectus istius natura integrè stabiliatur, dicendum est cum sapientissimo Varandæo præceptore meo, præter vulgarem intemperiem aliquid superius, & maius reperiri, quod istum affectum producere valeat. Et illud dicit esse occultiozem quamdam intemperiem, quæ exolutionem siue consumptionem humidi primigenij, siue radicalis in hepate inducit, ad quam sequitur caloris innati ipsius maxima exolutio.

Hanc prauam diathesim & occultam intemperiem producere possunt febres ardentes, & syntecticæ; intemperies viscerum calidior oleosam substantiâ colliquans; occulta putredo; humorum corruptela; refrigeratio summa à pituitæ vel melancholiæ copia in corpore præter naturam cumulata, & culorem natiuum opprimente, ac corrumpente. Id ipsum præstare possunt causæ externæ, vt larga frigida potio, niuis aut glaciei haustus, olerum frigidorum ac crudorum vsus immodicus; venena assumpta, & medicamenta cathartica vehementiora. Sic enim vinum meracum copiosè haustum, salsa, acria, & piperata, aliæque insigni qualitate prædita, iecoris sub-

stantiam, exhauriunt, & extorrent; his addere licet omnes alias causas quæ impensè refrigerando vel calefaciendo, hepatis robur ac tonum dissolvere possunt.

Verus igitur ac legitimus fluxus hepaticus hætenus expositus est, qui hunc peculiariter habet characterisimum, ut in eo deiectiones liquidæ ac serosæ, & loturæ carniū similes appareant, & hic ab hepatis imbecillitate procedit, ob quam sanguificatio non rectè perficitur, seu ab intemperie maligniori calidum & humidum natium partis vitiantem.

Datur verò præterea fluxus hepaticus spurius, qui à simplici intemperie, sine ullo humidi primigenij vitio procedit, à qua quidem intemperie, ipsa facultas non læditur, sed tantum illius opus corrumpitur: ita ut loco puri sanguinis, impurus & corruptus proveniat, vel bonus sanguis in prauum degeneret, cum in legitimo fluxu hepatico nunquam bonus & laudabilis sanguis in hepate generetur.

Corrumpitur autem, vel impurus redditur sanguis fluxum istum spurium committens, vel ex permutatione bilis flauæ, aut atræ, alteriusque cuiusdam materiæ impuræ; vel ex diuturniori in hepate locisque vicinis mora, ob quam crassior redditur, aut aduritur, aut etiam interdum putrescit; vel propter vitium lienis sæculentam sanguinis portionem non trahentis. Et in hoc spurio fluxu sanguis interdum crassus, interdum niger, interdum variis humoribus diuersis coloribus infectis, permixtus excernitur.

Signa huius affectus ex his quæ dicta sunt facile elici possunt.

In fluxu enim hepatico legitimo deiectiones liquidæ, & loturæ carniū similes apparer, quod in aliis fluxibus sanguineis non contingit: saltem ut in omnibus  
deiectio

deiectionibus tales materiæ appareant, in dysenteria enim si aliquando talis excretio fit, id rarò contingit, & consequenter bilis, pituita & fæces varij coloris excernuntur. Adde quod in dysenteria adsunt dolores & tormina ventris, in fluxu verò hepatico nullus est dolor.

Causarum verò signa propriis characteribus distinguenda sunt. Si enim à calida intemperie hepatis imbecillitas & atonia inducta sit, febres ardentes aut colliquantes præcesserunt; vel vomitus æruginosi aut deiectiones, sitis, & febris adest, corporis squallor, & inappetentia, & deiectiones valdè fœtidæ apparent. Si verò à frigida intemperie ortum duxerit, deiectiones minùs fœtent, nec sitis, nec colliquatio adest; totum corpus frigidius efficitur, & liuido colore perfusum.

Interdùm tamen ex humorum putredine febris exoritur, prædicta symptomata aliquantulum immutat; sed causæ prægressæ examinandæ sunt, quæ utramque intemperiem faciliè manifestare possunt. In hac etiam frigida intemperie ægri maximo vini generosi meracioris desiderio tenentur.

Humidior verò ac siccior intemperies ex contrariis effectibus deprenhenduntur. Humidior enim plurimam ac crebram deiectionem facit, & valdè tenuem; contra verò siccior paucum, & crassiorem reddit, quam tamen ingens potus cupiditas comitatur.

Causæ denique externæ ex relatu ægrotantium & adstantium faciliè innotescunt.

Spurius verò fluxus hepaticus omnia ferè signa habet communia cum dysenteria, nisi quòd in eo nullus adest ventris dolor, neque tormina molestant, neque vllaamenta aut carunculæ in deiectionibus conspiciuntur.

Prognosis huius affectus non nisi mala & ut plurimū funesta institui potest. Cū enim pars princeps gravissimè laboret, exhausta scilicet & cōsūptione humidi primigenij, cuius reparatio vix sperabilis, est nō nisi certum exitum ut plurimū expectandū est | præcipuè quando à calida intemperie affectus ducit originem.

Quando enim in febribus hic affectus contingit, colliquationes corporis, & putredines ingentes breui succedunt, quæ citò ægrotantes de medio tollunt. In febribus verò malignis & pestilentibus propter causæ cacoëthiam, periculum augetur. Quando verò hic affectus à frigida intemperie ducit originem, diuturnior esse solet, & in hydropem immedicabilem plerūque degenerat.

Denique fluxus hepaticus spurius licet admodū periculosus sit, minùs tamen habet periculum legitimo; quia à simplici & vulgari intemperie, & prava humorū diathesi tantū exoritur, tono & robore hepatis integro remanente, & sublati causis sanguinem vitiantibus euinci potest.

Curatio huius affectus perficitur remediis hepar roborantibus, eius intemperiem corrigentibus, fluxūque cohibentibus. Et quia longè frequētius atque ut plurimū à calida intemperie ducit originem, ideò huic in primis intemperiei curationem aptabimus, cum ille qui à frigida intemperie producitur rarissimè contingat, & eandem cum hydropes curationem desideret.

Primò igitur quamvis nullus vacuationibus locus esse videatur, cū fluxus immodicus sui tantū cohibitionem indicet; rhab. tamen vel solū, vel cū myrobalanis exhibitum, iuxta formulas in dysēteriæ curatione propositas, interdū prodesse poterit, quia hepar roborat; idque imprimis, si quædā impuritates & eiectionibus permixtæ videantur. Imo verò nonnulli ægrotantes



ægotantes rhab. Scrup. j. cum conferua rosar. in multos dies exhibito liberari sunt.

Clysteres hic parùm profunt, cùm hepar affectum sit. Attamen ex lacte chalybeato, vel decocto leniter astringente interdum iniici poterunt, ne intestina nimia relaxentur.

Ad iulepi hepar roborantes, eiusque intemperiem corrigentes, in hunc modum componi poterunt.

℞. Rad. cichor. gramin. acetosana Vnc. j. fol. endiu. agrim. cichor. plantag. cuscute, ana M. j. absinthij pontici M. ss. fantali rubr. Drach. j. sem. rasur. eboris & spodij, ana Scrup. ij. coriandri præparati Drach. j. rosar. rubr. P. j. Coquantur ad lb. j. ss. In colatura dissolue syrupi cydoniorum & aceto simpl. ana Vnc. ij. Fiat iulep. pro iv. dosibus, serò & manè sumendis. Vel

℞. Aquæ plantag. Vnc. iij. syrup. de rosis sicca. Vnc. j. spiritus vitrioli q. s. ad moderatam aciditatem. Fiat iulep. frequenter iterandus.

Poterit etiam æger vti frequenter ex cochleari syrupis sequentibus.

℞. Syrupi myrtini, cydonior. & de rosis succis, ana Vnc. j. syrup. de cichor. simpl. aut compos. cum rheo, Vnc. j. sem. Misce.

Fit syrup. præstantissimus ex tinctura rosar. facta in aqua rosar. & cum saccharo rosac. redacta in syrupum.

Pulvis etiam sequens ad Drach. sem. vel Drach. j. semel aut bis in die, in ouo sorbili, iusculo, aut alio liquore idoneo vsurpari poterit.

℞. Sem. plantag. & acetosæ, ana Drach. j. sem. endiu. portul. cuscute. coriand. præp. ana Scrup. j. rosar. rubr. trochisc. de spodio, gum. tragacanth. torrefacti, ana Drach. sem. pellicul. interiorum ventriculor. galinæ exsiccator. Scrup. sem. Fiat pulvis tenuissimus.

Vel tabellæ triasantali duplicato rheo ad 3.ij. pro  
dosi exhibitæ, ad hepar roborandum erunt vtilissimæ,  
tum etiam opiata sequens.

℞. Conseru. rad. cichorij ʒ. j. conseru. rosar. veter.  
ʒ. ʒ. pulpæ passular. corinth. ʒ. vj. croci Martis ʒ. j. co-  
ralli præpar. rasuræ eboris, & cornu cerui, ana ʒ. j.  
Cum syrupo de ros. siccis, fiat opiata, addendo spi-  
rit. vitriol. ʒ. ʒ. De qua capiat magnitudinem casta-  
neæ tribus horis an pastum. Potest etiam addi hepar  
lupi præparatum, quod ab authoribus commenda-  
tur tanquàm specificum.

Passulæ maiores vel corinthiacæ, quia hepati ami-  
cæ, in hoc affectu commendantur, idèd magnâ copiâ  
cum seminibus sunt comedendæ. Quod vt commo-  
diùs fiat, priùs in mortario erunt contundendæ.

Vel rob passularum fieri potest, coquendo eas in  
vino rubro, vel alio generoso, si calor non obstiterit,  
& postea succum ex iis exprimendo, rursusque in  
formâ rob decoquendo. Quod simplex vsurpari po-  
terit, vel cum sequentibus componi in formâ opiatæ.

℞. Passular. corinthiac. lb. ʒ. Coquantur ad pultis  
consistentiam in vino veteri. Transfundantur seta-  
ceo, & colaturæ admisce corticis condit. pistati Vnc.  
sem. pulu. electar. triasantal. & diamarg. ana Drach. j.  
coralli præp. & rosar. rubr. ana Scrup. iv. iecoris lupi  
præp. Drach. iij. Fiat opiata.

Syrupus corall. ad hepar roborandum & fluxum  
cohibendum præstantissimus est. At longè præstan-  
tior illius tinctura. Cui etiâ substitui poterit extra-  
ctum vel magisterium, in aqua plantag. exhibitum.

Succus ex furculis tenuioribus vrticæ per se ad ʒ. ij.  
vel cum aqua & aceto exhibitus manè per triduum,  
fluxum sistit, & sanguinem corruptum purificat.

Quia verò in hoc affectu corpus vix absumitur,  
destillatum

destillatum restaurans fluxui etiam cohibendo do-  
neum, vel per se frequenter exhibendum, vel omnibus  
cibariis permiscendum est.

℞. Caponem pinguem & perdicem, iisque de plu-  
matis & exenteratis, repleantur ventres fol. cichorij,  
agrim. & carnis testudinum, ana M. j. conferuæ ros. ʒ.  
iij. sem. plantag. coriand. præp. ana ʒ. iij. myrobolan,  
citrin. ʒ. j. fol. sanguinaræ M. ʒ. trochiscor. de carabe,  
& de spodio, ana ʒ. iv. pulu. elect. de gemmis, tria-  
fantali & diamarg. frig. ana ʒ. j. Irrorentur omnia vi-  
no styptico, & simul in ventres auium immissa co-  
quantur in aquæ ʒ. iv. ad mediæ partis consumptionem  
vase clauso. Postea reponantur omnia in alembi-  
co vitreo cum vini optimi Vnc. iij. Distillantur in bal-  
neo Mariæ ad usum dictum.

Pro potu vtatur æger tincturâ rosar. vel decocto  
cichorij & graminis cum syrupo cydonior. addendo  
aliquot guttulas spiritus vitrioli.

In cibis hordeata & amygdalata, ac præcipuè ory-  
zata conueniunt.

Exteriùs verò applicentur ventri eadem remedia,  
quæ in dysentericæ curatione præscripta sunt, adden-  
do hepatica nonnulla, vt absinthium, rosas, santala  
omnia, spodium, &c. Quæ inunctiones ventris ad he-  
patis usque regionem debent pertingere.

Hepati verò sequens epithema admoeri poterit.

℞. Fol. endiu. & cichorij, ana M. j. cuscute & ab-  
sinthij vtriusque, ana M. ʒ. rosar. rubr. P. j. santali rub.  
ʒ. j. sem. spodij Scrup. ij Coquantur ad ʒ. j. sem. In co-  
latura dissolue aceti rosar. ʒ. iij. Iterum bulliant leui-  
ter & colentur. Fiat epithema.

Eadem pars sequenti vnguento illinatur.

℞. Cerati santalini ʒ. iij. olei cydonior. & absinthij,  
ana Drach. iij. Misce, fiat linimentum.

Denique si vigilæ plurimum ægrotantem infestent, ut non raro solet cōtingere, quia hic fluxus noctu solet ingrauescere, ad narcotica erit deueniendum, quæ in superioribus alui fluxibus fuerunt proposita.

## C A P V T IX.

### *De Lumbricis.*

**Q**Uamuis lumbrici in variis corporis partibus generentur quia tamen id rarissimè contingit, & frequentissimè in intestinis magnus sit eorum proventus, ideo nos tantum de his in hoc loco agere instituimus.

À nonnullis ambigitur, ad quod genus affectuum præter naturam lumbrici referendi sint: omnem tamen dubitationis ansam facillè auferre possumus, dicentes, sub diuerso respectu ad omnia genera referri posse. Prout enim intestina vellicant & pungunt, vel obstruunt aliosque morbos producunt, causæ morbificæ dici possunt. Prout verò sunt substantiæ superadditæ iis quæ naturaliter in intestinis contineri debet, inter morbos in numero aucto toto genere præter naturam à Galeno recensentur; quemadmodum & calculus: ac denique prout excernuntur per aluum præternaturaliter, aut etiam per os, ad vitium excretorum sunt referendi.

Tria lumbricorum genera proponuntur à Galeno *comment. aphor. 26. sect. 3.* teretes seu rotundi, qui in tenuibus intestinis frequētius generatur, vnde sæpè in ventriculū ascendunt, ascarides, seu tenues lumbrici, filorum particulas referentes, qui in parte inferiori crassorum intestinorum, & iuxta sphincterem musculum

lum residere solent:& lati lumbrici,fasciæ etiam nominati,quã lati & longi sunt instar fasciarũ quibus infantes obuoluũtur.Ista species rarior multo est cæteris,& medico praxim exercẽti vix ter aut quater in vita videre cõtingit.Magnæ tamen de eo apud authores habentur controuersiæ, aliis scilicet asserentibus esse vermem vnicum;aliis verò ex plurimis vermiculis simul vnitis compositum,quos vermiculos cucurbitinos appellant,& lati lumbrici particulas esse asserunt;alij verò quartam lumbricorum speciem faciũt, cucurbitinos continentem, quorum rationes, & experimenta sigillatim recensere, & toties ab aliis decantata repetere,instituti nostri ratio non patitur;sed ea curiosus lector apud Rondeletium,Platerum,Sennerium,aliosque innumeros videre poterit.

De causa etiam lumbricorum efficiente admodum controuertitur,aliis calorem putredinosum;aliis natiuũ accusantibus,aliis vtrumque vicissim concurrere asserentibus. Primi omnia insecta ex putredine secundũ Aristotelem exoriri contendunt.Secundi asserunt calorem putredinosum esse intensum,igneum,& destructiuũ;atque aded corporis viuentis generationi non esse idoneũ.Tertij vt pugnantes hæc sententias concilient, dicunt à calore putredinoso materiã disponi ad generationem vermiũ,eãque ita præparatam à calore natiuo per viam cõcoctionis in lumbricos cõuerti.Quæ tamen conciliatio subsistere non potest.Siquidem ex axioma physico,eiusdẽ est materiam disponere,& formam inducere;atque ita præparatio materiæ,& inductio formæ,ab eodem agente proficisci debet.Deinde in cadaueribus generantur vermes; in quibus nullus est calor natiuus. Dicendum est calorem,qui putredinosus est respectu materiæ putrescẽtis,fieri natiuum respectu lumbrici,quia

calor naturalis & putredinalis differunt tātū gradibus; sed ad diuersorum animalium generationem diuersi caloris gradu requiruntur; atque adeo calor qui putredinosus est respectu nostri, potest esse naturalis respectu alterius animalis. Sic calor qui leoni naturalis est, nobis est febrilis; & per consequens putrefactiuus. Multi confugiunt ad calorem Solis, qui est causa vniuersalis omnium generationum. Sed agnoscenda est perpetuū causa peculiaris, à qua immediatē producitur effectus, concurrente & cooperante causa vniuersali. At longē grauior hic etiam occurrit difficultas, ex eo quod vulgatissimo theōremate sancitum est, nihil posse seipso nobilius generare; atque ita calorem non esse præcipuū agens in generatione lumbricorum, qui ad substantiæ categoriam referendi sunt; calor verò est accidens, & quicquid de sole dicatur, perpetuū forma lūbrici, vtpotē forma viuētis, nobilior est formā solis, quæ tantū est forma mixti. Hæc dubitatio in grauem illam atque prolixam, de generatione æquiuoca disputationem nos coniecit; in cuius ambagibus præstantissimi quidam philosophi integris voluminibus sese exercuerūt, ad quos lectorem remittimus, & in primis Fortuniu Licetum *lib. de spontaneo viuētiū ortu*. Sufficit hoc loco dicere, multorum opinionem eō reduci, vt credant multiplicia rerum semina in variis substantiis latitare, quæ iuxta varias illarum permutationes, in lucem emergunt; prout videlicet materia per putredinem, aut aliam quamuis alterationem, ad hanc vel illam formam recipiendā magis disponitur, & semen illi dispositioni magis analogum suscitatur in actum, formamque sibi propriam in materiam introducit. Hæc sententia non valdē recedit à veteri philosophia, quæ docet formas produci è potentia materiæ. Sed hi tutius esse existimāt,  
 semina

femina rerum in materia recondere, quæ verè sint efficiencia, quàm solam materiæ potentiam agnosce-  
re, quæ nullam habet efficiendi vim, cum illa enim  
materiæ potentia inquirendum est aliquod efficiens,  
quod formas illa educat, aut potius in eam intro-  
ducat.

Causa materialis lumbricorum vulgarissima est pi-  
tuita dulcis, putredinem concipiens, cuius putredinis  
ope eam acquirit dispositionem, vt in lumbricos trās-  
mutetur, verùm nullo modò necessarium putamus, vt  
alimenta vermibus generandis idonea in pituitam  
priùs conuertantur. Ex ils enim immediatè, dum pu-  
trefcunt, vermes generari possunt, quemadmodùm vi-  
demus in carne, caseo, castaneis, pomis, pyris, cerasis,  
aliisque innumeris fructibus vermes per putredinem  
produci. Ita fit in corpore nostro præcipuè puerorum  
qui ingluuiei maximè dediti sunt, prædictis alimentis  
sele ingurgitant, & plerumque noua assumunt, ante-  
quam priora fuerint concocta. Hinc fit vt illa putre-  
dinem concipiant, ex qua lumbrici oriuntur.

Hoc verò tyrones aduertant, quod in praxi quoti-  
diè obseruatur, pueros lactentes, quibus carnes exhi-  
bentur, à lumbricis maximè infestari propterea quòd  
tenelli eorum stomachi solidum illud alimētum con-  
coquere non possunt; idèd corrumpitur, & in lum-  
bricos facessit. Adde quod lac citissimè conficitur in  
ventriculo, & cōfectum ad intestina deturbatur; quod  
si carnem admixtam habeat, quæ tam citò confici  
non potuit; illa cum lacte simul in intestina demitti-  
tur, ibique putrescit, & in lumbricos conuertitur.

Obseruent etiam iuniores, ex lacte solo nunquam  
lumbricos generari: ita vt, quoties de morbo infantis  
alicuius ambigitur, vtrum scilicet ex lumbricis labo-  
ret, quos mulierculæ perpetuò accusant, omnesque  
morbos

morbos infantiles, ac pueriles, ad lumbricos referunt; quemadmodum omnes mulierum affectus vtero adscribuntur. Medicus certò pronuntiare possit, infantem illum, si lacte solo vescatur, neque carnem aut iusculum ex ea gustauerit, lumbricis non laborare. Hoc docuit disertè Galen. *comm. aph. 26. sect. 3.* dicens in pueris lac sugentibus vermes non generari Cuius rei ratio perspicua non est. Multi dicunt in pueris lactentibus calorem non esse satis fortem ad lumbricorum generationem. Et fulcitur responsio auctoritate Galeni dicentis *loco citato*, ad generationem lumbricorum requiri calorem fortè; vnde fieri dicit, vt lumbrici magis generentur in pueris adultioribus quàm in infantibus, quod docet Hipp. *Aph. predicto*. Cui tamè doctrinæ ipse Hippocrates refrigerari videtur 4. *de morbis*, dicens in pueris dum vtero clausi sunt generati vermes: at illi non habent intensiorem calorem, pueris lac sugentibus. Et idem Hippocr. aliam reddit rationem cur pueri in vtero conclusi vermes generent: quia, inquit, *faces in iis retinentur; postquam verò in lucem exierunt, non generant, quia in iis amplius faces non retinentur*. Quod tamen satisfacere non videtur, siquidem in puerulis extra vterum faeces sæpe retinentur, & lumbrici tamen in iis non proueniunt, quamdiu solo lacte vtuntur. Cum igitur prædictæ rationes solidà ingenia non expleant; nouas hac in re sapientiū cogitationes expectamus, & interim quid nobis videatur, paucis aperiemus, id doctiorum criterio libenter subiiciētes. Dicimus igitur lac putrescēs aciditatem contrahere, quæ inepta sit lumbricorum generationi; imò verò illi fortiter obstat: acida enim omnia vermes enecare notissimum est. Hinc succus limonium ad hanc rem vtilissimus, & vtitatissimus est. Et in potu ordinario aqua spiritu vitrioli acidula reddita, in  
 Hoc



hoc affectu mirabilis est.

Inter causas materiales lumbricorū dulcis primum locum obtinere vulgò existimatur. Quod tamen dubitatione non caret, cum vulgari axiomate sancitum sit, dulcia faciliè bileſcere, & bilè amaritudine lumbricos enecare; cui tamen dubitationi facile est reſpondere, in corporibus bilioſis, & caloris acrimoniā præditiſ dulcia faciliè bileſcere, quia vltiori coctione amaritudinem contrahunt, vt in coctione artificialis quotidie experimur. Verum in aliis temperamentis minus calidis dulcia non bileſcunt, ſed potiùs in pituitā conuertuntur; dum à vètriculo citius, quàm par ſit, attrahuntur ad inteſtina, & ita cruda, ac ſemicocta putreſcunt ac lumbricis generandis materiā idoneam præbent.

Sed manet adhuc difficultas de ſaccharo & melle quæ ſubſtantiā habeant putredini minimè obnoxiam; imò verò cætera omnia, quantumvis putredini obnoxia, ab ea præſeruent; non poſſunt ex iis lumbrici generari. Quæ ratio cum omninò conuincat, dicimus ex ſaccharo & melle lumbricos non generari cum habeant ſubſtantiā incorruptibilem; ſed iam genitos excitari, ac commoueri, quia lumbrici dulcia maxime appetentes, ad mellis & ſacchari occurſum ſeſe exagitant, & verſus ventriculum feruntur, nec non citiſſimum incrementum capiunt; vnde ſymptomata emergunt lumbricorum conſectaria.

Signa lumbricorum præſentium, & in inteſtiniſ latitantium varia ſeſe offerre ſolèt, non omnia quidem in omnibus; ſed plura in pluribus. Frequentiora tamen & magis ordinaria ſunt, oris fœtor peculiariſ ad aciditatem vergens, idèò mulierculæ noſtræ acidum anhelitum vocant, & deiectiones ſtercori bubulo ſimiles ac grifeo colore infectæ; ita vt argillam diſſolutam re præſentent. Alia ſigna in frequentiora ſunt febres cõti-

nuz

nuz, quæ pluries in die exacerbantur ex motu vermium, cum anxietate, sudore frigido interdum, & animi deliquio, nausæa, vomitu, & siti enexplebili. Pulsus est inæqualis, genæ alternatim rubent, aut liuescunt, oculi splendent; narium pruritus adest; dentium stridor, & interdum tremor. Tussis adest sicca, & exigua; salua præter solitum ex ore effluit. Interdum etiam capitis gravitas & sopor, interdum deliria, interdum convulsiones epilepticæ. Dolor in ventre plerumque affligit, morsum & erosionem repræsentans; interdum etiam venter inflatur ac distenditur, instar hydropicorum; interdum, horrida est in somno expergiscencia, nonnulli in somno tremunt, ac surgunt, atque iterum sopiuntur; interdum totum corpus præter rationem decrescit, & nonnumquam æget fame canina laborat, atque insatiabili; quod in lato lumbrico magis contingit, qui omnia alimenta assumpta deuorat & absumit. Præterea vermes cucurbitini, si excernantur latorum sunt indicia. Ascarides verò ex pruritu ani molesto cognoscuntur, & sæces non raro iis conspersæ apparent.

Pro coronide, inter signa lumbricorum in corpore latentium censerì debet gingivarum erosio, vel putredo, quod sequenti obseruatione confirmatur. Puer quidam erosione gingivarum à longo tēpore grauissimè vexabatur. Multa, variâque remedia tã interna, quàm topica ipsi præscripta, & adhibita fuerunt, frustra tamen omnia. Tandem vitam cum morte commutauit. Aperto corpore tanta inuenta est abundantia vermium, vt aliquibus in locis intestina eroderent, multique in vacuo ventris reperti fuerint.

Quod ad prognosim spectat, lūbrici plures paucioribus sunt deteriores, maiores minoribus. Nō raro periculosi sunt, & graues morbos accersunt, vt febrem intensam,

intensam, & inordinatam, syncopem, aphoniam, delirium, epilepsiam, colicam, vel caninam appetentiam.

In morborum principio vermes prodire, malum, tam viuos, quàm mortuos, potissimum si soli, & sine stercore, exeant; viui enim summam cruditatem, aut alimenti penuriam significant, mortui verò magnam putredinem, à qua enecantur.

Lumbrici in declinatione morbi, & iam cessione apparente, cum excrementis exeuntes, salutem portendunt: ostenditur enim tum naturam excrementis dominari.

Curatio lumbricorum ad eorum expulsionem dirigenda est, cum sint toto genere præter naturam. Illa autem expulsio commodè perficietur catharticiis medicamentis; quæ vermes enecant, & expellunt, tum etiam putridam materiam, ex qua generantur, euacuant.

At verò inter purgantia præstantissimum est, hab. quod etiam præsentia lvi fluxui & feбри convenit. Illius tamen exhibitionem præcedere debent lumbricos enecantia, aut saltem quæ ipsos ad inferiora intestina detrudant, per os assumptam, tum quæ eosdem deorsum euocant, per clysterem iniecta. Quorum formulæ vulgò in hunc modum se habent.

℞. Aquar. gramin. & portulan. Vnc. j. sem. syrup. de limon. Vnc. j. confect. de hyacianth. Drach. j. pulueris contra vermes ℞. j. Fiat potio, quæ detur statim, & paulo post clyster sequens iniiciendus est.

℞. Hord. integ. fursur. macri & rosar. rubr. an. P. j. liquirit. ras. & passul. mundat. an. Vnc. β. coquantur ad ℔. sem. vel quartaria tria pro puerulo. In colatura dissolue sacchari rubri Vnc. j. vitellum oui n. j. Fiat clyster. Potest addi cassia, vel catholicum, si magis laxare est animus.

Quibus

Quibus remediis semel aut bis vsurpatis, potio sequens propinanda est.

℞. Rhab. electi Drach. j. fantali citrini scrup. sem. Inundatur in aquæ graminis, aut portulacæ Vnc. ij. vel iij. In expressiōe dissolue rhab. puluerati, & pulu. contra vermes, an. scrup. j. syrup. rosac. Vnc. j. Misce, fiat potio. Vel

℞. Rhab. puluerati, & corallinæ, an. Drach. sem. plus, minùs, pro ætate; aquæ gramin. Vnc. ij. syrup. violac. Vnc. j. Fiat potio.

Si febris magna non adest, hieræ picræ Drach. ij. plus, minùs, potioni admiscendæ sunt: illa enim propter amaritudinē lūbricos potēter enecat & expellit.

Siverò prædictis remediis non cesserit affectus, ad sequentia transeundem est.

℞. Rad. gram. & acetos. an. Vnc. j. fol. endiuiz, cichorij, acetosæ, & portulacæ, an. M. j. summitatum hyperici, scordij, & centaur. minor. an. P. j. corallin. Drach. iij. Coquantur ad ℥. j. In colatura dissolue syrup. de limonib. Vnc. iij. Fiat iulep. pro iij. aut iv. dosibus, bis in die sumendis.

℞. Vnguenti de arthanita Vnc. iij. mercurij crudi 3. j. Misce, inungatur totus venter.

Deinde purgatio repetenda est, imò frequenter iteranda, donec impuritati corporis sit satisfactum.

Imò verò prædicto decocto senna, agaric. rhab. &c. addi poterunt, & tunc semel tantum in die erit exhibendum.

Rondeletius valdè probat electar. diacarth. tanquam remedium potentissimum ad vermes deiiciendos, & pituitam expurgandam, ac etiam chylum corruptum, ex quibus generantur & nutriuntur vermes; tum etiam infusionem agarici in oxymelite. Quæ remedia præcipuè conuenient, si febris non adfuerit.

Quia

Quia verò sæpè non nisi magno labore, & longo tempore verminosi affectus in nonnullis pueris expugnari possunt, quamplurima remedia, eaque præstantissima, ab autoribus inuenta & usurpata sunt, tum interna, tum externa.

Inter interna primùm recenserì debent pulueres varij, quorum formulas apud authores passim videre est.

Ad præcipuos verò sequentes referendi sunt, quorum dosis erit à scrup. j. ad Drach. j. pro ætate puerorum, cum liquore idoneo.

℞. Sem. santonici, quod contra vermes vulgò vocant, Vnc. sem. corallinæ Drach. iij. rasuræ cornu cerui Drach. ij. Fiat pulvis. Vel.

℞. Sem. contra, corallinæ, & corn. cerui, ad summam albedinem vsti, ana partes æquales. Vel

℞. Pulu. hieræ simp. ʒ. ij. sem. contrà, scordij, centaur. minor. corallinæ, an. Drach. j. Fiat pulvis.

℞. Rhab. & agarici, an. ʒ. j. trochisc. alhandal. scrup. j. diagryd. scrup. ʒ. corallinæ, cornu cerui vsti, an. ʒ. ʒ. myrrhæ. zedoar. flor. tanaceti, an. scrup. j. salis absinthij & tartari, ana, Drach. ʒ. Fiat pulvis tenuissimus.

In hisce autem pulueribus aduertendum est, vt ex calidioribus medicamentis compositi, in calidis naturis & febricitantibus, rarò & in minori dosi vsurpentur.

Mulierculæ vulgò pueris à lumbricis malè habentibus exhibere solent sem. contrà saccharo incrustatum vel nudum sem. cum melle permixtum. Quod remedium præstantissimum est; siquidem lumbrici dulcium rerum audi mel deuorant, & cum melle semen quo interficiuntur.

Quia verò semen aliud valdè calidum est, temperari potest si in aceto infundantur per duas horas;

postea verò cum melle cocto misceatur ad formam opiatae, quam Amatus Lusitanus prædicat, tanquam primum aduersus lumbricos remedium.

Cornu cerui vstum à Foresto maximè laudatur cum passulis, aut alio quouis modo exhibitum, vt nonnulli hoc solo remedio curati sint; iis præcipuè conuenit, qui lumbricis cum alui fluxu laborant. In qua affectum complicatione commendat etiam succum plantaginis, & decoctum centinodiae in potu exhibitum. Quibus addi possunt topica ventri admota, partim astringentia, partim lumbricos enecandi virtute prædita.

Vulgò etiam vsurpatur à mulieribus oleum commune cum vino exhibitum. Illud autem lentore suo, animalium eorum, quæ solà transpiratione viuunt, spiracula occludens, ipsa suffocat & interimit. Vinum etiam acrimoniâ suâ, eadem interficit. At præsentē febre, melius est oleum cum succo limonum, vel granatorum admiscere; vel, quod multò præstantius est, oleum amygdal. amar. cum prædictis succis vel aqua florum arantiorum.

Stocherus in Empirica sua, oleum è ligno exsiccatò coryli, seu auellanae per descensum paratum laudat, si vna, vel duæ guttæ puero exhibeantur: grandioribus verò, tres, vel quatuor cum mica panis. *Immediate, inquit, interficit, & educit per secessum; imò verò lumbricos pediculos extra corpus leui contactu enecat.* Volunt autem auctores peritissimi hoc oleum è ligno cotylino extractum esse oleum illud heraclinum, quo Martinus Rulandus pueros à lumbricis ferè in momento liberabat, labra & vmbilicum eodem illinendo; vt passim in illius centuriis videre est.

Nos autem experti sumus, oleum iuniperum ad guttam vnā exhibitum cum iusculo, puerulis hisce  
à lum

à lumbricis laborantibus multum opitulari, modò febris absit.

At reliquis omnibus remediis fortè præstaret mercurius crudus, si cum per eos exhibere auderemus; quod tamen magnorum virorum suffragia fieri posse testantur. Quorum nonnulla in medium proferam: ut qui hoc remedij genus tentare voluerint, id minimè sine authore fecisse existimentur.

Matthiolus epist. 4. ad Stephanum Laureum, Medicum Cæsareum. Cum, inquit, *argentum viuum* nullâ aliâ lethiferâ facultate (ut Dioscoriaes inquit) interimat, quàm quòd suo ingenti pondere intestina laceret: nihil sanè verendum videtur minimâ quantitate id posse moliri unquam; præsertim cum suâ gravitate sphericâ formâ, facile è corpore per inferiora labatur. Idcirco mirari non debemus, si Brassauolus, tam clarus ætatis nostræ Medicus, ad necandos interancorum vermes, dari pueris *argentum viuum* nullo incommodo, scriptum reliquit; & eo tam fœliciter usus sit alter quidam clarissimus Medicus Patauinus, quanquam parandi, dandique rationem minimè unquam docere voluit. Atqui ego, etsi hoc medicamento nunquam sum usus; viditamen dari sapè illud, scrupuli, vel sesquidrachma pondere à Goritiensibus obstetricibus, agrè parturientibus mulieribus, nullo prorsus incommodo, sed fœlici semper euentu. Hæc Matthiolus.

Fallopious tract. de morbo gallico cap. 76. Si bibatur, inquit, *argentum viuum*, illud non facit, quod unctum. Vidi mulieres, quæ libras eius biberunt ut abortum facerent; & sine noxa. Ego exhibeo in vermibus puerorum, & nullum parit symptoma: solum necantur vermes.

Platerus in curatione lumbricorum: *Argenti vini*, inquit, guttâ unam vel alteram, vel D. S. a'iqui deglutientiū proponat: quod vermes, quibus maximè aduersū, citò fugat,

potestque innoxie, ut alibi etiam dictum, sumi.

Apud Fabricium Hildanum *obseru.* 7 1. cent. 2. in qua describitur historia cuiusdā mulieris lumbricis laborantis, à Gilberto Saraceno ad dictum Fabricium missa, sequentia habentur, post quorundam remediorum enumerationem. *Hiscē additum est ex hydrargyra praestantissimum remedium illud enim ad sesquidrachmam purum, & per corium traiectum hausit, nec ab eo infestare cessarunt cum dira haec animalia.*

Ioannes Baptista Zappata *lib. de secretis mirabilibus, cap. 5.* insignes proponit historias lumbricis laborantium mercurij vsu sanatorum, in quibus infinito alia remedia, tum aloë & absinthium frustra vsurpata fuerant. Illius autem exhibendi modus duplex ab eo proponitur. Primus talis est.

℞. Arg. viui 3. j. pro puerulis verdē ʒ. j. vel ij. benjoini ʒ. ʒ. aquæ vitæ rectificatæ guttas iv. vel v. Misceantur simul in mortario vitreo, cum pistillo vitreo. Postea adde conferuæ rosar. aut violar. q. s. ad incorporandum, ut fiat bolus, quem capiat æger manē per se, vel in pane hostiario. Secundus modus talis est.

℞. Sacchari valdē rub. parūm, aquæ commun. guttas iij. vel iiij. Misceantur in mortario vitreo ad consistentiam mellis. Deinde adde arg. viui quantitatem dictam. Incorporentur simul, addendo olei amygd. dulc. guttas vi. aut vij. quæ impediane ne mercurius vitificari possit. Misceantur omnia. Tandem cum pauca conferua rosar. fiat bolus.

Baricellus in hortulo geniali hæc habet. *Hydrargyrum, quod à multis venenum existimatur, felicissimo successu contra vermes exhibetur, tanteque certitudinis illud in Hispania reputatur; ut mulieres tenellis pueris, qui lactis vomitu laborant, ad quantitatem granorum iij. in propria substantia propinare audeant. Hæc autem*

*viâ*



viâ morbus cessare videtur frequentatis experimentis. Ego quidem viduam mulierem curavi, quæ nonem dierum spatium, vomitibus continuis ex vermibus laborauerat, & fere triduo non comederat, nec cibum retinere valuerat. Huic cum hydrargyri ℥. ij. cum tantillo cydonij mortificati propinxissem, absque ulla molestia per aluum centum & plures emisit vermes, & eadem die liberata est, & solita exercuit domi & foris negotia; magnâ profecto parentum admiratione, cum prius debilis & emaciata esset. Alijs, etiam exhibui, & bono semper euentu; domique continuo aquam habeo, in qua hydrargyrum infusum retineo, illamque puerulis pro vermibus libentissimè concedo: nec adhuc quempiam ex illo noxam accepisse expertus. Vsus est hoc remedio ad vermes necandos Matthiolus; Horatius Angenius, & plerique alij celebres viri; qui omnes huius auxilij maximè extollunt beneficia. Datur pueris in substantia ℥. j. grandioribus ℥. ij. vel 3. j. Corrigitur illud & mortificatur in mortario vitreo cum saccharo rubro, idque tandem conteritur, ut in partes inuisibiles dissolvatur. Ne autem in pristinam formam iterum redeat, olei amygdal. dulc. guttulas binas addere oportet; & cum saccharo rosac. violato, vel cydoniato leuino stomacho languentibus propinatur. Hæc Baticellus.

Sanctoribus in mætk. vltand. error. lib. 5. cap. 11. Nisi, inquit, in lumbricis necandis ad valida præsidia confugiamus, ut ad aloën non lotam, vel ad mercurij ℥. j. cum aloës & terebinthina pauxillo, ad pilula perexiguæ formam recepti, nihil fit.

Qui mercurij crudi usum reformidant, eodem præparato vti possunt, nempe mercurio dulci, non solum ter, (ut vulgò fit) sed etiâ sexies sublimato: vltiori enim præparatione malignitas illius magis terunditur; admixtis aliquot granis diagrydij, ut citius e corpore eliminetur, simulq; lubricos, eorumq; materiâ expellat.

Quantitas autem illius augenda, vel minuenda est pro ratione ætatis. Exempli gratia pueris octo, aut decem annos natis ita præscribi poterit.

℞. Mercurij dulcis gr. xij. diagryd. gr. vj. fiat pulvis, qui detur cum pomo cocto saccharo consperso, vel panetella saccharata.

Pro potu ordinatio, aqua suprà laudata erit utilis-  
sima ex hydrargyri infusione parata; vel in qua hydrargyrum per horam integram in ampulla vitrea semiplena agitatum fuerit.

Vetilis etiam est aqua in qua stannum fusum sæpè extinctum fuerit. Si verò hydrargyro uti lubeat, satius est aquam cum eo parum ebullire: sic enim efficacior redditur.

Non minoris fortè est efficaciz aqua fontis, cum spiritus vitrioli aut sulphuris guttis aliquot acidulâ reddita: sunt enim acetositates illæ specifica materia quâ moriuntur vermes. Aqua verò, provt puer est grandior, magis vel minùs acidula est efficienda.

Vulgè autem vsurpatur pro potu ordinario, decoctum graminis, aut coriandri præpar. cum syrupo limonum, aut granatorû mixtum. Vel decocto graminis saccharum cum aceti tantillo admisceri poterit.

Dum prædicta remedia vsurpantur, clysteres toto morbi decursu frequenter iniiciendi sunt; primùm attractantes lûbricos, ex dulcibus cõpositi, ut ab initio dictum est. Qui non solùm ex decocto liquiritiæ, pas-sularum, & ficuum parari possunt; sed etiam ex iusculo pulli admixto saccharo, & melle rosaceo, vel ex lacte si febris abfuêrit; alioqui facilè corrumpitur.

At si lumbricos in crassis iam intestinis esse coniiciamus, quia tunc vix ampliùs in tenuia possunt ascendere, medicamenta illos enecantia per clysterem infundere possumus, in hunc modum composita.

℞. Rad.

℞. Rad. gram. Vnc. j. fol. betæ, malu. mercurial. & portulana M. β. corallina P. j. coriãdri præpar. & sem. contrã, ana Drach. ij. In lb. ij. aquæ fiet decoctio. In colaturâ lb. j. dissolue olei rosac. Vnc. ij. cassiæ recenter extractæ ʒ. vj. hieræ picræ ʒ. ij. mellis violacei ʒ. j. Fiat clyster.

Si fortio rem desideres.

℞. Rad. gentian Vnc. j. absinth. vulgaris, & abrotoni, ana M. j. centaur. min. M. sem. lupinor. Vnc. β. sem. contrã Drach. ij. Fiat decoctio. In colaturâ q. s. dissolue olei absinthij Vnc. j. sem. salis Drach. j. sem. Fiat clyster, qui iterandus est, & in posteriorib, vt vermes enecari educantur, dissolue benedictæ laxatiuæ, & hieræ picræ, ana Drach. iij. vel Vnc. sem.

Si præses sit alui fluxus, clyster sequēs iniiciendus est.

℞. Rad. tormentillæ, & aristol. rotund. ana ʒ. j. β. cortic. granat. & myrobolan. ana ʒ. j. létium P. i. baccarum myrti ʒ. j. rosar. rubr. P. j. Fiat decoctio. In colaturâ dissolue olei menthæ; vel absinthij ʒ. j. Fiat clyster.

Exteriùs verò ventri admoueri solent topica varia, non solum antea proposita, sed etiam sequentia.

℞. Rad. gentian. ʒ. j. rad. aristoloch. ʒ. vj. cortic. arãtior. ʒ. j. colocynthid. ʒ. j. cornu cerui vsti ʒ. ij. croci ʒ. β. Fiat puluis, qui subigatur cum oleo de absinthio, vel amygd. amar. & additâ fiat vnguentum.

Item oleum simplex cum pulpa colocynthid. decoctum efficacissimum est.

Item oleum de absinthio & hyperico, toti ventri manè & serò admouendum.

℞. Ol. absinthij, menthæ, & amygd. amar. ana ʒ. β. succi absinthij, rutæ, ana ʒ. ij. tormentillæ, dictamni albi zedoar, ana ʒ. β. fellis bubuli ʒ. iij. aloës ʒ. j. Puluerifcentur, & cum modica cera fiat vnguentum. Vel

℞. Colocynthid Drach. vi. Terantur, & cum felle  
Z z 4 bouis

bouis & vino imponantur vmbilico. Quo remedio & vermes interficiuntur, & venter soluitur.

℞. Myrrhæ ʒ. ii. mastich. ʒ. viij. aloës hepat. ʒ. xviii. sal. comm. lb. j. Contusa omnia destillentur per retortam lento igne, & magnâ diligentia: exhibit primò aqua, deindè oleum: Quod si illinatur infantium vmbilicus, omnem putredinem corrigit; quæ in eorum mesenterio restagnat.

Cataplasma etiâ in hunc modû concinnari poterit.

℞. Farinæ lupinor. ʒ. ij. myrrhæ, aloës, ana, ʒ. ij. fellis bouis quantum satis, olei de absinthio ʒ. ij. Fiat cataplasma ventri admouendum.

Si alui fluxus diutius perdurauerit, cataplasma sequens admoueri poterit.

℞. Ol. cydonior. & absinthij ana ʒ. j. succi portulacæ cum aceto extracti Vnc. j. sem. farinæ lentium Vnc. j. farinæ lupinor. Vnc. sem. coralli rubr. cornu ceru. vsti ana ʒ. iij. Incorporentur simul, & cum pauca terebinthina fiant ad formam cataplasmatidis.

Ex sola hiera picra cataplasma conflatum efficacissimum est.

Focus etiam interdum adhiberi possunt, quando magna ventri inflatio & tensio apparet, in hunc modum compositi.

℞. Fol. absinthij abrotoni, tanacetij, scordij, maluæ & violariæ, ana M. j. lupinor. contusor. Vnc. sem. centaure. P. i. Coquantur in aqua & aceto. Foveatur totus venter calidè frequenter.

Denique ad latos lumbricos, & ascarides, clyster ex amaris compositus erit vtilissimus. Cui addi debent purgantia toties repetita, donec corporis impuritas, ex qua illi generantur extirpata fuerit.

C A P V T X.

*De hamorrhoidum fluxu immodico.*

**L**icet moderatus hæmorrhoidum fluxus salutari sit, & à multis morbis, iisque grauissimis hominem præseruare, ac liberare solcat, quemadmodum docuit Hipp. in Epidemiis, & Aphorismis, nēpè pleuritide, peripneumonia, nephritide, mania, melancholia, aliisque innumeris. Immoderatus tamen periculosissimus est, aliisque morbos perniciosos inducit, nempe totius corporis imbecillitatem, omnium viscerum refrigerationem, & præsertim hepatis, atrophiam, cachexiā, & hydropem propter caloris natui deperditionem, effuso vitæ thesauro, & totius corporis fomento.

Ille autem fluxus immodicus easdem habet causas, quæ alia sanguinis profluvia excitare solent; sanguinem nimirum quantitate, vel qualitate peccantem. Dum quantitate peccat, & magnā copiā ad venas hæmorrhoidales deferitur, eas impensè dilatat, & oscula illarum aperit, quod quidem fit tunc temporis robore facultatis expultricis: sed nimia interdum copiā sanguis ad eas venas propulsus, retentricem opprimit, vnde fit, vt illā in officio suo deficiente, fluxus fiat immodicus, qui artis ministerio cohibendus est. Dum verò sanguis qualitate peccat, acrimoniā, vel tenuitate nimia facultatem iritat expultricem, quæ non solum inutilem, sed etiam vtilem sanguinem per illas venas excernit. Sanguis autem huiusmodi fluxum immodicum efficiens actior redditur ex permissione bilis, aut feri acrioris.

Cognoscitur immodicus hæmorrhoidum fluxus ex viribus prostratis, & imbecillitate, quàm æger percipit. & ex diuturnitate fluxus, ac copia sanguinis excreti; cum etiam fædo totius corporis colore ad citrinum vergente, ut ægri ictero laborare videantur.

Si à sanguinis quantitate prodeat, affectus præcessere causæ sanguinem multiplicantes, & patientes in principio leuiter fuerunt, alacriorésque fiunt; postmodum verò perseverante fluxu, debilitantur, ac vires eorum maximè deiiciuntur.

Si verò à sanguinis acrimonia, vel tenuitate nimia fluxus immodicus oriatur; causæ bilem generantes aut serum acre multiplicantes præcesserunt; temperamentum corporis adest biliosum, & exustum; sanguis magno impetu effunditur, effusus admodum rubicundus, rutilus, ac veluti flammeus apparet; cum aliàs, si sola quantitate peccet, subniger & melancholicus esse soleat.

Prognosis ex prædictis sufficienter colligitur, cum graues affectus, qui fluxum hæmorrhoidum immodicum consequuntur, enumerauimus.

Ad curationem, sanguis immodicè fluens cohibendus, aut saltem moderandus est; quod fit reuellentibus deriuantibus, incrassantibus, & astringentibus remediis.

Ac primùm phlebotomia in omni sanguinis profluuiò reuulsorium est remedium. Idèd in profluuiò hæmorrhoidum sanguis ex vena brachij erit detrahendus: maiori quidem copia, si plenitudinis quædam signa appareant. & nondum maxima sanguinis quantitas per hæmorrhoidas effluerit. Alioqui in exigua quantitate, & partitis vicibus tantum erit detrahendus.

Sanguinem etiam per dictas venas effluentem reuellunt

reuellunt frictiones, & ligaturæ partium superiorum: tum cucurbitulæ, scapulis, mammis, & hypochondriis admotæ, quæ ad maiorem reuulsionem in scapulis scarificari poterunt: in omnibus autem locis prædictis plures, & frequenter erunt admouendæ.

Purgatio etiam blanda humores biliosos sanguini impetum conciliantes ad intestina deriuat; æque fieri debet expurgantibus astringendi vi præditis, vt rhabarbaro, myrobolanis, & tamarindi, qualis ad vomitum sanguinis ruit proposita. Docetque Mercurialis tamarindos, præcipuè, ad compescendum huiusmodi sanguinem fluentem, miram quandam potestatem habere, tam decoctos, quam in substantia vsurpato. Imò pruna nostratia acidula, quæ aliquo modo tamarindos æmulantur, frequenter esitata ante alios cibos, huic rei etiam conducere. Illorum præterea vsus erit convenientissimus, vt aluus laxa seruetur; ac si non suffecerint, alia etiã addenda erunt, quæ ad alui astrictionem fuerunt proposita; quandoquidem vsu medicamentorum astringentium aluus constipatur, & in conatu, qui ad fæces duriores expellendas necessarius est, hæmorrhoides magis aperiuntur, ac copiosum sanguinem effundunt.

Postmodum ad ea remedia veniendum est, quæ sanguinem incrassant, & venas laxiores constringunt; qualia sunt ea, quæ ad sanguinis vomitum, & sanguinis sputum, informam iulepi, pulueri, opiatæ, aliorumque supra proposita sunt. Deueniendum etiam ad narcotica, vt ibidem dictum est, si maxima necessitas postulauerit.

Ac præter illa remedia, valdè laudatur ab auctoribus pilulæ de bdellio; quas tamen reiiicit Rôdeletius; propterea quod verò de bdellio Pharmacopœi careat, & illius

illius loco myrrham vsurpent, quæ sanguinis fluxum promouet. Verùm huic obstitit Solenander, illiusque experientia propriam opponit, asserens se in vsu harum pilularum, vt sunt præscriptæ, atque cùm vsitato bdellio compositæ, effectum, quem promittunt, tam euidentem comprehendisse, vt de compositione dubitare viæ queat. Nisi quis putet ab adiectis siccantibus & astringentibus, hoc qualecumque quod recipiunt myrrhæ, obtusum superatũque esse. His addere possumus, Bauderonium in Pharmacopœa, aliosque recentiores asserere, verum hodiè bdellium, Dioscoridis descriptioni conueniens, ex Iudæa nobis afferri, & à myrrhâ non difficile distingui. Illarum autem pilularum vsus talis esse poterit.

℞. Pilular. de bdellio ʒ. j. trochisc. de carabe, & de terra sigillata, ana ʒ. j. Cum mucilag. sem. cydonior. extracta cùm aqua rosacea, fiat massa pilularum, de qua capiat ʒ. j. bis in die, ante prandium & cœnam.

Topica remedia eodem tempore vsutpanda sunt, in varias formulas redacta.

Fotus ex verbasci, seu taphi barbati decocto in aqua ferrata, vel vino astringente parato, conuenientissimus est: hæc siquidem planta hæmorrhoidum fluori, & dolori appropriata est. In vsu verò fomenti diligenter obseruandum, vt frigide vel saltem temperatè admoueatur.

Magis composita decoctio in hunc modum præscribi potest.

℞. Radicis bistortæ ℞. ss. folior. plantaginis, verbasci, summitatum rubi, & quercus, ana M. ij. ss. granorum sumachi, balaustior. gallar. viridium, & malicorij, ana M. j. myrtillor. ʒ. sem. rosarum rubrar. P. ij. aluminis ʒ. j. Coquantur in tribus partibus aquæ ferratæ, & vna vini rubri austeri pro fotu.

Martinus



Martinus Rulandus fomentum laudat ex duobus facculis, alternatim calidè admotis, ex rubro panno conflatis, & glandibus confusis, ac quercus foliis repletis, & in forti aceto multùm decoctis, quibus ecyus fluxus consistit.

Ex decoctis superioribus, auctà dosi simplicium, potest fieri infessus, quo utatur æger subfrigidè, ut de fomento dictum est.

Unguentum comitissæ ac fluxum cohibendum utilissimum est, eoque inungi debet dorsum & hæmorrhoides, vel in rem præsentem tale componi poterit.

℞. Olei rosar. omphacini, & myrtillorum, ana ʒ. ij. succi plantaginis & tapsi barbati, ana ʒ. j. sem. aceti vini rubri Vnc. j. Bulliant ad succorum consumptionem, deinde adde boli armenæ, sanguinis draconis, thuris, & scorix ferri subtilissimè puluerat. ana ʒ. j. ceræ q. s. Fiat unguentum.

Rondeletius magis probat unguenta quæ sine oleis parantur, quia magis astringunt, eaque in hunc modum parat.

℞. Succi plantag. bursæ pastoris, & tapsi barbati, ana Vnc. ij. syrup. acetosi simplicis Vnc. iij. Coquantur simul leuiter. Postea misce sanguinis draconis Vnc. j. boli armenæ, terræ sigillatæ, & radicis bistorti subtilissimè puluerat. ana ʒ. j. sem. cerussæ lotæ ʒ. ij. Misceantur ad formam linimenti.

Si hæmorrhoides sint exulceratæ, sequens parari poterit.

℞. Olei rosac. Vnc. ij. thuris & aloës, ana ʒ. j. sarco-collæ, sanguinis draconis, boli armen. ana ʒ. sem. spodij, carabes, ana ʒ. j. amyli ʒ. iij. succi plantag. Vnc. j. Fiat unguentum.

Pinguedo anguillæ, quæ dum torretur exodat, unguentis

guentis addita, proprietate quâdam agens illa efficaciora reddit.

Cataplasma etiam doctis partibus vtiliter admo-  
uerur, in hunc modum compositum.

℞. Boli armenæ, aloës, mastiches, thuris, sangui-  
nis draconis, ana ʒ. sem. off. myrobolan. indorum, &  
gallarum, ana ʒ. j. Subigantur cum albumine oui &  
succo plantag. fiat cataplasma.

Vel pili leporis combusti, & tela araneorum minu-  
tissima, misceantur cum albumine oui, & fiat cata-  
plasma, quod ipsi venæ apertæ, si appareat, vtiliter  
admouebitur, aut in podicem blandè inseretur.

Suppositoria huic vsui sunt valdè idonea, quia pe-  
nitius in partem demittuntur. Horum autem forma  
talis est.

℞. Colophonix, thuris ana Drach. iij boli armenæ  
Vnc. sem. cerussæ, plumbi vsti, ana ʒ. j. acaciæ ʒ. sem.  
Subtilissimè trita excipiantur seuo hircino pro for-  
mandis suppositoriis.

Iniectiones per syringam in anum sunt, ex succo  
plantaginis, alijsve supradictis ad forum propositis.  
Sanguis cuiusvis animalis recèter extractus, & adhuc  
feruidus iniectus, mirabiliter sanguinem ex aluo  
profluentem cohibet.

Pulmo arietis adhuc calens & cruentus, podici  
subiectus, magnam in sistendo sanguine habet effi-  
caciâ.

Suffitus etiam in eundem finem vtiliter vsurpan-  
tur, ex decoctis forum prædictorum parari. Quibus  
etiam addi possunt, qui in dysenterix curatione suc-  
runt propositi. Tum etiam sequens.

℞. Thuris, aloës, mastiches, ros. rub. myrtillor. & ab-  
sinthij, ana ʒ. sem. trochisc. de carabe ʒ. j. Fiat pulvis  
crassior, carbonibus iniciendus. Cuius fumus recipiē-

cus est in cathedra perforata per infundibulum amplum, cuius angusto orificio aptetur tubulus ex ligno, vel argento, in anum demissus.

Suffitus ex decocto rapsi barbati omnium ferè utilissimus est.

Si venæ ipsi fluenti remedia applicari possint, reliquis præferenda sunt. Ideoque ut illa apparere possit, æger supra mensam collocatus podicem exprimere debet, quasi deicere velit, donec cõspiciat; adhibito insuper, si opus fuerit, instrumento ad eum nonnihil inuertendum. Tuncque venæ cataplasma prædictum, ex telis aranearum & pilis leporinis, vel alia remedia validissimè siccantia adhibenda sunt; vel bolus armena, alumen, aut vitriolum vstum. Oleo etiam vitrioli venam tangere efficax est remedium, vel in extremo periculo aqua forti appellata.

Quibus non conferentibus, Hippocrates libro de victus ratione in acutis, & libro de Hemorrhoidibus, deligationem, sectionem & vstionem hæmorrhoidum proponit, unicâ servatâ; quæ tamen operatio, tanquam laboriosissima & valdè periculosa, nostris temporibus obsolevit. Quamquam Massaria hanc semel operationem se vidisse referat; cuius historiam proponere erit utilissimum: siquidem ex ea operandi modus, eiusque euentus apertè docetur. Ea autem talis est. *Federicus Corsicus Vincentinus laborauerat primùm dolore, deinde immoderatâ fluxione hæmorrhoidum. Et cum ille multa præsidia expertus fuisset frustra, tandem Patavium se contulit. Vbi Medici communi consensu statuerunt, sanguinem esse cohibendum. Sed cum ille varia præsidia, tum interna, tum externa ab iis viris proposita frustra expertus fuisset; uno verbo, cum nullum suis malis remedium inueniret, statuit hanc manus operationem experiri. Cum autem apud nos nullus esset chirurgus idoneus, advocato*  
chirurgo

chirurgæ Neapolitano, qui hanc rem profitebatur, Fabricio, hæmorrhoides incise, ligata; & combustæ fuerunt. Summa autem huius administrationis est huiusmodi. Hominem primum accommodatè vinciunt, ut nullo modo possit dimoueri. Deinde extrema capita hæmorrhoidum, quotquot illa fuerunt, ab intestino excarnant leuiter, & separant; tum propria quadam acu foris obductâ filo ferè ad extremum tota perforant; & stricte obuinciunt, consuevè. Hoc pacto, demùm forcipe amputatâ venarum portiuncula, quæ ex sutura superest, ignito ferro eam comburunt. Opus sanè est dolorificum, & fastidiosum à ligatura, sectione, & ustione. Federico febris, atque insignis dolor supervenere. Sed nonnulla sua præsidia adhibente chirurgo, ille paucis diebus, & à febre, & à dolore, & sanguinis fluxione, non sine multorum admiratione, liberatus, integram suam sanitatem visus est recuperasse. Verum tamen non est prætermittendum, cum ille sibi nimium fideret, neque solum prætermisisset sectionem venæ, & purgationem, ut necessarium fuerat; sed & nullam probam vivendi rationem servasset, proximo anno febre pestilenti correptus obiit. Unde observandum venit diligenter Hippocratis præceptum Aph. 12. sectionis sextæ, ut una hæmorrhoidis aperta servetur. Nisi, ut docet Aëtius, maluerit ager, quæ à suppressione imminet pericula, victu frugali, exercitio, venæ sectione, & purgatione, cohibere.

In ordinaria autem curatione, quæ per medicamenta fit, hepatis & lienis ratio habenda est, cum venæ mesentericæ visceribus hisce inferantur, præsertim si hæc calidiora sint, aut debiliora. Ideoque non inutiliter epithemata, atque unguenta refrigerantia & roborantia applicantur; qualia in fluxu hepatico fuerunt proposita, & fusiùs in earum partium calida intemperie, & inflammatione describentur. Aliquândo etiam obstructions

iones viscerum, & venarum mesaraicarum huic malo dant originem. Quæ omninò soluendæ sunt, ut æger ab hoc affectu liberetur. Et nos aliquando fluxum hunc contumacem, pilulis ex chalybè, in hepatis obstructione descriptis, prorsus sustulimus.

Toto autem curationis tempore utatur æger potu ordinario aquâ ferratâ, vel decocto millefolij.

Eodem tempore, præ ceteris omnibus, summâ curâ sanguinis vitium emendandum est, quod primaria huius fluxus causa esse videatur. Idè si acer & biliosus fuerit, infuso rhei & tamarindorum sæpe repetito corrigendus est. Si calidus & tenuis, incrassantibus & refrigerantibus. Si aqueus, desiccantibus. Si multos, victu tenui. Nam frustra de sistendo fluore, consilium suscipitur, nisi mali origo prius tollatur. Quod abundè obseruauit Solenander *conf. 2 2. sect. 4.* sequenti historia, *Memini* (inquit) *me Annam, ex Ducibus Cliuentium progeneratam, grauissimò hamorrhoidum, diuturnoque fluxu curantem, magnâ diligentia, summòque nisu, quia viderem viribus labefactis, spiritibusque dissolutis summum discrimen imminere, profluvium obfirmasse. Verùm cum illa inde primo die recreata, sequentibus mirificè grauari, & circa præcordia tumere, atque inflari inciperet, reuocatus sextò die, coactus venis reclusis profluvium rursus moui. Neque potui securè & tutò stringere prius, quàm corpori, lenibus vacationibus, hepatisque necessariò aliis alterantibus atque roborantibus prospexissem.*

Curato tandem hæmorrhoidum fluxu, de præcautione cogitandum est ne iterum redeat. Quod fiet victus ratione conuenienti, phlebotomiâ bis aut ter in anno usurpatâ, purgatione vsuali ex syrupo magistrali aut alio medicamento, cum caustico tibiæ admoto, aliisque huiusmodi, quæ variâda sūt iuxta varias corporum dispositiones. Præterea aquæ minerales vitrio.

latæ, aluminosæ, & ferratæ erunt conuenientissimæ. Fonsæca commendat ad præcautionem huius affectus decoctum lentisci, vel eiusdem infusionem in vino, paratam hoc modo.

℞. Rasuræ lentisci ℥. ii. Infundantur in libris xij. vini per 24. horas in loco tepido. Deinde colentur, & de hoc vino bibat pro potu ordinario per mensem integrum. Habet enim vires sistendi hæmorrhoides, tum etiam ventriculū roborandi.

## C A P V T XI.

### *De dolore Hæmorrhoidum.*

**V**Enæ hæmorrhoidales in recti intestini extremitatem, & anum desinentes sæpe tumore afficiuntur, ex quo grauissimus dolor non raro excitari solet.

Fit autem ille tumor ex eadem causa, quæ fluxum hæmorrhoidum excitare potest; sanguine videlicet quantitate, vel qualitate peccante; qui si viam non inueniat, & venarum illarum extremitates aperire nequeat, in iisdem congeritur, easque replendo tumorem efficit cum inflammatione, & dolore, qui acerbitate sua omnes intentiones curatiuas ad se trahit. Causa autem præcipua, cur sanguis ex illis venis effluere nequeat, est eiusdem crassities, quippe qui melancholicus est: dicuntur enim vulgò hæmorrhoidales venæ, præcipuè internæ. humorem melancholicum à liene excipere; & interdum expurgare.

Multæ proponuntur ab authoribus hæmorrhoidum differentiæ, à magnitudine, numero, figura, & loco desumptæ

defumptæ: vnde aliæ magnæ, aliæ parvæ; aliæ plures; aliæ pauciores; aliæ vuis, moris, verrucis, aut vesicis similes, vnde vuales, morales, verrucales, aut vesicales nominantur: aliæ denique internæ, vel externæ dici consueverunt.

Ex his diagnosis facillè elicitur. Siquidem ex tumore in ani extremitatibus apparente, eiusdemque magnitudine, colore & consistentia, variæ illius differentiæ cognoscuntur. Præterea tamen ab aliis affectibus distinguendæ sunt qui anò accidere consueverunt, quales sunt, rhagades, condylomata, thymi, fici, aliique.

Rhagades sunt vlcera quædam in fissuras diducta, quæ iis ferè similes sunt, quæ in manibus, & labiis à vehemente frigore excitantur. Nullam habent cum hæmorrhoidibus similitudinem; sed eas cum subsequentibus paucis exponimus, vt omnes affectus anum obsidentes cum hæmorrhoidibus innotescant, licet illi ad morbos externos propriè referendi sint.

Condylomata sunt tumores quidam pelliculæ ani, quæ quum naturâ suâ rugosa sit, si ad eam confluentibus humoribus, rupa aliqua intumescat, affectio illa dicitur condyloma. Distinguitur ad hæmorrhoides, quoniam hæc maior est, nigra, & rotunda, venam aliquam occupans, cum illa sit oblonga, concolor, & venas non attingens.

Thymi sunt tubercula carnosæ, quæ non modò in ano, sed etiam in pudendo virili, ac miliebrī solent exoriri, verrucæ consimilia, & florum thymi formam referentia, vnde nomen sortita sunt. Parui sunt huiusmodi tumores, colore candido, vel subrubro, & doloris expertes; cum hæmorrhoides sint maiores nigriores, & vt plurimum dolorosæ.

Cucurbitulis etiam idem beneficium consequimur, ad motis hypocondriis ad reuellendum, coxi verò ad deriuandum.

Purgantia potentiora in hoc affectu non conueniunt, quia humorem ad partem attrahunt, & tumorem irritant. Attamen alius continuò emollienda est, quia dura excrementa & cum aliquo conatu emissa, dolorem exasperant. Ad alui autem lenitionem infusum cassiæ, manè & serò exhibitum, maximè conueniet in hunc modum paratum.

℞. Folior. lactuæ, buglossi, & summitat. maluæ, ana M. j. liquiritiæ ras. & passul. mundatar. ana ℥. β. Folior. buglossi, borragin. & violariæ, an. P. j. Coquantur ad ℥. viij. In colatura infunda cassiæ recenter extractæ ℥. j. Colentur & clarificentur. addenda postmodum syrup. violacei ℥. j. Capiat bis in die; ut dictum est.

Interdum etiam, ad humoris acrimoniam demulcendam, emulsiones quatuor seminum frigidorum, cum prædicto decocto extractæ, exhiberi poterunt.

Interim topica varia parti admouenda sunt, ad dolorem leniendum, inflammationem auferendam, & tumorem discutiendum. Oleum amygdalarum dulcium recenter extractum, parti dolenti admotum, dolorem demulcet. Idque multò efficacius præstant olea ex nucleis malorum persicorum, vel seminibus cucurbitæ, papaueris, & hyoscyami.

Præ cæteris autem efficacissimum est oleum buxi est enim narcoticum. Et sicuti dentium dolores quousvis ad miraculum sedat, ita & reliquos dolores, ac præsertim huc hæmorrhoidale mitigat, si illius gutta vna supra hæmorrhoides apponatur cū stylo gossipio inuoluto; aut si cum oleo seminis lini misceatur, eâ



proportione, vt prædicti olei  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . olei, buxi  $\mathfrak{d}$ . j. recipiat.

Quercetanus valdè commendat oleum nucum expressum, in quo millepedes, seu aselli bullierint. In oleo communi, eoque dulci, possunt etiam aselli decoqui, & dolorem mirabiliter sedant.

Oleum ouorum simplex, vel in mortario plumbeo agitatum ad idem est efficax.

Linimenta & vnguenta ad eundem vsum varia præscribi possunt. Quorum alia dolorem tantum leniunt; alia tumorem etiam discutiunt & exsiccant; alia vlceratis hæmorrhoidibus medentur. Eaque cum linteis, & lana, aut gossipio parti admoenda sunt.

℥. Vitellum oui n. j. olei rosac. vel violac. quantum sufficit. Fiat linimentum. Cui si vnguentum populeum addatur, efficacius erit ad dolorem sedandum; tum etiam in dolore acerbiori opij grana aliquot admisceri poterunt. Vel

℥. Axungia gallinae Vnc. sem. pulpæ pomi cocti sub cineribus  $\mathfrak{z}$ . j. croci orientalis Drach. sem. vnguent. popul. Vnc. sem. vitellum oui n. j. Fiat linimentum. Vel

℥. Olei violac. Vnc. ij. vnguenti populei Vnc.  $\beta$ . cum ouo integro fiat vnguentum. Vel album oui, cum lamuliebri agitatum parti admoueatur cum pannis linteis hoc liquore iubat. Vel

℥. Mucilag. sem. psyllij. Vnc. ij. olei violac. Vnc. iij. Fiat linimentum. Vel

℥. Mucilag. semin. psyllij & sænugr. extract. cum vino, an.  $\mathfrak{z}$ . ij. butyri recentis Vnc. iij.; seui hædini, Vnc. j. Agitentur simul in mortario plumbeo. Fiat linimentum.

Vel

Vel butyrum solum in mortario plumbeo ductum ad solem donec nigrescat, est egregium remedium.

Pomata etiam recens parti admota, est valdè anodyna. Vel

℥. Succi portulacæ & mellis, ana Vnc. iij. Miscantur in mortario plumbeo ad formam linimenti Vel

℥. Vnguenti rosac. Vnc. ij. mercurij. crudi Drach. ij. Misce. fiat linimentum. Vel

℥. Diachyli albi cum oleo chamæmel. mollificati Vnc. ij. croci ʒ. j. opij gr. iij. Fiat vnguentum.

Horskius plurimum commendat linimentum ex linaria herba cum floribus, cocta cum adipe porcino. Cui expresso, & parumper refrigerato vitellum oui permiscet, idque cum lana vel gossipio dolenti parti applicat. Dicitque hoc linimentum eiusmodi dolores ad miraculum vsque confestim sistere, seque illud accepisse à Ioanne Wolsio, celeberrimo in Hassia Medico, qui Principi suo Hassiæ Landgrauio, tanquàm secretum eximium, reuelare noluit, donec ipsi annuatim bouem saginatum promitteret..

Ad tumorem discutiendum simul & dolorem leniendum, sequentia linimenta vtiliter vsurpari poterunt.

Porrorum radices, sub prunis cum stupis madefactis decoctæ, & cum butyro pistatæ dolorem, & tumorem auferunt. Idem præstat cepe rubrum, cum pulpa lilij decoctum, & cum oleo myrtino pistatum & lubactum. Vel

℥. Ol. nucl. persicor. & olei amygdal. amarar. an.

A A a 4

Vnc. ij.

Vnc. ij. styracis liquidæ, & bdellij, ana Drach. ii. Omnia dissoluta in oleo incorporentur in mortario; fiat linimentum.

Balsamum sulphuris ex floribus sulphuris, & spiritu terebinthinæ paratum, præstantissimum est ad dolorem sedandum, & tumorem discutiendum; tum etiam vlcera eorum partium mundificat, & detergit. Idque potentius, si loco spiritus terebinthinæ, oleum hyperici & ouorum substituantur. Tum etiam in tumetibus & valdè inflammatis hæmorrhoidibus, loco prædicti spiritus oleum rosaceum, aut violaceum subrogari poterit.

Cataplasmata etiam ad eodem vsus commodè vsurpantur. Ex quibus vulgatissimum est, ad omnes dolores ex inflammatione demulcendos, cataplasma de mica panis, compositum ex medulla panis albi in lacte decocti; addendo oleum rosaceum, & vitellos ouorum.

Aqua-pendens commendat cataplasma ex plantagine, parietaria, & malua in aqua coctis, & cum oleo rosaceo decoctis subactis: cui interdum; cum magis exsiccare est animus, farinam hordei & milij admiscet. Si verò dolor vrgeat, lac omne adiicitur. Idem etiam laudat cataplasma ex radicibus porrorum, in oleo communi, aut myrtino coctis, tum etiam ex scofularia in aqua decocta.

Folia sambuci viridis concoquantur ad putrilaginè in aqua communi. Postea extendantur super pannum magnitudinè volæ manus. Applicentur calidè, ægro prono existente; prius tamen parte affectâ oleo communi illitâ. Renouetur sæpè applicatio, & continuetur per multas horas. Ante applicationem foueatur pars decocta eorundem foliorum.

Eadem

*Cap. XI. De dolore hæmorrhoidum.* 745

Eadem folia sambuci contusa, & frigide admota, tertiâ applicatione dolorem sedant.

Portulaca etiam contusa, & admota, dolorem sedat; tumorem imminuit, vlcera consolidat, & excrescentias carneas absumit.

Cepa alba sub cineribus cocta, & cum butyro recenti subacta instar cataplasmatidis, dolorem sedat, & timorem discutit.

Fotus admouentur eidem parti, ad dolorem sedandum, ex decocto tapfi barbari, malux, bismalux, pariatarix, seminis lini, fœnugræc. althææ, flor. chamæm. & anethi, in lacte parato. Vel lactis defectu, idem decoctum parari potest in hydrelæo, vel iusculo intestinorum veruscis.

Incessus ex eodem decocto, auctâ quantitate simplicium, parari potest.

Aqua frigida sola pro fotu vtilissima. Incessus in eadem præstans; hyeme sit tepida.

Fotus etiam vtilissimus fit ex aqua rosarum, in qua sal saturni dissolutum fuerit, præsertim si pars admotum inflammata fuerit.

Ad tumorem discutiendum conuenit fotus ex alumine in vino rubro decocto.

Polypodium quercinum, hipericum coquantur in æquis partibus aquæ, & vini, & prono corpore decoctio instilletur in hæmorrhoides guttatim ex spongia expressa. Hæmorrhoides sensibilibiter detumescunt.

Ad idem conferunt aquæ thermales, pro fotu cum spongiis admotæ, vel incessus in iisdem calidiusculè.

Aqua-pendens admouet spongiam, ex aqua calcis expressam, & supra partem alligat.

Suffitus ex decocto supradicto, dum feruet, exce-

A A a 5 ptus

ptus, vel ex paucioribus, aut solo tapso barbato in lacte cocto cum tritico secalino, dolorem quoque compescit. Vel

℞ Sempervini maj. M. ij. Decoquantur in vino albo, & fumum excipiat æger in sella perforata.

Ad hæmorrhoides absumendas & exsiccandas conveniet suffumigium ex pulueribus lolij, tapfi barbati, scrofulariæ, super prunas coniectis. At efficacius fiet suffumigium, si sulphur simul vtatur. Imò verò ex sulphure solo suffumigium paratur, & per tubulum exceptum hæmorrhoides cæcas, & latentes potenter exsiccat. Suffitus ex lapide pyrite in aceto extincto optimus ad hæmorrhoides absumendas.

Ad easdem hæmorrhoides cæcas & latentes, mirum in modum confert iniectio sequens, frequenter vsurpata.

℞. Succij & plantaginis & olei violac. ana ℥. iv. balsami naturalis Vnc. sem. Misce, fiat iniectione in anum : Amatus Lusitanus curatione 91. centur. 2. suppositorium sequens hisce verbis prædicat. *Romana qua ad pontem sancti Angeli habitat, cum uteri procidentiam pateretur, de dolore hæmorrhoidum querebatur. At cum illi multa, & selecta medicamenta admota essent, quibus non inuabatur, ad balanum ex senu hircino cum opio confectum confugimus, quo dolor euauuit; nec postea rediit. Ad postea calidis roborantibus, locum, prout post admota stupefacientia fieri solet, fouimus.*

Idem Amatus curatione 6. centur. 3. sequens topicum commendat. his verbis. *Reuerendissimus ille, qui ab hæmorrhoidum dolore graniter cruciabatur, post varia & multa à medicis tentata præsidia, hoc remedio a nobis presentato usus fuit, & breui ab illo infestissimo dolore liber euasit. Habet autem remedium sic.*

℞. Arantium pomum, & id cultro excava, in quo oleum

rosa

*rosaceum & pseudonardi, lauendula dicta, semina infunde, & ad cineres calidos admoue, & calidum applica, & sæpe innoua; est enim mirum.*

In communi vsu est pulmo hædius, ex animali adhuc calens parti appositus; vel illius laminæ inter duas patinās calefactæ, cum tantillo aquæ etiam admouentur. Sic enim dolor admodum demulcetur.

Ad hæmorrhoides vlceras conueniunt tum barbasus sulphuris prædictus, tum vnguenta sequentia.

℞. Olei ouor. recentis Vnc. ij. Agitentur in mortario plumbeo, & applicentur.

℞. Ol. rosar. Vnc. iv. cerussæ Vnc. j. lythargyri Vnc. sem. ceræ nouæ ʒ. vj. opij ʒ. iv. Fiat vnguentum. Vel

℞. Thuris, myrrhæ, croci. ana Drach. j. opij gr. ij. vitellum oui n. i. olei rosac. & mucilag. semin. psyllij, ana q. s. Fiat vnguentum.

Si non facile resolui possint, post conuenientes reuulsiones aperiendæ sunt, confrigando panno asperiori madefacto in succo ceparum, in quo dissoluta fuerit aloes Drach. i. Est secretum Hartmanni. Promptius tamen & cum minore dolore, scalpello, aut hircudinibus admotis aperiuntur.

Per os etiam assumuntur specifica nonnulla ad dolorem sedandum, & hæmorrhoides absumendas idoneæ; quorum præcipua hæc sunt.

Decoctum millefolij, in potu ordinario per tri dum exhibitum, hæmorrhoidum dolorem scilicet solet discutere.

Semen trifolij hæmorrhoidalis ad Drach. j. cum vitello oui per plures dies exhibitum, ad idem est efficax.

Tapsi barbari puluis exhibitus cum lacte, vel alio modo, valde probatur ad hæmorrhoides tumētes absumendas.


sumendas. Pulvis millefolij, & tormentillæ idem præstare valent.

Succus rapfi barbati per se, vel cum saccharo roseo, aut penidiato mixtus, vel cum saccharo in syrupum redactus, ad idem utilis est.

Denique pilulæ de bdellio frequenter, vsurpatæ, tumentes hæmorrhidas absument, earumque causam insensibiliter detrahunt.

In iis qui huic affectui valdè obnoxij sunt, causticum tibiz vtilissimè admouetur.

*F I N I S.*













# INDEX

Rerum, quæ in hoc Tomo primo  
continentur.

## A

<b>A</b>	BSCESSVS cerebri.	110
	Abstinentiæ laus.	652
	Acetum non pertimescendum in medica- mentis somnum conciliantibus.	115
	Acetum in lienis affectibus cur utile.	574
	Acetum & acida appetentiam cur excitant.	ibid.
	Acida & acuta appetere, quàm res absurdas, in pica melius.	654
	Acidus ructus cur dysenterici longæ superueniens salu- taris.	574
	Adnatæ tunicæ vlcera.	241
	Ægilos quid.	249
	Aër qualis frigida humidæ cerebri intemperiei conue- niens.	6
	Aëris aquilonaris incommoda.	8
	Aëris in aure implantati motus causæ.	27
	Aëris peculiari vitio dysenterici epidemici excitantur.	680
	Albugo quid.	212
	Alimentorum vitia.	570

## B B b

# *Index Rerum.*

Alimenta concoctu faciliora vel difficiliora redduntur ex coctura.	571
Aloë & aloëtica medicamenta specifica ad singul- tum.	185
Alui fluxus Autoris longior ouis induratis aceto intin- ctis curatus.	574. 575
Alui astrictæ incommoda & causæ. 654. curatio.	656
Alui fluxus differentia vnde desumuntur.	665
Alui fluxus signa tum causarum, tum partium mandan- tium.	666
Alui fluxus criticus quibus contingit.	667. 669
Alui fluxus grauidis abortum minatur.	667
Alui fluxus symptomati curatio. 670. an vomitus & venæ sectio conueniant. 670. quales clysteres.	671
Alui fluxus inueterati remedia.	674. 675
Amauroseos signa.	173
Ambra grisea vsus in melancholia hypochondriaca.	558
Anacatharsis quæ mala in pleuritide.	434
Anacatharsi expurgata materia, ex pectore per pulmo- nes transmutatur.	430. 431
Anacatharsi libera & liberali desistendum à venæ se- ctione.	437
Anacatharsim promouentia in pleuritide.	440
Anacollemata in hæmorrhagia.	333
Anasarcæ causa.	320
Anaxioni cur octauo solum die missus sanguis in pleu- ritide.	436
Angina quid.	387
Angina differentia & causæ.	389
Angina cur viri magis obnoxij quam fœminæ.	ibid.
Angina curatio.	396
in Angina cur sanguis copiosus vna vice mitti non de- bet.	397

# *Index Rerum.*

Anginæ quando conueniat purgatio.	398
in Angina abſceſſus quomodo rumpatur.	403
Anginoſas profundis ſcarificationibus ſub maxillis & ceruice liberatus.	406
Anhelitus acidus lumbricorum in puerulis indicium.	717
Animalcula tenella per medium ſecta & applicata in phrenitide.	117
Animalcula in aurem inſerta quomodo allicienda.	270
Ano qui accidunt affectus.	739
Anodyna in conuulſione. 74. in ophthalmia. 227. in aurium dolore 289. in pleuritide.	438
Anodynum ſingulare in cancro depaſcente.	246
Ανορεξία.	555
Antimonij vſus in lethargo 33. in dolore capitis contumaci.	162
Αρεμία cur periculofa.	576
Aphthæ quid.	380
Aphtharum curatio.	382. 383
Apnœa.	412
Apophlegmatiſmi cautè vſurpandi in obnoxiis fluxionibus ad pectus.	18
Apoplexia quomodo differat ab aliis affectibus ſoporofis.	22. 23
Apoplexiam qualis febris ſoluat.	27
in Apoplexia ephidroſis mala.	28
Apoplexiæ curatio.	ibid.
Apoplexiæ an phlebotomia conueniat.	28
in Apoplexia validiſſimum catharticum neceſſarium eſt.	31
Apoplecticæ aquæ variæ.	38
Αποπληξία quid.	535
Apozema purgans in gutta ſerena.	178
Apozema in vlcere ventriculi abſtergēs & purgans.	544

# *Index rerum.*

Appetentiæ abolitæ & imminutæ causæ.	535
Appetitus rerum absurdarum quibus familiaris.	560.
feratur ad similia vel contraria,	560
Appetentiam excitant acida.	542 543
Appetentiæ deprauatæ causæ.	553
Appetentiæ absurdarum rerum causa,	559
Aquarum thermalium potus quomodo conducit cere-	
bro roborando.	21
ex Aquis thermalibus fatus & infessus in hæmorrhoi-	
dum dolore.	745
Aquæ hirundinum laus in conuulsione.	74
Aquæ acidulæ in epilepsia sympathica.	87
Aquâ frigidâ facies aspersa quomodo hæmorrhagiam	
sistit.	334
Aquæ singulares in suffusione. 200. 201. in ophthalmia	
inueterata. 236. In oculorum vlceribus. 143. in sur-	
ditate.	474
Ad hæmoptoen.	469
Aqua stillatitia restaurans.	530
Aqua clareta ad ventriculum frigidum. 546. aqua cina-	
moni.	547
Aquæ sulphuræ & bituminosæ ad ventriculum frigi-	
dum.	ibid.
Aqua in pericardio contenta vna ex palpitacionis cau-	
sis.	520.
Aqua ex hydrargyri crudi infusione aduersus lumbrici-	
cos.	726
Aquei humoris affectus.	188.
Aquilonia constitutio quomodo sit causa catarrhi.	
142.	
Argentum quid.	24.
Argentum viuum seu crudum an exhiberi possit contra	
vermes.	723. 724.
Arteriotomiâ hemicrania curata.	166.

# *Index Rerum.*

Arteriotomia laudata à Galeno in opthalmiæ cura- tione.	244
Arteriotomia confert auris inflammationi.	228
Ascites quid.	46
Ascites vomitui sanguinis succedens, lethalis.	152
A sclepiadis medicamentum ad singulum, à Galeno probatum.	585
Asthyxia quid differat à syncope.	506
Asthma quid.	412
Asthmatis differentia & causæ. 412. signa. 414. cura- tio.	414
Asthinati an conueniant vomitoria. 415. an decoctum galli veteris.	423
Asthmaticum paroxysmum soluentia.	416
Astringentibus quando locus in dolore dentium.	367.
in disenteria.	690
Atoniæ hepatis in fluxu hepatico causa pendet ab occul- tiori supra primarum qualitatum excessum.	705
Auditus grauis causæ.	265
Auditus grauis facîle in surditatem degenerat.	268
Auditus instrumentorum cum loquelæ instrumentis consensus.	265.
Aues cur durissima plantarum semina dissoluunt.	575
Aurium affectus.	263
Aurem interiorem vellicando cur tussis excitetur.	264
Aurium cavitati inserta quomodo auferenda.	267
Aurium sonitus causæ. 297. differentia. 279. prognosis. 281. curatio.	ibid.
Aurium doloris causæ. 282. diagnosi.	284
Aurium dolor cum inflammatione periculosus.	286
Aurium doloris curatio.	ibid.
Auris inflammatione affecta quomodo tractanda to- pica.	42. 292
Auris suppuratæ curatio.	292



# *Index Rerum.*

Aurī inmissis medicamentis cur dolores dentium se-	
dentur.	365
Autumnalis aër acrium destillationum causa.	479

## B

<b>B</b> Albi qui sint Galeno, & qui Auicennæ.	355
Balbutici causa.	364
Balbutiei differentiæ.	ibid.
Balneum siccum in paralyfi.	61
Balneo sulphureo vtendi modus ingeniosus in surdi-	
tate.	272
Balneum an ophthalmiæ conueniat.	233
Balneum aquæ dulcis an conferat phthysicis.	503
Balneum an sit morbosæ salutare.	568
Balneum ex decocto remollientium & calefacientium	
in dolore ventriculi.	620
Balneum bis aut ter repetitum quibus conualescentibus	
vtile.	543
Balsamum apoplecticum.	38
Balsamum Guidonis in paralyfi.	59
Balsamum apoplecticum in epilepsia puerili.	92
Balsamum Peruvianum in vlcere pulmonum.	501. in
ventric. frig.	549
Balsami sulphurei dotes in hæmorrhoidum dolore &	
vlcere.	744
Βερυχηία quid.	269.
Bilis an possit esse causa paralyseos.	39
Bilem temperantia.	113
Bilem an dulcia semper procreent.	717
Bolus temperatus ad ventriculum purgandum.	548
Bolus adstringens in diarrhœa.	673
Bothor Arabum.	240
Βότρυς quid.	242

# *Index Rerum.*

Boulimiæ causæ.	553
Bæstusæ causæ.	579
Bugulæ decocti præstantia in pulmonum vlceribus.	
497	
Buxi oleum ad dolorem hæmorrhoidum leniendum efficacissimum.	741

## C

<b>C</b> Æcirati causæ.	173
Calor præcipua fluxionis causa.	145
Camphora odorata, illita, sumpta cum paucâ aqua ros. vomitum sedat.	595
Cantro depascenti caro pulli in tenues laminas concisa optimum anodynum.	246
Canina fames.	551
Caninæ famis causæ. 553. curatio.	557
Caninam famem obtundunt pinguiâ & oleaginosa.	
558	
Capitis dolorum differentiæ & causæ. 157. & seqq. curatio.	160
Caput faciliè tentantia.	9
Capitis omnibus in affectibus quanti momenti sobrietas.	10
Caput quot affectuum origo.	145. 146
Cardialgia cur in variis temperamentis diuerso tempore exacerbatur.	616. 617
Cardialgiæ causæ.	614. & seqq.
Carnes exhibitæ pueris lactentibus cur in lumbricos facessant.	715
Caros in quo differat ab apoplexia, comate & lethargo.	22
Cassiæ infusum in dolore hæmorrhoidum.	144
Castorei laus in apoplexia. 38. in conuulsione.	75

# *Index Rerum.*

Catalepsis idem quod catochus.	45
Catalepticorum historiae stupendae.	43
Cataplepticos causa.	44. 45
Cataracta quid.	188
Cataracta innunctione mercuriali curata.	203
Catarrhi causa.	140. & seqq.
Catarrhi differentiae.	145. & 146
Catarrhalis febris causa.	146
Catarrhus per quas vias à capite defluit.	ibid.
Catarrhi signa.	147
Catarrhus in valdè senibus difficillimè coquitur.	148
Catarrhi curatio.	148
Catarrhi obnoxij non rarò cerebrum frigidum & hepaticum calidum habent.	148
Catarrhi curatio.	158
Catarrhus contumax in pulmones defluens phthisim sapientitur.	490
Caulium rubrorum decoctum ad asthma.	421
Causticum in initio ad caput vacuandum.	20
Causticum in occipitio puerorum in epilepsia.	94
Cauteria multa applicata in affectibus soporosis.	37
Cauterium futuræ coronali applicatum in mania.	132
in dolore capitis contumaci.	166
Cepæ sub cineribus coctæ usus in hæmorrhoidum dolore.	745
Cephalæa quid.	157
Cephalalgia.	ibid.
Cerebri frigida & humida intemperies morborum serax.	3
Cerebrum metropolis pituitæ.	ibid.
Cerebrum quasi cucurbitula corpori imposita.	138
Cerebri frigidae intemperiei signa 5. 6. effectus.	140
Cerebri excrementa quæ euacuantur.	139
Cerebro maximè infensi lunares radij.	8

# *Index Rerum.*

Cerebrum frigidum humidum alterantia & roborantia.	13.18.20
Cerebrum exsiccantia.	151
Cerebri abscessus & sphacelus.	119
Cerebri calidi effectus.	142
Chamæmeli aqua stillatitia & decoctum specificum in doloribus ventriculi.	620
Chemosis quid.	218. 220
Chinæ decoctum in vulneribus capitis.	629
Cholera(morbus) unde dicatur.	608
Cholerae morbi essentia & differentia. 609. 610. curatio. 611. & seqq.	
Cholerae an sint quaedam criticae.	611
Cholerae quando conueniat phlebotomia.	613
Cholidochi pori praua conformatio facit picrocolos <sup>a. a.</sup>	589
Chordapsus cur ileos vocetur.	645
Chordarum lyrae cum nervis comparatio.	65
Ciborum liquationis & dissolutionis in ventriculo causa.	544
Cinnabaris nativæ laus in epilepsia.	69
Cinnabaris item antimonij.	90
Citri cortex conditus ventriculum roborat.	549
Clysteribus phrenitide laborantium olea non admiscenda.	111
Clysteres in dysenteria quales esse debeant.	686
Clysteres astringentes detergentibus intericiendi in dysenteria.	689
Clysterum in usu in tenesmo quid observandum.	702
Clysteres aduersus lumbricos.	726. 727
Collutiones variæ ad dolores dentium.	366
Collyria in suffusione 199. in pupillæ dilatatione. 208 in albugine. 214. 216. in hypopyo.	239
Collyrium valdè detergens & exsiccans.	1244

# *Index Rerum.*

Collyrium sarcoticum & epuloticum in fistula lacry-	
mali.	252
Collyria adstringentia & exsiccantia in epiphora.	258
Collyria in pterygio seu vngue oculorum.	261
Collyrium Lanfranci in ulceribus oris & faucium.	383
Colocynthis potenter cerebrum expurgat.	149
Colocynthis correctio & dosis.	ibid.
Columbinus pullus sectus calens suffuso oculo appli-	
catus	198
Cœliacæ passio tum ventriculi, tum intestinorum vitio	
fit.	659
Cœliacæ passionis causæ. 659. 661. signa. 662. prognosis	
ibid. curatio.	664
Cœliacæ passioni an clysteres conueniant.	662
Colici doloris causæ.	632
Colici doloris materia non semper in sola intestino-	
rum cavitare continetur.	633
Colicæ biliosæ essentia.	634
Colicæ item biliosæ quæ in paralyfim degenerat.	ibid.
Colica pestilens.	635
Colicus dolor cur difficilè dignoscitur à nephritico.	
138. 139	
Colicus dolor quis funestus. 636. epidemicus ut plur-	
mum talis est.	639
Colicæ flatuosæ curatio.	ibid.
Colicæ specificum intestinum lusi.	640
Colico dolori quæ cathartica conueniant.	641
Colicæ biliosæ quæ in paralyfim degenerat an conue-	
niat phlebothomia.	644
Columellæ relaxationis causæ.	384
Coma quid.	22
Comatis causæ.	23
Comatosus affectus acutissimo morbo superueniens	
perniciosus.	26

# *Index Rerum.*

Coma vigil in quo differat à simplici.	40
Comatis vigilis causa.	41
Concoctio ventriculi à moderato fit calore.	730
Condita in hæmoptoë.	468
Condyloma quid. 739. quid differat ab hæmorrhoidibus.	ibid.
Condylomata solâ chirurgiâ curantur.	740
Conformatio corporis tabifica.	480
Contagio phthisis communicatur.	479
Conualeſcentibus balneum vel semicupium cur prodest.	742
Conuulsio quid.	62
Conuulsionis differentia.	62
Conuulsionis & conuulsiui motus discrimen.	62
Conuulsio quæ periculosa.	69
Conuulsioni febrem superuenire melius, quàm febri conuulsionem.	70
Conuulsionis à repletionem curatio.	ibid.
Corallorum syrupus ab hepar roborandum & fluxum cohibendum præstantissimus.	710
Cordis affectus. 505. morbi insigniores.	508
Corneæ tunicæ affectus.	212.238.240
Coryza quid.	141
Croci metallorum aqua ad suffusionem.	200
Cruentum sputum an sit signum pleuritidis pathognomicum.	430
Crystallum minérale admixtum iulepis in fluxionibus.	155
Crystallini humoris affectus.	184
Crystallini situs vitiatu unde.	185
Cucupha ad cerebrum corroborandum.	156
Cucurbitulæ ubi affigendæ in conuulsione.	71
Cucurbitula summo capiti quando affigenda in phrenitide.	117

# *Index Rerum.*

Cucurbitulâ scarificatâ iuxta aurium glandulas, aurium inflammatio sedata.	288
Cucurbitula scarificata in occipitio in gutta serena.	169
Cucurbitularum in hypochondriis applicatio non semper tuta.	328
Cucurbitulâ sub mento scarificatâ angina curata.	400
Cucurbitulâ applicata parti dolenti in pleuritide.	441.
Cucurbitula scarificata in regione cordis in palpitatione.	526
Cydonicum, cydoniorum miua, syrupus cydoniorum ventriculū refrigerant & roborant.	542
in Cynanche laryngis musculi & pulmo afficiuntur.	392. 393

## D

<b>D</b> eglutitionis facilioris vel difficilioris causæ.	388
Deiectiones sinceræ cur malæ.	541
Deiectionum chylosarium causa.	664
Deliquium animi quomodo hæmorrhagiam cohibet.	339
Deliquium animi quid differat à syncope.	507
Delirium sedantia.	112. 114
Delirij causa in mania.	123
Deliriorum melancholicorum varietas.	133
Dentes an sentiant.	306
Dentes apostemantur.	461
Dentium doloris causæ.	361
Dentium dolores cur subleuentur medicamentis in aures immixtis.	364
Dentium ad dolorem topica varia.	370
Dentes dolentes cauterio quando adurendi.	ibid.

# *Index rerum.*

Dens cur vno ictu violenter non extrahendus.	370
Dentium casum promouentia.	371
Dentium nigredinis & erosinis causæ.	373
Dentes dealbat & detergit oleum vitrioli.	374
Destillatum restitans in fluxu hepatico.	711
Διαβρωτικὰ causæ.	320
Diacodium album.	114
Diætæ sudorificæ vtilitas in cerebri frigidi humidi in- temperie corrigenda. 46. in paralyfi. § 6. in gutta se- rena.	179
Diapedeseos causæ.	320
Diaphœnicum cum philonio romano in singultu vbi causa & symptoma valde vrgent. § 86. in dolore ven- triculi. 621. in colica.	640
Diarrhœa in pleuritide & peripneumonia an semper mala.	434
Diarrhœa quid. 664. in quo differat ab aliis alui fluxi- bus.	665
Diarrhœæ differentia.	665
Diarrhœæ syntecticæ causæ.	666
Diarrhœæ signa, tum causarum & partium mandan- tium.	666
Diarrhœa critica quibus præcipuè contingit.	666.667
Diarrhœæ symptomaticæ noxa & differentia. 667. an vomitibus & phlebotomia conueniant.	670
Diarrhœa biliosa curata largo aquæ tepidæ potu in æstate.	672
Diarrhœæ inueteratæ curatio.	667
Digestiui pulueris compositio.	9
Digestiuus puluis ad ventriculi coctionem iuuandam. § 48	
Dorsalis tabis species.	481
Dulcia an semper bilefcent.	718
Dysenteria species.	676



# *Index Rerum.*

Dysenteriaè strictè sumptæ essentia.	676
in Dysenteria vnde exulceratio excitatur. 677. quid mucositas excreta.	678
Dysenteria expidemica peculiari aëris vitio excitatur.	680.
Dysenteria ab atra bile cur lethalis.	681
Dysenteriaè curatio.	682
Dysenteriaè quæ purgantia maximè conueniant.	682.
683	
Dysenteriaè an conueniat vomitus. 684. an phlebotomia.	685
Dysenteriaè malignæ & epidemicaè bezoardica sudorifica conueniunt.	696
Dyspepsiaè causæ. § 69. signa.	575
Dyspnœa.	411.414

## E

<b>E</b> buli decoctum sudorificum est.	61
Eclegmata in angina. 402. in pleuritide. 440. in empyemate. 455. in sputo sanguinis.	467
Εκλυσις quid differat à syncope.	507
Elidæi secretum.	621
Elixir proprietatis in paralyfi. 61. in ventriculo frigido.	581
547. in singultu.	
Elleborastri vis in casu dentium promouendo.	372
Emplastrum caput roborans. 15. attrahens.	16
Emplastrum Galenicum hæmorrhagiam sistens.	31
Emplastra supra spinam dorsii applicanda in paralyfi.	
60. supra futuram coronalem in catarrho.	156
Emplastra in dolore dentium. 365. in empyemate ad pus eliciendum.	457
Emplastrum ventriculum calefaciens.	550
Emplastrum ad vomitum compescendum.	597

# *Index Rerum.*

Empoisthotonos conuulsionis species.	64
Empyematis causæ 451. signa 452, curatio.	455
in Empyemate lateris apertio vbi facienda.	ibid.
Empyici qui euadant.	454
Empyicorum pus quâ repurgetur.	454
Emulsiones in phrenitide.	113
in inflammatione ventriculi. 627. in fluxu humor- rhumidum immodico.	741
Enchanthidis curatio.	254
Ephidrosis in apoplexia mala.	27
Epidemica dysenteria aëris peculiari vitio excitatur.	688
Epidemicus catarrhus.	140
Epileptici plerumque melancholici fiunt.	83
Epilepsia quid.	75
Epilepsiæ causæ.	86
Epilepsiæ differentiæ, 76.77. signa.	79
Epilepsia an incurabilis post 25. annum.	83
Epilepsiæ curatio.	84
Epiphora vesicatorio sincipiti admoto curata.	256
Epiphoram exsiccantia collyria.	258
Epithemata refrigerantia. 114.131. ad hæmorrhagiam sistendam. 437. in hæmoptoe,	472
Epithema in fluxu hepatico,	711
Errhinorum formæ.	16.17
Errhinis quando præcipuè vtendum.	17
Errhina quando & qualia conueniant in catarrho, 150	
Errhina in foetore narium. 313. in asthmate.	417
Escharotica an in hæmorrhagia sistenda adhibenda. 337	
Essentiæ chymicæ ventriculum calefacientes & robo- rantes.	549
Euacuatio bona καὶ ἴσως fieri debet.	316
Exercitationis & corporis motus commoda.	10

# *Index Rerum.*

Expectorantia inſthmate. 421. in pleuritide.	440
Extenuationis in phthiſicis cauſa.	476
Extractum reſtaurans ex cordibus veruecinis.	529
Exulcerationis inteſtinorum cauſa in vera dyſenteria.	
677. 678.	

## F

<b>F</b> ames canina.	551
Famis caninæ cauſa. 553. 554. curatio.	557
Famen an pingia obtundant.	558
Fasciæ ſeu lumbrici lati an ſint vermis vnicus.	713
Fastidij ciborum cauſa.	535
Fastidium cibi quodnam magis funeſtum. 540. cur item in dyſenteriis longis.	ibid.
Faucium vlcerationis cauſa & differentiæ. 580. curatio.	
ibid.	
Febris apoplexiam ſolutura qualis eſſe debeat.	27
Febrem conuulſioni ſuperuenire cur melius quàm febrî conuulſionem.	70
Febribus catarrhalis vnde.	146
Febribus in epidemicis anginæ, pleuritides, peripneu- monia, dyſenteria, vnde.	390
Fel catelli lactentis antepilepticum.	93
Fella piſcium & aliorum animalium oculos potenter abſtergunt.	215
Ferinus catarrhus.	146
Fernelius improbat cur circa ſanguinem è naribus die critico fluentem. 325. vt & in cauſa epilepſiæ.	78
Fici quid.	740
Fici quid ab hæmorrhoidibus differant.	ibid.
Fisci ſola chirurgia curantur.	ibid.
Fiſtulæ lacrymalis differentiæ.	249. 250
Fiſtulæ lacrymalis curatio.	250. 251

**Fiſtula**

# *Index Rerum.*

in Fistula lacrymali os carie affectum solo cauterio curabile.	263
Fistulam sæpe in ano relinquunt hæmorrhoides suppurratæ aut exulceratæ.	740
Flagellum Medicorum, melancholia.	137
Fluxionum causæ.	140
Fluxioni attrahendæ calor maximè idoneus.	145
Fluxiones à capite per quas vias fiunt.	146
Fluxio externa quomodo ab interna dignoscatur.	148
Fluxus hepaticus quid.	704
Fluxus hepatici causa supra communem qualitatum primarum excessum.	705
Fluxus hepatici causæ antecedentes. 705. 706. differentiarum. ibid. signa tum affectus, tum causarum. ibid.	707
Fluxus hepaticus legitimus cur vt plurimum funestus. 708. spurius verò cur non ita exitiosus.	ibid.
Fluxus hepatici curatio.	708
in Fluxu hepatico an locus sit medicamenti purgantibus. 708. an clysteribus.	709
Fluxui hepatico conuenit tinctura rosarum. 709. destillatum restaurans.	711
Fœminæ minus obnoxia angina quam viri.	389
Fœtoris narium causæ. 312. curatio.	313
Formæ inductio & materiæ præparatio ab eodem agente proficiscitur.	713
Fotus in ophthalmia. 232. 234. in pleuritide. 437. in dolore ventriculi. 619. in inflammatione ventriculi. 602. in ileo ab inflammatione. 651. in lienteria. 663. in dysenteria. 647. in tenesmo. 702. in lumbricorum curatione. 728. in hæmorrhoidum fluxu immodico. 732. in dolore hæmorrhoidum.	745
Frigus quomodo sit causa catharri.	147
Frontale in phrenitide. 115. in ophthalmia. 226. in hæmorrhagia.	333

G

- G** Albanetum Paracelsi in colica. 641. eius descriptio.  
 ibid.
- Galenus defensus circa epilepsiæ idiopathicæ causam.  
 77. 78
- Galenii emplastrum ad cohibendam hæmorrhagiam.  
 379
- Galli annosi decoctum ad asthma. 423. 424
- Gargarisma in paralyfi linguæ. 357
- Gargarismata refrigerantia & repellentia in inflammatione linguæ. 346
- Gargarismata in angina. 401
- Genarum ruboris causa in peripneumonia. 447
- Gingivarum erosiones vnde. 375
- Gingivarum vlceribus lienosi maximè obnoxij sunt.  
 375
- Gingivarum putredinem arcet sulphuris & vitrioli spiritus. 376
- ex Gingivis sanguis fluit aliquando salutariter & criticè, aliquando symptomaticè. 377. 378
- Gingivarum erosio in puerilis indicium vermicum esse potest. 718
- Glandulæ cur fluxiones excipiunt. 144. 145
- Glaucoma quid. 184
- Glaucomatis dignotio. ibid.
- Gaussipium vt apparandum ad sordes ophthalmiæ pertinacis. 237
- Grauedinis causæ. 319
- Grauidis mulieribus cur familiaris pica. § 60. cur circa quartum mensem eâ vtplurimum liberantur. § 64
- Guaiaci vsus in paralyfi. § 4. in ventriculo frigido. § 47

# *Index Rerum.*

Guaiacum ex sudorificis in epilepsia præferendum.	85
Gummi arabicum sanguinem sistit.	379
Gurgulionis præcisio.	385.386
Gustus vitia. 352. curatio.	353
Gutta serena.	172
Gutta serena an curabilis.	174
Guttæ serenæ an conueniat phlebotomia.	177

## H

<b>H</b> Abitus corporis qualis frigidam cerebri intemperiem arguat.	6
Hæmatites lapis in hæmoptoë. 471. in phthisi.	497
Hæmoptysis quid propriè.	462
Hæmoptysis causæ. ibid. partis mandantis signa.	463
curatio.	466
Hæmorrhagiæ differentiæ.	321
Hæmorrhagia symptomatica in quibus morbis præcipuè contingit.	321
Hæmorrhagiæ imminentis prognosis.	323.324
Hæmorrhagiâ non rarè morbi acuti soluantur.	326
Hæmorrhagia quæ fit κατ' ἰξιν, bona.	ibid.
Hæmorrhagiæ curatio.	327
in Hæmorrhagia cohibenda an larga manu & amplo foramine venæ sectio fieri debeat.	328
Hæmorrhagia animi deliquio cohibita.	331
Hæmorrhoides melancholicis superuenientes, salutare.	138
Hæmorrhoidalium venarum apertio per hirudines in tenebro.	702
Hæmorrhagiæ salutaris & criticæ per gingiuas eruptio.	377
Hæmorrhoidum fluxus moderatus à quibus morbis præseruet & liberet.	729

# *Index Rerum.*

<b>Hæmorrhoidum fluxus immodici causæ ibid. signa tum</b>	
<b>immoderationis, tum causarum.</b>	730
<b>Hæmorrhoidibus immodicè fluentibus quæ purgantiâ</b>	
<b>conueniant.</b>	731
<b>Hæmorrhoidum fluxum immodicum cohibentia.</b>	734
<b>Hæmorrhoides ligandi, incidendi &amp; vrendi modus ex</b>	
<b>operatione celebri.</b>	735
<b>in Hæmorrhoidum fluxu curando &amp; post curationem</b>	
<b>quæ cautio adhibenda.</b>	737
<b>Hederæ terrestris succus ad dysenteriam.</b>	691
<b>Helleborus omnia medicamenta maniacorum ingredi</b>	
<b>debet.</b>	129
<b>Hemicrania arteriotomiâ curata.</b>	166
<b>Hepar calidum &amp; humidum quomodo pituitam ge-</b>	
<b>neret.</b>	5
<b>Hepate calido &amp; cerebro frigido vt plurimum sunt ca-</b>	
<b>tarrho obnoxij.</b>	148
<b>Hepatis atonia in hepatico fluxu pendet à causa supra</b>	
<b>primarum qualitatum excessum.</b>	704
<b>Hermeticorum doctrina de spiritu dissolvente cibos in</b>	
<b>ventriculo.</b>	554-555
<b>Hermeticorum opinio circa causam sitis auctæ.</b>	567.
<b>circa ventriculi coctionem vitiatam.</b>	572. & seqq.
<b>circa causam cholæræ morbi.</b>	609
<b>Hiepera specifica ventriculo.</b>	544
<b>Hircinus sanguis in pleuritide.</b>	442
<b>Hirudines temporibus &amp; pone aures in maniacis vt-</b>	
<b>lissimæ. 128. in auris inflammatione. 228. in linguæ</b>	
<b>tumore ipsi linguæ affixæ.</b>	348
<b>Hirundinum nidus specificus in angina.</b>	402
<b>Historia de Moniali epileptica satis faceta.</b>	75
<b>Hordeatum mundatum in catarrho.</b>	154
<b>Hormini semen oculum à sordibus purgat.</b>	215
<b>Hydrargyrum maximè dentes denigrat.</b>	373

# *Index Rerum.*

Hydrargyrus in iliaco affectu magna copiâ exhibitus:	
653. 654	
Hydrargyrus crudus an exhiberi possit contra vermes:	
723. & seqq.	
Hydromel ad phthisim.	497
Hydrops pulmonis ab Hippocrate graphicè delineatus.	458
Hydrops abdominis aliquando degenerat in hydropem pulmonis, & vice versa.	458
Hydrops pulmonis signa pathognomonica.	459
in Hydropse pulmonis an lateris apertio facienda.	
460	
Hydropi pulmonis quæ hydragoga conueniant.	461
Hypercatharsi superueniens conuulsio lethalis.	70
Hypercathartica medicamenta.	610
Hypochondriaca melancholia.	137
Hypopyon.	238

## I

Ilei varia nomina.	644
Ileos quid.	645
Ilei causæ.	647
Iliacum affectum quæ signa distinguant à colico dolore.	647
in Ileo an per inferiora aliquid descendat.	648
Ilei causæ & signa.	649
Ileos an semper exitialis, in quo post humores fæces eutomuntur.	649
Ilei curatio.	650
Ileo ab inflammatione conuenit venæsectio.	650. &
inedia.	652
Ileo desperato follis fabrilis & argenti viui vsus an conueniant.	655



# *Index Rerum.*

Imaginatio an lædi possit ratiocinatione illæsa.	105
Inanities quomodo singultum excitare possit.	578
Inappetentiæ causæ. 535. 539. prognos. 539. & seqq. curatio.	541
Inappetentiæ potus causæ.	569
Incrassans blandum humoremque acrem demulcens.	154
Incrassantia humores in catarrho.	153
Infantes lactentes quibus carnes exhibentur cur maxime lumbicis infestantur.	715
Injectio per syringam in anum in fluxu hæmorrhoidum immodico.	734
Inscissus an dysenterię conveniat. 697. in tenesmo.	703
Intemperies simplices cur raræ.	3
Intestinatorum affectus.	631. 632
Intestinum lupi ad colicam.	640
Intestinatorum motus naturalis.	645
Intestinatorum exulcerationis causa est qualitas maligna specifica.	677
Intestina tenuia an crassa afficiantur dignotio.	680. 681
Intestinatorum ulceratorum in dysenteria curatio. 587. & seqq.	
Ira incommoda.	11
Ireos nostratis succus pro vomitu in asthmate.	416
Inguales venæ in angina aperiri possunt.	139
Iulepi refrigerantes in phrenitide.	113
Iulepus sanguinis immodicè fluentis impetum cohibens.	338
Iulepus in sanguinis vomitu. 606. in dolore ventriculi.	619
Iulepi in colica biliosa.	642
Iulepi hepar roborantes in fluxu hepatico.	709
Liniperi baccarum decoctum in alui fluxu.	675
Lustulum in alui adstrictione.	658

# Index Rerum.

## K

<b>K</b> $\iota\tau\lambda\alpha$ quid.	551
$\kappa\omicron\iota\lambda\omega\mu\alpha$ :	242
$\kappa\acute{\alpha}\phi\omega\sigma\iota\varsigma$ .	264

## L

<b>L</b> Ac quibus siticulosis salutare.	568
Lactis vsus in clysteribus ad diarrhœam.	686
Lac putrescens cur non generet vermes.	716
Lactuca oculis infensa.	176
Lanfranci collyrium ad oris & faucium vlcera.	383
Larynx & pharynx propter viciniam in angina vt plurimum afficiuntur.	387
Laryngis vsus & officium:	388
Laryngotonia an in angina administranda.	407
Laudani vsus etiam in clysteribus phreniticorum.	116
Laudani vsus in catarrho calido. 155. in hæmorrhagiâ 337. in dolore dentium. 370. in faucium & oris vlceribus. 382. in vomitu. 594. 596. in cholera morbo 612. in dysentericorum clysteribus. 686. in tenesmo & per os sumptum.	704
Lentiscini ligni decoctum ad cerebrum exsiccandum.	151
Lethargi differentia ab apoplexia, caro & comate:	12
Lethargici quomodo empyici fiant.	27
in Lethargo qualiter purgandum:	32
Leucoma quid.	212
Leucomatis differentia:	ibid.
Lienis noui vsus ex Hermeticis.	573
Linguae affectus. 343. tumores & magnitudo valde excedens:	344

# *Index Rerum.*

Linguae paralyseos causæ. 354. curatio.	357
Linguae tumor carnosus an curationem suscipiat.	358
Linguae ranula.	349
Linguae ulcerum curatio.	354
Linimentum in convulsione.	72.73
Lienosi gingivarum ulceribus obnoxij sunt.	375
Lienosis dysenteria superueniens quæ bona.	682
Lienteria quid.	659
Lienteria an retentricis an concoctricis ventriculi vitio fiat.	ibid.
Lienteria quid differat à cœliaca passione.	659
Lienteriæ causa. 659. & seqq. signa. 662. prognosis & curatio.	ibid.
Lienteriæ quæ purgantia conueniant.	662
Lienteriæ à debilitate ventriculi curatio. 663. quales clysteres conueniant.	664
Lypothymia quid differat à syncope.	507
Lippitudo quid.	217
Liquida cur facilius vel difficilius deglutiuntur in angina.	388
Liquiores cardiaci ad palpitationem.	525
Liquorum acidorum vis.	574
Lochia fluentia phlebotomiam in præcipiti angina an dehortentur.	397
Lohoc in hæmoptoë.	467
Loquelæ instrumentorum cum auditoriis instrumentis consensus.	265
Lotiones pedum in phrenitide ex quibus componantur.	114
Lumbrici quæ mala accersant.	717
Lumbricorum excretio in morbi an salutaris.	719
Lumbricos enecantia.	ibid.
Lumbricis quæ purgantia conueniant. 719.720. quales clysteres.	726.727

# *Index Rerum.*

Lumbrici ad quod genus affectuum præter naturam referendi. 712

Lumbrici lati an vnicus vermis, an ex pluribus conflatus. 713

Lumbricorum causa efficiens. 713. 714. materialis 714

Lumbricis cur maximè infestentur pueri lactentes quibus carnes exhibentur. 715

Lumbrici an ex melle & saccharo possit generari. 717

Lunares radij cerebro maximè infensi. 8

Lupinorum intestinorum puluis in colico dolore. 640

## M

**M** Acies etiam à sanguis copia. 481

Malacia. 551

Malaciæ causa. 559

Mania quid. 122

Maniæ à phrenitide differentia. ibid.

Maniæ causa. 123

Maniæ materia vbi continetur. 125

Maniam significantia. ibid.

Mania affectus est valdè diuturnus. 127

Mania quæ curatu faciliior. ibid.

Maniæ curatio. 128

Maniæ amuletum. 138

Mannæ vsus varius in alui adstrictione. 658

Marcoris variæ causæ. 482. 483

Masticatoria quando conuenians in catarrho. 150

Mastiche sumpta vomitum compefcit. 595

Materiæ præparatio & inductio formæ ab eodem agente proficiscitur. 713

Materia in thoracis cauitate contenta qua transeat vt

# *Index Rerum.*

expectoretur.	430
Maxillarum tumorem in dentium dolore resoluentia,	
372.	
Mel rosaceum cum guttis aliquot spiritus vitrioli ad oris & faucium vlcera.	382
Mel & saccharum an lumbricos generent.	717
Melancholicus humor vt plurimum in hypochondriis cumulatur.	4
Melancholici plerumque fiunt epileptici, & contra.	83
Melancholiam purgantia.	118. 119
Melancholia morbus.	132
Melancholiæ variij gradus.	ibid.
Melancholiæ causa proxima.	133
Melancholia morbus est contumacissimus.	137
Melancholia flagellum Medicorum.	ibid.
Melancholiæ curatio.	138
Mensibus aut lochiis fluentibus in præcipiti angina an mittendus sanguis.	397. 437
Mercurius quomodo præparandus ad epilepsiam.	85
Mercurij inunctione cataracta curata. 203. ophthalmia desperata.	237
Mercurius præcipitatus rubeus ad polypum & sarcoma.	
308	
Mercurius crudus an exhibendus in dysenteria. 692. contra vermes.	723. 724
Mercurij dulcis vsus contra vermes.	725
Mesaraicarum venarum obstructions quæ consequan- tur symptomata.	661
Mespilorum in longo alui profluvio præscriptio quan- tum valuerit Spirinchio Medico.	674
Messorum fulmine extinctorum & rigidorum perma- nentium historia.	512
Miasmata à phthisicis exhalantia contagiosa.	479
Millefolij decoctum in hæmorrhoidum dolore.	747

# *Index Rerum.*

Morbi partim à victu, partim à spiritu.	8
Morsuli ad exsiccandum cerebrum.	155
Motus cur lædi potest illæso sensu, & contra.	52
Motus conuulsivus quomodo differat à conuulsione.	62
Motus depravati symptomata quomodo inter se distinguantur.	ibid.
Motu in omni quinque considerata.	139
Mucosa in dysenteria excreta quid & unde.	678
Musica instrumenta quando melius audiantur.	266
Muti cur surdi ab ortu.	264
Mydriasis quid.	205
Mydriaseos causæ. ibid. curatio.	208
Myrobalani conditi ventriculum roborant.	549
Myrabalanarum decoctum in dysenteria.	683

## N

<b>N</b> arcotica paralysem generantia.	51
Narcoticorum in usu cautio adhibenda.	116
Narcoticorum usus in catarrho calido. 155. in ophthalmia. 228. in aurium dolore. 291. in hæmorrhagia. 337. in dolore dentium. 370. in singultu. 586. in dolore ventriculi etiam mista cum purgante. 621. in clysteribus ad dysenteriam. 686. in tenesmo & per os sumpta, & admota. 704. in fluxu hepatico. 712.	
Narium affectus.	301
Narium in excrescentiis extirpandis quid observandum in causticis.	308
Narium foetoris causæ. 312. curatio.	313
Narium hæmorrhagiæ causæ.	320
Nusca quid.	586
Nervi qualiter affecti in paralysi.	52
Nervorum cum chordis lyrarum comparatio.	65
Nervus quintæ coniugationis rami communes lingue	

# Index Rerum.

& naribus.	165
Nomæ qualia vlcera.	381
Nutritionis perfectæ munia , bene ingerere , digerere , egerere.	631
Nux iuglans & moschata conditæ ventriculum calefaciunt & roborant.	549

## O

<b>O</b> bstuctionum partium infimi ventris symptomata.	141. 146
Oculorum affectus.	167. & seqq.
Oculis amica & aduersa.	175
Oculi prominentes suffusioni obnoxij.	190
Oculo vno tantum inflammato maiores dolores cur fiant, quàm utroque.	212
Oculorum vlcera periculosa & difficilia curatu.	242
Oculi cancer vt curetur.	246
Olea non miscenda in clysteribus phrenitide laborantium.	111
Oleaginosa ventriculum relaxant.	558
Oleum amygdalarum amararum cum aqua arantiorum ad lumbricos.	722
Oleum item ex ligno coryli exsiccato. ibid. & iuniperinum.	723
Olfactus symptomata.	510
Ophthalmia.	217
Ophthalmiæ differentiæ ibid. curatio.	221
Ophthalmia ab vno oculo ad alium sæpe transit.	221
Ophthalmiæ copiosissima sanguinis missio conuenit	223.
Ophthalmiæ initio collyriis repellentibus non utendum.	226
Ophthalmiæ an balneum & vinum conueniant.	232

# *Index Rerum.*

Ophthalmia desperata vnguento mercuriali curata.	237
Opiata cephalica roborans.	20
Opiatis cephalicis quid præcipuè admiscendum.	151
Opiatæ in epilepsia. 84. in mania. 130. in catarrho.	154
in gutta serena. 182. in hæmoptoë.	468
Opiata cardiaca in palpitatione.	526
Opiata cardiaca & restaurans.	530
Opiata in ventriculo frigido.	555
Opiata ad sanguinis vomitum. 606. ad vlcus ventriculi	710
630. in fluxu hepatico.	710
Opiata in lienteria & cœlicata passione. 663. in dysent.	695
Opium tinnitui aurium an adhibendum.	282
Opisthotonos conuulsionis species,	64
Ordo in alimentis sumendis præposterus concoctionem vitiat.	571
Oris tortura species item conuulsionis.	ibid.
Oris variæ collusiones in dolore dentium.	366
Oris vlcerum curatio.	382
Ouum induratum vt apparandum in ophthalmia.	234
in vlceribus corneæ.	245
Ovis induratis aceto Autoris alui fluxus inueteratus curatus.	774
Oxycratî vsus in choibenda hæmorrhagia. 334. 337. in vomitu sanguinis. 605. in cholera morbo. 612. in iliaco affectu.	651
Oxyrrhodina in phrenitide.	111
Ozænæ causa. 302. curatio.	303

## **P**

<b>P</b> Alatum expurgando cerebro cur commodius.	17
Palpitatio cordis malè à quibusdam tremor cordis nominatur.	515



# *Index Rerum.*

Palpitatio cordis & arteriarum ab aliarum partium pal- pitatione multum differt.	ibid.
Palpitatio sympathica frequentior idiopathica.	521
Palpitatio frequens signum est facultatis vitalis admo- dum debilis.	524
Palpitatio idiopathica ut plurimum lethalis.	ibid.
Palpitationis sympathicæ curatio.	524
Pauonis stercus specificum in vertigine.	100
Παράλυσις.	178
Paralysis quid.	47
Paralyseos causa.	48
Paralysis curatu cur difficilis.	55
Paralyti tremor superueniens cur salutaris.	ibid.
Paralyseos crurum & pedum faciliior curatio, quàm partium superiorum.	ibid.
Paralyti an conueniat phlebotomia.	56
Paralytica in parte sudores quomodo eliciendi.	60.61
Paralyseos à bilioso humore curatio.	63
Paroxysmi epileptici signa.	80
Paroxysmus epilepticus aliquando perimit.	83
Paroxysmum epilepticum eurantia.	84
Paraphrenitis quid differat à phrenitide.	108
Pars mandans & recipiens considerandæ in catarrho. 140. & seqq.	
Pastulæ iecori amicæ.	710
Pathematum animi vis, præcipuè iræ & tristitiæ.	11
Pathemata animi sanguinem sursum impellunt.	342
Pelles ventriculum calefacientes.	551
in Pericardio palpitationis causæ satis frequentes.	520
Peripneumonix eadem essentia cum pleuritide.	448
Peripneumonix differentix. 443. causæ.	444
Peripneumonia quæ communia habeat cum pleuritide. 446	
Peripneumonia cur pleuritide peculiarior.	448

# *Index rerum.*

Peripneumoniæ curatio.	449
Peripneumonicis mulieribus, mensibus fluentibus, unde mittendus sanguis.	448
Peristalticus intestinorum motus.	645
Perpiratione insensibili copiosissima fit euacuatio.	144
Pharynx quomodo afficitur in angina.	387
Phlebotomia in omni sanguinis fluxu est remedium reuulsorium.	730
Phlebotomia in phrenitide cur amplo foramine fieri non debet.	110
Phlebotomia liberalissima in ophthalmia facienda.	223
Phlebotomia an dysenterię conueniat.	684
Phrenitidi superueniens conuulsio lethalis.	70
Phrenitis quid.	103
Phrenitidis differentiæ. 106. causæ.	ibid.
Phrenitis cur ut plurimum lethalis.	109
Phrenitidis curatio.	ibid.
Phrenitidi an purgatio conueniat.	111
in Phrenitide topica refrigerantia cautè adhibenda.	112.
Phreniticis cur interdum vrina supprimitur.	118
Phthiſeos imminentis causæ. 475. & seqq. signa. 483. incipientis. 486. confirmatæ.	489
Phthiſis inter hæreditarios morbos principem locum obtinet.	477
Phthiſeos curatio.	492
Phthiſis an conueniat balneum aquæ dulcis.	503
Phthiſim sæpe euenitur catarrhus contumax in pulmonem defluens.	491
Phthiſeos deploratæ signa.	492
Picæ morbi causa.	559
Pica virginibus chlorosi laborantibus & grauidis cur familiaris.	560

# *Index Rerum.*

Picam quæ noxæ & incommoda sequantur.	564
Pilulæ pituitam purgantes.	12.13.19
Pilulæ in paralyfi.	57
Pilulæ in catarrho falfo.	155
Pilulæ ad dolorem capitis. 161. 162. in gurtâ ferena.	178
181. in tumore molli & laxo linguæ.	347
Pilulæ de bdellio celebratæ in fluxu hæmorrhoidum immodico. 731. 732. in dolore hæmorrhoidum.	748
Pilularum de cynogloffo vfus in clyfteribus ad dyfenteriam.	686
Pinguia ventriculum relaxant.	55
Pituitæ metropolis cerebrum.	3
Pituita quomodo attrahatur à capite & pulmone.	145
Pituitam producentia.	4
Pituitæ an conueniat venæ feftio.	12
Pituitam purgantia.	12.13.19
Pituitam præparantia.	13
Pituita acris & falfa catharri ferini caufa.	476
Pituita paralyfim efficiens quid differat ab ea quæ conuulfionem.	64
Pleuritidis differentiæ.	425
ad Pleuritidem notham qui dolores referantur.	426
in Pleuritide vera quæ partes efficiantur.	ibid.
Pleuritis in quibus conueniat cum peripneumonia.	ibid.
Pleuritidis caufa.	427.428
Pleuritidis figna pathognomonica.	429
Pleuritis fputia quomodo diftinguatur à legitima.	442
Pleuritidis figna funefta. 433. falutaria.	434
in Pleuritide diarrhœæ quando mala.	ibid.
in Pleuritide an femper mittendus fanguis vfque ad mutationem coloris.	436
Pleuritidi topica conuenientia.	437. & feqq.
Pleuritidi narcotica an conueniant.	439

# *Index Rerum.*

in Pleuritide quando purgandum.	440
Pleuritidi specifica.	441
Podagricis dysenteria superueniens cur bona.	682
Pœoniæ semen & radix ad epilepsiam specifica.	85
Polypi causa & curatio.	306
Potio licet sordida in colica biliosa quæ in paralyfim degenerat.	644
Potus in appetentiæ causæ.	569
Prægnantibus cur familiaris pica.	560
Priapismus quid.	64
Πτερυγίδες qui-	480
Puerilis epilepsię curatio.	90
in Pueris inappetentia cur grauior quam in alia ætate.	540
Pueri lactentes quibus carnes exhibentur cur à lumbricis maximè infestentur.	715
Pulmo cur fluxionem facillè excipit.	145
Pulmones in angina sæpe afficiuntur.	392
Pulmonis affectus tum in substantia, tum in vasis.	140
Pulmo an semper afficiatur in pleuritide.	426
per Pulmonem transsumpta materia per anacatharsim expurgata, quomodo & per quas vias.	430
Pulmonis hydrops ab Hippocrate graphicè descriptus.	458
Pulmonem exulcerantia.	476.477
Pulmonum vitiosa constitutio vnde.	478
Pulmonis tuberculum.	ibid.
Pulmones veruecini calentes applicati in conuulsione.	
72. in Phrenitide. 117. in abscessus cerebri declinatione. 122. in fluxu hæmorrhoidum podici admoti.	
734	
Pulmo hædinus calens admotus in dolore hæmorrhoidum.	747
Pulsus purus in pleuritide vnde.	230

# *Index Rerum.*

Pulsus magnus, languidus & mollis in peripneumonia.	
446	
Pulveres cerebrum roborantes.	18
Pulvis digestivus.	21
Pulvis ducis.	549
Pulveris de gutteta descriptio. 91. vsus in epilepsia puerorum.	91
Pulvis ad oculorum vlcera.	243
Pulveres cur in vuula relaxata commodiores, quam gargarismi.	383
Pulveres ad sputum sanguinis. 470. ad phthisim.	499
Pulvis ad singultum. 582. ad vomitum. 597. ad vomitum sanguinis. 605. ad ventriculi vlcus. 630. in dysenteria.	693
Pulvis adstringens in diarrhœa.	673
Pulveres ad lumbricos.	721
Punctorius dolor proprius membranarum.	249
Pupillæ dilatationis causæ.	205
Pupillæ angustia. 209. causæ.	ibid.
Pus empyicorum quæ expurgatur.	454

## Q

**Q**uartana febris epilepsiam aliquando solvit.  
84

## R

**R**anula quid. 349. quæ tumoris species. 349  
Ranula raro sine operatione chirurgica curatur.  
ibid.  
Raparum vsus frequens oculos reddit acutiores. 175  
Ratiocinatio an lædi possit non laesa imaginatione.  
104. 105.

# Index Rerum.

Raucedo quid.	145
Refrigerantia topica in phrenitide cautè adhibenda.	
112	
Repletio & inanitio conuulsionis causæ.	67, 68
Respirationis læsæ causæ & differentiæ.	410, 411
Restaurans destillatum.	528
Retentionem ventriculi quæ adiuuent.	674
P <sup>re</sup> æ causæ.	320, 321
Rhabarbarum specificum in dysent. 683. in fluxu hepatico. 703. in vermium curatione.	719
Rhabarbaro varij vtendi modi.	683, 684
Rhagades ani 739. quid differant ab hæmorrhoidibus.	
ibid.	
Rhyadis curatio.	254
Rosarum tinctura præstantissima in fluxu hepatico.	709
Ruboris genarum in peripneumonia causa.	447

## S

<b>S</b> accharum & mel an lumbricos generent.	717
Saccharum rosatum vtilissimum phthificis.	496
Sacehari oleum ad asthma.	421
Sacculi ventriculum calefacientes. 550. 551. roborantes. 663. anodynî in tenesmo.	702
Salis vitrioli vomitui vsus in pueris comate affectis.	33
Salis Saturni vsus in ophthalmia. 230. in dysenteria.	
687	
Sal absinthij in vomitu.	596
Sanguinis fluxui copioso superueniens conuulsio lethalis.	70
Sanguis copiosissimè detrahendus in ophthalmia.	128
vt & in mania.	223
Sanguinem fluentem cohibentia.	228. & seqq.
Sanguis fluxus in sartagine fixus specificus ad sisten-	

# *Index Rerum.*

dam hæmorrhagiam.	339
Sanguis criticè & symptomaticè interdum fluit è gingi- uis.	377-378
Sanguinis stillæ è naribus cur malæ.	326
Sanguis mittendus initio pleuritidis senibus, pueris, gravidis, puerperis, menstruis in purgationibus.	437
Sanguis spumofus an tantum à pulmone,	464
Sanguinem concretum diffoluentia.	472
à Sanguinis copia corpus emaciari potest.	481
Sanguinis congelationis causæ.	511
Sanguinem fluentem cohibentia.	328. & seqq.
Sanguinolentum sputum an signum pathognomoni- cum pleuritidis.	430
Sanguis columbinus ad suffusionem. 198. ad suggilla- tionem,	216
Sanguis feruidus iniectus, in dysenteria. 699. in fluxu hæmorrhoidum immodico.	734
Sarcoma quid,	306
Sarcomatis causa.	ibid.
Sassafras decoctum ad ventriculum frigidum.	547
Scorbutus nostris in regionibus rarus, sed scorbuticæ quædam affectiones latis frequentes.	50
Semicupium ex decocto emollientium in adstrictione alui. 6, 8 in tenefino.	703
Senes cur dysenteria sæpius pereunt, quam in media ætate constituti.	682
Serosus humor præcipua doloris dentium causa.	362
Setacei laus in epilepsia. 87. in phthisi.	494
Seminis contra vermes laus & vtendi modi.	721
Sinapismorum vsus in paralyfi.	58
Sincera deiectiones cur malæ,	541
Singultus motus conuulsius potius est, quam conuul- sio.	577
Singultus causæ,	ibid.

# *Index rerum.*

Singultum quomodo excitare possit inanitio.	578
Singultus quis perniciosus.	579
Singultui vomitus superueniens, salutaris.	584
Sitis deprauatæ differentiæ.	566
Sitis quæ à grauibus & periculosis morbis dependet, periculosa.	568
Solida cur facilius vel difficilius deglutiuntur.	388
Somni longi præsertim à cibo pituitam generant.	4
Somni præternaturalis differentiæ.	22
Somnum conciliantia.	115
Sonus per apertum os quomodo excipitur.	266
Sonitus aurium causæ. 277. & seqq. differentiæ.	279
Soporosi affectus. 21. cur in senibus valdè periculosi.	26
Soporosorum affectuum curatio.	28
Spasmus cynicus.	64
Specilla visum conseruantia.	204
Sphacelus cerebri.	119
Spica nardi specifica ad hæmorrhagiam sistendam.	338
Spiritus flatuosus conuulsionis causa.	68
Spiritus congelantis vis & effectus.	45. 46
Spiritus vnde maligna qualitate afficiuntur.	102
Spirituum tenebrositas in melancholia.	134. 135
Spiritus cum magna copia ad partem aliquam deferitur sanguinem secum transfert.	393
Spirituum defectus causæ in syncope.	508
Spiritus dissoluens causa boulimiæ, ex Hermeticis.	554
Spirituum dissoluentium vis.	573. 574
Spirituum congelantium & fixantium vis, ex Spagyri- cis.	511
Spiritus tartari in paralyfi.	61
Spiritus sulphuris & vitrioli in fluxionibus. 155. in asthmate. 421. contra vermes.	726
Spiritus vini fanem caninam soluit.	558.



# *Index rerum.*

<b>Spiritus sitibūdi ex Hermeticis,causæ sitis morbosæ.</b>	567
Spiritus vini ad fotum in ileo à flatibus.	655
Spumofus sanguis an tantum à pulmone.	474
Sputum cruentum an sit signum pathognomonicum pleuritis.	430
Sputi sanguinis causæ.45 z. curatio.	466
Stercus pavonis specificum in vertigine.	100
Stercus porcinum & asininum in hæmorrhagia sistende.338.equinum & gallinæ in pleuritide. 442. equinum item in colica.	664
Stercorosus fluxus.	666
Sternutatoriorum formulæ in catarrho.	150.151
Sternutatoria an conueniant in apoplexia.	36
Sternutationis causæ.	326
Sternutatio aliquando symptomatica.	53
Sternutatio à qua facultate editur.	316
Sternutationis curatio quando necessaria est.	319
Stomatica medicamenta.	382
Strabismus quid.	64
Strumis laborantium mesenterium vt plurimum glandulis refertum est.	483.662
Subeth Auicennæ.	22
Succini albi oleū in epilepsia. 89.in dolore capitis.163	
Suctionis in ventriculo sensum impediencia.	537
Sudorificorum vtilitas ad cerebri intemperiem frigidam humidam. 14. in cephalæa.162. in epilepsia.85 in gutta serena.179.in hydrope pulmonis.	461
Sudores mouentia.	61
Sudoribus nocturnis phthysici vt plurimum diuexantur.	487
Suffitus in corrigenda frigida humida cerebri intemperie. 7. in coryza.	315
Suffitus in auris surditate.	179
Suffocans catarrhus.	146

# *Index Rerum.*

Suffumigia cephalica. 252. in vlcere pulmonis.	501
Suffusio quid.	184
Suffusionis curatio.	194
Suggillationis in oculo curatio.	216
Sulphuris spiritus in fluxionibus.	155
Sulphuris oleum in oris & linguæ vlceribus.	354
Sulphuris spiritus in asthma.	421
Sulphuris flores in phthisi.	500
Suppositoria ad dolorem hæmorrhoidum.	747
Suppurationis in thorace causæ & signa.	451
Suppurati quæ euadant.	454
Surdi ab ortu cur muti.	264
Surditatis causæ. 265. curatio.	268
Surditati confert spiritus vini helleboratus. 274. pinguedo anguillæ.	274
Surdastrî cur aperto ore loquentium sermones excipiunt.	266
Syncope hæmorrhagiâ immoderatâ cohibita.	331
Syncope quid. 506. quid differat ab asphyxia.	507
Syncopes curatio.	514. 515
Syncopes morte subsequuta historia notabilis in nobili virgine Monspeliensi. 510. & in alia à sanguine circa cor congelato.	511
Syncopæ qui magis obnoxij.	518
Syntecticæ diarrhœæ causæ.	666
Syrupus magistralis cephalicus. 19. in dolore capitis.	161
Syrupus de peto ad epilepsiam.	86
Syrupus ad sistendam hæmorrhagiam inueteratam.	340
Syrupi ad asthma. 420. ad hæmoptoën.	468. 474
Syrupi ad phthisim.	467
Syrupi in ventriculo frigido.	545. 546
Syrupi de absinthio descriptio.	546

# *Index Rerum.*

Syrupi in ventriculi phlegmone.	627
Syrupus in diarrhoea biliosa. 672. 673. in dysenteria.	690
Syrupus corallorum ad iecur roborandum & fluxum côhibendum.	710

## T

<b>T</b> Abaci cinis dentes abstergit & dealbat.	364
Tabellæ in mania. 130. ad asthma. 422. in hæmo- ptoc. 471. in ventriculo frigidus.	547
Tabellæ triasantali in diarrhoea.	673
Tabifici pulmones.	476. 477
Tabifica confirmatio.	180. 185
Tabis differentia.	480
Tabis signa.	483
Tactus symptomata.	2
Tapfi barbati vsus in dolore hæmorrhoidum.	747. 748
Taraxis quid.	220
Tempus in assumendis alimentis præposterum ventri- culi coctionem vitiat.	571
Tenesmus quid. 700. in quo differat à dysenteria.	ibid.
cur grauidis abortum faciat.	701
Terebellum extremum remedium in epilepsia.	681
Terebinthinæ vsus in asthmate. 421. in empyemate.	455
in ventriculo expurgando. 545. in inflammatione ventriculi.	627
Tetanos quid.	64
Theriace vsus in fame canina. 558. in cholera mor- bo.	612
Thermæ sulphureæ, nitrosæ & bituminosæ in febri intemperie frigida humida. 22. in cephalæa. 162. in surditate. 274. in ventriculo frigidus.	547
Tinctura rosarum ad formam syrupi redacta præstan- tissima in fluxu hepatico.	706

# *Index Rerum.*

Thoracis morbi.	409
Thoracis praua conformatio ad tabern procliuus.	484
Tinnitus aurium diuturnus in surditatem degenerat.	281
Tonicus motus quis.	64
Topica, non euacuato toto corpore, non sunt adhibenda.	393
Transpiratione insensibili quanta fiat euacuatio.	144
Trauli qui.	136
Tremor quid.	101
Tremoris causæ.	102
Trismus quid.	64
Tristitiæ incommoda.	11
Trochisci caput exsiccantes.	155
Trochisci ad vlcus ventriculi.	630
Tuberculum pulmonis duplex.	478
Tuberculum in pulmonum arteriis prope cor causa palpitationis & interitus in Antipatro medico.	520
Tussis cur excitetur dum auris interior vellicatur.	265
Typhomania quid.	41

## V

<b>V</b> alerianæ sylvestris radice laus in epilepsia.	88. 93
Vapor occulta qualitate molestus inter causas palpitationis cordis.	520
Vapor melancholicus vt plurimum causa catalepticos.	45
Varices melancholicis superuenientes salutare.	138
Vasis brevis vsus.	601
Venenatum quid in mania.	124
Ventriculi affectus.	534
Ventriculi calida intemperie laborantis curatio.	542
Ventriculum purgantia.	544
Ventriculum calefacientia & roborantia.	545. & seqq.

# *Index Rerum.*

Ventriculi coctio quibus causis lædatur.	569. & seqq.
Ventriculi motus expulsiui triplices.	577
Ventriculi motus naturalis sit versus pylorum & intestina, motus præternaturalis contra.	587
Ventriculus cur <i>καρδία</i> à veteribus vocatus.	614
Ventriculi doloris causæ.	ibid.
Ventriculi dolor cur variis temporibus exacerbatur.	
617	
Ventriculi dolor quando minetur periculum.	617
Ventriculi doloris curatio.	613
Ventriculi phlegmones causæ & signa.	628
Ventriculi phlegmone quando in abscessum degeneret.	
24	
Ventriculi vlcerum causæ & prognosis.	625
Ventriculo inflammato an purgandum.	626
Ventriculi vlceris curatio.	629
Ventris inunctio ex vnguento de arthanita & mercurio crudo in lumbricis.	720
Vermes aliquando doloris dentium causa.	362.
Vermium genera.	712
Vermes non rarò exitiosi sunt.	717
Vermes excreti in morbis an salutare.	719
Vermes an ex lacte in infantibus lactentibus generentur.	717
Vermium curatio.	719
Verminosi affectus quibus expugnandi.	720. & seqq.
Vertigo quid.	95
Vertiginis differentia.	95. 97
Vertiginis causa proxima.	95
Vertiginis sympathicæ signa.	98
Vertigo quæ imminentem epilepsiam, præfagit.	99
Vesicatorij vsus in catarrho scapulis, cervici & pone aures. 150. 156. in dolore capitis atroci. 166. in gutta serena. 182. in epiphora. 256. in angina. 399. in	

# *Index Rerum.*

peripneumonia.	450
Vigiliarum noxa.	10
Vinum helleboratum in mania.	119
Vinum an in gutta serena conueniat.	176
Vinum euphrasitarum.	176
Vinum an ophthalmia conueniat.	233
Vinum purgans in asthma.	414
Vinum absinthites in ventriculo frigido.	345
Vini calidi vsus in ventriculi intemperie frigida.	548
Vinum meracum famem caninam soluit.	558
Virginibus chlorosi laborantibus cur. familiaris pica.	560
Viri magis obnoxij anginae quam foeminae.	389
Virium imbecillitas in quo differat à syncope.	527
Viscus quercinus specificus in epilepsia.	85
Visibilia obiecta cur duplicia apparent visu deprauato.	185
Visum conseruantia specilla.	204
Vitrei humoris affectus.	182
Vitrioli spiritus in fluxionibus.	155
Vitrioli vsti & vitrioli albi vsus in sistenda hæmorrhagia.	336. 371
Vitrioli oleum ad vlcera oris & linguae.	354
Vlcera phagedænica quæ.	552
Vlceris narium curatio.	304
Vocem articulatam cur non edant surdi ab ortu.	262
Voluntarij motus symptomata.	5
Vnguentum ad spinam dorsi inungendam in paralyfi.	59
Vnguento mercuriali cataracta curata.	203.
ophthalmia desperata.	237
Vnguentum magistrale in cataracta.	202
Vnguenta varia in ophthalmia.	230. 231

# *Index Rerum.*

Vnguentum ventriculum roborans.	342
Vnguentum de arthanita pro inunctione totius ventris in vermibus.	725
Vnguis oculi causæ. 259. curatio.	260
Voluulus cur appellatus ileos.	645
Vomina pulmonis derepente rupta multos è medio su- stulit.	478
Vomitória affectibus soporosis coueniant. 33. pa- ralysi. 58. asthmati.	416
Vomitús differentia. 587. causæ.	588
Vomitús imminentis sina.	591
Vomitús longo alui profluuió superueniens bonus.	592
Vomitús sinceri & impermixti in acutis febribus cur mali.	593
Vomitús quando vomitu curetur.	594
Vomitúi vehementissimo laudanum cum pilulis co- chiis.	594
Vomitum cohibentia.	595
Vomitús sanguinis causæ.	599. 601
Vomitús sanguis à quibus partibus manare potest. 600. 602.	
Vomitús sanguinis cur periculosus.	602
Vomitum sanguinis cohibentia.	606
Vomitúi sanginis quæ purgantia conueniant.	607
Vrina cur in phrenitide aliquando supprimitur 118	
Vrinam prouocantia.	ibid.
Vrinarum critica profusio quibus contingat.	667
Vrticis viridibus membrum resolutum percutiendum. 58	
Vrticæ succus in sistendo sanguine.	338. 469
Vrtica contusa maxillæ admota cito dentium dolorem soluit.	372

*Index Rerum.*

Vuæ tunicæ affectus.	205
Vulturis pellis ventrem calefacit.	550
Vuulæ relaxatæ causa & curatio.	384
Vuula quomodo & quam cautè præscindenda.	385.
386.	

*F I N I S.*





